


**UNIVERSIDADE DE LISBOA
FACULDADE DE LETRAS
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA**



**ESTUDO FITOGEOGRÁFICO DOS JARDINS, PARQUES E
QUINTAS DO CONCELHO DO FUNCHAL
(Anexos)**

José Raimundo Gomes Quintal

**Dissertação apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa,
sob a orientação da Professora Doutora Maria Eugénia Soares de Albergaria Moreira,
para a obtenção do grau de Doutor em Geografia, especialidade de Geografia Física**

2007

Índice

Anexo 1 - CARACTERIZAÇÃO FITOGEOGRÁFICA DO JARDIM MUNICIPAL.....	5
Anexo 2 - CARACTERIZAÇÃO FITOGEOGRÁFICA DO PARQUE DE SANTA CATARINA	14
Anexo 3 - CARACTERIZAÇÃO FITOGEOGRÁFICA DO PARQUE MUNICIPAL DO MONTE.....	25
Anexo 4 - CARACTERIZAÇÃO FITOGEOGRÁFICA DO PASSEIO PÚBLICO MARÍTIMO	43
Anexo 5 - CARACTERIZAÇÃO FITOGEOGRÁFICA DA MATA DA NAZARÉ	55
Anexo 6 - CARACTERIZAÇÃO FITOGEOGRÁFICA DO JARDIM DO CAMPO DA BARCA	60
Anexo 7 - CARACTERIZAÇÃO FITOGEOGRÁFICA DO JARDIM MIRADOURO DA VILA GUIDA.....	63
Anexo 8 - CARACTERIZAÇÃO FITOGEOGRÁFICA DO JARDIM DO ALMIRANTE REIS.....	67
Anexo 9 - CARACTERIZAÇÃO FITOGEOGRÁFICA DO JARDIM DO CONSERVATÓRIO – ESCOLA DE ARTES	69
Anexo 10 - CARACTERIZAÇÃO FITOGEOGRÁFICA DO JARDIM DE SANTA LUZIA	75
Anexo 11 - CARACTERIZAÇÃO FITOGEOGRÁFICA DOS JARDINS DO TECNOPÓLO.....	82
Anexo 12 - CARACTERIZAÇÃO FITOGEOGRÁFICA DO JARDIM DA POUSADA DA JUVENTUDE	107
Anexo 13 - CARACTERIZAÇÃO FITOGEOGRÁFICA DA QUINTA DAS CRUZES	115
Anexo 14 - CARACTERIZAÇÃO FITOGEOGRÁFICA DA QUINTA DO POÇO	127
Anexo 15 - CARACTERIZAÇÃO FITOGEOGRÁFICA DA QUINTA MAGNÓLIA	136
Anexo 16 - CARACTERIZAÇÃO FITOGEOGRÁFICA DA QUINTA VIGIA.....	150
Anexo 17 - CARACTERIZAÇÃO FITOGEOGRÁFICA DA QUINTA VILA PASSOS.....	163
Anexo 18 - CARACTERIZAÇÃO FITOGEOGRÁFICA DA QUINTA DO PALHEIRO FERREIRO	169
Anexo 19 - CARACTERIZAÇÃO FITOGEOGRÁFICA DA QUINTA MONTE PALACE	198
Anexo 20 - CARACTERIZAÇÃO FITOGEOGRÁFICA DA QUINTA PALMEIRA	224
Anexo 21 - CARACTERIZAÇÃO FITOGEOGRÁFICA DA QUINTA JARDINS DO IMPERADOR.....	244
Anexo 22 - CARACTERIZAÇÃO FITOGEOGRÁFICA DO HOSPÍCIO PRINCESA D. MARIA AMÉLIA.....	258
Anexo 23 - CARACTERIZAÇÃO FITOGEOGRÁFICA DA ESTALAGEM JARDINS DO LAGO	264
Anexo 24 - CARACTERIZAÇÃO FITOGEOGRÁFICA DA ESTALAGEM QUINTA DA BELA VISTA	285
Anexo 25 - CARACTERIZAÇÃO FITOGEOGRÁFICA DO JARDIM DO HOTEL CLIFF BAY.....	295
Anexo 26 - CARACTERIZAÇÃO FITOGEOGRÁFICA DO JARDIM DO HOTEL PESTANA CASINO PARK.....	305

Anexo 27 - CARACTERIZAÇÃO FITOGEOGRÁFICA DO JARDIM DO HOTEL PESTANA VILLAGE	313
Anexo 28 - CARACTERIZAÇÃO FITOGEOGRÁFICA DO JARDIM DO HOTEL QUINTA DAS VISTAS	334
Anexo 29 - CARACTERIZAÇÃO FITOGEOGRÁFICA DO JARDIM DO HOTEL REID	344
Anexo 30 - CARACTERIZAÇÃO FITOGEOGRÁFICA DO JARDIM DO HOTEL SAVOY	369
Anexo 31 - CARACTERIZAÇÃO FITOGEOGRÁFICA DO CEMITÉRIO DE SÃO GONÇALO	382
Anexo 32 - CARACTERIZAÇÃO FITOGEOGRÁFICA DO CEMITÉRIO DE SÃO MARTINHO	385
Anexo 33 - CARACTERIZAÇÃO FITOGEOGRÁFICA DO CEMITÉRIO INGLÊS	391
Anexo 34 - CARACTERIZAÇÃO FITOGEOGRÁFICA DOS ESPAÇOS VERDES DO CONCELHO DO FUNCHAL	398
Anexo 35 - ÍNDICE DE FREQUÊNCIA ESPECÍFICA	499

Anexo 1
CARACTERIZAÇÃO FITOGEGRÁFICA DO JARDIM MUNICIPAL

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitoceográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Abelia x grandiflora</i> (André) Rehd.	Caprifoliaceae	Abélia	Hortícola	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z5	C11(3); C12(2); C16(1);
<i>Acacia farnesiana</i> (L.) Willd.	Leguminosae (Mimosoideae)	Aromeira	Neotropical	Perenifólio	1-12	7-2	Micro.	Árvore	Z11	C10(1)
<i>Acalypha wilkesiana</i> Muell. Arg.	Euphorbiaceae	Acálifa; Folha-de-cobre	Oceânia	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C1(3); C9 (2); C15(5); C16(3); C17(1); C20(1)
<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	Aceraceae	Sicómoro	Paleártico	Caducifólio	4-11	4	Meso.	Árvore	Z5	C6 (1)
<i>Aechmea nudicaulis</i> (L.) Griseb.	Bromeliaceae	Bromélia	Neotropical	Perenifólio	1-12	12-4	Hemi.	Herbácea	Z10	C18(grupo)
<i>Agathis robusta</i> (C. Moore ex. F. Muell.) Bail.	Araucariaceae	Pinheiro-de-damara; Pinheiro-folha-de-alegra-campo	Australiano	Perenifólio	1-12	3-4	Meso.	Árvore	Z9	C5(2); C11(1); C12(2); C13(1); C19(1);
<i>Agave americana</i> L.	Agavaceae	Agave; Piteira	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-8	Hemi.	Herbácea suculenta	Z9	C20(1)
<i>Agave attenuata</i> Salm-Dyck	Agavaceae	Piteira; Agave-pescoço-de-cisne	Neotropical	Perenifólio	1-12	12-3	Nano.	Árvore suculenta	Z9	C11(7); C12(1); C18(2); C20(14);
<i>Ageratina adenophora</i> (Spreng.) R. King. & H. Robinson	Compositae	Abundância	Neotropical	Perenifólio	1-12	3-7	Nano.	Herbácea	Z10	C18(grupo)
<i>Ageratum houstonianum</i> Mill.	Compositae		Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Terófito	Herbácea	Z8	C6(grupo)
<i>Albizia saman</i> F. Muell.	Leguminosae (Mimosoidae)	Enterolóbio; Samaneiro; Árvore-da-chuva	Neotropical	Caducifólio	4-12	7-11	Meso.	Árvore	Z9	C5 (1)
<i>Alcea rosea</i> L.	Malvaceae	Malvas	Paleártico	Sazonal	3-10	5-9	Terófito	Herbácea	Z4	C7(grupo)
<i>Alpinia zerumbet</i> (Pers.) B. L. Burtt & Rosemary M. Sm.	Zingiberaceae	Alpínia; Lírio-de-porcelana	Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C20 (1)
<i>Alstroemeria ligtu</i> L.	Liliaceae (Alstroemeriaceae)	Alstroemeria; Açucena-do-peru	Neotropical	Sazonal	4-10	5-9	Geófito	Herbácea	Z8	C10(grupo);
<i>Alstroemeria psittacina</i> Lehm.	Liliaceae (Alstroemeriaceae)	Alstroemeria; Açucena-do-peru	Neotropical	Sazonal	4-10	5-9	Geófito	Herbácea	Z8	C3(20)
<i>Alternanthera ficoidea</i> (L.) R. Br.	Polygonaceae	Piriquitos	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Caméfito	Herbácea	Z10	C7(grupo)
<i>Ananas comosus</i> (L.) Merr.	Bromeliaceae	Ananás	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-7	Hemi.	Herbácea	Z11	C18(7)
<i>Angiopteris evecta</i> (Forst.) Hoffm.	Marattiaceae	Feto-craca	Indomalaio; Australiano	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z10	C18(1)
<i>Apollonias barbuja</i> (Cav.) Bomm.	Lauraceae	Barbusano	Paleártico	Perenifólio	1-12	9-3	Meso.	Árvore	Z10	C2(1), C17(1)
<i>Araucaria bidwillii</i> Hook. f.	Araucariaceae	Araucária-de-bidwill	Australiano	Perenifólio	1-12	2-3	Meso.	Árvore	Z9	C18(1)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Araucaria columnaris</i> (Forst. f.) Hook.	Araucariaceae	Pinheiro-da-nova-caledônia; Araucária	Oceânia	Perenifólio	1-12	5-7	Macro.	Árvore	Z10	C16(1)
<i>Araucaria heterophylla</i> (Salisb.) Franco	Araucariaceae	Araucária	Oceânia	Perenifólio	1-12	2-3	Macro.	Árvore	Z9	C1(1), C2(1)
<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> H. A. Wendl. & Drude.	Palmae	Palmeira- elegante	Australiano	Perenifólio	1-12	2-10	Meso.	Árvore	Z10	C16(1)
<i>Argyranthemum frutescens</i> (L.) Schultz-Bip.	Compositae	Estreleiras; Pampilhos; Malmequeres	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C2(8), C4 (grupo), C6(grupo), C16(3)
<i>Asparagus setaceus</i> (Kunth) Jassop	Liliaceae (Asparagaceae)	Espargo-de-folha-miúda; Esparto	Africotropical	Perenifólio	1-12	9-12	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z9	C7(2);C18(2); C20(1)
<i>Aspidistra elatior</i> Bl.	Liliaceae (Convallariaceae)	Aspidistra	Paleártico	Perenifólio	1-12	6-7	Hemi.	Herbácea	Z8	C11(6)
<i>Bambusa vulgaris</i> Schräd. ex Wendl.	Gramineae	Bambu	Paleártico; Indomalaio	Perenifólio	1-12	Não floriu**	Hemi.	Herbácea	Z10	C18 (grupo)
<i>Begonia x ricinifolia</i> A. Dietr.	Begoniaceae	Corações; Begónias	Hortícola	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C4, C7, C10 (grupo)
<i>Bergenia crassifolia</i> (L.) Fritsch.	Saxifragaceae	Bergénia; Couve-de- jardim	Paleártico	Perenifólio	1-12	11-4	Caméfito	Herbácea	Z3	C2(20);C8 (grupo); C18(grupo)
<i>Bougainvillea glabra</i> Choisy	Nyctaginaceae	Buganvília	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	C7(1), C16(1)
<i>Brachychiton acerifolius</i> Cunn. ex. F. Muell.	Sterculiaceae	Árvore-do- fogo	Australiano	Caducifólio	1-5; 8-12	5-8	Micro.	Árvore	Z10	C4(1), C13(1)
<i>Brahea armata</i> S. Wats.	Palmae	Palmeira-azul	Neártico; Neotropical	Perenifólio	1-12	7-8	Micro.	Árvore	Z9	C18(1)
<i>Breynia nivosa</i> (W.G. Sm.) Small.	Euphorbiaceae		Oceânia	Perenifólio	1-12	7-8	Nano.	Arbusto	Z11	C16(1)
<i>Brugmansia versicolor</i> Lagerh.	Solanaceae	Trombeteira	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C6(1), C9 (1),C16(3), C20(2)
<i>Brugmansia x candida</i> Pers.	Solanaceae		Hortícola	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C7(1),C11(1),C18(2),C22(1)
<i>Brunfelsia pauciflora</i> (Cham. & Scltd.) Benth.	Solanaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	2-10	Micro.	Arbusto	Z10	C19(1)
<i>Butea monosperma</i> (Lamb.) Taub.	Leguminosae (Papilionoideae)		Indomalaio	Caducifólio	6-3	5-7	Micro.	Árvore	Z10	C9(1)
<i>Butia capitata</i> (Mart.) Becc.	Palmae		Neotropical	Perenifólio	1-12	5-8	Micro.	Árvore	Z10	C20(1)
<i>Calendula officinalis</i> L.	Compositae	Calendula	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Terófito	Herbácea	Z6	C6,C7(grupo)
<i>Callistemon viminalis</i> (Sol. ex Gaertn.) G. Don ex Loud.	Myrtaceae	Martinete- chorão	Australiano	Perenifólio	1-12	3-7	Micro.	Arbusto	Z9	C21(2)
<i>Callistephus chinensis</i> (L.) Nees.	Compositae	Não-me-deixes	Paleártico	Sazonal	3-12	4-12	Terófito	Herbácea	Z6	C6, C7(grupo)
<i>Calodendrum capense</i> (L. f.) Thunb.	Rutaceae	Castanheiro-do-cabo	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	3-6	Micro.	Árvore	Z9	C6(1)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Campsis x tagliabuana</i> (Vis.) Rehd.	Bignoniaceae	Campsis	Hortícola	Caducifólio	5-12	5-8	Fane. trep.	Árbusto trepador	Z6	C5(1), C7(1)
<i>Canna indica</i> L.	Cannaceae	Canas-da-índia; Bananeiras-de-flor	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Geófito	Herbácea	Z9	C17(grupo)
<i>Canna x generalis</i> L. H. Bail.	Cannaceae	Canas-da-índia; Bananeiras-de-flor	Hortícola	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z9	C1, C2, C7, C9, C17, C18,C20 (grupo)
<i>Carica papaya</i> L.	Caricaceae	Papaieira	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Árvore	Z10	C13(1)
<i>Cassia ferruginea</i> (Schräd.) Schräd ex DC.	Leguminosae (Caesalpinoideae)	Cássia	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-7	Meso.	Árvore	Z10	C2(1)
<i>Celtis australis</i> L.	Ulmaceae	Lódão-bastardo; Conteira	Paleártico	Caducifólio	4-1	5-6	Meso.	Árvore	Z8	C17(1)
<i>Chamaedorea elegans</i> Mart.	Palmae	Palmeira-de-salão; Palmeira-bambu	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-6	Micro.	Árbusto	Z10	C8(grupo)
<i>Chambeyronia macrocarpa</i> (Brongn.) Vieill. ex Becc.	Palmae	Palmeira-rubra	Oceânia	Perenifólio	1-12	1-2	Micro.	Árvore	Z10	C19(1)
<i>Chlorophytum comosum</i> (Thumb.) Jacques	Liliaceae (Anthericaceae)	Fitinhas	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z9	C1, C2, C3, C4, C5, C7, C10, C11, C17, C18, C21(grupo)
<i>Chorisia speciosa</i> A. St. Hil.	Bombacaceae	Sumaúma	Neotropical	Caducifólio	3-11	8-11	Meso.	Árvore	Z10	C1(1), C5(1), C11(1), C14(1), C15(2), C16(2)
<i>Cinnamomum camphora</i> (L.) Sieb.	Lauraceae	Canforeira	Paleártico; Indomalaio	Perenifólio	1-12	2-4	Meso.	Árvore	Z10	C14(1)
<i>Clerodendrum splendens</i> G. Don ex James	Verbenaceae	Clerodendro	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fan. trep.	Árbusto trepador	Z10	C6(1)
<i>Clivia miniata</i> Regel	Amaryllidaceae	Clívia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	2-11	Hemi.	Herbácea	Z10	C1,C, C3,C5,C8, C16, C17, C18 (grupo)
<i>Clivia nobilis</i> Lindl.	Amaryllidaceae	Clívia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	2-11	Hemi.	Herbácea	Z10	C1, C2, C5, C17, C18 (grupo)
<i>Codiaeum variegatum</i> (L.) Bl. var. <i>pictum</i> (Lodd.) Muell. Arg.	Euphorbiaceae	Crótone	Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Árbusto	Z11	C11(1)
<i>Colocasia esculenta</i> (L.) Schott.	Araceae	Inhame	Indomalaio	Perenifólio	1-12	5-6	Geófito	Herbácea	Z10	C18(grupo)
<i>Cordia myxa</i> L. non Forssk.	Boraginaceae		Paleártico; Indomalaio; Áfricotropical	Perenifólio	1-12	3-6	Micro.	Árvore	Z10	C16(1)
<i>Cordyline australis</i> (Forst.) Endl.	Agavaceae	Cordiline	Antártico	Perenifólio	1-12	4-7	Micro.	Árvore	Z9	C7(1)
<i>Cordyline stricta</i> (Sims) Endl.	Agavaceae	Cordiline	Australiano	Perenifólio	1-12	1-6	Nano.	Árbusto	Z10	C2(10); C9 (2);C14(2); C18(1);
<i>Cordyline terminalis</i> (L.) Kunth.	Agavaceae	Árvore-dos-reis	Indomalaio; Australiano; Oceânia; Antártico	Perenifólio	1-12	11-5	Micro.	Árbusto	Z10	C2(3); C6(2); C11(2)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Crassula ovata</i> (Mill.) Druce.	Crassulaceae	Ensaído -branco ; Planta-de-jade	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	11-3	Nano.	Arbusto suculento	Z10	C14 (grupo)
<i>Crinum asiaticum</i> L.	Amaryllidaceae	Crino	Indomalaio	Perenifólio	1-12	5-8	Geófito	Herbácea	Z10	C18(1), C22 (1)
<i>Crinum moorei</i> Hook. f.	Amaryllidaceae	Crino	Áfricotropical	Sazonal	11-9	4-8	Geófito	Herbácea	Z8	C15, C17(grupo)
<i>Ctenanthe lubbersiana</i> (E. Morr.) Eichl.	Marantaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	4-8	Hemi.	Herbácea	Z10	C2(7), C11(grupo), C17(grupo)
<i>Cuphea ignea</i> A. DC.	Lythraceae	Cigarrinhos	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C21(grupo)
<i>Cyathea australis</i> (R. Br.) Domin	Cyatheaceae	Feto-arbóreo	Australiano	Perenifólio	1-12	-----	Micro.	Árvore	Z9	C1(2), C11(3), C13(5), C14(3), C15(3), C16(3), C18(4), C20(7)
<i>Cyathea cooperi</i> (F. Mueller) Domin.	Cyatheaceae	Feto-arbóreo	Australiano	Perenifólio	1-12	-----	Micro.	Árvore	Z10	C2(1), C19(2)
<i>Cycas circinalis</i> L.	Cycadaceae	Cicas	Indomalaio	Perenifólio	1-12	3-7	Micro.	Árvore	Z10	C20(1)
<i>Cycas revoluta</i> Thunb.	Cycadaceae	Cicas-revoluta; Cicas-de-sagú	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-8	Micro.	Árvore	Z9	C4(1), C5(2), C6(1), C7(1), C10(3)
<i>Delonix regia</i> (Bojer) Raf.	Leguminosae (Papilionoideae)	Acácia-rubra	Áfricotropical	Caducifólio	6-3	7-9	Micro.	Árvore	Z11	C18(1)
<i>Delphinium grandiflorum</i> L.	Ranunculaceae	Délfínios	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Herbácea	Z3	C21(grupo)
<i>Dichorisandra thyrsiflora</i> Mikan.	Commelinaceae	Dicorisandra	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C4(1), C14(2)
<i>Dombeya cacuminum</i> Hochr..	Sterculiaceae	Dombeia; Aurora	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-4	Micro.	Árvore	Z10	C9(1)
<i>Dracaena deremensis</i> Engl.	Agavaceae (Dracaenaceae)	Dracena	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	11-12	Micro.	Arbusto	Z11	C2(3), C4(1), C9(1), C11(6), C14(5), C16(1), C17(3), C18(3), C20(3), C22(1)
<i>Dracaena draco</i> L. ssp. <i>draco</i>	Agavaceae (Dracaenaceae)	Dragoeiro	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-6	Micro.	Árvore	Z11	C13(1), C14(1), C16(1)
<i>Dracaena fragrans</i> (L.) Ker-Gawl.	Agavaceae (Dracaenaceae)	Dracena	Africotropical	Perenifólio	1-12	11-1	Micro.	Arbusto	Z12	C1(2), C9(1), C11(2), C17(1), C18(1)
<i>Duranta erecta</i> L.	Verbenaceae	Duranta; Violeteira-do-brasil	Neotropical	Perenifólio	1-12	7-1	Micro.	Arbusto	Z10	C9(1), C16(1), C18(sebe), C22(sebe)
<i>Encephalartos transvenosus</i> Stapf & Burt Davy.	Zamiaceae	Encefalartos	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	5-11	Micro.	Árvore	Z9	C6(1), C5(2)
<i>Ensete ventricosum</i> (Welw.) E.E. Cheesm.	Musaceae	Bananeira-da-abissínia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Terófito	Herbácea	Z10	C9(1), C22(3)
<i>Epipremnum aureum</i> (Lind. & André)	Araceae		Oceânia	Perenifólio	1-12	6-8	Fane.trep.	Herbácea trepadora	Z10	C11(1), C21(1)
<i>Erythrina lysistemon</i> Hutch.	Leguminosae (Papilionoideae)	Coralina	Áfricotropical	Marcescente	5-4 (12-4)	12-4; 7	Micro.	Árvore	Z10	C8(1)
<i>Erythrina speciosa</i> Andrews	Leguminosae (Papilionoideae)	Coralina-elegante	Neotropical	Caducifólio	4-11	12-4	Micro.	Árvore	Z10	C6 (2)
<i>Eugenia brasiliensis</i> Lam.	Myrtaceae	Cereja-do-brasil	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-5	Micro.	Árvore	Z10	C13(1)
<i>Eugenia uniflora</i> L.	Myrtaceae	Pitangueira	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Árvore	Z10	C20 (1)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Euphorbia nerifolia</i> L.	Euphorbiaceae	Eufórbia	Indomalaio; Oceânia	Perenifólio	1-12	3-7	Micro.	Arbusto suculento	Z10	C18(2)
<i>Fernandoa magnifica</i> Seem.	Bignoniaceae	Fernandoa	Áfricotropical	Marcescente	6-5 (1-5)	12-6	Micro.	Árvore	Z10	C8(1)
<i>Ficus microcarpa</i> L. f.	Moraceae	Figueira-da-india	Indomalaio	Perenifólio	1-12	3-12	Meso.	Árvore	Z11	C2(1)
<i>Ficus pumila</i> L.	Moraceae	Pastinha	Indomalaio; Paleártico	Perenifólio	1-12	10-12	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z8	C5(grupo)
<i>Garcinia xanthochymus</i> Hook. f. ex Anderson	Guttiferae	Garcinia; Mangostão	Indomalaio	Perenifólio	1-12	6-7	Micro.	Árvore	Z11	C4(1)
<i>Gerbera jamesonii</i> Bol. ex Adlam.	Compositae	Gerbera	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z8	C7 (grupo)
<i>Ginkgo biloba</i> L.	Ginkgoaceae	Ginco; Árvore-avenca	Paleártico	Caducifólio	4-1	5	Micro.	Árvore	Z4	C1(1), C3(2)
<i>Grevillea robusta</i> A. M. Cunn. Ex. R. Br.	Proteaceae	Grevilea	Australiano	Perenifólio	1-12	4-7	Meso.	Árvore	Z8	C3(1), C15(1)
<i>Hedera helix</i> L.	Araliaceae	Hera	Paleártico	Perenifólio	1-12	9-10	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z5	C2 (grupo)
<i>Hedychium gardnerianum</i> Ker-Gawl.	Zingiberaceae	Bananiha; Roca-de-vnus; Conteira	Paleártico; Indomalaio	Perenifólio	1-12	7-10	Hemi.	Herbácea	Z9	C2(grupo)
<i>Heliconia bihai</i> (L.) L.	Heliconiaceae	Helicónia	Neotropical	Perenifólio	1-12	9-2	Hemi.	Herbácea	Z11	C9(1), C11(1), C15(1), C16(1), C18(1), C22(2)
<i>Hibiscus elatus</i> Swartz	Malvaceae	Hibisco-arbóreo	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Árvore	Z10	C6(1)
<i>Hibiscus rosa-sinensis</i> L.	Malvaceae	Cardeais; Hibiscos; Rosa da China	Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C1(1)
<i>Howea forsteriana</i> (C. Moore & F. Muell.) Becc.	Palmae	Quência	Australiano	Perenifólio	1-12	1-9	Micro.	Árvore	Z10	C4(3), C12(2), C13(6), C18(1), C19(1)
<i>Hymenocallis littoralis</i> (Jacq.) Salisb.	Amaryllidaceae	Lírio-aranha	Neotropical	Perenifólio	1-12	9-11	Geófita	Herbácea	Z10	C14, C18, C20 (grupo)
<i>Iberis umbellata</i> L.	Cruciferae	Iberis	Paleártico	Sazonal	4-6	5-6	Terófita	Herbácea	Z7	C7(grupo)
<i>Impatiens walleriana</i> Hook. f.	Balsaminaceae	Maravilhas	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Herbácea	Z9	C6, C7, C8, C10, C11, C12, C18, C21, C22 (grupo)
<i>Iresine herbstii</i> Hook.	Amaranthaceae	Iresine	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Caméfito	Herbácea	Z10	C3, C6, C7, C17, C18, C21 (grupo)
<i>Iris germanica</i> L. var. <i>florentina</i> (L.) Dykes	Iridaceae	Lírio-branco	Paleártico	Perenifólio	1-12	2-7	Geófita	Herbácea	Z4	C11(grupo)
<i>Iris japonica</i> Thunb.	Iridaceae	Lírio	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-7	Geófita	Herbácea	Z8	C2(grupo)
<i>Jacaranda mimosifolia</i> D. Don.	Bignoniaceae	Jacarandá	Neotropical	Caducifólio	5-2	4-6; 9-10	Meso.	Árvore	Z9	C1(1), C9(1), C22(1)
<i>Justicia carnea</i> Lindl.	Acanthaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	5-10	Nano.	Arbusto	Z12	C2(6), C3 (2), C5(1), C17(1), C21(2)
<i>Kigelia africana</i> (Lam.) Benth.	Bignoniaceae	Árvore-das- salsichas	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	5-7	Micro.	Árvore	Z10	C2(1), C7 (1), C10(1)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Lagerstroemia indica</i> L.	Lythraceae	Laguerestrémia; Flor-de- merenda; Suspiros	Paleártico; Indomalaio	Caducifólio	3-11	7-9	Micro.	Árvore	Z7	C10(2)
<i>Leucanthemum x superbum</i> (J. Ingram) Bergmans ex Kent	Compositae	Estrelas	Hortícola	Perenifólio	1-12	5-8	Nano.	Herbácea	Z5	C5, C7 (grupo)
<i>Ligustrum lucidum</i> Ait. f.	Oleaceae	Ligustro; Alfinheiro	Paleártico	Perenifólio	1-12	7-9	Micro.	Árvore	Z7	C9(1)
<i>Ligustrum obtusifolium</i> Sieb. & Zucc.	Oleaceae	Ligustro; Alfeneiro Alfinheiro	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-6	Micro.	Arbusto	Z3	C9(1), C11, C12, C14 (grupo), C18(1), C20(1), C21(1), C22(1)
<i>Livistona chinensis</i> (Jacq.) R. Br. ex Mart.	Palmae	Palmeira-de- leque	Paleártico	Perenifólio	1-12	2-5	Meso.	Árvore	Z9	C1(1), C17(1), C19(1), C18(2)
<i>Lobelia erinus</i> L.	Campanulaceae	Lobélia	Áfricotropical	Sazonal	4-9	5-9	Terófito	Herbácea	Z9	C7(grupo)
<i>Lobularia maritima</i> (L.) Desv.	Cruciferae	Lobulária	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z8	C7(grupo)
<i>Lonchocarpus sericeus</i> (Poir.) Kunth ex DC.	Leguminosae (Papilionoideae)	Loncocarpus	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-1	Meso.	Árvore	Z10	C10(1)
<i>Lysimachia nummularia</i> L.	Primulaceae	Lisimáquia	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-11	Hemi.	Herbácea	Z4	C10(grupo)
<i>Macadamia integrifolia</i> Maid. & Betch.	Proteaceae	Macadâmia	Australiano	Perenifólio	1-12	2-5	Micro.	Árvore	Z9	C3(1)
<i>Magnolia grandiflora</i> L.	Magnoliaceae	Magnólia	Neártico	Perenifólio	1-12	5-8	Micro.	Árvore	Z6	C1(1), C3(1), C4(1);
<i>Magnolia x soulangiana</i> Soul.-Bod.	Magnoliaceae	Magnólia	Hortícola	Caducifólio	3-12	12-2	Micro.	Árvore	Z5	C4(1), C6(2), C7(1)
<i>Markamia lutea</i> (Benth.) Schum.	Bignoniaceae	Marcâmia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Meso.	Árvore	Z11	C13(1), C19(2)
<i>Matthiola incana</i> (L.) R. Br.	Cruciferae	Goivos	Paleártico	Sazonal	1-7	3-7	Terófito	Herbácea	Z6	C4, C6 (grupo)
<i>Monstera deliciosa</i> Liebm.	Araceae	Fruto-delicioso; Costela-de-adão	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z10	C11(2)
<i>Montanoa bipinnatifida</i> (Kunth) K. Kock	Compositae	Malmequer- arbóreo	Neotropical	Perenifólio	1-12	11-2	Micro.	Arbusto	Z10	C2(1)
<i>Musa velutina</i> Wendl. & Drude.	Musaceae	Bananeira-de- jardim	Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z9	C11(grupo)
<i>Musa x paradisiaca</i> L.	Musaceae	Bananeira-de- prata	Hortícola	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C16(15)
<i>Myrtus communis</i> L.	Myrtaceae	Murta	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-6	Micro.	Arbusto	Z8	C14(1)
<i>Nephrolepis cordifolia</i> (L.) Presl.	Oleandraceae	Feto	Neotropical; Áfricotropical; Indomalaio; Oceânia; Australiano	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z10	C11, C16, C18 (grupo)
<i>Nerium oleander</i> L.	Apocynaceae	Sevadilha; Loendro	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-11	Micro.	Arbusto	Z9	C7(1), C13(1), C18(1)
<i>Nolina recurvata</i> (Lem.) Hemsl.	Agavaceae	Nolina; Pata-de-elefante	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-8	Micro.	Árvore	Z9	C6(2), C11(2), C16(1), C17(1), C18(1)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Ochna serrulata</i> (Hochst.) Walp.	Ochnaceae	Planta-do-rato-mikey	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	2-4	Nano.	Arbusto	Z9	C8(1)
<i>Ocotea foetens</i> (Aiton) Baill.	Lauraceae	Til	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Meso.	Árvore	Z10	C12(1), C13(2), C20(1)
<i>Odontonema strictum</i> (Nees) Kuntze	Acanthaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	8-12	Nano.	Arbusto	Z10	C5(1)
<i>Oenothera fruticosa</i> L.	Onagraceae	Oenotera	Neártico	Sazonal	1-10	3-9	Terófito	Herbácea	Z4	C4 (grupo)
<i>Ophiopogon japonicus</i> (L. f.) Ker-Gawl	Liliaceae (Convallariaceae)	Relva-do-japão	Paleártico	Perenifólio	1-12	7-9	Hemi.	Herbácea	Z8	C13, C14, C15, C16, C19, C20 (mancha)
<i>Pandanus utilis</i> Bory	Pandanaceae	Pândano	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	9-3	Micro.	Árvore	Z10	C11A(1)
<i>Pelargonium x hortorum</i> L. H. Bail.	Geraniaceae	Malvas	Hortícola	Perenifólio	1-12	4-7	Nano.	Herbácea	Z10	C21 (grupo)
<i>Pericallis x hybrida</i> R. Nordenstam	Compositae	Cinerária	Hortícola	Sazonal	1-7	3-6	Terófito	Herbácea	Z10	C6; C7; C8 (grupo)
<i>Petrea volubilis</i> L.	Verbenaceae	Estrela-azul; Viuvinha	Neotropical	Perenifólio	1-12	3-12	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	C7 (1)
<i>Petunia x hybrida</i> hort. Vilm.-Andr.	Solanaceae	Petúnia	Hortícola	Sazonal	2-11	2-11	Terófito	Herbácea	Z9	C4, C5 (grupo)
<i>Philodendron bipinnatifidum</i> Endl.	Araceae	Filodendro	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-7	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	C11(1), C12(2), C18(1)
<i>Philodendron erubescens</i> K. Koch & Augustin	Araceae	Filodendro	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-6	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z11	C16(1); C18(1); C20(1);
<i>Philodendron scandens</i> K. Koch & Sello ssp. <i>oxicardium</i> (Schott) Bunting	Araceae	Filodendro	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-6	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z11	C20(1)
<i>Phoenix canariensis</i> Chabaud.	Palmae	Palmeira-das-Canárias	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-3	Meso.	Árvore	Z11	C7(3), C8(3), C9(1) C18(1), C21(2)
<i>Phoenix reclinata</i> Jacq.	Palmae	Tamareira-do-Senegal	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	5-7	Micro.	Árvore	Z11	C18(1)
<i>Phoenix roebelinii</i> O' Brien.	Palmae	Palmeira-anã	Indomalaio	Perenifólio	1-12	5-7	Micro.	Árvore	Z11	C5(1), C8(1)
<i>Phyllanthus arbuscula</i> (Sw.) J. F. Gmel.	Euphorbiaceae	Filanto	Neotropical	Perenifólio	1-12	7-9	Micro.	Arbusto	Z12	C17(1)
<i>Phyllanthus tenellus</i> Roxb.	Euphorbiaceae	Quebra-pedra	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Herbácea	Z11	C17 (grupo)
<i>Phyllostachis bambusoides</i> Sieb. & Zucc.	Gramineae	Bambu	Paleártico	Perenifólio	1-12	Não floriu**	Hemi.	Herbácea	Z8	C12, C14, C16 (grupo)
<i>Phytolacca dioica</i> (L.) Moq.	Phytolaccaceae	Bela-sombra	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-9	Meso.	Árvore	Z11	C15(1)
<i>Picconia excelsa</i> (Ait.) DC.	Oleaceae	Pau-branco	Paleártico	Perenifólio	1-12	2-5	Micro.	Árvore	Z10	C8(1)
<i>Pilea cadierei</i> Gagnep. & Guillaum.	Urticaceae	Planta-do-alumínio	Indomalaio	Perenifólio	1-12	10-12	Hemi.	Herbácea	Z11	C1, C2, C3, C5, C7, C8, C10, C11, C18 (grupo)
<i>Pilea microphylla</i> (L.) Liebm.	Urticaceae	Arrozinho	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C6,C7 (grupo)
<i>Plectranthus barbatus</i> Andrews	Labiatae	Falso-boldo; Boldo-da-terra	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C11(3)
<i>Plumeria rubra</i> L. var. <i>acutifolia</i> (Poir.) Woodson.	Apocynaceae	Planta-dos-dentes	Neotropical	Caducifólio	5-1	6-10	Micro.	Árvore	Z10	C5(2), C10(2), C7(3), C21(2)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Polyscias cumingiana</i> (C. Prest) Fernandez-Vilar	Araliaceae		Indomalaio	Perenifólio	1-12	Não floriu**	Micro.	Árbusto	Z11	C11 (1)
<i>Punica granatum</i> L.	Punicaceae	Romãzeira	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-7	Micro.	Árvore	Z9	C15(3)
<i>Rhaphidophora decursiva</i> (Wallich) Schott.	Araceae		Indomalaio	Perenifólio	1-12	5-6	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	C18(1)
<i>Rudbeckia fulgida</i> Ait.	Compositae	Margarida- amarela; Susana-de- olhos- negros	Neártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Herbácea	Z3	C6,C7,C10, C18 (grupo)
<i>Ruscus hypophyllum</i> L.	Liliaceae (Asparagaceae)	Ruscos	Paleártico	Perenifólio	1-12	11-12	Nano.	Herbácea	Z8	C11, C16(grupo)
<i>Salvia leucantha</i> Cav.	Labiatae	Sálvia-branca	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z9	C20(1)
<i>Salvia splendens</i> Sell ex Roem. & Scult.	Labiatae	Camarões; Sálvias	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Herbácea	Z10	C4, C6, C9, C18, C22 (grupo)
<i>Sansevieria trifasciata</i> Prain var. <i>laurentii</i> (De Wild.) N. E. Br.	Agavaceae	Língua-de-sogra	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	8-11	Hemi.	Herbácea	Z10	C1(10), C16(5), C17(10)
<i>Schefflera actinophylla</i> (Endl.) Harms	Araliaceae	Brassaia	Australiano; Oceânia	Perenifólio	1-12	8-10	Meso.	Árvore	Z10	C1(1), C14(1), C18(1)
<i>Senna didymobotrya</i> (Fres.) Irwin & Barneby.	Leguminosae (Caesalpinoideae)	Planta-das- pipocas; Cássia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C6(1)
<i>Senna occidentalis</i> (L.) Link.	Leguminosae (Caesalpinoideae)	Cássia-café; Sena-café	Áfricotropical; Indomalaio; Australiano; Oceânia	Perenifólio	1-12	6-12	Micro.	Arbusto	Z10	C18(1)
<i>Solenostemon scutellarioides</i> (L.) Codd.	Labiatae	Cóleos	Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C8, C1(grupo)
<i>Sophora japonica</i> L.	Leguminosae (Papilionoideae)	Acácia-do- japão; Sófora-do-japão	Paleártico	Caducifólio	4-12	7-9	Micro.	Árvore	Z5	C5(1), C11(1)
<i>Spathodea campanulata</i> Beauv.	Bignoniaceae	Chama-da- floresta; Tulipeiro- africano	Áfricotropical	Caducifólio	1-12 (Variação individual)	1-12	Micro.	Árvore	Z11	C16(1)
<i>Stenotaphrum secundatum</i> (Walter) Kuntze	Gramineae	Relva; Relva-de-correr	Neotropical; Áfricotropical; Oceânia	Perenifólio	1-12	3-11	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z9	C4,C6,C10,C18 (tapete)
<i>Strelitzia nicolai</i> Reg. & Körn.	Strelitziaceae	Estrelícia- gigante	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C14(1)
<i>Strelitzia reginae</i> BanKs ex Dryand	Strelitziaceae	Estrelícia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C8(17), C10(4)
<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassm.	Palmae	Coqueiro-de- jardim; Palmeira-rainha	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-7	Micro.	Árvore	Z10	C7(1), C11(1), C18(1), C21(1)
<i>Synadenium grantii</i> Hook. f.	Euphorbiaceae	Sinadénio	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	8-11	Micro.	Arbusto suculento	Z10	C18(4)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Syngonium wendlandii</i> Schott.	Araceae	Singónio	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-7	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z11	C18(1)
<i>Tagetes patula</i> L.	Compositae	Cravos-de-burro	Neotropical	Sazonal	1-9	3-8	Terófito	Herbácea	Z9	C4, C6, C7, C10, C18(grupo)
<i>Tibouchina urvilleana</i> (DC.) Cogn.	Melastomataceae	Aranhas; Tibouchina	Neotropical	Perenifólio	1-12	7-12	Micro.	Arbusto	Z10	C22(1)
<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	Leguminosae (Papilionoideae)	Tipuana	Neotropical	Marcescente	5-4 (3-4)	4-7	Meso.	Árvore	Z9	C11(1), C12(1) C17(1)
<i>Tradescantia pallida</i> (Rose) D. Hunt.	Commelinaceae	Tradescantia	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea trepadora	Z8	C2, C9, C18, C21 (grupo)
<i>Tradescantia spathacea</i> SW.	Commelinaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	10-2	Hemi.	Herbácea	Z9	C18(grupo)
<i>Tradescantia zebrina</i> hort. ex. Bosse	Commelinaceae	Zebrina	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z9	C7, C8, C9, C16 (grupo)
<i>Verbena x hybrida</i> Groenl. & Ruempl.	Verbenaceae	Verbena	Hortícola	Perenifólio	1-12	6-10	Caméfito	Herbácea	Z9	C6 (grupo)
<i>Washingtonia filifera</i> (Lind. ex André) H. A. Wendl	Palmae	Palmeira-de-leque da Califórnia	Neártico	Perenifólio	1-12	5-8	Micro.	Árvore	Z9	C4(2)
<i>Wedelia trilobata</i> (L.) Hitchc.	Compositae		Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Herbácea	Z11	C7, C20, C22 (grupo)
<i>Yucca elephantipes</i> Regel.	Agavaceae	luca	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-10	Micro.	Arbusto	Z10	C18(1)

Legenda:

- Plantas que não floriram no período em estudo (Janeiro 2002 – Janeiro 2005): * plantas novas; ** plantas que nunca floriram por falta de aclimação;
- Plantas marcescentes (plantas semiperenifólias e semicaducifólias): 3-2 (3-4) – folhas todo o ano mas com renovação significativa em Março e Abril.

Anexo 2
CARACTERIZAÇÃO FITOGEOGRÁFICA DO PARQUE DE SANTA CATARINA

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Abelia x grandiflora</i> (André) Rehd.	Caprifoliaceae	Abélia	Hortícola	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z5	C1(9), C2(12), C5 (40), C8 (5), C9(14), C18 (7), C22(8), C27(20), C28(12)
<i>Abutilon grandifolium</i> (Willd.) Sweet	Malvaceae	Abutilão	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z9	C2(1), C22(1)
<i>Acalypha wilkesiana</i> Muell. Arg.	Euphorbiaceae	Acálifa; Folha-de-cobre	Oceânia	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C1(24), C8 (9), C9(3), C18(10), C20(5), C21 (22), C22(30), C23(4), C24(7), C25(9), C28(3), C29(2)
<i>Adiantum capillus-veneris</i> L.	Adiantaceae	Avenca; Avenca-das-fontes	Paleártico, Neotropical, Áfricotropical, Indomalaio	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z8	C28(18)
<i>Agapanthus praecox</i> Willd. ssp. <i>orientalis</i> (Leighton) Leighton	Liliaceae	Agapantos; Coroas-de-Henrique	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	4-9	Hemi.	Herbácea	Z9	C2 (>1000), C14(>50), C16(24), C20(>100), C21 (>100)
<i>Agathis robusta</i> (C. Moore ex. F. Muell.) Bail.	Araucariaceae	Pinheiro-de-damara; Pinheiro-com-folha-de-alegra-campo	Australiano	Perenifólio	1-12	3-4	Meso.	Árvore	Z9	C2(7), C16(1), C21(1)
<i>Agave americana</i> L.	Agavaceae	Agave; Piteira	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-8	Hemi.	Herbácea suculenta	Z9	C21 (12), C28 (3)
<i>Agave attenuata</i> Salm-Dyck	Agavaceae	Piteira; Agave-pescoço-de-cisne	Neotropical	Perenifólio	1-12	12-3	Nano.	Árvore suculenta	Z9	C6(16), C16(12), C17(7), C21 (22), C22(14), C28(30), C29(15)
<i>Ageratina adenophora</i> (Spreng.) R. King. & H. Robinson	Compositae	Abundância	Neotropical	Perenifólio	1-12	3-7	Nano.	Herbácea	Z10	C18, C21 (grupo)
<i>Ageratum houstonianum</i> Mill.	Compositae		Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Terófito	Herbácea	Z8	C1, C10(grupo)
<i>Aleurites moluccana</i> (L.) Willd	Euphorbiaceae	Aleurites; Nós-vômica	Indomalaio	Perenifólio	1-12	6-10	Micro.	Árvore	Z10	C1 (1)
<i>Aloe arborescens</i> Mill.	Liliaceae (Aloeaceae)	Aloés, Babosas, Foguetes-de-natal	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	11-2	Nano.	Arbusto suculento	Z9	C20(>100), C28(>200)
<i>Aloe capitata</i> Bak.	Liliaceae (Aloeaceae)	Aloés	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	4-5	Hemi.	Herbácea suculenta	Z9	C6A, C21 (grupo)
<i>Aloe ciliaris</i> Haw.	Liliaceae (Aloeaceae)	Aloés	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	10-6	Fane. trep.	Arbusto trepador esuculento	Z9	C21(20)
<i>Aloe plicatilis</i> (L.) Mill.	Liliaceae (Aloeaceae)	Aloés	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	2-4	Nano.	Árvore suculenta	Z9	C21(1)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Aloe saponaria</i> (Ait. f.) Haw.	Liliaceae (Aloeaceae)	Aloés	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-7	Hemi.	Herbácea suculenta	Z9	C6(2)
<i>Aloe vera</i> (L.) Burm.	Liliaceae (Aloeaceae)	Aloés-vera	Paleártico; Neotropical	Perenifólio	1-12	11-6	Hemi.	Herbácea suculenta	Z8	C6A(grupo)
<i>Alternanthera ficoidea</i> (L.) R. Br.	Amaranthaceae	Piriquitos	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Caméfito	Herbácea	Z10	C10, C11 (grupo)
<i>Ananas comosus</i> (L.) Merr.	Bromeliaceae	Ananás	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-7	Hemi.	Herbácea	Z11	C20(4), C22(2), C28(16), C29(2)
<i>Annona cherimola</i> Mill.	Annonaceae	Anoneira	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-7	Micro.	Árvore	Z10	C21(1)
<i>Anredera cordifolia</i> (Tem.) Stemis.	Basellaceae	Boussingaul-tia	Neotropical	Caducifólio	6-2	7-9	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z9	C21(grupo)
<i>Antirrhinum majus</i> L.	Scrophulariaceae	Bocas-de-peixe	Paleártico	Sazonal	3-10	3-10	Terófito	Herbácea	Z7	C1(6), C10 (8), C11 (5)
<i>Apollonias barbujana</i> (Cav.) Bomm.	Lauraceae	Barbusano	Paleártico	Perenifólio	1-12	9-3	Meso.	Árvore	Z10	C2(2), C27(2)
<i>Araucaria araucana</i> (Molina) K. Koch.	Araucariaceae	Araucária-do-chile; Pinheiro-do-chile	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-5	Meso.	Árvore	Z8	C16(1)
<i>Araucaria columnaris</i> (Forst. f.) Hook.	Araucariaceae	Pinheiro-da-nova-caledónia; Araucária	Oceânia	Perenifólio	1-12	5-7	Macro.	Árvore	Z10	C6(1), C21(1)
<i>Araucaria heterophylla</i> (Salisb.) Franco	Araucariaceae	Araucária	Oceânia	Perenifólio	1-12	2-3	Macro.	Árvore	Z9	C6(1), C26(1)
<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> H. A. Wendl. & Drude.	Palmae	Palmeira-elegante	Australiano	Perenifólio	1-12	2-10	Meso.	Árvore	Z10	C6(1), C7 (8), C20 (1), C23(1), C24(1), C27(1), C28(1)
<i>Argyranthemum frutescens</i> (L.) Schultz-Bip.	Compositae	Estrelas; Estreleiras; Pampilhos; Malmequeres	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C1,C1A, C2,C9,C18, C23, C24 (grupo)
<i>Argyranthemum pinnatifidum</i> (L.f.) Lowe ssp. <i>pinnatifidum</i>	Compositae	Estrelas; Estreleiras; Pampilhos; Malmequeres	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C1(grupo)
<i>Asparagus densiflorus</i> (Kunth) Jassop	Liliaceae (Asparagaceae)	Esparto	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	7-8	Nano.	Herbácea	Z9	C21(5), C22(3)
<i>Asparagus setaceus</i> (Kunth) Jassop	Liliaceae (Asparagaceae)	Esparto-de-folha-miúda; Esparto	Africotropical	Perenifólio	1-12	9-12	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z9	C1(12), C2(>100), C14(10), C21(12)
<i>Bambusa vulgaris</i> J.C. Wendl.	Gramineae	Bambu	Paleártico; Indomalaio	Perenifólio	1-12	Nunca floriu	Hemi.	Herbácea	Z10	C16 (grupo)
<i>Bauhinia variegata</i> L.	Leguminosae (Caesalpinioidae)	Bauínia; Árvore-de-são-Tomé	Indomalaio	Marcescente	5-4 (12-4)	10-6	Micro.	Árvore	Z9	C2(1), C7(1), C23(1), C24(1)
<i>Bergenia crassifolia</i> (L.) Fritsch.	Saxifragaceae	Bergénia; Couve-de-jardim	Paleártico	Perenifólio	1-12	11-4	Caméfito	Herbácea	Z3	C2,C14,C15,C16, C21, C22 (grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Billbergia vittata</i> Brongn. ex Morel.	Bromeliaceae	Bromélia	Neotropical	Perenifólio	1-12	11-2	Hemi.	Herbácea	Z10	C1(1), C5(40)
<i>Bougainvillea glabra</i> Choisy	Nyctaginaceae	Buganvília	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	C4, C20, C21, C28 (grupo)
<i>Bougainvillea spectabilis</i> Willd.	Nyctaginaceae	Buganvília	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	C4, C20, C21, C28 (grupo)
<i>Brachychiton acerifolius</i> Cunn. ex. F. Muell.	Sterculiaceae	Árvore-do-fogo	Australiano	Caducifólio	1-5; 8-12	5-8	Micro.	Árvore	Z10	C9(1)
<i>Brachychiton x hybridus</i> hort.	Sterculiaceae	Árvore-do-fogo	Hortícola	Caducifólio	1-5; 8-12	6-10	Micro.	Árvore	Z10	C19(1)
<i>Brugmansia versicolor</i> Lagerh.	Solanaceae	Trombeteira	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C16(2), C22(3)
<i>Brugmansia x candida</i> Pers.	Solanaceae	Trombeteira; Belas-noites	Hortícola	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C1(1)
<i>Bulbine frutescens</i> (L.) Willd.	Liliaceae (Asphodelaceae)	Bulbine	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Geófita	Herbácea suculenta	Z9	C1,C2,C6, C9,C10, C12, C14,C15, C21, C22; C23;C25;C27 (grupo)
<i>Butia capitata</i> (Mart.) Becc.	Palmae	Palmeira-da-geleia	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-8	Micro.	Árvore	Z10	C16(1)
<i>Calendula officinalis</i> L.	Compositae	Calendula	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Terófita	Herbácea	Z6	C11(grupo)
<i>Callistemon rigidus</i> R. Br.	Myrtaceae	Martinete	Australiano	Perenifólio	1-12	4-8	Micro.	Arbusto	Z9	C8(2), C22 (1), C28(1)
<i>Callistemon viminalis</i> (Sol. ex Gaertn.) G. Don ex Loud.	Myrtaceae	Martinete-chorão	Australiano	Perenifólio	1-12	3-9	Micro.	Arbusto	Z9	C8(1)
<i>Canna x generalis</i> L.H. Bail.	Cannaceae	Canas-da-índia; Bananeiras-de- flor	Hortícola	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z9	C1,C2, C10, C11, C12 C13, C14, C15, C18, C22, C26, C27(grupo)
<i>Cardiospermum grandiflorum</i> Sw.	Sapindaceae	Corriola-dos-balões	Áfricotropical; Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z10	C21, C28
<i>Carica papaya</i> L.	Caricaceae	Papaieira	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Árvore	Z10	C21(2)
<i>Catharanthus roseus</i> (L.) G. Don.	Apocynaceae	Maravilhas	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Herbácea	Z10	C11(grupo)
<i>Cedrus deodara</i> (D. Don) G. Don.	Pinaceae	Cedro-deodara; Cedro-dos-himalaias	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-5	Meso.	Árvore	Z7	C16(1)
<i>Celtis australis</i> L.	Ulmaceae	Lodão-bastardo; Conteira	Paleártico	Caducifólio	4-1	5-6	Meso.	Árvore	Z8	C20(1)
<i>Centranthus ruber</i> (L.) DC.	Valerianaceae	Rosa-da-rocha; Alfinetes	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Caméfito	Herbácea	Z5	C21, C22, C28(grupo)
<i>Cephalophyllum alstonii</i> Marloth.	Aizoaceae	Chorão	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	6-11	Fane. trep.	Herbácea trepadora e suculenta	Z11	C9,C22,C24 (grupo)
<i>Cereus uruguayanus</i> Kiesling	Cactaceae	Cacto-vela-de-cera	Neotropical	Perenifólio	1-12	7-8	Nano.	Árvore suculenta	Z9	C21(1)
<i>Cestrum roseum</i> HBK.	Solanaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	3-11	Nano.	Arbusto	Z10	C2(2)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Chamaedorea elegans</i> Mart.	Palmae	Palmeira-de-salão; Palmeira-bambu	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-6	Micro.	Arbusto	Z10	C16(1)
<i>Chlorophytum comosum</i> (Thumb.) Jacques	Liliaceae (Anthericaceae)	Fitinhas	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z9	C1,C2,C6, C10, C11,C15, C24, C27 (grupo)
<i>Chorisia speciosa</i> A. St. Hil.	Bombacaceae	Sumaúma	Neotropical	Caducifólio	3-11	8-11	Meso.	Árvore	Z10	C4(1), C9(1), C14(2) C21(1)
<i>Chrysalidocarpus lutescens</i> (Bory) Wendl.	Palmae	Palmeira- amarela; Palmeira- borboleta	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	6-7	Micro.	Arbusto	Z10	C7(1)
<i>Cinnamomum camphora</i> (L.) Sieb.	Lauraceae	Canforeira	Paleártico; Indomalaio	Perenifólio	1-12	2-4	Meso.	Árvore	Z10	C3(3), C5(5), C9(3), C16(1), C26(1)
<i>Clivia miniata</i> Regel	Amaryllidaceae	Clívia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	2-11	Hemi.	Herbácea	Z10	C2,C4,C6, C13, C16, C22, 24, C25, C26, C27 (grupo)
<i>Clivia nobilis</i> Lindl.	Amaryllidaceae	Clívia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	2-11	Hemi.	Herbácea	Z10	C2,C4,C6, C13, C16, C22, C24, C25, C26, C27 (grupo)
<i>Codiaeum variegatum</i> (L.) Bl. var. <i>pictum</i> (Lodd.) Muell. Arg.	Euphorbiaceae	Crótone	Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z11	C4(1), C8(4), C16(1)
<i>Cordyline terminalis</i> (L.) Kunth.	Agavaceae	Árvore-dos-reis	Indomalaio; Australiano; Oceânia; Antártico	Perenifólio	1-12	11-5	Micro.	Arbusto	Z10	C1(3), C21(1)
<i>Cortaderia selloana</i> (Schult. & Schult. f.) Asch. & Gräbn.	Gramineae	Plumas; Capim-das- pampas	Neotropical	Perenifólio	1-12	7-10	Hemi.	Herbácea	Z6	C16(2), C28(1)
<i>Cosmos bipinnatus</i> Cav.	Compositae	Cosmos	Neártico; Neotropical	Sazonal	3-7	3-6	Terófito	Herbácea	Z8	C6, C9, C10 (grupo)
<i>Crassula ovata</i> (Mill.) Druce.	Crassulaceae	Ensaio-branco ; Planta-de-jade	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	11-3	Nano.	Arbusto suculento	Z10	C7(1), C16(>40), C20(5), C21(>50), C22(15)
<i>Ctenanthe oppenheimiana</i> (E. Morr.) Schum.	Marantaceae	Maranta-de-três- cores	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-8	Hemi.	Herbácea	Z10	C6 (grupo)
<i>Cuphea ignea</i> A. DC.	Lythraceae	Cigarrinhos	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C2(8)
<i>Cupressus sempervirens</i> L.	Cupressaceae	Cipreste	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-2	Micro.	Árvore	Z8	C22(1)
<i>Cyathea australis</i> (R. Br.) Domin	Cyatheaceae	Feto-arbóreo	Australiano	Perenifólio	1-12	-----	Micro.	Árvore	Z10	C2(3), C5(2)
<i>Cyathea cooperi</i> (F. Mueller) Domin.	Cyatheaceae	Feto-arbóreo	Antártico	Perenifólio	1-12	-----	Micro.	Árvore	Z9	C4(1)
<i>Cycas revoluta</i> Thunb.	Cycadaceae	Cicas-revoluta; Cicas-d-sagú	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-8	Micro.	Árvore	Z9	C14(2), C21(2)
<i>Cyperus involucratus</i> Rottb.	Cyperaceae		Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C21(>100)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Dasyllirion serratifolium</i> Karw. ex Schult. F.	Agavaceae		Neártico; Neotropical	Perenifólio	1-12	6-9	Nano.	Árvore	Z9	C21(1)
<i>Doryanthes palmeri</i> W. Hill.	Agavaceae	Doriantes	Australiano	Perenifólio	1-12	3-6	Hemi.	Herbácea	Z10	C16(12), C28(2)
<i>Dracaena deremensis</i> Engl.	Agavaceae (Dracaenaceae)	Dracena	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	11-12	Micro.	Arbusto	Z11	C1(2)
<i>Dracaena draco</i> L. ssp. <i>draco</i>	Agavaceae	Dragoeiro	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-6	Micro.	Árvore	Z11	C8(4)
<i>Dracaena fragrans</i> (L.) Ker- Gawl.	Agavaceae (Dracaenaceae)	Dracena	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	11-1	Micro.	Arbusto	Z12	C1(2)
<i>Duranta erecta</i> L.	Verbenaceae	Duranta	Neotropical	Perenifólio	1-12	7-1	Micro.	Arbusto	Z10	C1(1), C2(8), C4(3), C6(1), C8(5), C9(1), C12(1), C18(1), C20(2), C21(2), C28(1), C29(3)
<i>Echium nervosum</i> Dryand.	Boraginaceae	Massaroco	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-6	Nano.	Arbusto	Z11	C1(2), C18(3), C20(22), C21(7), C25(5), C29(12)
<i>Emilia coccinea</i> (Sims) D. Don.	Compositae	Emilia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Herbácea	Z11	C9, C15, C22 (grupo)
<i>Encephalartos transvenosus</i> Stapf & Burt Davy.	Zamiaceae	Encefalartos	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	5-11	Micro.	Árvore	Z9	C14(2), C16(1) C21(1), C27(1)
<i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl.	Rosaceae	Nespereira	Paleártico	Perenifólio	1-12	10-12	Micro.	Árvore	Z8	C2(1), C20(1)
<i>Erythrina abyssinica</i> Lam. ex DC.	Leguminosae (Papilionoideae)	Coralina-da- abissínia	Áfricotropical	Caducifólio	5-1	1-6; 9-10	Micro.	Árvore	Z10	C8(1), C15(1), C16(3), C22(2), C24(1), C25(1), C29(1)
<i>Erythrina crista-galli</i> L.	Leguminosae (Papilionoideae)	Coraleira; Coralina-crista-de- galo	Neotropical	Marcescente	3-2 (12-3)	4-1	Micro.	Árvore	Z8	C18(1)
<i>Erythrina lysistemon</i> Hutch.	Leguminosae (Papilionoideae)	Coralina	Áfricotropical	Marcescente	5-4 (12-4)	12-5	Micro.	Árvore	Z10	C18(1), C23(1)
<i>Erythrina speciosa</i> Andrews	Leguminosae (Papilionoideae)	Coralina-elegante	Neotropical	Caducifólio	4-11	12-4	Micro.	Árvore	Z10	C8(2), C12(1), C16(1), C18(1), C27(2)
<i>Eucalyptus citriodora</i> Hook.	Myrtaceae	Eucalipto-limão	Australiano	Perenifólio	1-12	12-1	Meso.	Árvore	Z10	C16(1)
<i>Eucalyptus sideroxylon</i> Cunn. ex Wolls.	Myrtaceae	Eucalipto	Australiano	Perenifólio	1-12	8-9	Meso.	Árvore	Z9	C2(1)
<i>Eugenia uniflora</i> L.	Myrtaceae	Pitangueira	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Árvore	Z10	C2(3), C18(1), C20(4), C21(2), C24(1)
<i>Euphorbia cotinifolia</i> L.	Euphorbiaceae	Eufórbia	Neotropical	Caducifólio	3-12	6-11	Micro.	Árvore	Z11	C9(1)
<i>Euphorbia grandicornis</i> Goebel.	Euphorbiaceae	Eufórbia-grande- cornuda	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	12-2	Nano.	Arbusto suculento	Z9	C21(1)
<i>Euphorbia ingens</i> E. Mey.	Euphorbiaceae	Eufórbia-gigante	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	10-12	Micro.	Arbusto suculento	Z9	C8(1), C21(1), C22(1)
<i>Euphorbia milii</i> Desmoul.	Euphorbiaceae	Mira-mira-não- me-toques	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C22(2)
<i>Euphorbia nerifolia</i> L.	Euphorbiaceae	Eufórbia	Indomalaio; Oceânia	Perenifólio	1-12	3-7	Micro.	Arbusto suculento	Z10	C21(2), C22(4), C28(1)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Euphorbia pulcherrima</i> Willd. ex Klotzsch.	Euphorbiaceae	Manhã-de-páscoa	Neotropical	Caducifólio	5-2	10-3	Micro.	Arbusto	Z10	C2(6), C4(12), C8(1), C16(2), C18(2), C21(15), C23(1)
<i>Euphorbia tirucalli</i> L.	Euphorbiaceae	Eufórbia	Áfricotropical; Indomalaio	Perenifólio	1-12	4-9	Micro.	Arbusto suculento	Z10	C18(2), C29(1)
<i>Felicia amelloides</i> (L.) Voss.	Compositae	Felícia ; Margarida-azul	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z9	C1(grupo), C2(>50), C11(30)
<i>Festuca glauca</i> Vill.	Gramineae	Festuca	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-6	Hemi.	Herbácea	Z3	C22 (grupo)
<i>Ficus benjamina</i> L. var. <i>nuda</i> (Miq.) Barrett	Moraceae	Figueira-da-índia	Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-4	Meso.	Árvore	Z11	C20(2), C22(2)
<i>Ficus carica</i> L.	Moraceae	Figueira	Paleártico	Caducifólio	4-12	6-7	Micro.	Árvore	Z8	C21(3)
<i>Ficus elastica</i> Roxb. ex Homem	Moraceae	Borracheira	Indomalaio	Perenifólio	1-12	5-8	Micro.	Árvore	Z11	C3(1), C29(1)
<i>Ficus pumila</i> L.	Moraceae	Pastinha	Indomalaio; Paleártico	Perenifólio	1-12	10-12	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z8	C4 (muro)
<i>Furcraea selloa</i> K. Koch. var. <i>marginata</i>	Agavaceae	Furcreia; Piteira	Neotropical	Perenifólio	1-12	8-12	Micro.	Árvore suculenta	Z10	C6(4), C21(6), C22(1), C28(1)
<i>Gazania rigens</i> (L.) Gaertn.	Compositae	Gazania	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z9	C1, C6, C8, C9, C11, C15, C22, C23, C26 (grupo)
<i>Grevillea robusta</i> A. M. Cunn. ex R. Br.	Proteaceae	Grevílea	Australiano	Perenifólio	1-12	4-7	Meso.	Árvore	Z8	C6(1)
<i>Hebe salicifolia</i> (Forst. f.) Pennell	Scrophulariaceae	Verónica	Neotropical; Antártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z7	C22 (grupo)
<i>Hebe x franciscana</i> (Eastw.) Souster.	Scrophulariaceae	Verónica	Hortícola	Perenifólio	1-12	5-12	Nano.	Arbusto	Z8	C8(20), C22(16), C28(16)
<i>Hedera helix</i> L.	Araliaceae	Hera	Paleártico	Perenifólio	1-12	9-10	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z5	C4(1), C14(1)
<i>Helichrysum bracteatum</i> (Vent.) Andrews	Compositae	Margarida-de- papel	Australiano	Sazonal	3-10	4-10	Terófito	Herbácea	Z8	C2(>100), C9(>100), C10(>50), C11(42), C16(14), C23(>50)
<i>Heliconia bihai</i> (L.) L.	Heliconiaceae	Helicónia	Neotropical	Perenifólio	1-12	7-2	Hemi.	Herbácea	Z11	C22(3)
<i>Hibiscus elatus</i> Swartz	Malvaceae	Hibisco-arbóreo	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Árvore	Z10	C21(1)
<i>Hibiscus rosa-sinensis</i> L.	Malvaceae	Cardeais; Hibiscos; Rosa-da-china	Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C8(1), C16(4), C18(2), C20(1), C21(4), C22(1), C23(1)
<i>Hibiscus syriacus</i> L.	Malvaceae	Cardeal-roxo; Hibisco-da-síria	Paleártico; Indomalaio	Caducifólio	5-11	7-9	Micro.	Arbusto	Z5	C9(2), C24(1)
<i>Howea belmoreana</i> (C. Moore & F. Muell.) Becc.	Palmae	Quência	Australiano	Perenifólio	1-12	1-9	Micro.	Árvore	Z10	C1(1), C8(2), C26(2)
<i>Howea forsteriana</i> (C. Moore & F. Muell.) Becc.	Palmae	Quência	Australiano	Perenifólio	1-12	1-9	Micro.	Árvore	Z10	C1(2), C2(4), C8(2), C26(2)
<i>Hylocereus triangularis</i> (L.) Britt. & Rose	Cactaceae	Rainha-da-noite; Cacto-trepador	Neotropical	Perenifólio	1-12	7-10	Fane. trep.	Arbusto trepador e suculento	Z10	C21(12), C22(8), C28(>20)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Impatiens walleriana</i> Hook. f.	Balsaminaceae	Maravilhas	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Herbácea	Z9	C1,C2, C5,C6, C9, C11, C12, C14, C23, C26, C27 (grupo)
<i>Ipomoea indica</i> (Burm.) Merrill.	Convolvulaceae	Campainhas	Neotropical; Áfricotropical; Indomalaio; Oceânia	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z10	C1, C21, C28 (grupo)
<i>Iresine herbstii</i> Hook.	Amaranthaceae	Iresine	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Caméfito	Herbácea	Z10	C2, C6, C8, C9, C10, C11, C12, C14, C23, C24, C25, C26 (grupo)
<i>Iris germanica</i> L.	Iridaceae	Lírio-branco	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-8	Geófita	Herbácea	Z4	C2(20), C12(32), C22(>100), C24(>100)
<i>Jacaranda mimosifolia</i> D. Don.	Bignoniaceae	Jacarandá	Neotropical	Caducifólio	5-2	4-6; 9-10	Meso.	Árvore	Z9	C2(9), C3(2), C15(2), C25(4)
<i>Kalanchoe delagouensis</i> Ecklon & Perrier	Crassulaceae	Rainhas	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	12-9	Nano.	Arbusto suculento	Z11	C21(grupo)
<i>Kalanchoe fedtschenkoi</i> Hamet & Perrier.	Crassulaceae	Rainhas	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-8	Caméfito	Arbusto suculento	Z11	C2,C16, C21,C22, C25, C27 (grupo)
<i>Kigelia africana</i> (Lam.) Benth.	Bignoniaceae	Árvore-das- salsichas	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	5-7	Micro.	Árvore	Z10	C16(1)
<i>Lagerstroemia indica</i> L.	Lythraceae	Laguerestré-mia; Flor-de-merenda; Suspiros	Paleártico; Indomalaio	Caducifólio	3-11	7-9	Micro.	Árvore	Z7	C2(1), C3(3), C4 (1), C8(3), C9(1), C10(1), C16(2),C18(18), C22(1),C23(1), C28(2)
<i>Lagunaria patersonii</i> (Anderss) G. Don.	Malvaceae	Lagunária	Australiano	Perenifólio	1-12	5-7	Micro.	Árvore	Z10	C22(1)
<i>Lantana camara</i> L.	Verbenaceae	Lantana	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C11 (grupo), C14(1), C21(10), C22 (grupo)
<i>Laurus novocanariensis</i> Rivas Mart. & al.	Lauraceae	Loureiro	Paleártico	Perenifólio	1-12	11-3	Meso.	Árvore	Z10	C23(1)
<i>Lavandula dentata</i> L.	Labiatae	Alfazema	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z8	C1(10), C28(14)
<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) De Wit.	Leguminosae (Mimosoideae)	Aroma-branco; Leucena	Neártico	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z9	C21(4), C22(2)
<i>Leucanthemum x superbum</i> (J. Ingram) Bergmans ex Kent	Compositae	Estrelas	Hortícola	Perenifólio	1-12	5-8	Nano.	Herbácea	Z5	C10, C11, C12 (grupo)
<i>Ligustrum lucidum</i> Ait. f.	Oleaceae	Ligustro; Alfinheiro	Paleártico	Perenifólio	1-12	6-9	Micro.	Árvore	Z7	C21(2)
<i>Ligustrum obtusifolium</i> Sieb. & Zucc.	Oleaceae	Ligustro; Alfeneiro; Alfenheiro	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-6; 11-12	Micro.	Arbusto	Z3	C1,C2, C8, C9, C16, C22 (sebe)
<i>Livistona chinensis</i> (Jacq.) R. Br. ex Mart.	Palmae	Palmeira-de- leque	Paleártico	Perenifólio	1-12	2-5	Meso.	Árvore	Z9	C2(1), C7(4), C16(2)
<i>Lobelia erinus</i> L. .	Campanulaceae	Lobélia	Áfricotropical	Sazonal	4-9	4-12	Terófita	Herbácea	Z9	C9 (grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Lonchocarpus sericeus</i> (Poir.) Kunth ex DC.	Leguminosae (Papilionoideae)	Loncocarpus	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-1	Meso.	Árvore	Z10	C21(1)
<i>Magnolia grandiflora</i> L.	Magnoliaceae	Magnólia	Neártico	Perenifólio	1-12	5-8	Micro.	Árvore	Z6	C2(7), C3(3), C15(3)
<i>Mangifera indica</i> L.	Anacardiaceae	Mangueiro	Indomalaio	Perenifólio	1-12	11-6	Micro.	Árvore	Z11	C21(3)
<i>Markamia lutea</i> (Benth.) Schum.	Bignoniaceae	Marcâmia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Meso.	Árvore	Z11	C16(1)
<i>Matthiola incana</i> (L.) R. Br.	Cruciferae	Goivos	Paleártico	Sazonal	1-7	3-7	Terófito	Herbácea	Z6	C9(12), C10(grupo)
<i>Monstera deliciosa</i> Liebm.	Araceae	Fruto-delicioso; Costela-de-adão	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z10	C2(8), C14(2), C21(10)
<i>Nemesia strumosa</i> Benth. in Hook.	Scrophulariaceae	Nemésia	Áfricotropical	Sazonal	5-8	5-8	Terófito	Herbácea	Z9	C14 (grupo)
<i>Neoregelia johanis</i> (Carrière) L. B. Smith.	Bromeliaceae	Bromélia-ninho-de-passrinho	Neotropical	Perenifólio	1-12	8-1	Hemi.	Herbácea	Z10	C1(12), C21(25), C23(32)
<i>Nerium oleander</i> L.	Apocynaceae	Sevadilha; Loendro	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-11	Micro.	Arbusto	Z9	C8(3), C9(1), C18(36), C19(1), C20(7), C22(7), C23(4), C24(2)
<i>Nicotiana glauca</i> Graham.	Solanaceae	Tabaqueira-azul; Charuteira	Neotropical	Perenifólio	1-12	3-9	Micro.	Arbusto	Z8	C20(7), C21(10)
<i>Nolina recurvata</i> (Lem.) Hemsl.	Agavaceae	Nolina; Pata-de-elefante	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-8	Micro.	Árvore	Z9	C16(1), C21(2)
<i>Ocotea foetens</i> (Aiton) Baill.	Lauraceae	Til	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Meso.	Árvore	Z10	C2(4), C16(1), C19(1), C20(1), C22(2), C24(1)
<i>Opuntia ficus-indica</i> (L.) Mill.	Cactaceae	Tabaibeira	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-7	Micro.	Arbusto suculento	Z9	C18(7), C20(1), C22(2), C28(1)
<i>Opuntia leucotricha</i> D. C.	Cactaceae	Tabaibeira	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-7	Nano.	Arbusto suculento	Z9	C22A(1)
<i>Opuntia tuna</i> (L.) Mill.	Cactaceae	Tabaibeira	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-9	Micro.	Arbusto suculento	Z9	C22A(1)
<i>Osteospermum barberiae</i> (Harv.) Norl.	Compositae	Estrelas-do- cabo	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Caméfito	Arbusto	Z10	C18, C20, C21, C22 (grupo)
<i>Osteospermum ecklonis</i> (DC.) Norl.	Compositae	Estrelas-do- cabo	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Caméfito	Arbusto	Z10	C18, C20, C21, C22, C25 (grupo)
<i>Oxalis pes-caprae</i> L.	Oxalidaceae	Azedas	Áfricotropical	Sazonal	10-5	12-4	Geófito	Herbácea	Z9	C2 (grupo)
<i>Paspalum dilatatum</i> Poir.	Gramineae	Erva-rija; Erva-do-governo	Neotropical	Perenifólio	1-12	3-9	Hemi.	Herbácea	Z8	C19 (tapete)
<i>Pelargonium peltatum</i> (L.) L'Hérit.	Geraniaceae	Malvas	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z10	C8, C28 (grupo)
<i>Pelargonium x hortorum</i> L. H. Bail.	Geraniaceae	Malvas	Hortícola	Perenifólio	1-12	4-7	Nano.	Herbácea	Z10	C1, C8, C18, C21, C22, C23, C24, C25, C28 (grupo)
<i>Persea americana</i> Mill.	Lauraceae	Abacateiro	Neotropical	Perenifólio	1-12	11-5	Micro.	Árvore	Z10	C18(2), C29(1)
<i>Phoenix canariensis</i> ex. Chabaud.	Palmae	Palmeira-das-canárias	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-3	Meso.	Árvore	Z11	C2(7), C4(1), C6(2), C7(26), C8(1), C9(1), C16(3), C20(5), C21(7), C28 (5)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Phoenix reclinata</i> Jacq.	Palmae	Tamareira-do-senegal	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	5-7	Micro.	Árvore	Z11	C7(1), C21(2)
<i>Phoenix roebelinii</i> O' Brien.	Palmae	Palmeira-anã	Indomalaio	Perenifólio	1-12	5-7	Micro.	Árvore	Z11	C4(1)
<i>Phyllanthus tenellus</i> Roxb.	Euphorbiaceae	Quebra-pedra	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Herbácea	Z11	C23 (grupo)
<i>Phytolacca dioica</i> (L.) Moq.	Phytolaccaceae	Bela-sombra	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-9	Meso.	Árvore	Z11	C2(1)
<i>Pilea microphylla</i> (L.) Liebm.	Urticaceae	Arrozinho	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C6, C9, C10, C11, C14, C22, C23 (grupo)
<i>Pittosporum undulatum</i> Vent.	Pittosporaceae	Incenseiro	Australiano	Perenifólio	1-12	2-4	Micro.	Árvore	Z9	C22(1)
<i>Platanus x acerifolia</i> (Ait.) Willd.	Platanaceae	Plátano	Hortícola	Caducifólio	4-11	4-5	Meso.	Árvore	Z7	C29(1)
<i>Plectranthus barbatus</i> Andrews	Labiatae	Falso-boldo; Boldo-da-terra	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C23(2)
<i>Plumeria alba</i> L.	Apocynaceae	Pluméria-branca	Neotropical	Caducifólio	5-2	6-11	Micro.	Árvore	Z10	C9(2)
<i>Plumeria rubra</i> L.	Apocynaceae	Pluméria-vermelha	Neotropical	Caducifólio	5-2	6-2	Micro.	Árvore	Z10	C9(1)
<i>Plumeria rubra</i> L. var. <i>acutifolia</i> (Poir.) Woodson.	Apocynaceae	Planta- dos - dentes; Pluméria	Neotropical	Caducifólio	5-1	6-12	Micro.	Árvore	Z10	C14(1), C22(1), C27(1)
<i>Psidium guajava</i> L.	Myrtaceae	Goiabeira	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-7	Micro.	Árvore	Z10	C2(3), C16(1), C21(2)
<i>Pteris vittata</i> L.	Pteridaceae	Feto	Paleártico; Indomalaio; Australiano Oceânia	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z9	C1(1), C8(!2), C21(24), C22(15), C28(6)
<i>Ptychosperma macarthurii</i> (Wendl.) Nichols.	Palmae	Palmeira-de-macarthur	Australiano; Oceânia	Perenifólio	1-12	6-8	Micro.	Árvore	Z11	C16(1)
<i>Punica granatum</i> L.	Punicaceae	Romãzeira	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-7	Micro.	Árvore	Z9	C8(2)
<i>Pyrostegia venusta</i> (Ker-Gawl.) Miers	Bignoniaceae	Gaitinhas	Neotropical	Perenifólio	1-12	11-5	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	C21(7)
<i>Quercus ilex</i> L.	Fagaceae	Azinheira	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-5	Meso.	Árvore	Z7	C6(1)
<i>Roldana petasites</i> (Sims) H. Robinson & Bretell.	Compositae	Senécio	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-4	Micro.	Arbusto	Z9	C21(grupo)
<i>Rudbeckia fulgida</i> Ait.	Compositae	Margarida-amarela; Susana-de-olhos-negros	Neártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Herbácea	Z3	C6(14), C9(12), C10(30), C11(40), C12(>100), CD15(5), C18(12)
<i>Salvia coccinea</i> Juss. ex Murray	Labiatae	Sálvia	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Herbácea	Z8	C1, C9, C10 (grupo)
<i>Salvia guaranitica</i> St.-Hil. ex Benth.	Labiatae	Sálvia	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z9	C6, C19, C20, C22 (grupo)
<i>Salvia splendens</i> Sell ex Roem. & Scult.	Labiatae	Camarões; Sálvia	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Herbácea	Z10	C1, C2, C5, C6, C8, C9, 10, C11, C12, C14, C15, C16, C18, C21, C26, C28 (grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Sansevieria trifasciata</i> Prain var. <i>laurentii</i> (De Wild.) N. E. Br.	Agavaceae	Língua-de-sogra	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	8-11	Hemi.	Herbácea	Z10	C2(>50)
<i>Schefflera actinophylla</i> (Endl.) Harms	Araliaceae	Brassaia	Australiano; Oceânia	Perenifólio	1-12	8-10	Meso.	Árvore	Z10	C5(1)
<i>Schinus molle</i> L. non hort. ex Engl.	Anacardiaceae	Pimenteira- bastarda; Pimenteira-da- índia	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Meso.	Árvore	Z9	C1(1), C2(1), C4(1), C9(2), C16(6), C20(1), C21(1)
<i>Schotia brachypetala</i> Sonder.	Leguminosae (Caesalpinoideae)	Scótia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	2-5	Micro.	Árvore	Z9	C22(1), C23(1), C24(1)
<i>Senecio cineraria</i> DC.	Compositae	Senécio	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-8	Nano.	Arbusto	Z8	C9, C11, C12, C15 (grupo)
<i>Senna didymobotrya</i> (Fres.) Irwin & Barneby.	Leguminosae (Caesalpinoideae)	Planta-das- pipocas; Cássia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C21(1), C28(2)
<i>Senna pendula</i> (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Irwin & Barneby var. <i>glabrata</i> (Vogel) Irwin & Barneby	Leguminosae (Caesalpinoideae)	Chuva-de-ouro; Cássia	Neotropical; Nearctico	Perenifólio	1-12	10-1	Micro.	Arbusto	Z9	C5(1), C16 (14), C20(3), C22(7), C24(1)
<i>Solenostemon scutellarioides</i> (L.) Codd.	Labiatae	Cóleos	Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C1(>50), C2(8)
<i>Spathodea campanulata</i> Beauv.	Bignoniaceae	Chama-da- floresta; Tulipeiro-africano	Áfricotropical	Caducifólio	1-12 (Variação individual)	1-12	Micro.	Árvore	Z11	C4(1), C5(5), C6(2), C9(1), C16(1), C19(1), C20(1), C22(1), C23(1), C24(2)
<i>Stenotaphrum secundatum</i> (Walter) Kuntze	Gramineae	Relva; Relva-de-correr	Neotropical; Áfricotropical; Oceânia	Perenifólio	1-12	3-11	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z9	C1, C3, C4, C5, C6, C7,C8,C9,C14, C16, C19, C20, C25,C26, C28 (tapete)
<i>Strelitzia nicolai</i> Reg. & Körn.	Strelitziaceae	Estrelícia-gigante	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C14(grupo), C16(3)
<i>Strelitzia reginae</i> Banks ex Dryand.	Strelitziaceae	Estrelícia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C1(2), C10(12), C13(12), C14(17)
<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassm.	Palmae	Coqueiro-de- jardim; Palmeira-rainha	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-7	Micro.	Árvore	Z10	C6(1), C9(3)
<i>Syzygium jambos</i> (L.) Alston.	Myrtaceae	Jambeiro	Indomalaio	Perenifólio	1-12	3-7	Micro.	Árvore	Z10	C16(2), C21(2)
<i>Syzygium malaccense</i> (L.) Merril & Perry	Myrtaceae	Jambeiro	Indomalaio; Australiano	Perenifólio	1-12	4-6	Micro.	Árvore	Z10	C13(1)
<i>Tagetes patula</i> L.	Compositae	Cravos-de-burro	Neotropical	Sazonal	1-9	3-8	Terófito	Herbácea	Z9	C1,C2, C5,C6, C9, C10, C16, C18, C22,C24, C26 (grupo)
<i>Tecoma stans</i> (L.) Juss. ex HBK.	Bignoniaceae	Estenolóbio	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C7(1), C21(6)
<i>Tibouchina urvilleana</i> (DC) Cogn.	Melastomataceae	Aranhas	Neotropical	Perenifólio	1-12	7-12	Micro.	Arbusto	Z10	C9(2)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	Leguminosae (Papilionoideae)	Tipuana	Neotropical	Marcescente	5-4 (3-4)	4-7	Meso.	Árvore	Z9	C2 (13), C6(2), C20(2), C21(3), C28(1)
<i>Tradescantia pallida</i> (Rose) D. Hunt.	Commelinaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea trepadora	Z8	C1, C14, C18, C24, C25, C26 (grupo)
<i>Tradescantia spathacea</i> SW.	Commelinaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	10-2	Hemi.	Herbácea	Z9	C11(grupo)
<i>Tradescantia zebrina</i> hort. ex. Bosse	Commelinaceae	Zebrina	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z9	C1, C2 (grupo)
<i>Trifolium repens</i> L.	Leguminosae	Trevo	Paleártico	Perenifólio	1-12	2-10	Hemi.	Herbácea	Z4	C19 (grupo)
<i>Verbena x hybrida</i> Groenl. & Ruempl.	Verbenaceae	Verbena	Hortícola	Perenifólio	1-12	6-10	Caméfito	Herbácea	Z9	C9, C11, C12 (grupo)
<i>Washingtonia filifera</i> (Lind. ex André) H. A. Wendl	Palmae	Palmeira-de-leque- da- califórnia	Neártico	Perenifólio	1-12	5-8	Micro.	Árvore	Z9	C4(1)
<i>Yucca elephantipes</i> Regel.	Agavaceae	luca	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-10	Micro.	Arbusto	Z10	C20(3), C21(3), C22(1), C23(2) C28(1), C29(1)
<i>Yucca faxoniana</i> (Trelease) Sargent	Agavaceae	lúca	Neotropical; Neártico	Perenifólio	1-12	Não floriu**	Micro.	Árvore	Z10	C16(1)
<i>Yucca gloriosa</i> L.	Agavaceae	luca	Neártico	Perenifólio	1-12	6-11	Micro.	Arbusto	Z7	C6(4), C16(22), C16A(5), C18(1), C21(3), C22(8), C28(1)
<i>Yushania anceps</i> (Mitford) Yi.	Gramineae	Bambu	Paleártico	Perenifólio	1-12	Não floriu**	Hemi.	Herbácea	Z9	C16, C17(grupo)

Legenda:

- Plantas que não floriram no período em estudo (Janeiro 2002 – Janeiro 2005): * plantas novas; ** plantas que nunca floriram por falta de aclimação;
- Plantas marcescentes (plantas semiperenifólias e semicaducifólias): 3-2 (3-4) – folhas todo o ano mas com renovação significativa em Março e Abril.

Anexo 3
CARACTERIZAÇÃO FITOGEOGRÁFICA DO PARQUE MUNICIPAL DO MONTE

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Abelia x grandiflora</i> (André) Rehd.	Caprifoliaceae	Abélia	Hortícola	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z5	C1(8), C2(1), C10C(1), 10B(1)
<i>Abutilon megapotamicum</i> (Spreng.) St.-Hil. & Naudin.	Malvaceae	Abutilão; Lanternas	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z9	C49A(3)
<i>Abutilon pictum</i> (Gillies ex Hook. & Arn.) Walp.	Malvaceae	Abutilão	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z9	C48(1)
<i>Acacia dealbata</i> Link.	Leguminosae (Mimosoideae)	Mimosa	Australiano	Perenifólio	1-12	12-3	Meso.	Árvore	Z8	C2(8)
<i>Acacia meamsii</i> De Wildeman.	Leguminosae (Mimosoideae)	Mimosa	Australiano	Perenifólio	1-12	1-8	Micro.	Árvore	Z8	C2(27)
<i>Acanthus mollis</i> L.	Acanthaceae	Erva-gigante	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-8	Hemi.	Herbácea	Z6	C2A(grupo)
<i>Acca sellowiana</i> (O. Berg.) Burret	Myrtaceae	Goiabeira-ananás	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-7	Micro.	Árvore	Z8	C2(1), C59(1)
<i>Acer negundo</i> L.	Aceraceae	Ácer	Neártico	Caducifólio	4-11	5-6	Micro.	Árvore	Z4	C33(1), C52(1)
<i>Acer palmatum</i> Thunb.	Aceraceae	Ácer-do-japão	Paleártico	Caducifólio	4-11	4	Micro.	Árvore	Z5	C2(2), C12(2) C28(2)
<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	Aceraceae	Ácer; Sicómoro	Paleártico	Caducifólio	4-11	4	Meso.	Árvore	Z5	C44(1)
<i>Adiantum capillus-veneris</i> L.	Adiantaceae	Avenca	Paleártico, Neotropical, Áfricotropical, Indomalaio	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z8	C1, C2, C13, C14, C16, C11A, C12 (grupo)
<i>Adiantum hispidulum</i> Swartz	Adiantaceae	Feto-pata-de- galinha	Paleártico, Áfricotropical, Indomalaio, Oceânia, Australiano, Antártico	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z10	C1, C2, C8, C11A, C13, C14, C15, C26, C28, C51, C53, C56, C62 (grupo)
<i>Aechmea fasciata</i> (Lindl.) Bak.	Bromeliaceae	Bromélia	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C50(20)
<i>Aeonium glandulosum</i> (Aiton) Webb & Berthel	Crassulaceae	Ensaio; Saio	Paleártico	Perenifólio	1-12	7-8	Caméfito	Herbácea suculenta	Z10	C26(1)
<i>Aeonium glutinosum</i> (Aiton.) Webb. & Berthel.	Crassulaceae	Farrobo; Ensaio	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-8	Nano.	Herbácea suculenta	Z10	C44(grupo)
<i>Aesculus hippocastanum</i> L.	Hippocastanaceae	Castanheiro-de- cavalo; Castanheiro-da- índia	Paleártico	Caducifólio	3-12	4-5	Meso.	Árvore	Z6	C7(1), C8(1), C59(1), C64(1)
<i>Agapanthus praecox</i> Willd. ssp. <i>orientalis</i> (Leighton) Leighton	Liliaceae	Agapantos; Coroas-de- henrique	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	4-9	Hemi.	Herbácea	Z9	C1, C2, C2A, C3, C3A, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C11, C11A, C25, C26, C27, C28, C29, C30, C31, C32, C33, C38, C39, C41, C42, C45,

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
										C46, C52, C53, C56, C57, C58, C59, C61, C62, C63, C64 (mancha)
<i>Agathis robusta</i> (C. Moore ex. F. Muell.) Bail.	Araucariaceae	Pinheiro-de-damara; Pinheiro-com-folha-de-alegra-campo	Australiano	Perenifólio	1-12	3-4	Meso.	Árvore	Z9	C29(1), C32(1), C56(1), C57(1), C64(1)
<i>Agave attenuata</i> Salm-Dyck	Agavaceae	Piteira; Agave-pescoço-de-cisne	Neotropical	Perenifólio	1-12	12-3	Nano.	Árvore suculenta	Z9	C2 (2)
<i>Ageratina adenophora</i> (Spreng.) R. King. & H. Robinson	Compositae	Abundância	Neotropical	Perenifólio	1-12	3-7	Nano.	Herbácea	Z10	C1, C2, C6, C8, C9, C11, C12, C26, C44, C55, C57A, C59 (grupo)
<i>Ageratina riparia</i> (Reg.) R. King. & H. Robinson	Compositae	Falsa-abundância	Neotropical	Perenifólio	1-12	2-6	Nano.	Herbácea	Z10	C1, C2, C8, C25, C26, C44 (grupo)
<i>Albizia lophantha</i> Benth.	Leguminosae (Mimosoideae)	Albizia	Australiano	Perenifólio	1-12	10-1	Micro.	Árvore	Z9	C9(1)
<i>Alcea rosea</i> L.	Malvaceae	Malva	Paleártico	Sazonal	3-10	5-9	Terófito	Herbácea	Z4	C1, C12, C14, C15, C16, C17, C22, C60 (grupo)
<i>Allium triquetrum</i> L.	Liliaceae (Alliaceae)	Alinho; Alho-bravo	Paleártico	Sazonal	12-4	12-4	Geófito	Herbácea	Z8	C1, C2, C33, C34, C44 (grupo)
<i>Alocasia macrorrhiza</i> (L.) G. Don.	Araceae	Taro	Indomalaio	Perenifólio	1-12	4-8	Hemi.	Herbácea	Z10	C2(2)
<i>Aloe arborescens</i> Mill.	Liliaceae	Babosas	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	11-2	Nano.	Arbusto suculento	Z9	C1(grupo)
<i>Aloe vera</i> (L.) Burm.	Liliaceae	Aloé-vera; Babosas	Paleártico; Neotropical	Perenifólio	1-12	11-6	Hemi.	Herbácea suculenta	Z8	C2A (grupo)
<i>Amaryllis belladonna</i> L.	Amaryllidaceae	Açucenas-da-serra; Belas-donas	Áfricotropical	Sazonal	5-7	8-11	Geófito	Herbácea	Z8	C1, C2, C25, C26, C31, C37, C40, C49A, C50, C55, C56 (grupo)
<i>Ananas nanus</i> (L.B. Sm.) L.B. Sm.	Bromeliaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	5-7	Hemi.	Herbácea	Z11	C25, C50 (grupo)
<i>Anemone hupehensis</i> Lem.	Ranunculaceae	Anêmona	Paleártico	Perenifólio	1-12	8-12	Hemi.	Herbácea	Z6	C44 (grupo)
<i>Anisodonteia capensis</i> (L.) Bates	Malvaceae	Malva-do-cabo	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	3-10	Nano.	Arbusto	Z9	C39(15)
<i>Annona cherimola</i> Mill.	Annonaceae	Anoneira	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-7	Micro.	Árvore	Z10	C2(4)
<i>Apollonias barbujana</i> (Cav.) Bomm.	Lauraceae	Barbusano	Paleártico	Perenifólio	1-12	9-3	Meso.	Árvore	Z10	C2A(1)
<i>Aquilegia alpina</i> L.	Ranunculaceae	Aquilégia	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-8	Hemi.	Herbácea	Z5	C2(1), C15(3), C24A(13)
<i>Araucaria heterophylla</i> (Salisb.) Franco	Araucariaceae	Araucária	Oceânia	Perenifólio	1-12	2-3	Macro.	Árvore	Z9	C2(1), C5(1)
<i>Arctotis x hybrida</i> hort.	Compositae	Arctótis; Margarida-africana	Hortícola	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z9	C1, C2, C2A, C34, C35, C36, C39, C43, C46, C48 (grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Argyranthemum frutescens</i> (L.) Schultz-Bip.	Compositae	Estrelas; Estreleiras; Pampilhos; Malmequeres	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C10(grupo), C10C(9), C10D(3), C12(3)
<i>Argyranthemum pinnatifidum</i> (L. f.) Lowe ssp. <i>pinnatifidum</i>	Compositae	Estrelas; Pampilhos; Malmequeres	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C1(>50), C2(>50), C2A(24), C3(6), C7(1), C8(5), C13(1), C12(3), C26(1), C35(6), C43(8), C46(3), C48(3), C55(6), C57A(4), 60(>20), C61(4)
<i>Artemisia argentea</i> L'Hér.	Compositae	Losna	Antártico	Perenifólio	1-12	5-7	Geófita	Herbácea	Z8	C12(4)
<i>Asparagus setaceus</i> (Kunth) Jassop	Liliaceae (Asparagaceae)	Espargo-de-folha- miúda; Esparto	Afrotropical	Perenifólio	1-12	9-12	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z9	C55(grupo)
<i>Aspidistra elatior</i> Bl.	Liliaceae (Convallariaceae)	Aspidistra	Paleártico	Perenifólio	1-12	6-7	Hemi.	Herbácea	Z8	C9(8), C48(grupo), C55(grupo)
<i>Baeckea virgata</i> (Forst. & Forst. f.) Andrews.	Myrtaceae	Béquia	Australiano	Perenifólio	1-12	6-8	Nano.	Arbusto	Z9	C2(2)
<i>Bauhinia variegata</i> L.	Leguminosae (Caesalpiniaceae)	Bauínia; Árvore-das- orquídeas	Indomalaio	Marcescente	5-4 (12-4)	10-6	Micro.	Árvore	Z9	C2(2)
<i>Begonia x ricinifolia</i> A. Dietr.	Begoniaceae	Corações; Begónias	Hortícola	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C14, C23(grupo)
<i>Berberis maderensis</i> Lowe	Berberidaceae	Ameixieira-de- espinho; Fustete	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-5	Micro.	Arbusto	Z10	C22(1)
<i>Bergenia crassifolia</i> (L.) Fritsch.	Saxifragaceae	Bergénia; Couve-de-jardim	Paleártico	Perenifólio	1-12	11-4	Caméfito	Herbácea	Z3	C1,C2,C2A,C5, C9, C27, C48 (grupo)
<i>Billbergia amoena</i> (Lodd.) Lindl.	Bromeliaceae	Bromélia	Neotropical	Perenifólio	1-12	12-3	Hemi.	Herbácea	Z11	C56(grupo)
<i>Blechnum spicant</i> (L.) Roth.	Blechnaceae	Feto-de-pente	Paleártico; Neártico	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z4	C14(12), C15(26)
<i>Brachychiton acerifolius</i> Cunn. ex. F. Muell.	Sterculiaceae	Árvore-do-fogo	Australiano	Caducifólio	1-5; 8-12	5-8	Micro.	Árvore	Z10	C9(1), C11(2)
<i>Brugmansia arborea</i> (L.) Lagerh.	Solanaceae	Trombeteira	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C24A(3), C25 (1), C35(2), C50(3), C57(2)
<i>Brugmansia sanguinea</i> (Ruiz & Pav.) D. Don.	Solanaceae	Trombeteira	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C2(1)
<i>Brugmansia versicolor</i> Lagerh.	Solanaceae	Trombeteira	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C9(8), C11(1), C34(2), C43(3)
<i>Brunfelsia pauciflora</i> (Cham. & Scltd.) Benth.	Solanaceae	Brunfelsia; Manacá	Neotropical	Perenifólio	1-12	2-10	Micro.	Arbusto	Z10	C12(1), C14(2), C15(2), C16(1), C23(1), C24A(1)
<i>Buddleja davidii</i> Franch.	Loganiaceae	Budléia	Paleártico	Perenifólio	1-12	6-10	Micro.	Arbusto	Z5	C2(2)
<i>Bulbine frutescens</i> (L.) Willd.	Liliaceae (Asphodelaceae)	Bulbine	Áfrotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Geófita	Herbácea suculenta	Z9	C1, C2, C3, C9 (grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Buxus sempervirens</i> L.	Buxaceae	Buxo	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-4	Nano.	Arbusto	Z5	C5, C7, C10A-D, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C24A, C25, C26, C27, C28, C29, C30, C31, C32, C33, C35, C37, C38, C39, C40, C41, C42, C43, C44, C45, C46, C47, C48, C49A, C50, C51, C52, C53, C55, C56, C57, C58, C59, C60, C62, C63, C64 (grupo)
<i>Calendula officinalis</i> L.	Compositae	Calendula	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Terófito	Herbácea	Z6	C2, C10B, C14, C16, C23 (grupo)
<i>Callistemon citrinus</i> (Curtis) Skeels.	Myrtaceae	Martinete	Australiano	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z8	C2(1)
<i>Calycanthus occidentalis</i> Hook. & Arn.	Calycanthaceae	Carocha (Californian- allspice)	Neártico	Caducifólio	4-11	4-8	Micro.	Arbusto	Z7	C31(1)
<i>Camellia japonica</i> L.	Theaceae	Camélia; Japoneira	Paleártico	Perenifólio	1-12	11-6	Micro.	Árvore	Z8	C1(16), C6(3), C12(1), C15(1), C27(1), C30(2), C31(2), C38(2), C39(3), C40(3), C44(2), C45(4), C46(1), C48(1), C50(1), C52(2), C55(1), C56(10), C57(1), C58(1), C59(1), C62(2), C64(1)
<i>Camellia reticulata</i> Lindl.	Theaceae	Camélia	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-5	Micro.	Árvore	Z8	C15(1)
<i>Canna indica</i> L.	Cannaceae	Canas-da-índia; Bananeiras-de- flor	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Geófito	Herbácea	Z9	C2, C34 (grupo)
<i>Canna x generalis</i> L. H. Bail.	Cannaceae	Canas-da-índia; Bananeiras-de- flor	Hortícola	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z9	C1, C2, C19, C34, C43, C59 (grupo)
<i>Castanea sativa</i> Mill.	Fagaceae	Castanheiro	Paleártico	Caducifólio	3-12	3-8	Meso.	Árvore	Z5	C1(3), C2(3), C3(3), C28(1), C45(2), C52(1), C53(1), C56(1), C61(1)
<i>Cedrus deodara</i> (D. Don) G. Don.	Pinaceae	Cedro- deodara; Cedro-dos- himalaias	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-5	Meso.	Árvore	Z7	C22(1), C24(1), C24A(1)
<i>Celtis australis</i> L.	Ulmaceae	Lódão-bastardo; Conteira	Paleártico	Caducifólio	4-1	5-6	Meso.	Árvore	Z8	C64(2)
<i>Centaurea cineraria</i> L.	Compositae	Centaurea	Paleártico	Perenifólio	1-12	6-8	Nano.	Herbácea	Z7	C1, C2(grupo)
<i>Cercis siliquastrum</i> L.	Leguminosae (Papilionoideae)	Olaia; Árvore-de- judas	Paleártico	Caducifólio	4-11	10-5	Micro.	Árvore	Z7	C1(1), C35(1)
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> (Murray) Parl.	Cupressaceae	Cedro-de- orégão	Neártico	Perenifólio	1-12	1-2	Micro.	Árvore	Z6	C1(1), C10C(1), C15(1), C23(1), C28(2), C32(1), C44(4), C58(1), C59(1),

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitoceográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
										C64(1)
<i>Chamaedorea elegans</i> Mart.	Palmae	Palmeira-de-salão; Palmeira-bambu	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-6	Micro.	Arbusto	Z10	C46(1), C54(1)
<i>Chasmanthe aethiopica</i> (L.) N. E. Br.	Iridaceae	Antoliza	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	11-3	Geófito	Herbácea	Z9	C5, C8, C29, C26, C29, C33 (grupo)
<i>Chelidonium majus</i> L.	Papaveraceae	Celidónia; Cedronha	Paleártico	Perenifólio	1-12	2-8	Hemi.	Herbácea	Z6	C1 C2, C24A, C26, C28, C49A, C55(grupo)
<i>Chlorophytum comosum</i> (Thumb.) Jacques Cv.	Liliaceae (Anthericaceae)	Fitinhas	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z9	C1(>50), C2(50) C12(bordadura)
<i>Choisya ternata</i> HBK.	Rutaceae	Laranjeira-do-méxico	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z7	C1(1), C2(6), C25(1), C28(3), C37(8), C40(4), C44(2), C45(2), C48(12), C50(8), C55(6), C58(10)
<i>Chorisia speciosa</i> A. St. Hil.	Bombacaceae	Sumaúma	Neotropical	Caducifólio	4-11	10-11	Meso.	Árvore	Z10	C59(1), C64(1)
<i>Citrus sinensis</i> (L.) Osbeck	Rutaceae	Laranjeira	Paleártico	Perenifólio	1-12	2-4	Micro.	Árvore	Z9	C2(3)
<i>Clematis aristata</i> R. Br.	Ranunculaceae	Clematite-da-austrália	Australiano	Perenifólio	1-12	6-9	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z8	C2A(2)
<i>Clethra arborea</i> Ait.	Clethraceae	Folhado	Paleártico	Perenifólio	1-12	7-10	Micro.	Árvore	Z10	C1(11), C2(6), C2A(4), C3 (6), C3A(4), C4 (4), C8(1), C23(1), C26(1), C27(2), C30(1), C51(1), C59(1), C62(1)
<i>Clivia miniata</i> Regel	Amaryllidaceae	Clívia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	2-11	Hemi.	Herbácea	Z10	C9, C12, C19, C24, C25, C38, C45, C46, C48, C49A, C51, C55, C56, C57A, C58, C59 (grupo)
<i>Clivia nobilis</i> Lindl.	Amaryllidaceae	Clívia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	2-11	Hemi.	Herbácea	Z10	C38, C57A, C59 (grupo)
<i>Colocasia esculenta</i> (L.) Schott.	Araceae	Inhame	Indomalaio	Perenifólio	1-12	5-6	Geófito	Herbácea	Z10	C2(grupo)
<i>Commelina benghalensis</i> L.	Commelinaceae	Erva-menina; Flor-dum-dia	Indomalaio Áfricotropical;	Perenifólio	1-12	3-9	Hemi.	Herbácea trepadora	Z9	C2, C8 (grupo)
<i>Cordyline australis</i> (Forst.) Endl.	Agavaceae	Cordilina	Antártico	Perenifólio	1-12	4-7	Micro.	Árvore	Z9	C21(1), C31(1), C50(1), C51(1)
<i>Cordyline stricta</i> (Sims) Endl.	Agavaceae	Cordiline	Australiano	Perenifólio	1-12	2-10	Nano.	Arbusto	Z10	C9(2), C31(2), C41(2), C42(2), C55 (grupo), C58(grupo)
<i>Cortaderia selloana</i> (Schult. & Schult. f.) Asch. & Gräbn.	Gramineae	Plumas; Erva-das-pampas; Penacho-branco	Neotropical	Perenifólio	1-12	7-10	Hemi.	Herbácea	Z6	C1(grupo)
<i>Corylus maxima</i> Mill.	Betulaceae (Corylaceae)		Paleártico	Perenifólio	1-12	8-12	Micro.	Arbusto	Z5	C26(3), C28(2), C32(1), C33(1), C35(1), C36(3), C37(1), C39(8), C58(1)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Cosmos bipinnatus</i> Cav.	Compositae	Cosmos	Neártico; Neotropical	Sazonal	3-7	3-6	Terófito	Herbácea	Z8	C1 (grupo)
<i>Cotoneaster pannosus</i> Franch.	Rosaceae		Paleártico	Perenifólio	1-12	4-5	Micro.	Arbusto	Z7	C10D(1), C15(1)
<i>Crassula multicauda</i> Lem.	Crassulaceae	Crássula	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea suculenta	Z10	C27, C38, C39, C40, C44, C45, C46, C47, C48, C49A, C57A (grupo)
<i>Crinum moorei</i> Hook. f.	Amaryllidaceae	Crino	Áfricotropical	Sazonal	11-9	4-8	Geófito	Herbácea	Z8	C1, C8, C9, C25, C26, C48, C49A, C50, C52, C55(grupo)
<i>Crocasmia x crocosmiflora</i> (Burb. & Dean) N.E. Br.	Iridaceae	Monbrécias; Hastes-de-são-josé	Hortícola	Perenifólio	1-12	5-9	Geófito	Herbácea	Z7	C1, C2, C2A, C3, C9, C19, C20, C24A, C27, C28, C30, C37, C39, C40, C45, C46, C48, C51, C52, C58, C61 (grupo)
<i>Cryptomeria japonica</i> (L.f.) Don	Taxodiaceae	Criptoméria	Paleártico	Perenifólio	1-12	12-3	Meso.	Árvore	Z7	C56(1), C58(1)
<i>Cuphea ignea</i> A. DC.	Lythraceae	Cigarrinhos	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C1, C2 (grupo)
<i>Cupressus lusitanica</i> Mill.	Cupressaceae	Cedro-de-goia	Neártico; Neotropical	Perenifólio	1-12	1-3	Meso.	Árvore	Z9	C9(9), C11A (8)
<i>Cyathea australis</i> (R. Br.) Domin	Cyatheaceae	Feto-arbóreo	Australiano	Perenifólio	1-12	-----	Micro.	Árvore	Z9	C25(2), C28(1), C40(1), C47(1), C48(2), C50(1), C51(2), C55(4), C59(2), C62(1)
<i>Cyathea cooperi</i> (F. Mueller) Domin.	Cyatheaceae	Feto-arbóreo	Australiano	Perenifólio	1-12	-----	Micro.	Árvore	Z10	C1(11), C2(3), C2A(1), C3(5), C5(6), C8(9), C12(4), C18(1), C24A(1), C26(6), C27(3), C28(4), C31(1), C33(1), C39(2), C41(2), C42(1) C43(1), C44(2), C48(2), C49(4), C52(1), C54(10), C55(1), C57(1), C57A(1) C59(2), C62(2)
<i>Cymbalaria muralis</i> P. Gaertn., Mey. & Scherb.	Scrophulariaceae	Perpétua-de-roma	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-10	Hemi.	Herbácea	Z3	C1, C2, C13, C26, C28 (grupo)
<i>Cymbidium insigne</i> Rolfe	Orchidaceae	Orquídea-de- haste; Cimbidio	Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-6	Hemi.	Herbácea	Z9	C2A(2)
<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link.	Leguminosae (Papilionoideae)	Giesta	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-7	Micro.	Arbusto	Z5	C2(1), C29(1)
<i>Dahlia imperialis</i> Roez. ex Ortgies.	Compositae	Dália-imperial	Neotropical	Perenifólio	1-12	11-3	Micro.	Arbusto	Z10	C2A(7), C3A(4)
<i>Davallia canariensis</i> (L.) Sm.	Davalliaceae	Cabrinhas	Paleártico	Perenifólio	1-12	-----	Epífita	Herbácea	Z9	C1, C2, C2A, C56
<i>Delairea odorata</i> Lem.	Compositae	Tasneirinha	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	12-3	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z9	C2(grupo), C9(1)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Dendranthema x grandiflorum</i> Kitam.	Compositae	Crisântemo-das-floristas	Hortícola	Perenifólio	1-12	10-12	Nano.	Herbácea	Z4	C2, C2A, C10A, C10C, C12 (grupo)
<i>Dianthus barbatus</i> L.	Caryophyllaceae	Craveiro	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-7	Nano.	Herbácea	Z4	C2A (grupo)
<i>Dicksonia antarctica</i> Labill.	Dicksoniaceae	Feto-arbóreo	Australiano	Perenifólio	1-12	-----	Micro.	Árvore	Z8	C13(2), C17(1), C20(1), C48(2), C49A(1)
<i>Dietes bicolor</i> (Steud.) Klatt.	Iridaceae	Dietes	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	4-8	Geófita	Herbácea	Z9	C2, C37, C56, C59 (grupo)
<i>Dietes iridioides</i> (L.) Klatt.	Iridaceae	Dietes	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-5	Geófita	Herbácea	Z9	C2, C52 (grupo)
<i>Diplazium caudatum</i> (Cav.) Jermy	Woodsiaceae	Feto	Paleártico	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z10	C2, 2A, C50, C51, C54, C55 (grupo)
<i>Dodonaea viscosa</i> (L.) Jacq.	Sapindaceae		Indomalaio; Australiano; Áfricotropical; Neotropical	Perenifólio	1-12	5-7	Micro.	Arbusto	Z9	C38(1)
<i>Dombeya wallichii</i> (Lindl.) B. D. Jackson	Sterculiaceae	Dombeia; Aurora	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	12-2	Micro.	Árvore	Z10	C2(1)
<i>Duchesnea indica</i> (Andrews) Focke.	Rosaceae	Morangueiro-selvagem	Paleártico; Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea trepadora	Z6	C1, C2, C2A(mancha)
<i>Duranta erecta</i> L.	Verbenaceae	Duranta	Neotropical	Perenifólio	1-12	7-1	Micro.	Arbusto	Z10	C1(1), C2A(1), C25(7), C39(3)
<i>Echium candicans</i> L. f.	Boraginaceae	Massaroco	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-6	Micro.	Arbusto	Z10	C1(11), C2(12), C3(3), C9(2)
<i>Echium nervosum</i> Dryand.	Boraginaceae	Massaroco	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-6	Nano.	Arbusto	Z11	C3A(2), C9(2), C12(1), C32(2), C45(2), C47(1)
<i>Encephalartos transvenosus</i> Stapf & Burtt Davy.	Zamiaceae	Encefalartos	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	5-11	Micro.	Árvore	Z9	C10B(1)
<i>Erica carnea</i> L.	Ericaceae	Urze-de- inverno	Paleártico	Perenifólio	1-12	11-2	Nano.	Arbusto	Z5	C12(grupo)
<i>Erica platycodon</i> (Webb & Berthel.) Rivas Mart. & al. ssp. <i>madericola</i> (D. C. McClint.) Rivas Mart. & al.	Ericaceae	Urze-das-vassouras; Urze-durázia	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-6	Micro.	Arbusto	Z10	C9(1), C27(1), C29(2), C30(10), C31(1)
<i>Erigeron karvinskianus</i> D.C.	Compositae	Intrometidas; Floricos; Margaridas	Neotropical	Perenifólio	1-12	3-11	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z7	C1, C12, C13, C14, C15, C28, C44, C47, C57A, C59 (grupo)
<i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl.	Rosaceae	Nespereira	Paleártico	Perenifólio	1-12	11-12	Micro.	Árvore	Z8	C2(2)
<i>Eriocephalus africanus</i> L.	Compositae	Alecrim-de-nossa-senhora	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	4-1	Nano.	Arbusto	Z9	C1(grupo)
<i>Erysimum bicolor</i> (Hornem.) DC.	Cruciferae	Goivo-da-serra	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-5	Nano.	Arbusto	Z10	C2(2)
<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.	Myrtaceae	Eucalipto	Australiano	Perenifólio	1-12	12-4	Meso.	Árvore	Z8	C2(3)
<i>Euonymus japonicus</i> Thunb.	Celastraceae	Verde-gaio	Paleártico	Perenifólio	1-12	7-8; 11-12	Micro.	Arbusto	Z7	C2(3), C13(2), C28(1), C36(1), C49A(2), C53(1), C55(3), C59(1)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Euphorbia mellifera</i> Ait.	Euphorbiaceae	Alindres; Figueira-do-inferno	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-5	Micro.	Arbusto	Z10	C12(1)
<i>Euphorbia piscatoria</i> Ait.	Euphorbiaceae	Figueira-do-inferno	Paleártico	Caducifólio	9-6	4-6	Micro.	Arbusto suculento	Z10	C51(1), C54(1), C56(1)
<i>Euphorbia pulcherrima</i> Willd. ex Klotzsch.	Euphorbiaceae	Manhã de Páscoa	Neotropical	Caducifólio	5-2	11-1	Micro.	Arbusto	Z10	C2(1), C12(1)
<i>Euryops pectinatus</i> (L.) Cass.	Compositae	Estrela-amarela	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z9	C2(1), C14(3)
<i>Fagus sylvatica</i> L.	Fagaceae	Faia-europeia	Paleártico	Caducifólio	4-12	4-5	Meso.	Árvore	Z5	C27(2), C35(1), C40(3), C44(1), C46(1), C57(1)
<i>Fagus sylvatica</i> L. var. <i>purpurea</i> (Ait.) Schneid.	Fagaceae	Faia-europeia; Faia-de-cobre	Paleártico	Caducifólio	4-12	4-5	Meso.	Árvore	Z5	C1(1), C2(1), C5(3), C27(1), C30(1), C32(1), C33(1), C41(2), C43(1), C45(1), C46(1), C51(1), C57(2)
<i>Farfugium japonicum</i> (L.) Kitam.	Compositae	Patás-de-cavalo; Boinas	Paleártico	Perenifólio	1-12	10-2; 6-7	Hemi.	Herbácea	Z7	C2, C8, C40, C47, C43, C48, C52, C53, C57, C58 (grupo)
<i>Ficus carica</i> L.	Moraceae	Figueira	Paleártico	Caducifólio	4-12	6-7	Micro.	Árvore	Z8	C8(1), C44(1)
<i>Ficus pumila</i> L.	Moraceae	Pastinha	Indomalaio; Paleártico	Perenifólio	1-12	10-12	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z8	C3, C3A, C4, C28, C43, C49A, C55; C56, C57A, C59, C60, C61 (grupo)
<i>Fragaria vesca</i> L.	Rosaceae	Morangueiro- selvagem	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-4	Hemi.	Herbácea trepadora	Z4	C1, C2, C2A (mancha)
<i>Fraxinus excelsior</i> L.	Oleaceae	Freixo	Paleártico	Caducifólio	2-11	1-2	Micro.	Árvore	Z4	C31(1)
<i>Fuchsia arborescens</i> Sims.	Onagraceae	Fúcsia-arbórea	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z9	C1(54), C2(13), C2A(7), C3(2), C3A(6), C9(5), C11A(1), C24(2), C25(1), C26(1), C31(1), C38(1), C39(1), C40(1), C44(1), C45(1), C52(5), C55(1), C58(2), C61(1)
<i>Fuchsia boliviana</i> Carr.	Onagraceae	Fúcsia; Brincos-de- princesa; Mimos	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C1(5), C2(4), C24A(2), C25(5), C26(12), C26A(5), C28(5), C44(22), C46(12), C49A(6), C50(8), C51(4), C55(10), C56(20), C57A(1), C58(6), C59(3), C62(6)
<i>Fuchsia magellanica</i> Lam.	Onagraceae	Fúcsia; Brincos-de- princesa; Mimos	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z7	C2, C3, C5, C6, C7, C11, C27, C29, C30, C31, C40, C59 (grupo)
<i>Fuchsia triphylla</i> L.	Onagraceae	Fúcsia; Brincos-de- princesa; Mimos	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z11	C11, C12 (grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Geranium maderense</i> P. F. Yeo	Geraniaceae	Gerânio-da-madeira;	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-6	Nano.	Herbácea	Z10	C1(13), C8(4), C9(3), C24 (grupo), C35(1), C60(grupo)
<i>Geranium palmatum</i> Cav.	Geraniaceae	Gerânio-de- folha-de-anêmona; Pássaras	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-12	Nano.	Herbácea	Z10	C1(>50), C2(>50), C5(2), C8(5), C12(2), C35(3), C36(6)
<i>Ginkgo biloba</i> L.	Ginkgoaceae	Ginco; Árvore - avenca	Paleártico	Caducifólio	4-12	5	Micro.	Árvore	Z4	C20(1), C28(1)
<i>Hebe salicifolia</i> (Forst. f.) Pennell.	Scrophulariaceae	Verónica; Hebe	Neotropical; Antártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z7	C2A(1), C12(2), C27(1), C29(4), C30(14), C31(2), C41(3), C42(1),
<i>Hebe x andersonii</i> (Lindl. & Paxt.) Ckn.	Scrophulariaceae	Verónica; Hebe	Hortícola	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z9	C1(1)
<i>Hedera canariensis</i> Willd.	Araliaceae	Hera	Paleártico	Perenifólio	1-12	7-10	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z8	C1, C2 (grupo)
<i>Hedera maderensis</i> K. Koch ex A. Rutherf. ssp. <i>maderensis</i>	Araliaceae	Hera	Paleártico	Perenifólio	1-12	7-10	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	C1, C2, C2A, C3, C3A, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C12, C13, C14, C19, C24A, C25, C26, C27, C28, C29, C35, C36, C38, C39, C40, C43, C44, C46, C47, C49A, C50, C52, C53, C54, C55, C56, C58, C59, C61 (grupo)
<i>Hedychium gardnerianum</i> Ker- Gawl.	Zingiberaceae	Roca-de-vénus; Conteira; Bananilha	Paleártico; Indomalaio	Perenifólio	1-12	7-10	Hemi	Herbácea	Z9	C2(12), C9(>20), C24A(>20), C25(5), C26(>20), C26A(12), C33(2), C34(4), C38(2), C44(8), C52(8), C55(7), C56(10), C62(9)
<i>Helianthus annus</i> L.	Compositae	Girassol	Neártico	Sazonal	4-8	7-10	Terófito	Herbácea	Z4	C2, C12 (grupo)
<i>Helichrysum bracteatum</i> (Vent.) Andrews	Compositae	Margarida-de-papel; Sempre-viva	Australiano	Sazonal	3-10	4-10	Terófito	Herbácea	Z8	C2, C2A(grupo)
<i>Helichrysum foetidum</i> (L.) Cass.	Compositae	Perpétua	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	5-10	Terófito	Herbácea	Z9	C1(grupo)
<i>Helichrysum melaleucum</i> Rchb. ex Holl	Compositae	Perpétua-branca	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-8	Nano.	Arbusto	Z10	C2(1)
<i>Hibiscus rosa-sinensis</i> L.	Malvaceae	Cardeais	Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C1(1), C25(1), C32(2), C39(4), C45(1), C48(2), C52(2), C60(1), C64(1),
<i>Hibiscus syriacus</i> L.	Malvaceae	Cardeal-roxo; Hibisco-da- síria	Paleártico; Indomalaio	Caducifólio	5-11	7-9	Micro.	Arbusto	Z5	C2(2), C8(1), C9(2), C14(1)
<i>Homalocladium platycladum</i> (F. Muell.) L. H. Bail.	Polygonaceae	Homaloclá-dio	Oceânia	Perenifólio	1-12	7-8	Nano.	Arbusto	Z11	C1(1), C2(2)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLOGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Hydrangea macrophylla</i> (Thunb.) Ser.	Hydrangeaceae	Hortênsias; Novelos	Paleártico	Caducifólio	3-12	5-10	Nano.	Arbusto	Z6	C2, C2A, C5, C9, C11, C11A, C12, C26, C27, C28, C40, C41, C44, C45, C46, C49A, C52, C53, C54, C55, C56, C62 (grupo), C3A(5), C13(2), C24A(1), C30(2), C35(7), C37(3), C39(17), C47(8), C57(8), C59(12), C60(13)
<i>Ilex aquifolium</i> L.	Aquifoliaceae	Azevinho	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-6	Micro.	Árvore	Z6	C30(3), C51(1), C61(1)
<i>Ilex x altaclarensis</i> (hort. ex Loud.) Dallim.	Aquifoliaceae	Azevinho	Hortícola	Perenifólio	1-12	12-8	Micro.	Árvore	Z6	C60(2)
<i>Impatiens balsamina</i> L.	Balsaminaceae	Maravilhas	Indomalaio	Sazonal	4-9	6-9	Terófito	Herbácea	Z9	C10 A, C14, C15 (grupo)
<i>Impatiens sodenii</i> Engl. & Warb. ex Engl.	Balsaminaceae	Maravilhas	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Herbácea	Z10	C1(30), C2(grupo), C2A (grupo), C8(2), C46(3), C47(12), C61(20)
<i>Impatiens walleriana</i> Hook. f.	Balsaminaceae	Maravilhas	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Herbácea	Z9	C1, C2, C2A, C8, C10A, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C20, C21, C22, C24, C24A, C28, C33, C35, C36, C45, C57A, C60 (grupo)
<i>Iresine herbstii</i> Hook.	Amaranthaceae	Iresine	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Caméfito	Herbácea	Z10	C1, C2, C3A, C8, C9, C12, C48 (grupo)
<i>Iris germanica</i> L. var. <i>florentina</i> (L.) Dykes	Iridaceae	Lírio-branco	Paleártico	Perenifólio	1-12	2-7	Geófito	Herbácea	Z4	C12, C13, C44, C47, C60 (grupo)
<i>Iris germanica</i> L.	Iridaceae	Lírio	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-8	Geófito	Herbácea	Z4	C2, C12 (grupo)
<i>Isoplexis sceptrum</i> (L. f.) Loud.	Scrophulariaceae	Isoplexis; Dedaleira-da- madeira	Paleártico	Perenifólio	1-12	Não floriu**	Nano.	Arbusto	Z10	C9(2), C39(2)
<i>Jacaranda mimosifolia</i> D. Don.	Bignoniaceae	Jacarandá	Neotropical	Caducifólio	5-2	4-7	Meso.	Árvore	Z9	C64(1)
<i>Juniperus cedrus</i> Webb. & Berthel. ssp. <i>maderensis</i> (Menezes) Rivas Mart. & al.	Cupressaceae	Cedro-da- madeira	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-3	Micro.	Árvore	Z10	C2(3), C44(1), C45(1), C58(1)
<i>Juniperus chinensis</i> L.	Cupressaceae	Cedro-da –china	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-3	Micro.	Árvore	Z4	C10A(1), C10B(2), C10C(2), C10D(2), C11(1), C14(1), C15(2), C17(1), C19(1), C23(1)
<i>Justicia carnea</i> Lindl.	Acanthaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	5-10	Nano.	Arbusto	Z12	C1(1), C2(3)
<i>Kniphofia x praecox</i> Bak.	Liliaceae (Aloecaceae)	Foguetes	Hortícola	Perenifólio	1-12	11-2	Hemi.	Herbácea	Z9	C2(grupo)
<i>Kohleria eriantha</i> (Benth.) Hanst.	Gesneriaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z11	C2(grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Lagerstroemia indica</i> L.	Lythraceae	Laguerestré-mia; Flor-de-merenda; Suspiros	Paleártico; Indomalaio	Caducifólio	3-11	7-9	Micro.	Árvore	Z7	C23(1), C25(1), C35(1), C39(1), C54(1)
<i>Lamium galeobdolon</i> (L.) L.	Labiatae	Arcanjo-amarelo	Paleártico	Perenifólio	1-12	10-12	Hemi.	Herbácea	Z4	C1, C2 (grupo)
<i>Lampranthus aurantiacus</i> (DC.) Schwantes	Aizoaceae	Lamprantos; Chorão	Áfrotropical	Perenifólio	1-12	4-12	Fane. trep.	Arbusto trepador e suculento	Z11	C2(grupo)
<i>Lantana camara</i> L.	Verbenaceae	Lantana	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C2(5), C33(3), C35(1)
<i>Laurus novocanariensis</i> Rivas Mart. & al.	Lauraceae	Loureiro	Paleártico	Perenifólio	1-12	11-3	Meso.	Árvore	Z10	C1(2), C2(1), C2A(4), C27(1), C28(1), C33(1), C45(1), C52(1), C56(1), C59(1), C62(1), C63(1)
<i>Lemna minor</i> L.	Lemnaceae	Pastinha; Lentilha-de-água	Indomalaio; Australiano	Perenifólio	1-12	6-10	Hidrófita	Herbácea	Z4	C8(mancha nas margens do ribeiro)
<i>Leptospermum scoparium</i> Forst. & Forst.	Myrtaceae	Leptospermo; Urze-de-jardim	Australiano; Antártico	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z8	C2(4)
<i>Leucadendron salignum</i> Bergius x <i>L. laeureolum</i> (Lam.) Fourc.	Proteaceae	Safari-sunset	Hortícola	Perenifólio	1-12	11-2	Micro.	Arbusto	Z9	C2(1)
<i>Leucanthemum x superbum</i> (J. Ingram) Bergmans ex Kent	Compositae	Estrelas	Hortícola	Perenifólio	1-12	5-8	Nano.	Herbácea	Z5	C12(12), C13(10)
<i>Ligustrum lucidum</i> Ait. f.	Oleaceae	Ligustro; Alfinheiro	Paleártico	Perenifólio	1-12	6-9	Micro.	Árvore	Z7	C2(1), C29(2), C32(1) C33(2), C50(1), C51(4), C52(1), C53(1), C54(1), C57A(1), C59(1), C61(1)
<i>Ligustrum ovalifolium</i> Hassk.	Oleaceae	Ligustro	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-7	Nano.	Arbusto	Z5	C2A(2), C39(1), C49A(1), C50(grupo), C57A(7), C58(3),
<i>Lilium candidum</i> L.	Liliaceae	Lírio-de-nossa- senhora	Paleártico	Sazonal	2-7	4-6	Geófita	Herbácea	Z6	C10A, C10B, C10C, C10D , C15 (grupo)
<i>Liquidambar styraciflua</i> L.	Hamamelidaceae	Liquidambar	Neártico	Caducifólio	4-11	4-6	Meso.	Árvore	Z5	C5(1), C33(1), C35(1)
<i>Liriodendron tulipifera</i> L.	Magnoliaceae	Tulipeiro- arbóreo	Neártico	Caducifólio	4-11	4-6	Meso.	Árvore	Z4	C5(1), C44(1)
<i>Livistona australis</i> (R. Br.) Mart.	Palmae	Livistona-da- austrália	Australiano	Perenifólio	1-12	4-5	Meso.	Árvore	Z9	C9(1), C10B(1)
<i>Lobelia laxiflora</i> HBK.	Campanulaceae	Lobélia	Neártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z9	C12(1), C28(10), C48(6),
<i>Lonicera japonica</i> Thunb.	Caprifoliaceae	Madressilva	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z4	C1(>50), C2(>50), C2A(>50), C3(>50), C3A(6), C5(>10), C9(>10), C11(>20), C28(1), C29(1), C41(4)
<i>Lunaria annua</i> L.	Cruciferae	Hóstias; Moedas	Paleártico	Sazonal	2-7	3-6	Terófita	Herbácea	Z8	C1(10), C2(grupo)
<i>Lychnis coronaria</i> (L.) Desr.	Caryophyllaceae		Paleártico	Perenifólio	1-12	5-8	Nano.	Herbácea	Z4	C44(1), C46(2), C47(1)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Lychnis flos-jovis</i> (L.) Desr.	Caryophyllaceae	Licnis	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-8	Nano.	Herbácea	Z5	C2A, C10A, C10B, C10C (grupo)
<i>Lysimachia nummularia</i> L.	Primulaceae	Lisimáquia	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-11	Hemi.	Herbácea	Z4	C10C(grupo)
<i>Magnolia grandiflora</i> L.	Magnoliaceae	Magnólia	Neártico	Perenifólio	1-12	5-8	Micro.	Árvore	Z6	C2(1), C50(1)
<i>Magnolia stellata</i> (Sieb. & Zucc.) Maxim.	Magnoliaceae	Magnólia	Paleártico	Caducifólio	2-11	12-3	Micro.	Arbusto	Z4	C15(1)
<i>Magnolia x soulangiana</i> Soul. –Bod.	Magnoliaceae	Magnólia	Hortícola	Caducifólio	3-12	12-4	Micro.	Árvore	Z5	C1(1), C2A(2), C9(3), C11(1), C11A(3), C12(1), C14(3), C26(1), C51(2), C54(1), C55(1)
<i>Malus pumila</i> Mill.	Rosaceae	Pereiro; Macieira	Paleártico	Caducifólio	4-11	4-5	Micro.	Árvore	Z3	C15(1)
<i>Melanoselinum decipiens</i> (Schrad. & Wendl.) Hoffm.	Umbelliferae	Aipo-de-gado	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-6	Nano.	Herbácea	Z10	C2(>50), C2A(10), C12(3), C52(1), C61(2)
<i>Metrosideros excelsa</i> Sol. ex Gaertn.	Myrtaceae	Metrosidero	Antártico	Perenifólio	1-12	6-7	Meso.	Árvore	Z10	C26(1), C44(1)
<i>Michelia figo</i> (Lour.) Spreng	Magnoliaceae	Carocha	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-8	Micro.	Árvore	Z9	C58(1)
<i>Microlepidia platyphylla</i> (D. Don) J. Sm.	Dennstaedtiaceae	Feto	Paleártico; Indomalaio	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z10	C12(1), C19(3), C24A(1)
<i>Monizia edulis</i> Lowe	Umbelliferae	Cenoura-da-rocha; Nozelha	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-5	Nano.	Herbácea	Z10	C1(2), C2(1)
<i>Monstera deliciosa</i> Liebm.	Araceae	Fruto-delicioso; Costela-de-adão	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z10	C1, C9, C19, C26, C28, C43, C44, C48, C49A, C56, C59 (grupo),
<i>Montanoa bipinnatifida</i> (Kunth) K. Kock	Compositae	Malmequer-arbóreo	Neotropical	Perenifólio	1-12	11-5	Micro.	Arbusto	Z10	C2(1), C26(1), C60(1)
<i>Musschia wollastonii</i> Lowe	Campanulaceae	Múchia-de-wollaston	Paleártico	Perenifólio	1-12	Não floriu**	Nano.	Arbusto	Z10	C1(1), C2(5), C9(3), C34(1), C35(3), C36(1)
<i>Myrica faya</i> Ait.	Myricaceae	Faia-das-ilhas; Samouco	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-5	Micro.	Árvore	Z9	C2A(1), C2(3), C32(1)
<i>Narcissus tazetta</i> L.	Amaryllidaceae	Junquinhos	Paleártico	Sazonal	11-5	12-3	Geófito	Herbácea	Z8	C1, C2, C2A, C3, C9 (grupo)
<i>Neoregelia carolinae</i> (Beer) L. B. Sm.	Bromeliaceae	Bromélia	Neotropical	Perenifólio	1-12	11-2	Hemi.	Herbácea	Z10	C50(grupo)
<i>Nephrolepis cordifolia</i> (L.) Presl	Oleandraceae	Feto	Neotropical; Áfricotropical; Indomalaio; Oceânia; Australiano	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z10	C2, C48, C49A (grupo)
<i>Nerium oleander</i> L.	Apocynaceae	Sevadiha; Loendro	Paleártico	Perenifólio	1-12	6-10	Micro.	Arbusto	Z9	C1(2), C2(3), C2A(3), C16(3), C17(2), C64(2)
<i>Nolina recurvata</i> (Lem.) Hemsl.	Agavaceae	Nolina; Pata-de-elefante	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-8	Micro.	Árvore	Z9	C59(1)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Nothoscordum gracile</i> (Ait.) Stearn.	Liliaceae (Alliaceae)	Alhinho; Alho-bravo	Neotropical	Sazonal	1-4	1-3	Geófita	Herbácea	Z7	C1, C2, C12(grupo)
<i>Ocotea foetens</i> (Aiton) Baill.	Lauraceae	Til	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Meso.	Árvore	Z10	C1(9), C2 (16), C2A(3), C3(4), C3A(3), C4(2), C5(1), C8(1), C27(1), C33(1), C40(1), C45(1), C53(1), C56(3).
<i>Ophiopogon japonicus</i> (L. f.) Ker-Gawl	Liliaceae (Convallariaceae)	Relva-do-japão	Paleártico	Perenifólio	1-12	7-9	Hemi.	Herbácea	Z8	C1, C9, C12, C25, C26, C28, C37, C39, C44, C49, C59 (mancha)
<i>Osteospermum barberiae</i> (Harv.) Norl.	Compositae	Estrelas-do- cabo	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Caméfitas	Arbusto	Z10	C12, C43, C44, C48, C57 (grupo)
<i>Osteospermum ecklonis</i> (DC.) Norl.	Compositae	Estrelas-do- cabo	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Caméfitas	Arbusto	Z10	C12, C43 (grupo)
<i>Oxalis pes-caprae</i> L.	Oxalidaceae	Azedas	Áfricotropical	Sazonal	10-5	12-4	Geófita	Herbácea	Z9	C1, C2, C25, C26 (grupo)
<i>Parthenocissus tricuspidata</i> (Sieb. & Zucc.) Planch. in DC.	Vitaceae	Vinha-virgem	Paleártico	Caducifólio	4-12	5-6	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z4	C60(grupo)
<i>Passiflora mollissima</i> (HBK.) L. H. Bail.	Passifloraceae	Maracujá-banana	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z8	C9(1)
<i>Pelargonium peltatum</i> (L.) L'Hérit. cv.	Geraniaceae	Malvas	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z10	C12, C59(grupo)
<i>Pelargonium x hortorum</i> L. H. Bail.	Geraniaceae	Malvas	Hortícola	Perenifólio	1-12	4-7	Nano.	Herbácea	Z10	C2, C2A, C10B, C44, C46, C47 (grupo)
<i>Pelargonium zonal</i> (L.) L'Hérit	Geraniaceae	Malvas	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C2, C2A, C10B, C10D, C18, C34, C44(grupo)
<i>Pericallis x hybrida</i> R. Nordenstam	Compositae	Cinerária	Hortícola	Sazonal	1-7	3-6	Terófita	Herbácea	Z10	C2, C12(grupo)
<i>Persea americana</i> Mill.	Lauraceae	Abacateiro	Neotropical	Perenifólio	1-12	11-5	Micro.	Árvore	Z10	C2(4)
<i>Persea indica</i> (L.) Spreng.	Lauraceae	Vinhático	Paleártico	Perenifólio	1-12	7-9	Meso.	Árvore	Z10	C1(1), C2(3), C3(2), C3A(1)
<i>Peucedanum lowei</i> (Coss.) Menezes	Umbelliferae	Imperatória; Peucedano	Paleártico	Perenifólio	1-12	7-10	Hemi.	Herbácea	Z10	C1(2), C2(10)
<i>Philadelphus coronarius</i> L.	Hydrangeaceae (Philadelphaceae)		Paleártico	Caducifólio	3-12	4-7	Micro.	Arbusto	Z5	C31(1), C32(3), C33(2), C35(1)
<i>Phlebodium aureum</i> (L.) Sm.	Polypodiaceae	Polipódio-dourado	Neártico; Neotropical	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z10	C2, C49A, C55 (grupo)
<i>Phoenix canariensis</i> ex. Chabaud.	Palmae	Palmeira-das-canárias	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-3	Meso.	Árvore	Z11	C1(3), C2(2), C26(1), C31(2), C32(1), C41(1), C42(1), C43(1)
<i>Phormium tenax</i> Forst. & Forst. f.	Agavaceae	Espadana	Antártico	Perenifólio	1-12	6-8	Hemi.	Herbácea	Z8	C2(1)
<i>Phyllis nobla</i> L.	Rubiaceae	Cabreira	Paleártico	Perenifólio	1-12	6-8	Nano.	Arbusto	Z9	C2(grupo), C40(1)
<i>Piconia excelsa</i> (Ait.) DC.	Oleaceae	Pau-branco	Paleártico	Perenifólio	1-12	2-5	Micro.	Árvore	Z10	C3(1), C18(1), C46(1)
<i>Pieris japonica</i> (Thunb.) D. Don ex G. Don.	Ericaceae	Piéris	Paleártico; Indomalaio	Perenifólio	1-12	3-5	Nano.	Arbusto	Z4	C12(3)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Pinus pinaster</i> Ait.	Pinaceae	Pinheiro-marítimo	Paleártico	Perenifólio	1-12	2-4	Meso.	Árvore	Z8	C2(1)
<i>Pinus radiata</i> D. Don.	Pinaceae	Pinheiro-de-monterrei	Neártico	Perenifólio	1-12	2-4	Meso.	Árvore	Z8	C31(1)
<i>Pittosporum tenuifolium</i> Banks & Sol ex Gaertn.	Pittosporaceae		Antártico	Perenifólio	1-12	4-5	Micro.	Árvore	Z9	C2(1)
<i>Pittosporum undulatum</i> Vent.	Pittosporaceae	Incenseiro	Australiano	Perenifólio	1-12	2-4	Micro.	Árvore	Z9	C2(8), C2A(2)
<i>Plantago major</i> L.	Plantaginaceae	Tanchagem	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-8	Hemi.	Herbácea	Z6	C1(grupo)
<i>Platanus x acerifolia</i> (Ait.) Willd.	Platanaceae	Plátano	Hortícola	Caducifólio	4-11	4-5	Meso.	Árvore	Z7	C1(1), C2(6), C3(2), C6(2), C6(2), C26(1), C30(1), C48(1), C49(16), C49A(1), C52(3), C56(3), C58(2), C63(2)
<i>Plectranthus forsteri</i> Benth.	Labiatae	Plectratos	Australiano	Perenifólio	1-12	3-8	Nano.	Arbusto	Z10	C1, C2, C2A, C8(grupo)
<i>Polygonum capitatum</i> Buch. -Ham. ex D. Don	Polygonaceae	Polígono-de-jardim	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z8	C1(mancha)
<i>Polypodium macaronesicum</i> A. E. Bobrov	Polypodiaceae	Polipódio	Paleártico	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z10	C3 (grupo)
<i>Populus heterophylla</i> L.	Salicaceae	Choupo	Neártico	Caducifólio	2-11	2-3	Micro.	Árvore	Z4	C44(1)
<i>Primula vulgaris</i> Huds.	Primulaceae	Primerose; Primaveras	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-6	Caméfito	Herbácea	Z6	C3(grupo)
<i>Protea neriifolia</i> R. Br.	Proteaceae	Protéia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	11-2	Nano.	Arbusto	Z9	C2(1), C12(5)
<i>Prunella vulgaris</i> L.	Labiatae	Erva-férrea	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-9	Caméfito	Herbácea	Z3	C1, C2 (grupo)
<i>Prunus cerasifera</i> Ehrh.	Rosaceae	Ameixeira-de-jardim	Paleártico	Caducifólio	3-11	2-3	Micro.	Árvore	Z4	C9(2), C28(2), C43(1), C46(1), C52(1), C53(1), C62(1)
<i>Prunus hixa</i> Willd.	Rosaceae	Ginjeira-brava; Azereiro	Paleártico	Perenifólio	1-12	6-8	Meso.	Árvore	Z10	C5(1), C26(1), C29(1), C41(1)
<i>Prunus laurocerasus</i> L.	Rosaceae	Loureiro-inglês; Loureiro-cerejo	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-4	Micro.	Árvore	Z7	C26(1)
<i>Prunus persica</i> (L.) Batsch.	Rosaceae	Pessegueiro	Paleártico	Caducifólio	3-11	2-4	Micro.	Árvore	Z5	C9(1)
<i>Prunus serrulata</i> Lindl.	Rosaceae	Cerejeira-oriental	Paleártico	Caducifólio	4-1	4-6	Micro.	Árvore	Z5	C58(1)
<i>Prunus x domestica</i> L.	Rosaceae	Ameixeira	Hortícola	Caducifólio	4-11	3-4	Micro.	Árvore	Z5	C24A(1)
<i>Pseudosasa japonica</i> (Sieb. & Zucc. ex Steud.) Mak. ex Nak.	Gramineae	Bambo	Paleártico	Perenifólio	1-12	Não floriu**	Hemi.	Herbácea	Z6	C7(grupo)
<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn.	Dennstaedtiaceae	Feiteira	Paleártico; Neártico	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z4	C12(grupo)
<i>Pteris vittata</i> L.	Pteridaceae	Feto	Paleártico; Indomalaio; Australiano Oceânia	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z9	C1(grupo)
<i>Punica granatum</i> L.	Punicaceae	Romãzeira	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-7	Micro.	Árvore	Z9	C40(2), C57(1)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Pyracantha angustifolia</i> (Franch.) Schneid.	Rosaceae	Perinhos; Sarça-ardente	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-7	Micro.	Arbusto	Z7	C2(3), C5(1), C10B(1)
<i>Pyracantha coccinea</i> Roem.	Rosaceae	Persinhos; Sarça-ardente	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-5	Micro.	Arbusto	Z6	C58(1)
<i>Quercus ilex</i> L.	Fagaceae	Azinhaira	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-5	Meso.	Árvore	Z7	C56(1)
<i>Quercus robur</i> L.	Fagaceae	Carvalho-roble	Paleártico	Caducifólio	2-11	3-5	Meso.	Árvore	Z6	C1(2), C2A(1), C3(1), C6(2), C26(1), C27(1), C28(1), C29(1), C30(1), C39(2), C41(1), C43(1), C44(1), C46(1), C52(1), C53(1), C59(1)
<i>Quercus rubra</i> L.	Fagaceae	Carvalho-americano	Neártico	Caducifólio	4-11	4-5	Meso.	Árvore	Z3	C27(1), C30(1), C31(1), C32(1), C38(1), C40(2), C41(1), C46(3), C59(1)
<i>Ranunculus cortusifolius</i> Willd. var. <i>major</i> Lowe	Ranunculaceae	Ranúnculo; Doiradinha	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-6	Hemi.	Herbácea	Z10	C2, C2A, C9 (grupo)
<i>Rhamnus glandulosa</i> Ait.	Rhamanceae	Sanguinho	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-5	Micro.	Árvore	Z10	C2(2), C21(1), C24(1), C29(1)
<i>Rhaphiolepis umbellata</i> (Thunb.) Mak.	Rosaceae		Paleártico	Perenifólio	1-12	10-4	Nano.	Arbusto	Z8	C36(1)
<i>Rhododendron arboreum</i> Sm.	Ericaceae	Rododendro-arbóreo	Indomalaio; Paleártico	Perenifólio	1-12	2-5	Micro.	Árvore	Z7	C9(2)
<i>Rhododendron mucronatum</i> G. Don.	Ericaceae	Azálea-japonesa	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z5	C5(1), C9(18), C10C(6), C12(42), C13(23), C48(3)
<i>Rhododendron ponticum</i> L.	Ericaceae	Rododendro; Loendro	Paleártico	Perenifólio	1-12	11-6	Micro.	Arbusto	Z6	C41(2), C57A(1), C59(1)
<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Leguminosae (Papilionoideae)	Robinia	Neártico	Caducifólio	3-12	3-6	Meso.	Árvore	Z3	C1(1), C2(2), C2A(1)
<i>Roldana petasites</i> (Sims) H. Robinson & Bretell.	Compositae	Senécio	Neotropical	Perenifólio	1-12	12-3; 6-8	Micro.	Arbusto	Z9	C2(grupo), C9(6), C12(8), C24A(3), C25(3), C26(5), C29(1), C61, C62 (grupo)
<i>Rosa x damascena</i> Mill.	Rosaceae	Roseira	Hortícola	Perenifólio	1-12	5-8	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z4	C2(2), C44(grupo)
<i>Rosmarinus officinalis</i> L.	Labiatae	Alecrim	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z6	C2 (2)
<i>Rudbeckia fugida</i> Ait.	Compositae	Margarida - marela; Susana-de-olhos-negros	Neártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Herbácea	Z3	C2,C10, C10B, C12, C15 (grupo), C60(6)
<i>Ruscus aculeatus</i> L.	Liliaceae (Asparagaceae)	Gilbardeira	Paleártico	Perenifólio	1-12	11-12	Hemi.	Herbácea	Z7	C41(grupo)
<i>Ruscus hypophyllum</i> L.	Liliaceae (Asparagaceae)	Ruscos	Paleártico	Perenifólio	1-12	11-12	Nano.	Herbácea	Z8	C48, C55(grupo)
<i>Salix babylonica</i> L.	Salicaceae	Salgueiro-chorão	Paleártico	Marcescente	1-12 (12-3)	3-5	Micro.	Árvore	Z4	C26(2)
<i>Salix canariensis</i> C. Sm. ex Link	Salicaceae	Seixo; Seixeiro	Paleártico	Caducifólio	2-12	1-2	Micro.	Árvore	Z11	C2(2)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Salvia involucrata</i> Cav.	Labiatae	Sálvia	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z9	C1(1), C2(5)
<i>Salvia leucantha</i> Cav.	Labiatae	Sálvia-branca	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z9	C44(grupo)
<i>Salvia sessei</i> Benth.	Labiatae	Sálvia-do-méxico	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z9	C33(1)
<i>Salvia splendens</i> Sell ex Roem. & Scult.	Labiatae	Camarões; Sálvia	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Herbácea	Z10	C10A(6), C13(2), C15(8), C39(2)
<i>Sambucus ebulus</i> L.	Caprifoliaceae	Engos	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-5	Nano.	Herbácea	Z5	C2(grupo)
<i>Sambucus lanceolata</i> R. Br. In Buch.	Caprifoliaceae	Sabugueiro-da- madeira	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-5	Micro.	Árvore	Z10	C24A(1), C48(1), C49A(1), C54(2), C55(1)
<i>Saxifraga stolonifera</i> Meerb.	Saxifragaceae	Saxifraga	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-4	Hemi.	Herbácea	Z5	C2(grupo)
<i>Scaevola aemula</i> R. Br.	Goodeniaceae		Australiano	Perenifólio	1-12	4-9	Hemi.	Herbácea	Z9	C10C(grupo)
<i>Schefflera arboricola</i> (Hayata)	Araliaceae	Schefflera	Indomalaio	Perenifólio	1-12	2-4; 7-8	Micro.	Arbusto	Z10	C2(1), C12(1)
<i>Selaginella kraussiana</i> (Kunze) A. Braun.	Sellaginellaceae	Selaginela	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z9	C1, C2A (mancha)
<i>Semele androgyna</i> (L.) Kunth.	Liliaceae	Alegre-campo	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-5	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	C6(1), C8(1), C30(2), C38(2), C39(1), C40(2), C43(1), C44(1), C48(1), C53(1), C57(1), C59(2)
<i>Senecio glastifolius</i> L. f.	Compositae	Senécio-cor-rosa	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	3-6	Nano.	Arbusto	Z9	C3A, C10A, C11, C11A (grupo)
<i>Sequoia sempervirens</i> (D. Don) Endl.	Cupressaceae	Sequóia	Neártico	Perenifólio	1-12	2-3	Macro.	Árvore	Z8	C45(1), C58(2)
<i>Sibthorbia peregrina</i> L.	Scrophulariaceae	Hera-terrestre; Erva-redonda	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-8	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z10	C28, C39 (grupo)
<i>Solanum mauritanum</i> Scop.	Solanaceae	Tabaqueira	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C1(grupo), C2(1), C2A(1)
<i>Solanum pseudocapsicum</i> L.	Solanaceae	Pimenta-brava	Neotropical	Perenifólio	1-12	7-8; 12-1	Nano.	Arbusto	Z9	C2(1), C44 (3)
<i>Soleirolia soleirolii</i> Gaudich	Urticaceae	Soleirola	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-6	Hemi.	Herbácea trepadora	Z9	C38(grupo)
<i>Solenostemon scutellarioides</i> (L.) Codd. cvs.	Labiatae	Cóleos; Basólias	Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C10B, C10C, C14 (grupo)
<i>Sonchus fruticosus</i> L.fil.	Compositae	Leituga; Língua-de- vaca; Serralha-da- rocha	Paleártico	Perenifólio	1-12	6-8	Nano.	Arbusto	Z10	C1(1), C2(1)
<i>Sonchus pinnatus</i> Ait.	Compositae	Leituga	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-7	Nano.	Arbusto	Z10	C2(1)
<i>Spiraea cantoniensis</i> Lour.	Rosaceae	Grinalda-de-noiva	Paleártico	Marcescente	3-2 (11-2)	2-9	Nano.	Arbusto	Z6	C2(2), C45(3)
<i>Stachys byzantina</i> K. Koch.	Labiatae	Orelhas-de-gato	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-7	Caméfita	Herbácea	Z5	C44(grupo)
<i>Strelitzia reginae</i> BanKs ex Dryand	Strelitziaceae	Estrelícia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C2(grupo)
<i>Streptosolen jamesonii</i> (Benth.) Miers.	Solanaceae	Rapaziada	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z9	C2(1)
<i>Synadenium grantii</i> Hook. f.	Euphorbiaceae	Sinadénio	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	8-11	Micro.	Arbusto suculento	Z10	C2(1)
<i>Syzygium jambos</i> (L.) Alston.	Myrtaceae	Jambeiro	Indomalaio	Perenifólio	1-12	3-7	Micro.	Árvore	Z10	C59(1)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Tagetes patula</i> L.	Compositae	Cravos-de-burro	Neotropical	Sazonal	1-9	3-8	Terófito	Herbácea	Z9	C10A, C10B, C14 (grupo)
<i>Tanacetum parthenium</i> (L.) Schultz-Bip.	Compositae	Artemija; Alfinetes-de- senhora	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-12	Caméfito	Herbácea	Z6	C1, C2 (grupo)
<i>Taxus baccata</i> L.	Taxaceae	Teixo	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-4	Micro.	Árvore	Z5	C14A(2), C45(1), C58(1)
<i>Tecomaria capensis</i> (Thunb.) Spach.	Bignoniaceae	Camarões	Áfrotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C44 (grupo)
<i>Teline maderensis</i> Webb et Berth. var. <i>maderensis</i>	Leguminosae (Papilionoideae)	Piomo	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-8	Micro.	Arbusto	Z10	C1(>100), C2(>100), C2A(50), C3(>50), C5(3), C9(>20), C27(6), C29(12), C30(8), C31(10), C32(6), C42(5), C43(1), C57A(2), C59(>20),
<i>Tetrapanax papyrifer</i> (Hook.) K. Kock.	Araliaceae	Arália-do-papel	Indomalaio	Perenifólio	1-12	10-1	Micro.	Arbusto	Z8	C55(3)
<i>Teucrium abutiloides</i> L' Hérít.	Labiatae	Abrotona -amarela	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-8	Nano.	Arbusto	Z10	C2(8), C27(1), C28(2), C34(1), C39(1), C40(2), C44(1), C57(2)
<i>Tibouchina grandifolia</i> Cogn.	Melastomataceae	Aranhas; Tibouchina	Neotropical	Perenifólio	1-12	9-1	Micro.	Arbusto	Z10	C2(2), C12(1)
<i>Tibouchina urvilleana</i> (DC.) Cogn.	Melastomataceae	Aranhas; Tibouchina	Neotropical	Perenifólio	1-12	8-5	Micro.	Arbusto	Z10	C1(10), C2A(2), C34(1), C43(2), C48(1),
<i>Tilia tomentosa</i> Moench.	Tiliaceae	Tília-prateada	Paleártico	Caducifólio	4-11	5-6	Meso.	Árvore	Z6	C33(1), C44(2), C59(1)
<i>Tropaeolum majus</i> L.	Tropaeolaceae	Chagas	Neotropical	Sazonal	1-10	2-9	Terófito	Herbácea	Z8	C1, C2, C9 (grupo)
<i>Umbilicus rupestris</i> (Salisb.) Dandy.	Crassulaceae	Inhame-de- lagartixa	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-6	Hemi.	Herbácea	Z7	C8 (grupo)
<i>Viburnum tinus</i> L.	Caprifoliaceae	Viburno	Paleártico	Perenifólio	1-12	10-4	Micro.	Arbusto	Z7	C6(1), C9(1), C32(1), C41(2)
<i>Vinca major</i> L.	Apocynaceae	Pervinca	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea trepadora	Z7	C2 (mancha)
<i>Viola riviniana</i> Rchb.	Violaceae	Violeta	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z5	C49A, C55(grupo)
<i>Watsonia borbonica</i> (Pourr.) Goldblatt ssp. <i>ardemei</i> (Sanders) Goldblatt.	Iridaceae	Hastes-de-são- josé	Áfrotropical	Perenifólio	1-12	3-7	Geófito	Herbácea	Z10	C29 (grupo)
<i>Weigela florida</i> (Bunge) A. D.C.	Caprifoliaceae	Pessegueiro-de- jardim; Veigela	Paleártico	Caducifólio	3-12	4-7	Micro.	Arbusto	Z5	C45(1)
<i>Woodwardia radicans</i> (L.) Sm.	Blechnaceae	Feto-de-botão	Paleártico	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z8	C1(>100), C2 (>200), C2A(>50), C3(20), C6(5), C8(5), C13(3), C19(20), C27(>20), C26(>50), C28(>100), C34(2), C35(1), C38(1), C45(3), C50(3), C51(9), C52(12)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Yushania anceps</i> (Mitford) Yi.	Gramineae	Bambo	Paleártico	Perenifólio	1-12	Não floriu**	Hemi.	Herbácea	Z9	C2, C57A(sebe)
<i>Zantedeschia aethiopica</i> (L.) Spreng.	Araceae	Jarros	Áfricotropical	Sazonal	10-7	11-5	Geófita	Herbácea	Z8	C1(>20), C2(>20), C8(12), C13(1), C18(>50), C19(15), C21(20), C24A(>100), C26A(>50), C36(1), C34(3), C60(5), C61(7)

Legenda:

- Plantas que não floriram no período em estudo (Janeiro 2002 – Janeiro 2005): * plantas novas; ** plantas que nunca floriram por falta de aclimação;
- Plantas marcescentes (plantas semiperenifólias e semicaducifólias): 3-2 (**3-4**) – folhas todo o ano mas com renovação significativa em Março e Abril.

Anexo 4
CARACTERIZAÇÃO FITOGEOGRÁFICA DO PASSEIO PÚBLICO MARÍTIMO

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Abelia x grandiflora</i> (André Rehd.	Caprifoliaceae	Abélia	Hortícola	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z5	C1, C3, C10A, C11, C13, C15, C20, C22 (grupo) C6(3), C10(5), C12(2)
<i>Abutilon grandifolium</i> (Willd.) Sweet	Malvaceae	Abutilão	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z9	C20(1)
<i>Acacia meamsii</i> De Wildeman.	Leguminosae (Mimosoideae)	Mimosa	Australiano	Perenifólio	1-12	1-8	Micro.	Árvore	Z8	C22(2)
<i>Acacia melanoxylon</i> R. Br.	Leguminosae (Mimosoideae)	Acácia-austrália	Australiano	Perenifólio	1-12	1-4	Meso.	Árvore	Z8	C22(2)
<i>Acalypha wilkesiana</i> Muell. Arg.	Euphorbiaceae	Acálifa;	Oceânia	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C10, C14, C15, C16, C17, C20 (grupo)
<i>Acca sellowiana</i> (O. Berg.) Burret	Myrtaceae	Goiabeira-ananás	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-7	Micro.	Árvore	Z8	C4(1), C17(1)
<i>Achyranthes sicula</i> (L.) All.	Amaranthaceae		Paleártico	Perenifólio	1-12	2-10	Nano.	Arbusto	Z9	C22(grupo)
<i>Agapanthus praecox</i> Willd. ssp. <i>orientalis</i> (Leighton) Leighton	Liliaceae	Agapantos; Coroa-de-henrique	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	4-9	Hemi.	Herbácea	Z9	C6 (grupo)
<i>Agave americana</i> L.	Agavaceae	Agave; Piteira	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-8	Hemi.	Herbácea suculenta	Z9	C1(1), C6(4), C16(grupo), C24(14)
<i>Agave angustifolia</i> Haw.	Agavaceae	Agave; Piteira	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-8	Nano.	Árvore suculenta	Z9	C24(11)
<i>Agave attenuata</i> Salm-Dyck	Agavaceae	Piteira; Agave-pescoço-de-cisne	Neotropical	Perenifólio	1-12	12-3	Nano.	Árvore suculenta	Z9	C1, C6, C14 (>100)
<i>Agave decipiens</i> Bak.	Agavaceae	Agave	Neártico	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Nano.	Arbusto suculento	Z9	C1(1), C8(grupo)
<i>Ageratum houstonianum</i> Mill.	Compositae		Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Terófito	Herbácea	Z8	C22(grupo)
<i>Aloe arborescens</i> Mill.	Liliaceae (Aloeaceae)	Aloés, Babosas, Foguetes-de-natal	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	11-2	Nano.	Arbusto suculento	Z9	C6, C8 (grupo)
<i>Aloe pretoriensis</i> Pole Evans	Liliaceae (Aloeaceae)	Aloés	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea suculenta	Z9	C24(grupo)
<i>Aloe vera</i> (L.) Burm.	Liliaceae (Aloeaceae)	Aloés-vera	Paleártico; Neotropical	Perenifólio	1-12	11-6	Hemi.	Herbácea suculenta	Z8	C3, C20, C22, C24 (grupo)
<i>Anredera cordifolia</i> (Ten.) Steenis	Basellaceae	Boussingau-Itia	Neotropical	Caducifólio	6-2	7-9	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z9	C20(1)
<i>Apollonias barbuja</i> (Cav.) Bomm.	Lauraceae	Barbusano	Paleártico	Perenifólio	1-12	9-3	Meso.	Árvore	Z10	C5(1), C11(1), C16(15), C17(1), C20(4), C22(4)
<i>Aptenia cordifolia</i> (L. f.) Schwant.	Aizoaceae	Apténia; Rosinha-de-sol	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Herbácea trepadora e suculenta	Z9	C6, C7, C8, C20, C22 (grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Araucaria bidwillii</i> Hook. f.	Araucariaceae	Araucária-de-bidwill	Australiano	Perenifólio	1-12	2-3	Meso.	Árvore	Z9	C4(1), C18(1)
<i>Araucaria columnaris</i> (Forst. f.) Hook.	Araucariaceae	Pinheiro-da-nova-caledónia; Araucária	Oceânia	Perenifólio	1-12	5-7	Macro.	Árvore	Z10	C6(2)
<i>Araucaria heterophylla</i> (Salisb.) Franco	Araucariaceae	Araucária	Oceânia	Perenifólio	1-12	2-3	Macro.	Árvore	Z9	C6(1)
<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> H. A. Wendl. & Drude.	Palmae	Palmeira-elegante	Australiano	Perenifólio	1-12	2-10	Meso.	Árvore	Z10	C2(1)
<i>Arctotis x hybrida</i> hort.	Compositae	Margarida-africana	Hortícola	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z9	C22(grupo)
<i>Argyranthemum frutescens</i> (L.) Sch. Bip.	Compositae	Estreleira; Pampilhos	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C10A(grupo), C15(2), C16(grupo), C22(2)
<i>Argyranthemum pinnatifidum</i> (L. f.) Lowe ssp. <i>pinnatifidum</i>	Compositae	Estrelas; Pampilhos; Malmequeres	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C22 (grupo)
<i>Armeria maritima</i> (Mill.) Willd.	Plumbaginaceae	Arméria-marítima	Paleártico; Neártico	Perenifólio	1-12	3-8	Hemi.	Herbácea	Z4	C22(grupo)
<i>Arundo donax</i> L.	Gramineae	Cana-vieira; Cana-de-roca; Cana	Paleártico	Perenifólio	1-12	7-10	Hemi.	Herbácea	Z9	C8, C14, C16 (grupo)
<i>Atriplex halimus</i> L.	Chenopodiaceae	Salgadeira	Paleártico	Perenifólio	1-12	7-8	Nano.	Arbusto	Z6	C1(3)
<i>Beta procumbens</i> C. Sm. ex Homem.	Chenopodiaceae	Beterraba	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-7	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z11	C20, C22 (grupo)
<i>Bituminaria bituminosa</i> (L.) C. H. Stirt.	Leguminosae	Fedegosos	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z8	C16, C22 (grupo)
<i>Bougainvillea glabra</i> Choisy	Nyctaginaceae	Buganvília	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	C6, C12, C13, C14, C16, C19, C20, C22 (grupo) C10A (1)
<i>Brachychiton acerifolius</i> Cunn. ex F. Muell.	Sterculiaceae	Árvore-do-fogo	Australiano	Caducifólio	1-5; 8-12	5-8	Micro.	Árvore	Z10	C6(1)
<i>Brugmansia versicolor</i> Lagerh.	Solanaceae	Trombeteira	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C20(1)
<i>Bulbine frutescens</i> (L.) Willd.	Liliaceae (Asphodelaceae)	Bulbine	Áfrotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Geófita	Herbácea suculenta	Z9	C2, C7, C10A, C15, C19, C21 (grupo)
<i>Callistemon citrinus</i> (Curtis) Skeels	Myrtaceae	Martinete	Australiano	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z8	C20(5), C22(11)
<i>Callistemon salignus</i> (Sm.) DC.	Myrtaceae	Martinete	Australiano	Perenifólio	1-12	3-11	Micro.	Arbusto	Z9	C22(6)
<i>Canna x generalis</i> L. H. Bail.	Cannaceae	Canas-da-índia; Bananeiras-de-flor	Hortícola	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z9	C6(grupo)
<i>Cardiospermum grandiflorum</i> Sw.	Sapindaceae	Corriola-dos-balões	Afrotropical; Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z10	C16, C20, C22 (grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Carpobrotus edulis</i> (L.) L. Bol.	Aizoaceae	Bálsamo; Chorão	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	3-8	Fane. trep.	Herbácea suculenta e trepadora	Z9	C5, C6, C8, C14, C16, C21 (mancha)
<i>Caryota mitis</i> Lour.	Palmae	Palmeira-de-rabo- de-peixe	Indomalaio	Perenifólio	1-12	6-8	Micro.	Árvore	Z10	C3(1)
<i>Casuarina equisetifolia</i> Forst. & Forst. f.	Casuarinaceae	Casuarina	Indomalaio; Australiano; Oceânia	Perenifólio	1-12	6-11	Meso.	Árvore	Z10	C4(4), C14(7), C17B(8), C20 (58), C21(1)
<i>Celosia argentea</i> L.	Amaranthaceae	Celósia; Crista-de-galo	Indomalaio; Áfricotropical Neotropical	Sazonal	5-12	7-12	Terófito	Herbácea	Z10	C1, C15, C17 (grupo)
<i>Cephalophyllum alstonii</i> Marloth.	Aizoaceae	Chorão	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	3-11	Fane. trep.	Herbácea suculenta e trepadora	Z11	C22 (mancha)
<i>Cercis siliquastrum</i> L.	Leguminosae (Papilionoideae)	Olaia; Árvore-de- judas	Paleártico	Caducifólio	4-11	2-4	Micro.	Árvore	Z7	C6(1)
<i>Cestrum roseum</i> HBK.	Solanaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	3-11	Nano.	Arbusto	Z10	C11(1)
<i>Chamaedorea elegans</i> Mart.	Palmae	Palmeira-de- salão; Palmeira- bambu	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-6	Micro.	Arbusto	Z10	C20(3)
<i>Chamaerops humilis</i> L.	Palmae	Palmeira-das- vassouras	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-5	Micro.	Arbusto	Z9	C10A(2), C13(3)
<i>Cinnamomum camphora</i> (L.) Sieb.	Lauraceae	Canforeira	Paleártico; Indomalaio	Perenifólio	1-12	2-4	Meso.	Árvore	Z10	C2(2), C17(2)
<i>Codiaeum variegatum</i> (L.) Bl. var. <i>pictum</i> (Lodd) Muell. Arg.	Euphorbiaceae	Crótone	Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z11	C9(grupo), C20(1)
<i>Colocasia esculenta</i> (L.) Schott.	Araceae	Inhame	Indomalaio	Perenifólio	1-12	5-6	Geófito	Herbácea	Z10	C20(grupo)
<i>Convolvulus altheoides</i> L.	Convolvulaceae	Corriola; Campainhas	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-10	Geófito	Herbácea trepadora	Z8	C16, C23 (grupo)
<i>Convolvulus cneorum</i> L.	Convolvulaceae		Paleártico	Perenifólio	1-12	3-8	Nano.	Arbusto	Z8	C16 (grupo)
<i>Cordyline indivisa</i> (Forst.) Steud.	Agavaceae	Cordilina	Antártico	Perenifólio	1-12	3-6	Micro.	Árvore	Z9	C1(4)
<i>Cordyline stricta</i> (Sims) Endl.	Agavaceae	Cordiline	Australiano	Perenifólio	1-12	1-10	Nano.	Arbusto	Z10	C3(1)
<i>Cordyline terminalis</i> (L.) Kunth.	Agavaceae	Árvore-dos-reis	Indomalaio; Australiano; Oceânia; Antártico	Perenifólio	1-12	11-5	Micro.	Arbusto	Z10	C19(3)
<i>Cortaderia selloana</i> (Schult. & Schult. f.) Asch. & Gräbn.	Gramineae	Plumas; Capim-das- pampas	Neotropical	Perenifólio	1-12	7-10	Hemi.	Herbácea	Z6	C19(3)
<i>Cotoneaster lacteus</i> W. W. Sm.	Rosaceae		Paleártico	Perenifólio	1-12	4-7	Micro.	Arbusto	Z7	C3(3), C4(2), C13(1)
<i>Cotyledon orbiculata</i> L.	Crassulaceae		Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-3	Nano.	Arbusto suculento	Z10	C22 (grupo)
<i>Crassula multicava</i> Lem.	Crassulaceae	Crássula	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea suculenta	Z10	C19 (grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Crassula ovata</i> (Mill.) Druce.	Crassulaceae	Ensaíão-branco ; Planta-de-jade	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	11-3	Nano.	Arbusto suculento	Z10	C6(1), C9(3), C20, C22, C24 (grupo)
<i>Crithmum maritimum</i> L.	Umbelliferae	Perrexil; Funcho-marítimo	Paleártico	Perenifólio	1-12	6-9	Caméfito	Herbácea suculenta	Z7	C6, C14, C22 (grupo)
<i>Cucurbita moschata</i> (Duchesne ex Lam.) Duchesne ex Poir.	Cucurbitaceae	Aboboreira	Neártico; Neotropical	Perenifólio	1-12	7-9	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z10	C21 (grupo)
<i>Cuphea hyssopifolia</i> HBK.	Lythraceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C20, C22 (grupo)
<i>Cupressus arizonica</i> Green	Cupressaceae	Cipreste-do- arizona	Neártico	Perenifólio	1-12	11-1	Micro.	Árvore	Z7	C20(8), C22(2)
<i>Cycas revoluta</i> Thunb.	Cycadaceae	Cicas-revoluta; Cicas-de-sagú	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-8	Micro.	Árvore	Z9	C20A(2)
<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.	Gramineae	Relva-bermuda	Cosmopolita	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z7	C6, C15, C16 (tapete)
<i>Cyperus involucratus</i> Rottb.	Cyperaceae		Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C20(grupo)
<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link	Leguminosae	Giesta	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-7	Micro.	Arbusto	Z5	C22(2)
<i>Delonix regia</i> (Bojer) Raf.	Leguminosae (Caesalpinioideae)	Acácia-rubra	Áfricotropical	Caducifólio	6-3	7-9	Micro.	Árvore	Z11	C4(1)
<i>Dendranthema x grandiflorum</i> Kitam.	Compositae	Crisântemo-das- floristas	Hortícola	Perenifólio	1-12	10-12	Nano.	Herbácea	Z4	C6, C20(grupo)
<i>Dracaena draco</i> L. ssp. <i>draco</i>	Agavaceae	Dragoeiro	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-6	Micro.	Árvore	Z11	C3(2), C4(2), C6(6), C10(3), C15(10), C11(3), C20A(3), C21(4), C22A(1), C24(2)
<i>Dracaena marginata</i> Lam.	Agavaceae	Dracena	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu**	Micro.	Arbusto	Z11	C19(1)
<i>Drosanthemum floribundum</i> (Haw.) Schwantes	Aizoaceae	Arrozinho	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	5-7	Fane. trep.	Arbusto trepador e suculento	Z9	C14, C15 (mancha)
<i>Duranta erecta</i> L.	Verbenaceae	Duranta	Neotropical	Perenifólio	1-12	7-1	Micro.	Arbusto	Z10	C6(4), C22(8)
<i>Echium nervosum</i> Dryand.	Boraginaceae	Massaroco	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-6	Nano.	Arbusto	Z11	C1(1), C8(1), C11(1), C13(3), C15(grupo), C19(1), C20(grupo), C22(grupo)
<i>Echium plantaginium</i> L.	Boraginaceae	Invejosa	Paleártico	Perenifólio	1-12	2-6	Nano.	Herbácea	Z9	C16, C22, C24 (grupo)
<i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl.	Rosaceae	Nespereira	Paleártico	Perenifólio	1-12	10-12	Micro.	Árvore	Z8	C15(5), C17(3), C22(6)
<i>Erythrina abyssinica</i> Lam. ex DC.	Leguminosae (Papilionoideae)	Coralina-da- abissínia	Áfricotropical	Caducifólio	5-1	1-6; 9-10	Micro.	Árvore	Z10	C4(2), C15(1)
<i>Erythrina crista-galli</i> L.	Leguminosae (Papilionoideae)	Coraleira; Coralina-crista-de- galo	Neotropical	Marcescente	4-3 (12-3)	4-1	Micro.	Árvore	Z8	C4(1), C17(1)
<i>Erythrina speciosa</i> Andrews	Leguminosae (Papilionoideae)	Coralina- elegante	Neotropical	Caducifólio	4-11	12-4	Micro.	Árvore	Z10	C4(1), C15(2)
<i>Escallonia bifida</i> Link & Otto	Grossulariaceae	Escalónia	Neotropical	Perenifólio	1-12	3-1	Micro.	Arbusto	Z9	C1(1), C4(3), C16(1), C21(1)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.	Myrtaceae	Eucalipto	Australiano	Perenifólio	1-12	11-4	Meso.	Árvore	Z8	C15(1)
<i>Eugenia uniflora</i> L.	Myrtaceae	Pitangueira	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Árvore	Z10	C10A(1), C15(6)
<i>Euphorbia grandicornis</i> Goebel.	Euphorbiaceae	Eufórbia-grande-cornuda	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	12-2	Nano.	Arbusto suculento	Z9	C24(2)
<i>Euphorbia ingens</i> E. Mey.	Euphorbiaceae	Eufórbia-gigante	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	10-12	Micro.	Arbusto suculento	Z9	C6(1), C24(1)
<i>Euphorbia nerifolia</i> L.	Euphorbiaceae	Eufórbia	Indomalaio; Oceânia	Perenifólio	1-12	3-7	Micro.	Arbusto suculento	Z10	C6(6)
<i>Euphorbia piscatoria</i> Ait.	Euphorbiaceae	Figueira-do-inferno	Paleártico	Caducifólio	9-6	4-6	Micro.	Arbusto suculento	Z10	C11(2), C15(grupo), C22(grupo), C24(1)
<i>Euphorbia pulcherrima</i> Willd. ex Klotzsch.	Euphorbiaceae	Manhã-de-páscoa	Neotropical	Caducifólio	5-2	10-3	Micro.	Arbusto	Z10	C1(1), C6(1), C16(2), C20(1)
<i>Euphorbia tirucalli</i> L.	Euphorbiaceae	Eufórbia	Áfricotropical; Indomalaio	Perenifólio	1-12	4-9	Micro.	Arbusto suculento	Z10	C16(2), C24(1)
<i>Felicia amelloides</i> (L.) Voss.	Compositae	Felícia ; Margarida-azul	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z9	C8, C10, C16 (grupo)
<i>Festuca glauca</i> Vill.	Gramineae	Festuca	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-6	Hemi.	Herbácea	Z3	C7, C16, C19 (grupo)
<i>Ficus benjamina</i> L. var. <i>nuda</i> (Miq.) Barrett	Moraceae	Figueira-da-índia	Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-4	Meso.	Árvore	Z11	C4(2), C6(1)
<i>Ficus carica</i> L.	Moraceae	Figueira	Paleártico	Caducifólio	4-12	6-7	Micro.	Árvore	Z8	C15(9), C17(1), C22(6)
<i>Ficus elastica</i> Roxb. ex Homem	Moraceae	Borracheira	Indomalaio	Perenifólio	1-12	5-8	Micro.	Árvore	Z11	C4(1), C6(2)
<i>Ficus lyrata</i> Warb.	Moraceae		Áfricotropical	Perenifólio	1-12	4-6	Micro.	Árvore	Z11	C4(2), C5(1)
<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	Umbelliferae	Funcho	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-8	Hemi.	Herbácea	Z5	C16, C22(grupo)
<i>Furcraea foetida</i> (L.) Haw.	Agavaceae	Furcreia; Piteira	Neotropical	Perenifólio	1-12	9-12	Hemi.	Herbácea suculenta	Z10	C8(1), C16(grupo)
<i>Furcraea selloa</i> K. Koch. var. <i>marginata</i> Trel.	Agavaceae	Furcreia; Piteira	Neotropical	Perenifólio	1-12	8-12	Micro.	Árvore suculenta	Z10	C6(11), C23(1)
<i>Galactites tomentosa</i> Moench.	Compositae	Cardo; Galactite	Paleártico	Sazonal	2-5	2-6	Terófito	Herbácea	Z9	C20(grupo)
<i>Gazania rigens</i> (L.) Gaertn.	Compositae	Gazania	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z9	C6, C7, C10, C10A, C13, C14, C16, C21, C22 (grupo)
<i>Globularia salicina</i> Lam.	Globulariaceae	Globulária; Malfurada	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-8	Nano.	Arbusto	Z11	C23(grupo)
<i>Grevillea robusta</i> A. M. Cunn. Ex. R. Br.	Proteaceae	Grevílea	Australiano	Perenifólio	1-12	4-7	Meso.	Árvore	Z8	C4(1)
<i>Hebe speciosa</i> (A. Cunn.) Ckn. & Allan.	Scrophulariaceae	Verónica	Antártico	Perenifólio	1-12	4-10	Nano.	Arbusto	Z9	C16(2)
<i>Hedera helix</i> L.	Araliaceae	Hera	Paleártico	Perenifólio	1-12	9-10	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z5	C17(grupo)
<i>Helichrysum devium</i> Johns.	Compositae	Perpétua-de-são-lourenço	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-6	Nano.	Arbusto	Z11	C6(grupo)
<i>Helichrysum obconicum</i> L.	Compositae	Murrião	Paleártico	Perenifólio	1-12	6-10	Nano.	Arbusto	Z11	C16, C21(grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Heliconia bihai</i> (L.) L.	Heliconiaceae	Helicônia	Neotropical	Perenifólio	1-12	7-11	Hemi.	Herbácea	Z11	C20 (grupo)
<i>Hibiscus rosa-sinensis</i> L.	Malvaceae	Cardeais; Hibiscos; Rosa da China	Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C2(2), C6(sebe), C10(grupo), C12(grupo), C13(grupo), C16(3), C17(grupo)
<i>Hibiscus syriacus</i> L.	Malvaceae	Cardeal-roxo	Paleártico; Indomalaio	Caducifólio	5-11	7-9	Micro.	Arbusto	Z5	C3(2), C17(2)
<i>Holmskioldia sanguinea</i> Retz.	Verbenaceae	Chapéus-de- mandarim; Chapéus-chineses	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C3(3)
<i>Howea forsteriana</i> (C. Moore & F. Muell.) Becc.	Palmae	Quência	Australiano	Perenifólio	1-12	1-9	Micro.	Árvore	Z10	C3(1), C6(1)
<i>Hylocereus triangularis</i> (L.) Britt. & Rose	Cactaceae	Rainha-da-noite; Cacto-trepador	Neotropical	Perenifólio	1-12	7-10	Fane. trep.	Arbusto trepador e suculento	Z10	C16, C19, C20 (grupo)
<i>Hyparrhenia hirta</i> (L.) Stapf	Gramineae	Feno	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-5	Hemi.	Herbácea	Z9	C15, C22 (mancha)
<i>Impatiens walleriana</i> Hook. f.	Balsaminaceae	Maravilhas	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Herbácea	Z9	C1, C16, C20 (grupo)
<i>Ipomoea indica</i> (Burm.) Merrill	Convolvulaceae	Camapinhas	Neotropical; Oceânia	Perenifólio	1-12	6-10	Geófita	Herbácea trepadora	Z9	C1, C16, C20 (grupo)
<i>Ipomoea purpurea</i> (L.) Roth.	Convolvulaceae	Campainhas	Neotropical	Sazonal	1-12	1-12	Terófita.	Herbácea trepadora	Z10	C1, C16, C20 (grupo)
<i>Iresine herbstii</i> Hook.	Amaranthaceae	Iresine	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Caméfito	Herbácea	Z10	C15, C21(grupo)
<i>Jasminum azoricum</i> L.	Oleaceae	Jasmineiro-branco	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-11	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z11	C22 (17)
<i>Jasminum mesnyi</i> Hance.	Oleaceae	Jasmineiro- amarelo	Paleártico	Perenifólio	1-12	12-6	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z8	C7(8), C15(12), C16, C19, C22, C23(grupo)
<i>Jasminum odoratissimum</i> L.	Oleaceae	Jasmineiro- amarelo	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z11	C16(grupo)
<i>Kalanchoe blossfeldiana</i> Poelln.	Crassulaceae	Calanchoé	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto suculento	Z11	C6(grupo)
<i>Kalanchoe fedtschenkoi</i> Hamet & Perrier.	Crassulaceae	Calanchoé	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-8	Caméfito	Arbusto suculento	Z11	C7, C10, C22 (grupo)
<i>Kigelia africana</i> (Lam.) Benth.	Bignoniaceae	Árvore-das- salsichas	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	5-7	Micro.	Árvore	Z10	C4(4)
<i>Kniphofia uvaria</i> (L.) Oken.	Liliaceae (Aloecaceae)	Foguetes	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	6-8	Hemi.	Herbácea	Z9	C9(grupo)
<i>Lablab purpureus</i> (L.) Sweet	Leguminosae (Papilionoideae)		Áfricotropical	Perenifólio	1-12	3-7	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z9	C20(grupo)
<i>Lagerstroemia indica</i> L.	Lythraceae	Laguerestré-mia; Flor-de-merenda; Suspiros	Paleártico; Indomalaio	Caducifólio	3-11	7-9	Micro.	Árvore	Z7	C22(2)
<i>Lampranthus aureus</i> (L.) N. E. Br.	Aizoaceae (Mesembryanthemaceae)	Lamprantos; Chorão	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	4-12	Fane. trep.	Arbusto trepador e suculento	Z11	C22 (grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitoceográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Lampranthus multiradiatus</i> (Jacq.) N. E. Br.	Aizoaceae (Mesembryanthemaceae)	Lamprantos; Chorão	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Arbusto trepador e suculento	Z11	C6, C7, C11 (grupo)
<i>Lampranthus spectabilis</i> (Haw.) N.E. Br.	Aizoaceae (Mesembryanthemaceae)	Lamprantos; Chorão	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Arbusto trepador e suculento	Z11	C6, C7, C11, C16, C24 (grupo)
<i>Lantana camara</i> L.	Verbenaceae	Lantana	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C1, C15, C16, C22, C24 (grupo)
<i>Lavandula dentata</i> L.	Labiatae	Alfazema; Lavanda	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z8	C14, C16, C22 (grupo)
<i>Lavandula pinnata</i> L. f.	Labiatae	Alfazema; Lavanda	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z11	C16(grupo)
<i>Leptospermum scoparium</i> Forst. & Forst.	Myrtaceae	Leptospermo; Urze-de-jardim	Australiano; Antártico	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z8	C15(2)
<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) De Wit.	Leguminosae (Mimosoideae)	Aroma-branco; Leucena	Neártico	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z9	C6, C15, C16, C19, C20, C22 (grupo)
<i>Ligustrum ovalifolium</i> Hassk.	Oleaceae	Ligustro; Alfinheiro	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-7	Nano.	Arbusto	Z5	C6(grupo)
<i>Livistona chinensis</i> (Jacq.) R. Br. ex Mart.	Palmae	Palmeira-de-leque-da-china	Paleártico	Perenifólio	1-12	2-5	Meso.	Árvore	Z9	C4(4), C6(1)
<i>Lobularia maritima</i> (L.) Desv.	Cruciferae	Lobulária	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z8	C6, C22(grupo)
<i>Lonchocarpus sericeus</i> (Poir.) Kunth ex DC.	Leguminosae (Papilionoideae)	Loncocarpus	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-12	Meso.	Árvore	Z10	C4(1)
<i>Macadamia integrifolia</i> Maid. & Betch.	Proteaceae	Macadâmia	Australiano	Perenifólio	1-12	2-5	Micro.	Árvore	Z9	C10A(1)
<i>Magnolia grandiflora</i> L.	Magnoliaceae	Magnólia	Neártico	Perenifólio	1-12	5-8	Micro.	Árvore	Z6	C4(6), C5(1)
<i>Malva sylvestris</i> L.	Malvaceae	Malva-silvestre; Malva-do-caminho	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-8	Nano.	Herbácea	Z5	C22 (grupo)
<i>Mangifera indica</i> L.	Anacardiaceae	Mangueiro	Indomalaio	Perenifólio	1-12	11-6	Micro.	Árvore	Z11	C4(1), C9(1), C15(1), C22(1)
<i>Marcetella maderensis</i> (Bomm.) Svent.	Rosaceae	Marcetela	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-6	Nano.	Arbusto	Z10	C22(1)
<i>Matthiola incana</i> (L.) R. Br.	Cruciferae	Goivos	Paleártico	Sazonal	1-7	3-7	Terófito	Herbácea	Z6	C17 (grupo)
<i>Matthiola maderensis</i> Lowe	Cruciferae	Goivo-da-rocha	Paleártico	Sazonal	2-8	4-7	Terófito	Herbácea	Z10	C20, C22(grupo)
<i>Maytenus umbellata</i> (R. Br.) Mabb.	Celastraceae	Buxo-da-rocha	Paleártico	Perenifólio	1-12	8-9	Micro.	Arbusto	Z11	C22(2)
<i>Melaleuca armillaris</i> (Sol. ex Gaertn.) Sm.	Myrtaceae	Melaleuca	Australiano	Perenifólio	1-12	3-5	Micro.	Árvore	Z9	C6(4), C20(3), C21(3), C22(34)
<i>Melia azederach</i> L.	Meliaceae	Amargoseira; Mélia; Conteira; Lilás-da-índia	Paleártico; Indomalaio	Caducifólio	4-1	4-6	Micro.	Árvore	Z10	C18(1)
<i>Mesembryanthemum crystallinum</i> L.	Aizoaceae	Barrilha; Erva-gelada;	Áfricotropical	Sazonal	10-7	3-6	Terófito	Herbácea trepadora e suculenta	Z9	C22(grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Mesembryanthemum nodiflorum</i> L.	Aizoaceae	Barrilha	Áfricotropical	Sazonal	10-7	3-6	Terófito	Herbácea trepadora e suculenta	Z9	C22 (grupo)
<i>Metrosideros excelsa</i> Sol. ex Gaertn.	Myrtaceae	Metrosidero	Antártico	Perenifólio	1-12	6-7	Meso.	Árvore	Z10	C4(1), C7(2), C12(1), C17(3), C20(19), C23(>100)
<i>Mirabilis jalapa</i> L.	Nyctaginaceae	Boas-noites	Neotropical	Sazonal	3-10	5-11	Geófito	Herbácea	Z8	C1(1), C16(grupo), C22(grupo)
<i>Musa acuminata</i> Colla	Musaceae	Bananeira	Indomalaio; Australiano	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C20 (grupo)
<i>Myoporum tenuifolium</i> Forst. f.	Myoporaceae	Miopóro	Australiano	Perenifólio	1-12	2-5	Micro.	Árvore	Z9	C20 (33), C22 (25)
<i>Myrica faya</i> Ait.	Myricaceae	Faia-das-ilhas; Samouco	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-5	Micro.	Árvore	Z9	C4(1), C7(1), C14(1), C15(3), C20(>50), C22(>100),
<i>Myrtus communis</i> L.	Myrtaceae	Murta	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-7; 10-11	Micro.	Arbusto	Z8	C10A(4)
<i>Nasturtium officinale</i> R. Br.	Cruciferae	Agrião	Paleártico	Perenifólio	1-12	2-10	Helófito	Herbácea	Z6	C20(grupo)
<i>Nerium oleander</i> L.	Apocynaceae	Sevadilha; Loendro	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-11	Micro.	Arbusto	Z9	C1(grupo), C2(2), C3(14), C4(17), C5(6), C6(>100), C7(1), C8(8), C11(grupo), C12(sebe), C14(grupo), C16(2), C17(grupo), C20(grupo), C22(>100)
<i>Nicandra physaloides</i> (L.) Gaertn.	Solanaceae	Nicandra	Neotropical	Sazonal	9-6	9-5	Terófito	Herbácea	Z8	C20(grupo)
<i>Nicotiana glauca</i> Grah.	Solanaceae	Tabaqueira-azul; Charuto-do-rei	Neotropical	Perenifólio	1-12	3-9	Micro.	Arbusto	Z8	C6, C16, C20, C22 (grupo)
<i>Nolina recurvata</i> (Lem.) Hemsl.	Agavaceae	Nolina; Pata-de-elefante	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-8	Micro.	Árvore	Z9	C4(1), C15(1)
<i>Ocotea foetens</i> (Aiton) Baill.	Lauraceae	Til	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Meso.	Árvore	Z10	C10(4), C11(2), C15(3), C16(1), C17(3)
<i>Opuntia cylindrica</i> (Lam.) DC.	Cactaceae	Cacto-redondo	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-7	Micro.	Arbusto suculento	Z9	C6(1)
<i>Opuntia ficus-indica</i> (L.) Mill.	Cactaceae	Tabaibeira	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-7	Micro.	Arbusto suculento	Z9	C22 (grupo)
<i>Opuntia microdasys</i> (Lehm.) Pfeiff.	Cactaceae	Cacto	Neártico	Perenifólio	1-12	5-7	Nano.	Arbusto suculento	Z8	C24(1)
<i>Opuntia monacantha</i> (Willd.) Haw. f. <i>variegata</i>	Cactaceae	Cacto	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-7	Nano.	Arbusto suculento	Z9	C24(2)
<i>Opuntia robusta</i> Wendl. & Pfeiff.	Cactaceae	Cacto	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-7	Nano.	Arbusto suculento	Z9	C24(3)
<i>Opuntia tuna</i> (L.) Mill.	Cactaceae	Tabaibeira	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-9	Micro.	Arbusto suculento	Z9	C16, C22 (grupo)
<i>Osteospermum barberiae</i> (Harv.) Norl.	Compositae	Estrelas-do-cabo	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Caméfito	Arbusto	Z10	C6, C7, C8C16, C24 (grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Osteospermum ecklonis</i> (DC.) Norl.	Compositae	Estrelas-do- cabo	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Caméfito	Arbusto	Z10	C24(grupo)
<i>Pachycereus schottii</i> (Engelm.) D. Hunt.	Cactaceae	Cacto	Neártico	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Nano.	Arbusto suculento	Z9	C24 (3)
<i>Paspalum dilatatum</i> Poir.	Gramineae	Erva-rija; Erva-do-governo	Neotropical	Perenifólio	1-12	3-9	Hemi.	Herbácea	Z8	C2, C4, C15 (tapete)
<i>Pelargonium inquinans</i> (L.) L'Hérit	Geraniaceae	Malva-vermelha	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C16(grupo)
<i>Pelargonium peltatum</i> (L.) L'Hérit.	Geraniaceae	Malva	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z10	C6, C7, C10, C10A, C13, C14, C19 (grupo)
<i>Pelargonium zonal</i> (L.) L'Hérit	Geraniaceae	Malva	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C6, C7, C10, C13, C16, C19, C20 (grupo)
<i>Pennisetum purpureum</i> Schum.	Gramineae	Capim-elefante; Erva-elefante	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C16(grupo)
<i>Persea americana</i> Mill.	Lauraceae	Abacateiro	Neotropical	Perenifólio	1-12	2-5	Micro.	Árvore	Z10	C20(1)
<i>Petunia x hybrida</i> hort. Vilm.- Andr.	Solanaceae	Petúnia	Hortícola	Sazonal	2-11	2-11	Terófito	Herbácea	Z9	C6 (grupo)
<i>Phalaris arundinacea</i> L.	Gramineae		Paleártico; Neártico; Neotropical	Perenifólio	1-12	7-11	Hemi.	Herbácea	Z4	C16 (grupo)
<i>Philodendron undulatum</i> Engl.	Araceae	Filodendro	Neotropical	Perenifólio	1-12	3-4	Nano.	Arbusto	Z11	C20(1)
<i>Phoenix canariensis</i> Chabaud.	Palmae	Palmeira-das- Canárias	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-3	Meso.	Árvore	Z11	C1(5), C2(2), C3(1), C4(43), C5(3), C6(8), C7(13), C12(3), C13(6), C15(20), C16(6), C17(1), C20(3), C21(1)
<i>Phoenix dactylifera</i> L.	Palmae	Tamareira	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-3	Meso.	Árvore	Z11	C4(3), C15(2), C17(9), C19(4), C21(2), C23(28)
<i>Phoenix reclinata</i> Jacq.	Palmae	Tamareira-do- senegal	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	5-7	Micro.	Árvore	Z11	C15(2)
<i>Phoenix roebelinii</i> O' Brien.	Palmae	Palmeira-anã	Indomalaio	Perenifólio	1-12	5-7	Micro.	Árvore	Z11	C1(5), C19(1)
<i>Phormium tenax</i> Forst. & Forst. f.	Agavaceae	Espadana	Antártico	Perenifólio	1-12	6-8	Hemi.	Herbácea	Z8	C1(5), C19(8)
<i>Phyllostachys aurea</i> (Carr.) A. & C. Riv.	Gramineae	Bambu	Paleártico	Perenifólio	1-12	Não floriu**	Hemi.	Herbácea	Z6	C16, C19 (grupo)
<i>Phytolacca dioica</i> (L.) Moq.	Phytolaccaceae	Bela-sombra	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-9	Meso.	Árvore	Z11	C4(1)
<i>Picconia excelsa</i> (Ait.) DC.	Oleaceae	Pau Branco	Paleártico	Perenifólio	1-12	2-5	Micro.	Árvore	Z10	C11(1)
<i>Pistia stratiotes</i> L.	Araceae	Alface-de- água	Neotropical; Áfricotropical; Indomalaio; Oceânia; Australiano	Perenifólio	1-12	1-12	Hidrófito	Herbácea	Z10	C20(grupo)
<i>Pittosporum undulatum</i> Vent.	Pittosporaceae	Incenseiro	Australiano	Perenifólio	1-12	2-4	Micro.	Árvore	Z9	C16(1)
<i>Plantago maderensis</i> Decne.	Plantaginaceae	Plantago-da- madeira	Paleártico	Perenifólio	1-12	2-5	Nano.	Arbusto	Z10	C22(1)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Plectranthus forsteri</i> Benth.	Labiatae	Plectratos	Australiano; Oceânia	Perenifólio	1-12	6-11	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z10	C20(grupo)
<i>Plumbago auriculata</i> Lam.	Plumbaginaceae	Plumbago	Áfrotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z9	C1, C15, C16, C22 (grupo)
<i>Plumeria rubra</i> L. var. <i>acutifolia</i> (Poir.) Woodson.	Apocynaceae	Planta-dos- dentes	Neotropical	Caducifólio	5-1	6-12	Micro.	Árvore	Z10	C3(1), C17(3), C18(3)
<i>Portulacaria afra</i> Jacq.	Portulacaceae	Portulacária	Áfrotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu**	Nano.	Arbusto suculento	Z9	C8(3)
<i>Psidium guajava</i> L.	Myrtaceae	Goiabeira	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-7	Micro.	Árvore	Z10	C15(3)
<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn.	Dennstaedtiaceae	Feiteira	Paleártico; Neártico	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z4	C14, C22 (grupo)
<i>Pteris tremula</i> R. Br.	Pteridaceae	Feto	Australiano; Antártico; Oceânia; Áfrotropical	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z10	C20 (grupo)
<i>Pteris vittata</i> L.	Pteridaceae	Feto	Paleártico; Indomalaio; Australiano Oceânia	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z9	C11, C13, C17, C20 (grupo)
<i>Punica granatum</i> L.	Punicaceae	Romãzeira-anã	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-7	Micro.	Árvore	Z9	C22(3)
<i>Pyracantha angustifolia</i> (Franch.) Schneid.	Rosaceae	Perinhos; Sarça-ardente	Paleártico	Perenifólio	1-12	2-7	Micro.	Arbusto	Z7	C15(1)
<i>Raphanus raphanistrum</i> L. ssp. <i>raphanistrum</i>	Cruciferae	Saramago	Paleártico	Sazonal	10-5	11-3	Terófito	Herbácea	Z6	C16, C17, C22 (grupo)
<i>Rapistrum rugosum</i> (L.) All.	Cruciferae	Rinchão	Paleártico	Sazonal	1-8	3-6	Terófito	Herbácea	Z6	C16, C20, C22 (grupo)
<i>Ricinus communis</i> L.	Euphorbiaceae	Ricino; Carrapateira	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z9	C20, C22 (grupo)
<i>Rosmarinus officinalis</i> L.	Labiatae	Alecrim	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z6	C18(1), C20(1), C21(1)
<i>Rumex conglomeratus</i> Murray	Polygonaceae	Labaça	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-7	Helófito	Herbácea	Z6	C20(grupo)
<i>Russelia equisetiformis</i> Scdl. & Cham.	Scrophulariaceae	Russélia ; Lágrimas-de-amor	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z9	C23(grupo)
<i>Salix babylonica</i> L.	Salicaceae	Salgueiro-chorão	Paleártico	Marcescente	1-12 (12-3)	3-5	Micro.	Árvore	Z4	C4(1)
<i>Salix canariensis</i> C. Sm. ex Link	Salicaceae	Seixo; Seixeiro	Paleártico	Caducifólio	2-12	1-2	Micro.	Árvore	Z11	C20(34)
<i>Salix x rubens</i> Schrank.	Salicaceae	Vimeiro	Hortícola	Marcescente	1-12 (12-3)	3-5	Micro.	Arbusto	Z4	C20(1)
<i>Sansevieria trifasciata</i> hort. ex Prain.	Agavaceae	Língua-de-sogra	Áfrotropical	Perenifólio	1-12	8-11	Hemi.	Herbácea	Z10	C9(grupo)
<i>Santolina chamaecyparissus</i> L.	Compositae	Santolina	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-8	Caméfito	Arbusto	Z7	C15, C19 (grupo)
<i>Schinus molle</i> L. non hort. ex Engl.	Anacardiaceae	Pimenteira- bastarda; Pimenteira-da- índia	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Meso.	Árvore	Z9	C19A(1)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Schinus terebinthifolius</i> Raddi	Anacardiaceae	Pimenteira-do-brasil	Neotropical	Perenifólio	1-12	8-10	Micro.	Árvore	Z10	C8(3), C15(6)
<i>Senecio cineraria</i> DC.	Compositae	Senécio	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-8	Nano.	Arbusto	Z8	C1(grupo)
<i>Senna corymbosa</i> (Lam.) Irwin & Barneby	Leguminosae (Caesalpinioideae)	Cássia-corimbosa	Neotropical	Perenifólio	1-12	7-11	Nano.	Arbusto	Z9	C1(5), C14(1), C22(1), C20(26)
<i>Senna occidentalis</i> (L.) Link.	Leguminosae (Caesalpinioideae)	Cássia-café; Sena-café	Áfrotropical; Indomalaio; Australiano; Oceânia	Perenifólio	1-12	6-12	Micro.	Arbusto	Z10	C20(2)
<i>Sideroxylon mirmulans</i> R. Brown in Buch	Sapotaceae	Marmulano	Paleártico	Perenifólio	1-12	8-1	Micro.	Árvore	Z10	C22(1)
<i>Sonchus pinnatus</i> Ait.	Compositae	Leituga	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-7	Nano.	Arbusto	Z10	C6(1)
<i>Spathodea campanulata</i> Beauv.	Bignoniaceae	Chama-da-floresta; Tulipeiro- africano	Áfrotropical	Caducifólio	1-12 (Variação individual)	1-12	Micro.	Árvore	Z11	C2(1), C6(2)
<i>Stachys ocymastrum</i> (L.) Briq.	Labiatae		Paleártico	Sazonal	12-5	1-4	Terófito	Herbácea	Z5	C19(grupo)
<i>Stenotaphrum secundatum</i> (Walter) Kuntze	Gramineae	Relva; Relva-de-correr	Neotropical; Áfrotropical; Oceânia	Perenifólio	1-12	3-11	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z9	C2, C4, C6, C7, C10, C11, C12, C13, C15, C17, C18, C20A (tapete)
<i>Strelitzia reginae</i> Banks ex Dryand	Strelitziaceae	Estrelícia	Áfrotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C9(grupo)
<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassm.	Palmae	Coqueiro-de-jardim; Palmeira-rainha	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-7	Micro.	Árvore	Z10	C3(2), C15(5)
<i>Synadenium grantii</i> Hook. f.	Euphorbiaceae	Sinadénio	Áfrotropical	Perenifólio	1-12	8-11	Micro.	Arbusto suculento	Z10	C20(1)
<i>Tagetes patula</i> L.	Compositae	Cravos-de-burro	Neotropical	Sazonal	1-9	3-8	Terófito	Herbácea	Z9	C15, C16, C20, C22 (grupo)
<i>Tamarix gallica</i> L.	Tamaricaceae	Tamargueira	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-5	Micro.	Arbusto	Z5	C8(sebe), C10(2), C11(4), C12(sebe), C14(grupo), C21(grupo), C22(9)
<i>Tecomaria capensis</i> (Thunb.) Spach.	Bignoniaceae	Camarões	Áfrotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C15, C16, C22, C23 (grupo)
<i>Teucrium fruticans</i> L.	Labiatae		Paleártico	Perenifólio	1-12	12-5	Nano.	Arbusto	Z8	C14(8)
<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	Leguminosae (Papilionoideae)	Tipuana; Orgulho da Bolívia	Neotropical	Marcescente	5-4 (3-4)	4-7	Meso.	Árvore	Z9	C3(2), C4(16), C11(1), C13(1), C15(1),
<i>Tradescantia pallida</i> (Rose) D. Hunt.	Commelinaceae	Tradescantia	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea trepadora	Z8	C1, C7, C16 (grupo)
<i>Tradescantia zebrina</i> hort. ex. Bosse	Commelinaceae	Zebrina	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z9	C20 (grupo)
<i>Verbena x hybrida</i> Groenl. & Ruempl.	Verbenaceae	Verbena	Hortícola	Perenifólio	1-12	1-12	Caméfito	Herbácea	Z9	C22 (grupo)
<i>Vitis vinifera</i> L.	Vitaceae	Vinha-púrpura	Paleártico	Caducifólio	3-12	4-6	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z6	C1(1), C16(grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Washingtonia filifera</i> (Lind. ex André) H. A. Wendl	Palmae	Palmeira-de-leque-da-califórnia	Neártico	Perenifólio	1-12	5-8	Micro.	Árvore	Z9	C9(2), C10(1), C15(1), C21(4)
<i>Washingtonia robusta</i> H. A. Wendl	Palmae	Palmeira-de-leque-mexicana	Neártico	Perenifólio	1-12	4-6	Micro.	Árvore	Z10	C9(1)
<i>Wedelia trilobata</i> (L.) Hitchc.	Compositae	Vedélia	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Herbácea	Z11	C7, C10A, C16 (grupo)
<i>Yucca gloriosa</i> L..	Agavaceae	luca	Neártico	Perenifólio	1-12	6-11	Micro.	Arbusto	Z7	C1(1), C6(2), C14(2), C19(4)

Legenda:

- Plantas que não floriram no período em estudo (Janeiro 2002 – Janeiro 2005): * plantas novas; ** plantas que nunca floriram por falta de aclimação;
- Plantas marcescentes (plantas semiperenifólias e semicaducifólias): 3-2 **(3-4)** – folhas todo o ano mas com renovação significativa em Março e Abril.

Anexo 5
CARACTERIZAÇÃO FITOGEOGRÁFICA DA MATA DA NAZARÉ

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Abutilon grandifolium</i> (Willd.) Sweet	Malvaceae	Abutilão	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z9	C1(1), C2(grupo)
<i>Abutilon pictum</i> (Gillies ex Hook. & Arn.) Walp.	Malvaceae	Abutilão	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z9	C1(grupo)
<i>Acacia meamsii</i> De Wildeman.	Leguminosae (Mimisoideae)	Mimosa	Australiano	Perenifólio	1-12	1-8	Micro.	Árvore	Z8	C2(1)
<i>Acalypha wilkesiana</i> Muell. Arg.	Euphorbiaceae	Acalífa;	Oceânia	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C1(8), C2(2), C3(1)
<i>Agapanthus praecox</i> Willd. ssp. <i>orientalis</i> (Leighton) Leighton	Liliaceae	Agapantos; Coroas-de-henrique	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	4-9	Hemi.	Herbácea	Z9	C3(mancha)
<i>Agathis robusta</i> (C. Moore ex F. Muell.) Bail.	Araucariaceae	Pinheiro-de-damara; Pinheiro-folha-de-alegra-campo	Australiano	Perenifólio	1-12	3-4	Meso.	Árvore	Z9	C1(2), C3(4)
<i>Agave attenuata</i> Salm-Dyck	Agavaceae	Piteira; Agave-pescoço-de-cisne	Neotropical	Perenifólio	1-12	12-3	Nano.	Árvore suculenta	Z9	C1(27)
<i>Amaranthus caudatus</i> L.	Amaranthaceae		Áfricotropical; Indomalaio; Neotropical	Sazonal	3-10	6-9	Terófito	Herbácea	Z8	C2(1)
<i>Apollonias barbuja</i> (Cav.) Bomm.	Lauraceae	Barbusano	Paleártico	Perenifólio	1-12	9-3	Meso.	Árvore	Z10	C1(2), C2(1), C3(1)
<i>Aptenia cordifolia</i> (L. f.) Schwant.	Aizoaceae	Apténia; Rosinha-de-sol	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Herbácea trepadora e suculenta	Z9	C3(grupo)
<i>Araucaria bidwillii</i> Hook. f.	Araucariaceae	Araucária-de-bidwill	Australiano	Perenifólio	1-12	2-3	Meso.	Árvore	Z9	C1(1)
<i>Argyranthemum pinnatifidum</i> (L. f.) Lowe ssp. <i>pinnatifidum</i>	Compositae	Estrelas; Pampilhos; Malmequeres	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C1(grupo)
<i>Arundo donax</i> L.	Gramineae	Cana-vieira; Cana-de-roca; Cana	Paleártico	Perenifólio	1-12	7-10	Hemi.	Herbácea	Z9	C1(grupo)
<i>Asclepias fruticosa</i> L.	Asclepiadaceae	Planta-da-seda	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	5-11	Nano.	Arbusto	Z8	C1(1), C3(1)
<i>Bauhinia variegata</i> L.	Leguminosae (Caesalpinioidae)	Bauínia; Árvore-de-são-tomé	Indomalaio	Marcescente	5-4 (12-4)	10-6	Micro.	Árvore	Z9	C1(1)
<i>Bergenia crassifolia</i> (L.) Fritsch.	Saxifragaceae	Bergénia; Couve-de-jardim	Paleártico	Perenifólio	1-12	11-4	Caméfito	Herbácea	Z3	C3(grupo)
<i>Bougainvillea glabra</i> Choisy	Nyctaginaceae	Buganvília	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	C1(grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Brachychiton acerifolius</i> Cunn. ex. F. Muell.	Sterculiaceae	Árvore-do-fogo	Australiano	Caducifólio	1-5; 8-12	5-8	Micro.	Árvore	Z10	C2(1), C3(1)
<i>Brachychiton x hybridus</i> hort.	Sterculiaceae	Árvore-do-fogo	Hortícola	Caducifólio	1-5; 8-12	6-10	Micro.	Árvore	Z10	C2(1)
<i>Brugmansia versicolor</i> Lagerh.	Solanaceae	Trombeteira	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C2(1), C3(4)
<i>Canna indica</i> L.	Cannaceae	Canas-da-índia; Bananeiras-de-flor	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Geófito	Herbácea	Z9	C1(grupo)
<i>Canna x generalis</i> L. H. Bail.	Cannaceae	Canas-da-índia; Bananeiras-de-flor	Hortícola	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z9	C1, C2(grupo)
<i>Casuarina equisetifolia</i> Forst. & Forst. f.	Casuarinaceae	Casuarina	Indomalaio; Australiano; Oceânia	Perenifólio	1-12	6-11	Meso.	Árvore	Z10	C1(39)
<i>Celtis australis</i> L.	Ulmaceae	Lódão-bastardo; Conteira	Paleártico	Caducifólio	4-1	5-6	Meso.	Árvore	Z8	C1(4)
<i>Cestrum nocturnum</i> L.	Solanaceae	Galã-da-noite	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-12	Micro.	Arbusto	Z11	C1(1), C3(1)
<i>Cestrum roseum</i> HBK.	Solanaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	3-11	Nano.	Arbusto	Z10	C3(2)
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> (Murray) Parl.	Cupressaceae	Cedro-de-oregão	Neártico	Perenifólio	1-12	1-2	Micro.	Árvore	Z6	C1(1), C2(2), C3(1)
<i>Chorisia speciosa</i> A. St. Hil.	Bombacaceae	Sumaúma	Neotropical	Caducifólio	3-11	8-11	Meso.	Árvore	Z10	C1(4), C2(1), C3(1)
<i>Cinnamomum camphora</i> (L.) Sieb.	Lauraceae	Canforeira	Paleártico; Indomalaio	Perenifólio	1-12	2-4	Meso.	Árvore	Z10	C1(10), C3(4)
<i>Clivia miniata</i> Regel	Amaryllidaceae	Clívia	Áfrotropical	Perenifólio	1-12	2-10	Hemi.	Herbácea	Z10	C1(grupo)
<i>Clivia nobilis</i> Lindl.	Amaryllidaceae	Clívia	Áfrotropical	Perenifólio	1-12	2-10	Hemi.	Herbácea	Z10	C1(grupo)
<i>Cosmos bipinnatus</i> Cav.	Compositae	Cosmos	Neártico; Neotropical	Sazonal	3-7	3-6	Terófito	Herbácea	Z8	C3(grupo)
<i>Cupressus arizonica</i> Green.	Cupressaceae	Cedro-do-arizona	Neártico	Perenifólio	1-12	11-1	Micro.	Árvore	Z7	C1(2)
<i>Cupressus sempervirens</i> L.	Cupressaceae	Cipreste	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-2	Micro.	Árvore	Z8	C1(3)
<i>Delonix regia</i> (Bojer) Raf.	Leguminosae (Caesalpinoideae)	Acácia-rubra	Áfrotropical	Caducifólio	6-3	7-9	Micro.	Árvore	Z11	C3(1)
<i>Dombeya wallichii</i> (Lindl.) B. D. Jackson	Sterculiaceae	Dombeia; Aurora	Áfrotropical	Perenifólio	1-12	12-2	Micro.	Árvore	Z10	C2(4)
<i>Dracaena draco</i> L. ssp. <i>draco</i>	Agavaceae	Dragoeiro	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-6	Micro.	Árvore	Z11	C2(2)
<i>Duranta erecta</i> L.	Verbenaceae	Duranta	Neotropical	Perenifólio	1-12	7-1	Micro.	Arbusto	Z10	C1(grupo)
<i>Echium nervosum</i> Dryand.	Boraginaceae	Massaroco	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-6	Nano.	Arbusto	Z11	C1(grupo)
<i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl.	Rosaceae	Nespereira	Paleártico	Perenifólio	1-12	10-12	Micro.	Árvore	Z8	C1(1)
<i>Erythrina crista-galli</i> L.	Leguminosae (Papilionoideae)	Coraleira; Coralina-crista-de-galo	Neotropical	Marcescente	4-3 (12-3)	4-1	Micro.	Árvore	Z8	C1(1), C2(1)
<i>Erythrina lysistemon</i> Hutch.	Leguminosae (Papilionoideae)	Coralina	Áfrotropical	Marcescente	5-4 (12-4)	12-5	Micro.	Árvore	Z10	C3(1)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Erythrina speciosa</i> Andrews	Leguminosae (Papilionoideae)	Coralina- elegante	Neotropical	Caducifólio	4-11	12-4	Micro.	Árvore	Z10	C2(1), C3(1)
<i>Escallonia bifida</i> Link & Otto	Grossulariaceae	Escalónia	Neotropical	Perenifólio	1-12	3-12	Micro.	Arbusto	Z9	C2(1), C3(2)
<i>Eucalyptus ficifolia</i> F. Muell.	Myrtaceae	Eucalipto	Australiano	Perenifólio	1-12	3-10	Meso.	Árvore	Z9	C3(1)
<i>Euphorbia pulcherrima</i> Willd. ex Klotzsch.	Euphorbiaceae	Manhã-de-páscoa	Neotropical	Caducifólio	5-2	10-3	Micro.	Arbusto	Z10	C1(1), C2(10), C3(2)
<i>Farugium japonicum</i> (L.) Kitam.	Compositae	Patas-de- cavalo; Boinas	Paleártico	Perenifólio	1-12	10-2	Hemi.	Herbácea	Z7	C1(grupo)
<i>Ficus carica</i> L.	Moraceae	Figueira	Paleártico	Caducifólio	4-12	6-7	Micro.	Árvore	Z8	C1(1), C2(1)
<i>Ficus elastica</i> Roxb. ex Homem	Moraceae	Borracheira	Indomalaio	Perenifólio	1-12	5-8	Micro.	Árvore	Z11	C1(2)
<i>Gleditsia triacanthos</i> L.	Leguminosae (Caesalpinioidae)	Espinheiro-da- virginia	Neártico	Caducifólio	3-11	3-6	Meso.	Árvore	Z3	C1(3), C2(1), C3(1)
<i>Grevillea robusta</i> A. M. Cunn. ex. R. Br.	Proteaceae	Grevilea	Australiano	Perenifólio	1-12	4-7	Meso.	Árvore	Z8	C1(7), C3(2)
<i>Hibiscus elatus</i> Swartz	Malvaceae	Hibisco-arbóreo	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Árvore	Z10	C2(1)
<i>Hibiscus rosa-sinensis</i> L.	Malvaceae	Cardeais; Hibiscos; Rosa-da-china	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Árvore	Z10	C1(4), C2(2), C3(1)
<i>Jacaranda mimosifolia</i> D. Don.	Bignoniaceae	Jacarandá	Neotropical	Caducifólio	5-2	4-6; 9-10	Meso.	Árvore	Z9	C1(21), C2(1), C3(4)
<i>Jasminum mesnyi</i> Hance.	Oleaceae	Jasmim-primavera	Paleártico	Perenifólio	1-12	12-6	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z8	C2(2)
<i>Juniperus cedrus</i> Webb. & Berthel. ssp. <i>maderensis</i> (Menezes) Rivas Mart. & al.	Cupressaceae	Cedro-da- madeira	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-3	Micro.	Árvore	Z10	C1(4)
<i>Kigelia africana</i> (Lam.) Benth.	Bignoniaceae	Árvore-das- salsichas	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	5-7	Micro.	Árvore	Z10	C1(1)
<i>Lantana camara</i> L.	Verbenaceae	Lantana	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C1(3), C2(2), C3(2)
<i>Laurus novocanariensis</i> Rivas Mart. & al.	Lauraceae	Loureiro	Paleártico	Perenifólio	1-12	11-3	Meso.	Árvore	Z10	C1(1), C2(4)
<i>Ligustrum ovalifolium</i> Hassk.	Oleaceae	Ligustro; Alfinheiro	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-7	Nano.	Arbusto	Z5	C1(1)
<i>Magnolia grandiflora</i> L.	Magnoliaceae	Magnólia	Neártico	Perenifólio	1-12	5-8	Micro.	Árvore	Z6	C1(7), C3(1)
<i>Markamia lutea</i> (Benth.) Schum.	Bignoniaceae	Marcâmia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Meso.	Árvore	Z11	C1(5), C2(4), C3(4)
<i>Melia azederach</i> L.	Meliaceae	Amargoseira; Mélia; Conteira; Lilás-da-índia	Paleártico; Indomalaio	Caducifólio	4-1	4-6	Micro.	Árvore	Z10	C1(1)
<i>Metrosideros excelsa</i> Sol. ex Gaertn.	Myrtaceae	Metrosidero	Antártico	Perenifólio	1-12	6-7	Meso.	Árvore	Z10	C3(1)
<i>Myrica faya</i> Ait.	Myricaceae	Faia-das-ilhas; Samouco	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-5	Micro.	Árvore	Z9	C1(2), C2(5), C3(1)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Neoregelia carolinae</i> (Beer) L. B.	Bromeliaceae	Bromélia	Neotropical	Perenifólio	1-12	11-2	Hemi.	Herbácea	Z10	C2(1), C3(2)
<i>Nerium oleander</i> L.	Apocynaceae	Sevadilha; Loendro	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-11	Micro.	Arbusto	Z9	C1(5), C2(2)
<i>Ocotea foetens</i> (Aiton) Baill.	Lauraceae	Til	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Meso.	Árvore	Z10	C1(6), C2(4), C3(4)
<i>Opuntia tuna</i> (L.) Mill.	Cactaceae	Tabaibeira	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-9	Micro.	Arbusto suculento	Z9	C1(grupo)
<i>Osteospermum barberae</i> (Harv.) Norl.	Compositae	Estrelas-do-cabo	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Caméfito	Arbusto	Z10	C2, C3 (grupo)
<i>Osteospermum ecklonis</i> (DC.) Norl.	Compositae	Estrelas-do-cabo	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Caméfito	Arbusto	Z10	C2, C3 (grupo)
<i>Paspalum dilatatum</i> Poir.	Gramineae	Erva-rija; Erva-do-governo	Neotropical	Perenifólio	1-12	3-9	Hemi.	Herbácea	Z8	C1, C2, C3 (tapete)
<i>Pelargonium zonale</i> (L.) L'Hérit	Geraniaceae	Malva	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C1, C3 (grupo)
<i>Phoenix canariensis</i> Chabaud.	Palmae	Palmeira-das- Canárias	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-3	Meso.	Árvore	Z11	C1(33), C2(11)
<i>Phytolacca dioica</i> (L.) Moq.	Phytolaccaceae	Bela-sombra	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-9	Meso.	Árvore	Z11	C1(5), C2(4)
<i>Picconia excelsa</i> (Ait.) DC.	Oleaceae	Pau-branco	Paleártico	Perenifólio	1-12	2-5	Micro.	Árvore	Z10	C2(1), C3(3)
<i>Plectranthus barbatus</i> Andrews	Labiatae	Falso-boldo; Boldo-da-terra	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C1(4)
<i>Podranea ricasoliana</i> (Tanf.) Sprague.	Bignoniaceae	Ricassoliana	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	4-10	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z9	C1 (grupo)
<i>Populus nigra</i> L.	Salicaceae	Choupo-negro; Álamo	Paleártico	Caducifólio	4-12	3-4	Micro.	Árvore	Z2	C1(10)
<i>Prunus cerasifera</i> Ehrh.	Rosaceae	Ameixeira-de- jardim	Paleártico	Caducifólio	3-11	2-3	Micro.	Árvore	Z4	C3(1)
<i>Punica granatum</i> L.	Punicaceae	Romãzeira	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-7	Micro.	Árvore	Z9	C1(2), C3(1)
<i>Pyracantha angustifolia</i> (Franch.) Schneid.	Rosaceae	Perinhos; Sarça-ardente	Paleártico	Perenifólio	1-12	2-6	Micro.	Arbusto	Z7	C1(grupo), C2(2), C3(3)
<i>Ricinus communis</i> L.	Euphorbiaceae	Ricino; Carrapateira	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z9	C1(grupo)
<i>Ruscus aculeatus</i> L.	Liliaceae (Asparagaceae)	Gilbardeira	Paleártico	Perenifólio	1-12	11-12	Hemi.	Herbácea	Z7	C2(8)
<i>Saccharum officinarum</i> L.	Gramineae	Cana-sacarina; Cana-de-açúcar	Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-3	Hemi.	Herbácea	Z9	C1(grupo)
<i>Schefflera actinophylla</i> (Endl.) Harms	Araliaceae	Brassaia	Australiano; Oceânia	Perenifólio	1-12	8-10	Meso.	Árvore	Z10	C1(1)
<i>Schinus terebinthifolius</i> Raddi	Anacardiaceae	Pimenteira-do- brasil	Neotropical	Perenifólio	1-12	8-10	Micro.	Árvore	Z10	C1(8), C2(2), C3(6)
<i>Senna pendula</i> (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Irwin & Bameby var. <i>glabrata</i> (Vogel) Irwin & Bameby	Leguminosae (Caesalpinioideae)	Chuva-de-ouro; Cássia	Neotropical; Neártico	Perenifólio	1-12	10-1	Micro.	Arbusto	Z9	C1(2), C2(1), C3(2)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Sophora japonica</i> L.	Leguminosae (Papilionoideae)	Acácia-do-japão; Sófora-do-japão	Paleártico	Caducifólio	4-12	7-9	Micro.	Árvore	Z5	C3(1)
<i>Spathodea campanulata</i> Beauv.	Bignoniaceae	Chama-da- floresta; Tulipeiro-africano	Áfricotropical	Caducifólio	1-12 (Variação individual)	1-12	Micro.	Árvore	Z11	C1(1)
<i>Stenotaphrum secundatum</i> (Walter) Kuntze	Gramineae	Relva; Relva-de-correr	Neotropical; Áfricotropical; Oceânia	Perenifólio	1-12	3-11	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z9	C1, C2, C3 (tapete)
<i>Strelitzia reginae</i> Banks ex Dryand.	Strelitziaceae	Estrelícia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C1(grupo)
<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassm.	Palmae	Coqueiro-de- jardim; Palmeira-rainha	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-7	Micro.	Árvore	Z10	C3(1)
<i>Syzygium jambos</i> (L.) Alston.	Myrtaceae	Jambeiro	Indomalaio	Perenifólio	1-12	3-7	Micro.	Árvore	Z10	C1(1)
<i>Tagetes patula</i> L.	Compositae	Cravos-de-burro	Neotropical	Sazonal	1-9	3-8	Terófito	Herbácea	Z9	C3(grupo)
<i>Thuja occidentalis</i> L.	Cupressaceae	Tuia-ocidental	Neártico	Perenifólio	1-12	5-8	Micro.	Árvore	Z4	C2(2), C3(1)
<i>Tibouchina urvilleana</i> (DC.) Cogn.	Melastomataceae	Aranhas; Tibouchina	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C1(3)
<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	Leguminosae (Papilionoideae)	Tipuana	Neotropical	Marcescente	5-4 (3-4)	4-7	Meso.	Árvore	Z9	C1(26), C2(13), C3(3)
<i>Washingtonia filifera</i> (Lind. ex André) H. A. Wendl	Palmae	Palmeira-de-leque- da-califórnia	Neártico	Perenifólio	1-12	5-8	Micro.	Árvore	Z9	C1(6)
<i>Wedelia trilobata</i> (L.) Hitchc.	Compositae	Vedélia	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Herbácea	Z11	C3(grupo)

Legenda:

- Plantas que não floriram no período em estudo (Janeiro 2002 – Janeiro 2005): * plantas novas; ** plantas que nunca floriram por falta de aclimação;
- Plantas marcescentes (plantas semiperenifólias e semcaducifólias): 3-2 (3-4) – folhas todo o ano mas com renovação significativa em Março e Abril.

Anexo 6
CARACTERIZAÇÃO FITOGEOGRÁFICA DO JARDIM DO CAMPO DA BARCA

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Abelia x grandiflora</i> (André) Rehd.	Caprifoliaceae	Abélia	Hortícola	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z5	C2(39)
<i>Acalypha wilkesiana</i> Muell. Arg.	Euphorbiaceae	Acálifa; Folha-de-cobre	Oceânia	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C1(27), C2(16)
<i>Agapanthus praecox</i> Willd. ssp. <i>orientalis</i> (Leighton) Leighton	Liliaceae	Agapantos; Coroas-de-henrique	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	4-9	Hemi.	Herbácea	Z9	C1(mancha)
<i>Argyranthemum gracile</i> Schultz-Bip	Compositae	Estrelaira	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C1(grupo)
<i>Begonia x ricinifolia</i> A. Dietr.	Begoniaceae	Corações; Begónia	Hortícola	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C2(grupo)
<i>Bergenia crassifolia</i> (L.) Fritsch.	Saxifragaceae	Bergénia; Couve-de-jardim	Paleártico	Perenifólio	1-12	11-4	Caméfito	Herbácea	Z3	C2(grupo)
<i>Bidens ferulifolia</i> (Jacq.) DC.	Compositae	Bidenes	Neártico; Neotropical	Perenifólio	1-12	5-8	Hemi.	Herbácea	Z8	C2(grupo)
<i>Brachychiton acerifolius</i> Cunn. ex. F. Muell.	Sterculiaceae	Árvore-do-fogo	Australiano	Caducifólio	1-5; 8-12	5-8	Micro.	Árvore	Z10	C2(1)
<i>Brugmansia versicolor</i> Lagerh.	Solanaceae	Trombeteira	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C1(6)
<i>Buddleja madagascariensis</i> Lam.	Loganiaceae	Budléia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-7	Micro.	Arbusto	Z9	C2(1)
<i>Bulbine frutescens</i> (L.) Willd.	Liliaceae (Asphodelaceae)	Bulbine	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Geófita	Herbácea suculenta	Z9	C1, C2(grupo)
<i>Calendula officinalis</i> L.	Compositae	Calendula	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Terófita	Herbácea	Z6	C2(grupo)
<i>Canna x generalis</i> L.H. Bail.	Cannaceae	Canas-da-índia; Bananeiras-de-flor	Hortícola	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z9	C2(grupo)
<i>Celtis australis</i> L.	Ulmaceae	Lódão-bastardo; Conteira; Sementeira	Paleártico	Caducifólio	4-1	5-6	Meso.	Árvore	Z8	C2(17)
<i>Chlorophytum comosum</i> (Thumb.) Jacques	Liliaceae (Anthericaceae)	Fitinhas	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z9	C2(grupo)
<i>Chorisia speciosa</i> A. St. Hil.	Bombacaceae	Sumaúma	Neotropical	Caducifólio	3-11	8-11	Meso.	Árvore	Z10	C1(2), C2(4)
<i>Cinnamomum camphora</i> (L.) Sieb.	Lauraceae	Canforeira	Paleártico; Indomalaio	Perenifólio	1-12	2-4	Meso.	Árvore	Z10	C2(3)
<i>Cinnamomum zeylanicum</i> Bl.	Lauraceae	Caneleira; Árvore-da-canel	Indomalaio	Perenifólio	1-12	2-4	Micro.	Árvore	Z11	C1(1)
<i>Clivia miniata</i> Regel	Amaryllidaceae	Clívia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	2-7	Hemi.	Herbácea	Z10	C2(grupo)
<i>Clivia nobilis</i> Lindl.	Amaryllidaceae	Clívia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	2-7	Hemi.	Herbácea	Z10	C2(grupo)
<i>Codiaeum variegatum</i> (L.) Bl. var. <i>pictum</i> (Lodd) Muell. Arg.	Euphorbiaceae	Crótone	Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z11	C2(5)
<i>Crassula ovata</i> (Mill.) Druce.	Crassulaceae	Ensaíão-branco; Planta-de-jade	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	11-3	Nano.	Arbusto suculento	Z10	C1(6), C2(1)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Cuphea ignea</i> A. DC.	Lythraceae	Cigarrinhos	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C2(grupo)
<i>Cyathea cooperi</i> (F. Mueller) Domin.	Cyatheaceae	Feto-arbóreo	Australiano	Perenifólio	1-12	-----	Micro.	Árvore	Z10	C1(1), C2(14)
<i>Cyperus involucratus</i> Rottb.	Cyperaceae		Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C2(grupo)
<i>Dracaena deremensis</i> Engl.	Agavaceae	Dracena	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	11-12	Micro.	Arbusto	Z11	C1(2)
<i>Dracaena draco</i> (L.) L. ssp. <i>draco</i>	Agavaceae	Dragoeiro	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-6	Micro.	Árvore	Z11	C2(1)
<i>Dracaena fragrans</i> (L.) Ker-Gawl.	Agavaceae	Dracena	Africotropical	Perenifólio	1-12	11-12	Micro.	Arbusto	Z12	C1(2)
<i>Duranta erecta</i> L.	Verbenaceae	Duranta; Violeteira-da-brasil	Neotropical	Perenifólio	1-12	7-1	Micro.	Arbusto	Z10	C2(1)
<i>Erythrina abyssinica</i> Lam. ex DC.	Leguminosae (Papilionoideae)	Coralina-da-abissínia	Áfricotropical	Caducifólio	5-1	1-6	Micro.	Árvore	Z10	C2(1)
<i>Erythrina americana</i> Mill.	Leguminosae (Papilionoideae)	Coralina	Neártico	Caducifólio	4-12	1-3	Micro.	Árvore	Z9	C2(1)
<i>Eugenia uniflora</i> L.	Myrtaceae	Pitangueira	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Árvore	Z10	C1(1)
<i>Farugium japonicum</i> (L.) Kitam.	Compositae	Patás-de-cavalo; Boinas	Paleártico	Perenifólio	1-12	6-3	Hemi.	Herbácea	Z7	C1, C2(grupo)
<i>Felicia amelloides</i> (L.) Voss.	Compositae	Felícia; Margarida-azul	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z9	C2(grupo)
<i>Ficus microcarpa</i> L. f.	Moraceae	Figueira-da-índia	Indomalaio	Perenifólio	1-12	3-12	Meso.	Árvore	Z11	C2(1)
<i>Helichrysum bracteatum</i> (Vent.) Andrews	Compositae	Margarida-de-papel	Australiano	Sazonal	3-10	4-10	Terófito	Herbácea	Z8	C1, C2(grupo)
<i>Heliconia bihai</i> (L.) L.	Heliconiaceae	Helicónia	Neotropical	Perenifólio	1-12	7-11	Hemi.	Herbácea	Z11	C2(grupo)
<i>Hibiscus rosa-sinensis</i> L.	Malvaceae	Cardeais	Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C2(3)
<i>Hibiscus syriacus</i> L.	Malvaceae	Cardeal-roxo; Hibisco-da-síria	Paleártico; Indomalaio	Caducifólio	5-11	7-9	Micro.	Arbusto	Z5	C1(1), C2(2)
<i>Hymenocallis littoralis</i> (Jacq.) Salisb.	Amaryllidaceae	Lírio-aranha	Neotropical	Perenifólio	1-12	9-11	Geófito	Herbácea	Z10	C2(grupo)
<i>Jacaranda mimosifolia</i> D. Don.	Bignoniaceae	Jacarandá	Neotropical	Caducifólio	5-2	4-6; 9-10	Meso.	Árvore	Z9	C2(3)
<i>Lagerstroemia indica</i> L.	Lythraceae	Laguerestré-mia; Flor-de-merenda; Suspiros	Paleártico; Indomalaio	Caducifólio	3-11	7-9	Micro.	Árvore	Z7	C2(1)
<i>Lavandula stoechas</i> L.	Labiatae	Rosmaninho; Lavanda	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z7	C2(grupo)
<i>Lysimachia nummularia</i> L.	Primulaceae	Lisimáquia	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-11	Hemi.	Herbácea	Z4	C2(grupo)
<i>Markamia lutea</i> (Benth.) Schum.	Bignoniaceae	Marcâmia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Meso.	Árvore	Z11	C1(1)
<i>Monstera deliciosa</i> Liebm.	Araceae	Fruto-delicioso; Costela-de-adão	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z10	C1(3), C2(4)
<i>Musa x paradisiaca</i> L.	Musaceae	Bananeira-de-prata	Hortícola	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C1(grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Nerium oleander</i> L.	Apocynaceae	Sevadiha; Loendro	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-11	Micro.	Arbusto	Z9	C1(10), C2(5)
<i>Pelargonium x hortorum</i> L. H. Bail.	Geraniaceae	Malvas	Hortícola	Perenifólio	1-12	4-7	Nano.	Herbácea	Z10	C1(grupo)
<i>Phoenix canariensis</i> Chabaud.	Palmae	Palmeira-das- canárias	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-3	Meso.	Árvore	Z11	C1(1)
<i>Phoenix roebelinii</i> O'Brien.	Palmae	Palmeira-anã	Indomalaio	Perenifólio	1-12	5-7	Micro.	Árvore	Z11	C2(1)
<i>Phormium tenax</i> Forst. & Forst. f.	Agavaceae	Espadana	Antártico	Perenifólio	1-12	6-8	Hemi.	Herbácea	Z8	C2(1)
<i>Pilea cadierei</i> Gagnep. & Guillaum.	Urticaceae	Planta-do- alumínio	Indomalaio	Perenifólio	1-12	10-12	Hemi.	Herbácea	Z11	C2(grupo)
<i>Plectranthus forsteri</i> Benth.	Labiatae	Plectratos	Australiano; Oceânia	Perenifólio	1-12	6-11	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z10	C2(grupo)
<i>Plumeria alba</i> L.	Apocynaceae	Pluméria-branca	Neotropical	Caducifólio	5-2	6-11	Micro.	Árvore	Z10	C2(1)
<i>Plumeria rubra</i> L. var. <i>acutifolia</i> (Poir.) Woodson.	Apocynaceae	Planta-dos- dentes	Neotropical	Caducifólio	5-1	6-12	Micro.	Árvore	Z10	C2(1)
<i>Rudbeckia fulgida</i> Ait.	Compositae	Margarida- amarela; Susana-de-olhos- negros	Neártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Herbácea	Z3	C2(grupo)
<i>Salvia coccinea</i> Juss. ex Murray	Labiatae	Sálvia	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Herbácea	Z8	C2(grupo)
<i>Salvia splendens</i> Sell ex Roem. & Scult.	Labiatae	Camarões; Sálvias	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Herbácea	Z10	C1, C2(grupo)
<i>Sansevieria trifasciata</i> Prain var. <i>laurentii</i> (De Wild.) N. E. Br.	Agavaceae	Língua-de-sogra	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	8-11	Hemi.	Herbácea	Z10	C1(grupo)
<i>Stenotaphrum secundatum</i> (Walter) Kuntze	Gramineae	Relva; Relva-de-correr	Neotropical; Áfricotropical; Oceânia	Perenifólio	1-12	3-11	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z9	C1(tapete)
<i>Strelitzia reginae</i> Banks ex Dryand	Strelitziaceae	Estrelícia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C2(grupo)
<i>Tagetes patula</i> L.	Compositae	Cravos-de-burro	Neotropical	Sazonal	1-9	3-8	Terófito	Herbácea	Z9	C1, C2(grupo)
<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	Leguminosae (Papilionoideae)	Tipuana	Neotropical	Marcescente	5-4 (3-4)	4-7	Meso.	Árvore	Z9	C1(2)
<i>Tradescantia pallida</i> (Rose) D. Hunt.	Commelinaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea trepadora	Z8	C1(grupo)
<i>Tradescantia zebrina</i> hort. ex. Bosse	Commelinaceae	Zebrina	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z9	C1(grupo)

Legenda:

- Plantas que não floriram no período em estudo (Janeiro 2002 – Janeiro 2005): * plantas novas; ** plantas que nunca floriram por falta de aclimação;
- Plantas marcescentes (plantas semiperenifólias e semcaducifólias): 3-2 (3-4) – folhas todo o ano mas com renovação significativa em Março e Abril.

Anexo 7
CARACTERIZAÇÃO FITOGEOGRÁFICA DO JARDIM MIRADOURO DA VILA GUIDA

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Abelia x grandiflora</i> (André) Rehd.	Caprifoliaceae	Abélia	Hortícola	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z5	C1(7), C2(3)
<i>Acalypha wilkesiana</i> Muell. Arg.	Euphorbiaceae	Acálifa; Folha-de-cobre	Oceânia	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C1(4), C2(12)
<i>Adiantum capillus-veneris</i> L.	Adiantaceae	Avenca	Paleártico, Neotropical, Áfricotropical, Indomalaio	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z8	C2(grupo)
<i>Agapanthus praecox</i> Willd. ssp. <i>orientalis</i> (Leighton) Leighton	Liliaceae	Agapantos; Coroas-de-henrique	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	4-9	Hemi.	Herbácea	Z9	C1, C2(mancha)
<i>Agathis robusta</i> (C. Moore ex. F. Muell.) Bail.	Araucariaceae	Pinheiro-de-damara; Pinheiro-com-folha-de-alegra-campo	Australiano	Perenifólio	1-12	3-4	Meso.	Árvore	Z9	C1(2), C2(4)
<i>Agave americana</i> L.	Agavaceae	Agave; Piteira	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-8	Hemi.	Herbácea suculenta	Z9	C1(1)
<i>Ageratum houstonianum</i> Mill.	Compositae		Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Terófito	Herbácea	Z8	C2 (grupo)
<i>Allamanda cathartica</i> L.	Apocynaceae	Alamanda; Flor-de-manteiga	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-12	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z11	C2(1)
<i>Aloe arborescens</i> Mill.	Liliaceae	Babosas	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	11-2	Nano.	Arbusto suculento	Z9	C1, C2(grupo)
<i>Alstroemeria psittacina</i> Lehm.	Liliaceae (Alstroemeriaceae)	Alstroemeria	Neotropical	Sazonal	4-10	5-9	Geófito	Herbácea	Z8	C2(grupo)
<i>Anemone hupehensis</i> Lem.	Ranunculaceae	Anémone	Paleártico	Perenifólio	1-12	8-12	Hemi.	Herbácea	Z6	C1(12)
<i>Argyranthemum pinnatifidum</i> (L. f.) Lowe ssp. <i>pinnatifidum</i>	Compositae	Estrelas; Pampilhos; Malmequeres	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C2(8)
<i>Asparagus densiflorus</i> (Kunth) Jassop	Liliaceae (Asparagaceae)	Esparto	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	7-8	Nano.	Herbácea	Z9	C2(grupo)
<i>Asparagus setaceus</i> (Kunth) Jassop	Liliaceae (Asparagaceae)	Espargo-de-folha-miúda; Esparto	Africotropical	Perenifólio	1-12	9-12	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z9	C1, C2(grupo)
<i>Begonia x ricinifolia</i> A. Dietr.	Begoniaceae	Corações; Begónias	Hortícola	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C2(grupo)
<i>Bougainvillea glabra</i> Choisy in DC	Nyctaginaceae	Buganvília	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	C1(7)
<i>Brachychiton acerifolius</i> Cunn. ex. F. Muell.	Sterculiaceae	Árvore-do-fogo	Australiano	Caducifólio	1-5; 8-12	5-8	Micro.	Árvore	Z10	C1(1)
<i>Brahea armata</i> S. Wats.	Palmae	Palmeira-azul	Neártico; Neotropical	Perenifólio	1-12	7-8	Micro.	Árvore	Z9	C2(1)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Calendula officinalis</i> L.	Compositae	Calêndula	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Terófito	Herbácea	Z6	C2(grupo)
<i>Callistemon rigidus</i> R. Br.	Myrtaceae	Martinete	Australiano	Perenifólio	1-12	4-8	Micro.	Arbusto	Z9	C2(1)
<i>Callistemon viminalis</i> (Sol. ex Gaertn.) G. Don ex Loud.	Myrtaceae	Martinete-chorão	Australiano	Perenifólio	1-12	3-7	Micro.	Arbusto	Z9	C2(3)
<i>Canna x generalis</i> L. H. Bail.	Cannaceae	Canas-da-índia; Bananeiras-de-flor	Hortícola	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z9	C2 (grupo)
<i>Cardiospermum grandiflorum</i> Sw.	Sapindaceae	Corriola-dos-balões	Áfricotropical; Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z10	C2(2)
<i>Cercis siliquastrum</i> L.	Leguminosae (Papilionoideae)	Olaia; Árvore-de-judas	Paleártico	Caducifólio	4-12	2-5	Micro.	Árvore	Z7	C2(2)
<i>Chambeyronia macrocarpa</i> (Brongn.) Vieill. ex Becc.	Palmae	Palmeira-rubra	Oceânia	Perenifólio	1-12	1-2	Micro.	Árvore	Z10	C1(1)
<i>Chlorophytum comosum</i> (Thumb.) Jacques	Liliaceae (Anthericaceae)	Fitinhas	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z9	C1, C2 (grupo)
<i>Chorisia speciosa</i> A. St. Hil.	Bombacaceae	Sumaúma	Neotropical	Caducifólio	3-11	8-11	Meso.	Árvore	Z10	C1(2)
<i>Cinnamomum zeylanicum</i> Bl.	Lauraceae	Caneleira; Árvore-da-canela	Indomalaio	Perenifólio	1-12	2-4	Micro.	Árvore	Z11	C2(1)
<i>Clivia miniata</i> Regel	Amaryllidaceae	Clívia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	2-11	Hemi.	Herbácea	Z10	C1(grupo)
<i>Cordyline terminalis</i> (L.) Kunth.	Agavaceae	Árvore-dos-reis	Indomalaio; Australiano; Oceânia; Antártico	Perenifólio	1-12	11-5	Micro.	Arbusto	Z10	C1(2)
<i>Crassula ovata</i> (Mill.) Druce.	Crassulaceae	Ensaio -branco ; Planta-de-jade	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	11-3	Nano.	Arbusto suculento	Z10	C1(8), C2(grupo)
<i>Crassula tetragona</i> L.	Crassulaceae	Pinheirinho	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	6-8	Nano.	Arbusto suculento	Z10	C2(grupo)
<i>Cuphea hyssopifolia</i> HBK	Lythraceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C2(15)
<i>Cuphea ignea</i> A. DC.	Lythraceae	Cigarrinhos	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C2(grupo)
<i>Eugenia uniflora</i> L.	Myrtaceae	Pitangueira	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Árvore	Z10	C1(1), C2(1)
<i>Euphorbia pulcherrima</i> Willd. ex Klotzsch.	Euphorbiaceae	Manhã-de-páscoa	Neotropical	Caducifólio	5-2	10-3	Micro.	Arbusto	Z10	C1(5), C2(14)
<i>Felicia amelloides</i> (L.) Voss.	Compositae	Felícia ; Margarida-azul	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z9	C2(grupo)
<i>Gazania rigens</i> (L.) Gaertn.	Compositae	Gazania	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z9	C2(grupo)
<i>Grevillea robusta</i> A. M. Cunn. ex R. Br.	Proteaceae	Grevílea	Australiano	Perenifólio	1-12	4-7	Meso.	Árvore	Z8	C1(1)
<i>Guzmania lingulata</i> (L.) Mez.	Bromeliaceae	Bromélia	Neotropical	Perenifólio	1-12	11-5	Hemi.	Herbácea	Z11	C2(grupo)
<i>Heliconia bihai</i> (L.) L.	Heliconiaceae	Helicônia	Neotropical	Perenifólio	1-12	7-11	Hemi.	Herbácea	Z11	C2(grupo)
<i>Hibiscus rosa-sinensis</i> L.	Malvaceae	Cardeais; Hibiscos; Rosa-da-china	Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C2(grupo)
<i>Hydrangea macrophylla</i> (Thunb.) Ser.	Hydrangeaceae	Hortênsias; Novelos	Paleártico	Caducifólio	3-12	5-10	Nano.	Arbusto	Z6	C2(grupo)
<i>Impatiens walleriana</i> Hook. f.	Balsaminaceae	Maravilhas	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Herbácea	Z9	C2(grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Lagerstroemia indica</i> L.	Lythraceae	Laguerestrê-mia; Flor-de-merenda; Suspiros	Paleártico; Indomalaio	Caducifólio	3-11	7-9	Micro.	Árvore	Z7	C2(3)
<i>Lampranthus multiradiatus</i> (Jacq.) N. E. Br.	Aizoaceae	Lamprantos; Chorão	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Arbusto trepador e suculento	Z11	C2(grupo)
<i>Lavandula dentata</i> L.	Labiatae	Alfazema; Lavanda	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z8	C2(grupo)
<i>Lavandula stoechas</i> L.	Labiatae	Rosmaninho; Lavanda	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z7	C2(grupo)
<i>Ligustrum lucidum</i> Ait. f.	Oleaceae	Ligustro; Alfinheiro	Paleártico	Perenifólio	1-12	7-9	Micro.	Árvore	Z7	C2(2)
<i>Lobularia maritima</i> (L.) Desv.	Cruciferae	Lobulária	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z8	C2 (grupo)
<i>Lonicera japonica</i> Thunb.	Caprifoliaceae	Madressilva	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-11	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z4	C2(2)
<i>Markamia lutea</i> (Benth.) Schum.	Bignoniaceae	Marcâmia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Meso.	Árvore	Z11	C2(2)
<i>Nerium oleander</i> L.	Apocynaceae	Sevadiilha; Loendro	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-11	Micro.	Arbusto	Z9	C1(2), C2(2)
<i>Nolina recurvata</i> (Lem.) Hemsl.	Agavaceae	Nolina; Pata-de-elefante	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-8	Micro.	Árvore	Z9	C1(1)
<i>Odontonema strictum</i> (Nees) Kuntze	Acanthaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	8-12	Nano.	Arbusto	Z10	C2(8)
<i>Pelargonium x hortorum</i> L. H. Bail.	Geraniaceae	Malvas	Hortícola	Perenifólio	1-12	4-7	Nano.	Herbácea	Z10	C2(grupo)
<i>Persea americana</i> Mill.	Lauraceae	Abacateiro	Neotropical	Perenifólio	1-12	11-5	Micro.	Árvore	Z10	C2(1)
<i>Phoenix canariensis</i> ex. Chabaud.	Palmae	Palmeira-das- canárias	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-3	Meso.	Árvore	Z11	C1(1)
<i>Phoenix roebelinii</i> O' Brien.	Palmae	Palmeira-anã	Indomalaio	Perenifólio	1-12	5-7	Micro.	Árvore	Z11	C2(2)
<i>Pilea cadierei</i> Gagnep. & Guillaum.	Urticaceae	Planta-do- alumínio	Indomalaio	Perenifólio	1-12	10-12	Hemi.	Herbácea	Z11	C2(grupo)
<i>Pilea microphylla</i> (L.) Liebm.	Urticaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C2(grupo)
<i>Plumeria alba</i> L.	Apocynaceae	Pluméria- branca	Neotropical	Caducifólio	5-2	6-11	Micro.	Árvore	Z10	C2(1)
<i>Plumeria rubra</i> L.	Apocynaceae	Pluméria; Planta-dos- dentes	Neotropical	Caducifólio	5-2	6-11	Micro.	Árvore	Z10	C2(1)
<i>Plumeria rubra</i> L. var. <i>acutifolia</i> (Poir.) Woodson.	Apocynaceae	Pluméria; Planta-dos- dentes	Neotropical	Caducifólio	5-1	6-12	Micro.	Árvore	Z10	C2(2)
<i>Rosa x damascena</i> Mill. var. <i>semperflorens</i> (Duhamel) Rowley	Rosaceae	Rosa-de-quatro- estações	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z4	C1(2), C2(2)
<i>Rudbeckia fulgida</i> Ait.	Compositae	Margarida- amarela; Susana-de- olhos- negros	Neártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Herbácea	Z3	C2(grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Salvia coccinea</i> Juss. ex Murray	Labiatae	Sálvia	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Herbácea	Z8	C2(grupo)
<i>Salvia splendens</i> Sell ex Roem. & Scult.	Labiatae	Camarões; Sálvias	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Herbácea	Z10	C2(grupo)
<i>Sansevieria trifasciata</i> Prain var. <i>laurentii</i> (De Wild.) N. E. Br.	Agavaceae	Língua-de-sogra	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	8-11	Hemi.	Herbácea	Z10	C2(grupo)
<i>Stenotaphrum secundatum</i> (Walter) Kuntze	Gramineae	Relva; Relva-de-correr	Neotropical; Áfricotropical; Oceânia	Perenifólio	1-12	3-11	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z9	C1, C2(tapete)
<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassm.	Palmae	Coqueiro-de-jardim; Palmeira-rainha	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-7	Micro.	Árvore	Z10	C1(1)
<i>Tagetes patula</i> L.	Compositae	Cravos-de-burro	Neotropical	Sazonal	1-9	3-8	Terófito	Herbácea	Z9	C2(grupo)
<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	Leguminosae (Papilionoideae)	Tipuana	Neotropical	Marcescente	5-4 (3-4)	4-7	Meso.	Árvore	Z9	C1(2)

Legenda:

- Plantas que não floriram no período em estudo (Janeiro 2002 – Janeiro 2005): * plantas novas; ** plantas que nunca floriram por falta de aclimação;
- Plantas marcescentes (plantas semiperenifólias e semicaducifólias): 3-2 (3-4) – folhas todo o ano mas com renovação significativa em Março e Abril.

Anexo 8
CARACTERIZAÇÃO FITOGEOGRÁFICA DO JARDIM DO ALMIRANTE REIS

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLOGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Apollonias barbuiana</i> (Cav.) Bomm.	Lauraceae	Barbusano	Paleártico	Perenifólio	1-12	9-3	Meso.	Árvore	Z10	C13(1), C14(1)
<i>Bougainvillea glabra</i> Choisy	Nyctaginaceae	Buganvillea	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	C11(10)
<i>Brachychiton acerifolius</i> Cunn. ex. F. Muell.	Sterculiaceae	Árvore-do-fogo	Australiano	Caducifólio	1-5; 8-12	5-8	Micro.	Árvore	Z10	C9(3)
<i>Convolvulus cneorum</i> L.	Convolvulaceae		Paleártico	Perenifólio	1-12	3-8	Nano.	Arbusto	Z8	C2 (grupo)
<i>Crassula ovata</i> (Mill.) Druce.	Crassulaceae	Ensaião-branco ; Planta-de-jade	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	11-3	Nano.	Arbusto suculento	Z10	C3, C4, C5 (grupo)
<i>Cycas revoluta</i> Thunb.	Cycadaceae	Cicas-revoluta; Cicas-de-sagú	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-8	Micro.	Árvore	Z9	C13(2)
<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.	Gramineae	Relva-bermuda	Cosmopolita	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z7	C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12, C13, C14, C15 (tapete)
<i>Dichondra micrantha</i> Urban.	Convolvulaceae	Relva-redonda	Australiano; Antártico	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z9	C6 (tapete)
<i>Dracaena draco</i> (L.) L. ssp. <i>draco</i>	Agavaceae	Dragoeiro	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-6	Micro.	Árvore	Z11	C13(1)
<i>Felicia amelloides</i> (L.) Voss.	Compositae	Felícia ; Margarida-azul	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z9	C5(grupo)
<i>Festuca elatior</i> L.	Gramineae	Relva; Grama	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z5	C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12, C13, C14, C15 (tapete)
<i>Ficus benjamina</i> L. var. <i>nuda</i> (Miq.) Barrett	Moraceae	Figueira-da-índia	Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-4	Meso.	Árvore	Z11	C1(1), C2(1), C11(2)
<i>Ficus elastica</i> Roxb. ex Homem	Moraceae	Borracheira	Indomalaio	Perenifólio	1-12	5-8	Micro.	Árvore	Z11	C11(2)
<i>Grevillea robusta</i> A. M. Cunn. ex. R. Br.	Proteaceae	Grevílea	Australiano	Perenifólio	1-12	4-7	Meso.	Árvore	Z8	C6(2)
<i>Lantana camara</i> L.	Verbenaceae	Lantana	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C3, C4, C5 (grupo)
<i>Lantana montevidensis</i> (Spreng.) Briq.	Verbenaceae	Lantana	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C3, C4, C5 (grupo)
<i>Lavandula dentata</i> L.	Labiatae	Alfazema	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z8	C4, C5 (grupo)
<i>Markamia lutea</i> (Benth.) Schum.	Bignoniaceae	Marcâmia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Meso.	Árvore	Z11	C13(3)
<i>Metrosideros excelsa</i> Sol. ex Gaertn.	Myrtaceae	Metrosidero; Árvore-de- natal-da-nova- zelândia	Antártico	Perenifólio	1-12	6-7	Meso.	Árvore	Z10	C14(2)
<i>Ocotea foetens</i> (Aiton) Baill.	Lauraceae	Til	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Meso.	Árvore	Z10	C13(4), C14(2)
<i>Phoenix canariensis</i> ex. Chabaud.	Palmae	Palmeira-das-canárias	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-3	Meso.	Árvore	Z11	C11(3)
<i>Phoenix dactylifera</i> L.	Palmae	Tamareira	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-3	Meso.	Árvore	Z11	C9(1)
<i>Phoenix roebelinii</i> O'Brien.	Palmae	Palmeira-anã	Indomalaio	Perenifólio	1-12	5-7	Micro.	Árvore	Z11	C13(2)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLOGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Pittosporum tobira</i> Ait.	Pittosporaceae	Tobira	Paleártico	Perenifólio	1-12	2-5	Micro.	Árvore	Z9	C13(12)
<i>Platanus x acerifolia</i> (Ait.) Willd.	Platanaceae	Plátano	Hortícola	Caducifólio	4-11	4-5	Meso.	Árvore	Z7	C1(4), C11(3), C14(1), C15(2)
<i>Santolina chamaecyparissus</i> L.	Compositae	Santolina	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-8	Caméfito	Arbusto	Z7	C5(grupo)
<i>Spathodea campanulata</i> Beauv.	Bignoniaceae	Chama-da-floresta; Tulipeiro-africano	Áfricotropical	Caducifólio	1-12 (Variação individual)	1-12	Micro.	Árvore	Z11	C13(3)
<i>Stenocarpus sinuatus</i> Endl.	Proteaceae	Árvore da Roda do Fogo	Australiano	Perenifólio	1-12	9-10	Micro.	Árvore	Z9	C7(1), C8(2)
<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	Leguminosae (Papilionoideae)	Tipuana	Neotropical	Marcescente	5-4 (3-4)	4-7	Meso.	Árvore	Z9	C2(1), C11(7)
<i>Verbena x hybrida</i> Groenl. & Ruempl.	Verbenaceae	Verbena	Hortícola	Perenifólio	1-12	6-10	Caméfito	Herbácea	Z9	C3(grupo)
<i>Washingtonia filifera</i> (Lind. ex André) H. A. Wendl	Palmae	Palmeira-de-leque-da-califórnia	Neártico	Perenifólio	1-12	5-8	Meso.	Árvore	Z9	C2(1), C11(1)
<i>Washingtonia robusta</i> H. A. Wendl	Palmae	Palmeira-de-leque-mexicana	Neártico	Perenifólio	1-12	4-6	Macro.	Árvore	Z10	C11(1)

Legenda:

- Plantas que não floriram no período em estudo (Janeiro 2002 – Janeiro 2005): * plantas novas; ** plantas que nunca floriram por falta de aclimação;
- Plantas marcescentes (plantas semiperenifólias e semcaducifólias): 3-2 (3-4) – folhas todo o ano mas com renovação significativa em Março e Abril.

Anexo 9
CARACTERIZAÇÃO FITOGEOGRÁFICA DO JARDIM DO CONSERVATÓRIO – ESCOLA DE ARTES

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Abelia x grandiflora</i> (André) Rehd.	Caprifoliaceae	Abélia	Hortícola	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z5	C1(1), C6(3)
<i>Acacia retinodes</i> Schldtl.	Leguminosae (Mimoidae)	Acácia	Australiano	Perenifólio	1-12	1-2	Micro.	Árvore	Z8	C2(1)
<i>Acalypha wilkesiana</i> Muell. Arg.	Euphorbiaceae	Acálifa;	Oceânia	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C4, C5 (grupo)
<i>Aechmea nudicaulis</i> (L.) Griseb.	Bromeliaceae	Bromélia	Neotropical	Perenifólio	1-12	12-4	Hemi.	Herbácea	Z10	C7(grupo)
<i>Agapanthus praecox</i> Willd. ssp. <i>orientalis</i> (Leighton) Leighton	Liliaceae	Agapantos; Coroas-de-Henrique	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	4-9	Hemi.	Herbácea	Z9	C8 (grupo)
<i>Agave angustifolia</i> Haw.	Agavaceae	Agave	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-8	Nano.	Árvore suculenta	Z9	C6(4)
<i>Ageratum houstonianum</i> Mill.	Compositae		Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Terófito	Herbácea	Z8	C5(grupo)
<i>Alcea rosea</i> L.	Malvaceae	Malvas	Paleártico	Sazonal	3-10	5-9	Terófito	Herbácea	Z4	C1, C2, C5 (grupo)
<i>Allamanda cathartica</i> L.	Apocynaceae	Alamanda; Flor-de-manteiga	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-12	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z11	C1(1), C2(1),
<i>Aloe arborescens</i> Mill.	Liliaceae (Aloeaceae)	Aloés, Babosas, Foguetes-de-natal	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	11-2	Nano.	Arbusto suculento	Z9	C2(grupo)
<i>Aloe excelsa</i> A. Berger.	Liliaceae (Aloeaceae)	Aloés	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-3	Micro.	Árvore suculenta	Z9	C6(2), C5(1), C7(3)
<i>Aloe plicatilis</i> (L.) Mill.	Liliaceae (Aloeaceae)	Aloés	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	2-4	Nano.	Árvore suculenta	Z9	C6(1)
<i>Aloe rupestris</i> Bak.	Liliaceae (Aloeaceae)	Aloés	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	2-4	Micro.	Árvore suculenta	Z10	C6(4)
<i>Aloe saponaria</i> (Ait. f.) Haw.	Liliaceae (Aloeaceae)	Aloés-sabão	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-7	Hemi.	Herbácea suculenta	Z9	C6(grupo)
<i>Aloe vera</i> (L.) Burm.	Liliaceae (Aloeaceae)	Aloé-vera; Babosas	Paleártico, Neotropical	Perenifólio	1-12	11-6	Hemi.	Herbácea suculenta	Z8	C6(grupo)
<i>Antirrhinum majus</i> L.	Scrophulariaceae	Bocas-de-peixe; Boca-de-lobo	Paleártico	Sazonal	3-10	3-10	Terófito	Herbácea	Z7	C5 (grupo)
<i>Apollonias barbuja</i> (Cav.) Bomm.	Lauraceae	Barbusano	Paleártico	Perenifólio	1-12	9-3	Meso.	Árvore	Z10	C5(1)
<i>Aptenia cordifolia</i> (L. f.) Schwant.	Aizoaceae	Apténia; Rosinha-de-sol	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Herbácea trepadora e suculenta	Z9	C6(grupo)
<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> H. A. Wendl. & Drude.	Palmae	Palmeira- elegante	Australiano	Perenifólio	1-12	4-10	Meso.	Árvore	Z10	C3(3), C5(3), C6(7)
<i>Arctotis x hybrida</i> hort.	Compositae	Arctótis; Margarida-africana	Hortícola	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z9	C6(grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Argyranthemum dissectum</i> (Lowe) Lowe	Compositae	Pampilhos; Estrela; Malmequeres	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-7	Nano.	Arbusto	Z10	C1(1)
<i>Argyranthemum frutescens</i> (L.) Schultz-Bip.	Compositae	Estrelas; Estrela; Pampilhos; Malmequeres	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C1(2),C2(2), C5(1)
<i>Argyranthemum haematoma</i> (Lowe) Lowe	Compositae	Estrela; Malmequeres	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-7	Nano.	Arbusto	Z10	C2(1)
<i>Argyranthemum pinnatifidum</i> (L.f.) Lowe ssp. <i>pinnatifidum</i>	Compositae	Estrelas; Estrelas; Pampilhos; Malmequeres	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C1(1), C5(grupo)
<i>Begonia x ricinifolia</i> A. Dietr.	Begoniaceae	Corações; Begónias	Hortícola	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C2(1), C5(grupo)
<i>Bergenia crassifolia</i> (L.) Fritsch.	Saxifragaceae	Bergénia; Couve-de-jardim	Paleártico	Perenifólio	1-12	11-4	Caméfito	Herbácea	Z3	C7(grupo)
<i>Billbergia vittata</i> Brongn. ex Morel.	Bromeliaceae	Bromélia	Neotropical	Perenifólio	1-12	11-2	Hemi.	Herbácea	Z10	C7(grupo)
<i>Bougainvillea glabra</i> Choisy	Nyctaginaceae	Buganvília	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	C2(grupo)
<i>Brugmansia versicolor</i> Lagerh.	Solanaceae	Trombeteira	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C7(1), C9(1)
<i>Brunfelsia pauciflora</i> (Cham. & Scltdl.) Benth.	Solanaceae	Brunfêlsia; Manacá	Neotropical	Perenifólio	1-12	2-10	Micro.	Arbusto	Z10	C5(1)
<i>Bulbine frutescens</i> (L.) Willd.	Liliaceae (Asphodelaceae)	Bulbine	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Geófito	Herbácea suculenta	Z9	C1, C2, C6, C7 (grupo)
<i>Callistephus chinensis</i> (L.) Nees.	Compositae	Não-me-deixes	Paleártico	Sazonal	3-12	4-12	Terófito	Herbácea	Z6	C5(grupo)
<i>Canna x generalis</i> L.H. Bail.	Cannaceae	Canas-da-índia; Bananeiras-de- flor	Hortícola	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z9	C5(grupo)
<i>Casuarina equisetifolia</i> Forst. & Forst. f.	Casuarinaceae	Casuarina	Indomalaio; Australiano; Oceânia	Perenifólio	1-12	6-11	Meso.	Árvore	Z10	E4(2)
<i>Cereus jamacaru</i> DC.	Cactaceae	Cacto	Neotropical	Perenifólio	1-12	7-8	Micro.	Árvore suculenta	Z11	C6(4)
<i>Cestrum roseum</i> HBK.	Solanaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	3-11	Nano.	Arbusto	Z10	C9(1)
<i>Chlorophytum comosum</i> (Thumb.) Jacques	Liliaceae (Anthericaceae)	Fitinhas	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z9	C5(grupo)
<i>Cinnamomum camphora</i> (L.) Sieb.	Lauraceae	Canforeira	Paleártico; Indomalaio	Perenifólio	1-12	2-4	Meso.	Árvore	Z10	C7(1)
<i>Cleistocactus straussi</i> (Heese) Backeb.)	Cactaceae	Cacto	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-8	Nano.	Arbusto suculento	Z9	C6(2)
<i>Clivia miniata</i> Regel	Amaryllidaceae	Clívia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	2-11	Hemi.	Herbácea	Z10	C6, C7 (grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Codiaeum variegatum</i> (L.) Bl. var. <i>pictum</i> (Lodd) Muell. Arg.	Euphorbiaceae	Crótone	Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z11	C9(3)
<i>Coffea arabica</i> L.	Rubiaceae	Cafézeiro; Café	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	4-5; 8-9	Micro.	Arbusto	Z11	C1(1)
<i>Commelina benghalensis</i> L.	Commelinaceae	Erva-menina; Flor-dum-dia	Indomalaio Áfricotropical;	Perenifólio	1-12	3-9	Hemi.	Herbácea trepadora	Z9	C5(grupo)
<i>Cordyline terminalis</i> (L.) Kunth.	Agavaceae	Árvore-dos-reis	Indomalaio; Australiano; Oceânia; Antártico	Perenifólio	1-12	11-5	Micro.	Arbusto	Z10	C5(1)
<i>Crassula ovata</i> (Mill.) Druce.	Crassulaceae	Ensaio-branco ; Planta-de-jade	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	11-3	Nano.	Arbusto suculento	Z10	C6(1)
<i>Ctenanthe lubbersiana</i> (E. Morr.) Eichl.	Marantaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	4-8	Hemi.	Herbácea	Z10	C5, C6, C7 (grupo)
<i>Ctenanthe oppenheimiana</i> (C. J. Morren) K. Schum.	Marantaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	4-8	Hemi.	Herbácea	Z10	C5 (grupo)
<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartw. ex Gordon	Cupressaceae	Cipreste-de- monterrey; Cedro-de- monterrey	Neártico	Perenifólio	1-12	1-2	Meso.	Árvore	Z8	C4(2), C5(1)
<i>Cupressus sempervirens</i> L.	Cupressaceae	Cipreste	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-2	Micro.	Árvore	Z8	C5(16)
<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.	Gramineae	Relva-bermuda	Cosmopolita	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z7	C5(tapete)
<i>Dracaena deremensis</i> Engl.	Agavaceae	Dracena	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	11-12	Micro.	Arbusto	Z11	C5(1)
<i>Duranta erecta</i> L.	Verbenaceae	Duranta	Neotropical	Perenifólio	1-12	7-1	Micro.	Arbusto	Z10	C1(1)
<i>Echinopsis backebergii</i> Werderm ex Backeb.	Cactaceae	Cacto	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-6	Caméfito	Arbusto suculento	Z9	C6(1)
<i>Echinopsis macrogona</i> (Salm-Dyck) Friedrich & Rowley	Cactaceae	Cacto	Desconhecida	Perenifólio	1-12	5-6	Micro.	Arbusto suculento	Z9	C6(1)
<i>Echinopsis spachiana</i> (Lem.) Friedrich & G. Rowley	Cactaceae	Cacto	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-6	Nano.	Arbusto suculento	Z9	C6(2)
<i>Echium nervosum</i> Dryand.	Boraginaceae	Massaroco	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-3	Nano.	Arbusto	Z11	C6(3)
<i>Emilia coccinea</i> (Sims) D. Don	Compositae	Emília	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Herbácea	Z11	C5(grupo)
<i>Erythrina abyssinica</i> Lam. ex DC.	Leguminosae (Papilionoideae)	Coralina-da- abissínia	Áfricotropical	Caducifólio	5-1	1-6; 9-10	Micro.	Árvore	Z10	C1(1)
<i>Erythrina crista-galli</i> L.	Leguminosae (Papilionoideae)	Coraleira; Coralina-crista-de- galo	Neotropical	Marcescente	4-3 (12-3)	4-1	Micro.	Árvore	Z8	C1(2), C6(2)
<i>Erythrina lysistemon</i> Hutch.	Leguminosae (Papilionoideae)	Coralina	Áfricotropical	Marcescente	5-4 (12-4)	12-5	Micro.	Árvore	Z10	C6(1)
<i>Erythrina speciosa</i> Andrews	Leguminosae (Papilionoideae)	Coralina-elegante	Neotropical	Caducifólio	4-11	12-4	Micro.	Árvore	Z10	C5(1)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Euphorbia candelabrum</i> Kotschy	Euphorbiaceae		Áfricotropical	Perenifólio	1-12	12-2	Micro.	Arbusto suculento	Z9	C6(1)
<i>Euphorbia cotinifolia</i> L.	Euphorbiaceae	Eufórbia	Neotropical	Caducifólio	3-12	7-11	Micro.	Árvore	Z11	C2(1), C6(2)
<i>Euphorbia grandicornis</i> Goebel.	Euphorbiaceae	Eufórbia-grande-cornuda	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	12-2	Nano.	Arbusto suculento	Z9	C6(1)
<i>Euphorbia milii</i> Desmoul.	Euphorbiaceae	Mira-mira-não-me-toques	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C6(1)
<i>Euphorbia pulcherrima</i> Willd. ex Klotzsch.	Euphorbiaceae	Manhã-de-páscoa	Neotropical	Caducifólio	5-2	10-3	Micro.	Arbusto	Z10	C1(1), C2(2), C3(5), C6(3), C7(4), C8(2)
<i>Euphorbia trigona</i> Mill.	Euphorbiaceae	Eufórbia	Africotropical	Perenifólio	1-12	6-8	Micro.	Arbusto suculento	Z10	C6(1)
<i>Euryops pectinatus</i> (L.) Cass.	Compositae	Estreleira-amarela	Áfricotropical	Perenifólio	1 – 12	1 – 12	Nano.	Arbusto	Z9	C5(4)
<i>Farfugium japonicum</i> (L.) Kitam.	Compositae	Patás-de-cavalo; Boinas	Paleártico	Perenifólio	1-12	7-3	Hemi.	Herbácea	Z7	C9(grupo)
<i>Festuca elatior</i> L.	Gramineae	Relva; Grama	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z5	C5(tapete)
<i>Grevillea robusta</i> A. M. Cunn. Ex. R. Br.	Proteaceae	Grevílea	Australiano	Perenifólio	1-12	4-6	Meso.	Árvore	Z8	C5(1)
<i>Haageocereus decumbens</i> (Vaup.) Backeb.	Cactaceae	Cacto	Neotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Nano.	Arbusto suculento	Z9	C6(2)
<i>Helichrysum bracteatum</i> (Vent.) Andrews	Compositae	Margarida-de-papel	Australiano	Sazonal	3-10	4-10	Terófito	Herbácea	Z8	C1, C5 (grupo)
<i>Heliconia bihai</i> (L.) L.	Heliconiaceae	Helicónia	Neotropical	Perenifólio	1-12	7-11	Hemi.	Herbácea	Z11	C1(2), C5(1)
<i>Hibiscus mutabilis</i> L.	Malvaceae	Rosa-de-algodão	Paleártico	Perenifólio	1-12	6-11	Micro.	Arbusto	Z8	C6(1), C3(2)
<i>Hibiscus rosa-sinensis</i> L.	Malvaceae	Cardeais; Hibiscos; Rosa-da-china	Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C1, C3, C5, C6 (grupo)
<i>Hibiscus syriacus</i> L.	Malvaceae	Cardeal-roxo; Hibisco-da-síria	Paleártico; Indomalaio	Caducifólio	5-11	7-9	Micro.	Arbusto	Z5	C1(1), C6(1)
<i>Holmskioldia sanguinea</i> Retz.	Verbenaceae	Chapéus-de-mandarim; Chapéus-chineses	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C4(1)
<i>Howea forsteriana</i> (C. Moore & F. Muell.) Becc.	Palmae	Quência	Australiano	Perenifólio	1-12	1-9	Micro.	Árvore	Z10	C5(6)
<i>Hydrangea macrophylla</i> (Thunb.) Ser.	Hydrangeaceae	Hortênsias; Novelos	Paleártico	Caducifólio	3-12	5-10	Nano.	Arbusto	Z6	C2(1), C3(grupo)
<i>Ipomoea purpurea</i> (L.) Roth.	Convolvulaceae	Campainhas	Neotropical	Sazonal	1-12	1-12	Terófito	Herbácea trepadora	Z10	C2(grupo)
<i>Iresine herbstii</i> Hook.	Amaranthaceae	Iresine	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Caméfito	Herbácea	Z10	C3 (grupo)
<i>Jacaranda mimosifolia</i> D. Don.	Bignoniaceae	Jacarandá	Neotropical	Caducifólio	5-2	4-6; 9-10	Meso.	Árvore	Z9	C7(1)
<i>Kniphofia x praecox</i> Bak	Liliaceae (Aloeaceae)	Foguete	Hortícola	Perenifólio	1-12	11-2	Hemi.	Herbácea	Z9	C6(1)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Lagerstroemia indica</i> L.	Lythraceae	Laguerestrê- mia; Suspiros; Flor-de-merenda	Paleártico; Indomalaio	Caducifólio	3-11	7-9	Micro.	Árvore	Z7	C6(1)
<i>Lampranthus blandus</i> (Haw.) Schwantes	Aizoaceae	Lamprantos; Chorão	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	3-9	Fane. trep.	Arbusto trepador e suculento	Z11	C6(grupo)
<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) De Wit.	Leguminosae (Mimosoideae)	Aroma-branco; Leucena	Neártico	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z9	C3(1)
<i>Lilium candidum</i> L.	Liliaceae	Lírio-de-nossa- senhora	Paleártico	Sazonal	2-7	4-6	Geófita	Herbácea	Z6	C5 (grupo)
<i>Matthiola incana</i> (L.) R. Br.	Cruciferae	Goivos	Paleártico	Sazonal	1-7	3-7	Terófita	Herbácea	Z6	C1, C2, C5, C6 (grupo)
<i>Monstera deliciosa</i> Liebm.	Araceae	Fruto-delicioso; Costela-de-adão	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z10	C6(1)
<i>Narcissus tazetta</i> L.	Amaryllidaceae	Junquinhos	Paleártico	Sazonal	11-5	12-3	Geófita	Herbácea	Z8	C6(grupo)
<i>Nephrolepis cordifolia</i> (L.) Presl.	Oleandraceae	Feto	Neotropical; Áfricotropical; Indomalaio; Oceânia; Australiano	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z10	C7(grupo)
<i>Nerium oleander</i> L.	Apocynaceae	Sevadilha; Loendro	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-11	Micro.	Arbusto	Z9	C6(1)
<i>Ocotea foetens</i> (Aiton) Baill.	Lauraceae	Til	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Meso.	Árvore	Z10	C6(1)
<i>Odontonema strictum</i> (Nees) Kuntze	Acanthaceae	Odontonema	Neotropical	Perenifólio	1-12	8-12	Nano.	Arbusto	Z10	C5(1)
<i>Osteospermum barberiae</i> (Harv.) Norl.	Compositae	Estrelas-do-cabo	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Caméfito	Arbusto	Z10	C6(grupo)
<i>Paspalum dilatatum</i> Poir.	Gramineae	Erva-rija; Erva-do-governo	Neotropical	Perenifólio	1-12	3-9	Hemi.	Herbácea	Z8	C3 (tapete)
<i>Passiflora edulis</i> Sims	Passifloraceae	Maracujá-roxo; Flor-da-paixão	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-11	Fane.trep.	Arbusto trepador	Z10	C2(1)
<i>Pelargonium cucullatum</i> (L.) L' Hérít	Geraniaceae	Malva	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	4-9	Nano.	Arbusto	Z10	C2(grupo)
<i>Pelargonium peltatum</i> (L.) L'Hérít.	Geraniaceae	Malva	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z10	C7(grupo)
<i>Persea americana</i> Mill.	Lauraceae	Abacateiro	Neotropical	Perenifólio	1-12	2-5	Micro.	Árvore	Z10	C4(1), C7(1)
<i>Phoenix canariensis</i> ex. Chabaud.	Palmae	Palmeira das Canárias	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-3	Meso.	Árvore	Z11	C7(1)
<i>Phytolacca dioica</i> (L.) Moq.	Phytolaccaceae	Bela-sombra	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-9	Meso.	Árvore	Z11	C6(1)
<i>Plectranthus forsteri</i> Benth.	Labiatae	Plectratos	Australiano; Oceânia	Perenifólio	1-12	6-11	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z10	C5 (grupo)
<i>Plumeria rubra</i> L. var. <i>acutifolia</i> (Poir.) Woodson.	Apocynaceae	Planta-dos- dentes	Neotropical	Caducifólio	5-1	6-12	Micro.	Árvore	Z10	C11(1)
<i>Polygonum capitatum</i> Buch.- Ham. ex D. Don	Polygonaceae	Polígono-de- jardim	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z8	C5 (grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Portulaca oleracea</i> L.	Portulacaceae	Beldroega	Indomalaio	Sazonal	6-11	7-10	Terófito	Herbácea	Z9	C6(grupo)
<i>Punica granatum</i> L.	Punicaceae	Romãzeira-anã	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-6	Micro.	Árvore	Z9	C7(1)
<i>Pyrostegia venusta</i> (Ker-Gawl.) Miers	Bignoniaceae	Gaitinhas	Neotropical	Perenifólio	1-12	11-4	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	C2(2)
<i>Salvia sessei</i> Benth.	Labiatae	Sálvia	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z9	C5(1)
<i>Salvia splendens</i> Sell ex Roem. & Scult.	Labiatae	Camarões; Sálvia	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Herbácea	Z10	C5(grupo)
<i>Schefflera actinophylla</i> (Endl.) Harms	Araliaceae	Brassaia	Australiano; Oceânia	Perenifólio	1-12	8-10	Meso.	Árvore	Z10	C6(2)
<i>Schefflera arboricola</i> (Hayata)	Araliaceae	Schefflera	Indomalaio	Perenifólio	1-12	2-4; 7-8	Micro.	Arbusto	Z10	C2(1), C7(1)
<i>Senna corymbosa</i> (Lamk.) Irwin & Barneby	Leguminosae (Caesalpinioideae)	Cássia-corimbosa	Neotropical	Perenifólio	1-12	8-11	Nano.	Arbusto	Z9	C7(1)
<i>Senna spectabilis</i> (DC.) Irwin & Barneby	Leguminosae (Caesalpinioideae)	Cássia	Neotropical	Caducifólio	3-12	7-11	Micro.	Árvore	Z10	C2(1), C6(1)
<i>Sobralia macrantha</i> Lindl.	Orchidaceae	Orquídea-de-cana; Sobralia	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-8	Hemi.	Herbácea	Z11	C9(2)
<i>Stachys byzantina</i> K. Koch.	Labiatae	Orelhas-de-gato	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-7	Caméfito	Herbácea	Z5	C5(grupo)
<i>Stenotaphrum secundatum</i> (Walter) Kuntze	Gramineae	Relva; Relva-de-correr	Neotropical; Áfrotropical; Oceânia	Perenifólio	1-12	3-11	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z9	C1, C2, C3, C6 (tapete)
<i>Strelitzia reginae</i> Banks ex Dryand	Strelitziaceae	Estrelícia	Áfrotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C3(grupo)
<i>Tagetes patula</i> L.	Compositae	Cravos-de-burro	Neotropical	Sazonal	1-9	3-8	Terófito	Herbácea	Z9	C1, C2 (grupo)
<i>Tecoma stans</i> (L.) Juss. ex HBK.	Bignoniaceae	Estenolóbio	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C3(1)
<i>Tecomaria capensis</i> (Thunb.) Spach.	Bignoniaceae	Camarões	Áfrotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C7 (sebe)
<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	Leguminosae (Papilionoideae)	Tipuana	Neotropical	Marcescente	5-4 (3-4)	4-7	Meso.	Árvore	Z9	C5(1)
<i>Tradescantia fluminensis</i> Vell. Conc.	Commelinaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	4-6	Hemi.	Herbácea trepadora	Z9	C5(grupo)
<i>Tradescantia spathacea</i> Sw.	Commelinaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	10-2	Hemi.	Herbácea	Z9	C6(1)
<i>Washingtonia filifera</i> (Lind. ex André) H. A. Wendl	Palmae	Palmeira-de-leque-da-califórnia	Neártico	Perenifólio	1-12	5-8	Micro.	Árvore	Z9	C5(1), C7(1)
<i>Wedelia trilobata</i> (L.) Hitchc.	Compositae	Vedélia	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Herbácea	Z11	C5, C7 (grupo)
<i>Wisteria sinensis</i> (Sims) Sweet.	Leguminosae (Papilionoideae)	Lilases; Glicínia	Paleártico	Caducifólio	2-12	2-5; 7-8	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z5	C5(3)

Legenda:

- Plantas que não floriram no período em estudo (Janeiro 2002 – Janeiro 2005): * plantas novas; ** plantas que nunca floriram por falta de aclimação;
- Plantas marcescentes (plantas semiperenifólias e semcaducifólias): 3-2 (3-4) – folhas todo o ano mas com renovação significativa em Março e Abril.

Anexo 10
CARACTERIZAÇÃO FITOGEOGRÁFICA DO JARDIM DE SANTA LUZIA

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitoceográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Abelia x grandiflora</i> (André) Rehd.	Caprifoliaceae	Abélia	Hortícola	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z5	C1(18), C2(6), C3(13), C16(4), C17 (grupo)
<i>Abutilon x hybridum</i> hort.	Malvaceae	Abutilão-amarelo	Hortícola	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z9	C1(7), C3(3), C4(6), C5(6), C15(2),
<i>Acalypha wilkesiana</i> Muell. Arg.	Euphorbiaceae	Acálifa	Oceânia	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C2(7), C3(2)
<i>Acanthus mollis</i> L.	Acanthaceae	Erva-gigante	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-8	Hemi.	Herbácea	Z6	C17(grupo)
<i>Aeonium arboreum</i> (L.) Webb. & Berth.	Crassulaceae	Hortícola (Ensaio; Saio)	Paleártico	Perenifólio	1-12	11-4	Nano.	Herbácea suculenta	Z9	C8, C9 (grupo)
<i>Agapanthus praecox</i> Willd. ssp. <i>orientalis</i> (Leighton) Leighton	Liliaceae	Agapantos; Coroas-de-Henrique	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	4-9	Hemi.	Herbácea	Z9	C1, C2, C3, C17, C18, C19 (mancha)
<i>Agathis robusta</i> (C. Moore ex. F. Muell.) Bail.	Araucariaceae	Pinheiro-de-damara; Pinheiro-com-folha-de-alegra-campo	Australiano	Perenifólio	1-12	3-4	Meso.	Árvore	Z9	C1(7), C3(2), C12(3), C16(6), C17(4)
<i>Ajuga reptans</i> L.	Labiatae	Ajuga	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z6	C1, C2, C3, C13, C15, C16, C17 (grupo)
<i>Albizia julibrissin</i> Durazz.	Leguminosae (Mimosoideae)	Árvore-da seda; Albizia-de-constantinopla	Paleártico	Caducifólio	4-12	5-8	Micro.	Árvore	Z8	C2(2), C3(1), C16(4), C17(2)
<i>Aloe arborescens</i> Mill.	Liliaceae (Aloeaceae)	Aloés, Babosas, Foguetes-de-natal	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	11-2	Nano.	Arbusto suculento	Z9	C8 (grupo)
<i>Aloe ciliaris</i> Haw.	Liliaceae (Aloeaceae)	Aloés	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	10-6	Fane. trep.	Arbusto trepador e suculento	Z9	C8, C9 (grupo)
<i>Aloe vera</i> (L.) Burm.	Liliaceae (Aloeaceae)	Aloés-vera	Paleártico; Neotropical	Perenifólio	1-12	11-6	Hemi.	Herbácea suculenta	Z8	C8, C9, C11 (grupo)
<i>Alternanthera ficoidea</i> (L.) R. Br.	Amaranthaceae	Pirriquitos	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Caméfito	Herbácea	Z10	C10(grupo)
<i>Anthurium scherzerianum</i> Schott. cvs.	Araceae	Antúrio-rabinho-de-porco	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C13(grupo)
<i>Apollonias barbuja</i> (Cav.) Bomm.	Lauraceae	Barbusano	Paleártico	Perenifólio	1-12	9-3	Meso.	Árvore	Z10	C2(7), C3(1)
<i>Araucaria bidwillii</i> Hook. f.	Araucariaceae	Araucária-de-bidwill	Australiano	Perenifólio	1-12	2-3	Meso.	Árvore	Z9	C2(1), C17(2)
<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> H. A. Wendl. & Drude.	Palmae	Palmeira-elegante	Australiano	Perenifólio	1-12	2-10	Meso.	Árvore	Z10	C14(1), C19(11)
<i>Asparagus densiflorus</i> (Kunth) Jassop	Liliaceae (Asparagaceae)	Esparto	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	7-8	Nano.	Herbácea	Z9	C1, C2, C3, C11, C12, C14, C17, C18, 19 (grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Asplenium nidus</i> L.	Aspleniaceae	Feto-de-ninho	Neotropical	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z11	C13 (grupo)
<i>Bauhinia variegata</i> L.	Leguminosae (Caesalpinoideae)	Bauínia; Árvore-de-são- Tomé	Indomalaio	Marcescente	5-4 (12-4)	10-6	Micro.	Árvore	Z9	C3(5), C17(6)
<i>Bougainvillea glabra</i> Choisy	Nyctaginaceae	Buganvília	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	C13(1), C17(15), C18(10)
<i>Brachychiton populneus</i> R. Br.	Sterculiaceae	Esterculia	Australiano	Perenifólio	1-12	5-6	Meso.	Árvore	Z10	C2(3), C3(5), C15(2), C16(3), C17(4)
<i>Brugmansia aurea</i> Lagerh.	Solanaceae	Trombeteira	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C1(5), C2(1), C3(1), C17(1)
<i>Bulbine frutescens</i> (L.) Willd.	Liliaceae (Asphodelaceae)	Bulbine	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Geófita	Herbácea suculenta	Z9	C6, C9, C11, C12 (grupo)
<i>Callistemon citrinus</i> (Curtis) Skeels.	Myrtaceae	Martinete	Australiano	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z8	C1(9), C2(2), C3(7), C16(2), C17(7)
<i>Chlorophytum comosum</i> (Thumb.) Jacques	Liliaceae (Anthericaceae)	Fitinhas	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z9	C1, C2, C12, C14, C16 (grupo)
<i>Choisya ternata</i> HBK.	Rutaceae	Laranjeira-do- mexico	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z7	C3(4), C13(grupo), C15(2), C16(2)
<i>Chorisia speciosa</i> A. St. Hil.	Bombacaceae	Sumaúma	Neotropical	Caducifólio	3-11	8-11	Meso.	Árvore	Z10	C1(2), C2(3), C17(2)
<i>Cinnamomum camphora</i> (L.) Sieb.	Lauraceae	Canforeira	Paleártico; Indomalaio	Perenifólio	1-12	2-4	Meso.	Árvore	Z10	C1(4), C3(3), C13(1), C16(1), C17(1)
<i>Clethra arborea</i> Ait.	Clethraceae	Folhado	Paleártico	Perenifólio	1-12	7-8	Micro.	Árvore	Z10	C1(1), C2(7), C3(3)
<i>Clivia miniata</i> Regel	Amaryllidaceae	Clívia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	2-11	Hemi.	Herbácea	Z10	C2, C13, C14 (grupo)
<i>Codiaeum variegatum</i> (L.) Bl. var. <i>pictum</i> (Lodd.) Muell. Arg.	Euphorbiaceae	Crótone	Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z11	C1(4), C17(7)
<i>Crassula ovata</i> (Mill.) Druce.	Crassulaceae	Ensaio-branco ; Planta-de-jade	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	11-3	Nano.	Arbusto suculento	Z10	C8, C10 (grupo)
<i>Crassula perfoliata</i> L. var. <i>falcata</i> (Wendl.) Toelken	Crassulaceae		Áfricotropical	Perenifólio	1-12	6-10	Nano.	Arbusto suculento	Z10	C8 (grupo)
<i>Cyathea cooperi</i> (F. Mueller) Domin.	Cyatheaceae	Feto-arbóreo	Australiano	Perenifólio	1-12	-----	Micro.	Árvore	Z10	C13(3)
<i>Cycas circinalis</i> L.	Cycadaceae	Cicas	Australiano; Oceânia; Antártico	Perenifólio	1-12	ainda não floriram	Micro.	Árvore	Z9	C14(3), C16(3)
<i>Cycas revoluta</i> Thunb.	Cycadaceae	Cicas-revoluta; Cicas-de-sagú	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-8	Micro.	Árvore	Z9	C3(2), C16(5)
<i>Cymbidium insigne</i> Rolfe	Orchidaceae	Orquídea-de- haste; Cimbídio	Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-6	Hemi.	Herbácea	Z9	C13, C14, C15 (grupo)
<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.	Gramineae	Relva-bermuda	Cosmopolita	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z7	C1, C2, C16 (tapete)
<i>Cyperus papyrus</i> L.	Cyperaceae	Papiros	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C7(grupo)
<i>Delonix regia</i> (Bojer) Raf.	Leguminosae (Caesalpinoideae)	Acácia-rubra	Áfricotropical	Caducifólio	6-3	ainda não floriram	Micro.	Árvore	Z11	C2(4), C3(2), C17(5), C18(3)
<i>Dendranthema x grandiflorum</i> Kitam.	Compositae	Crisântemo-das- floristas	Paleártico	Perenifólio	1-12	10-12	Caméfito	Herbácea	Z7	C4, C5 (grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Dicksonia antarctica</i> Labill.	Dicksoniaceae	Feto-arbóreo	Australiano	Perenifólio	1-12	-----	Micro.	Árvore	Z8	C2(4), C13(1), C14(6)
<i>Doryanthes excelsa</i> Corr.	Agavaceae	Doriantes	Australiano	Perenifólio	1-12	7-9	Hemi.	Herbácea	Z10	C10(3), C11(9)
<i>Dracaena draco</i> (L.) L. ssp. <i>draco</i>	Agavaceae	Dragoeiro	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-6	Micro.	Árvore	Z11	C2(25), C3(11), C8(6), C10(15), C14(12)
<i>Duchesnea indica</i> (Andrews) Focke.	Rosaceae	Morangueiro-selvagem	Paleártico; Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea trepadora	Z6	C1, C2, C3, C15, C16, C17 (mancha)
<i>Echeveria secunda</i> W. B. Booth.	Crassulaceae	Rosa-mexicana	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-9	Caméfito	Herbácea suculenta	Z8	C9 (grupo)
<i>Echium candicans</i> L. f.	Boraginaceae	Massaroco	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-6	Micro.	Arbusto	Z10	C1, C2, C3 (grupo)
<i>Echium nervosum</i> Dryand.	Boraginaceae	Massaroco	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-3	Nano.	Arbusto	Z11	C1(grupo), C10(grupo)
<i>Eichhornia crassipes</i> (Mart.) Solms-Laub.	Pontederiaceae	Jacinto-de-água	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-10	Hidrófita	Herbácea	Z10	C7(grupo)
<i>Erica platycodon</i> (Webb & Berthel.) Rivas Mart. & al. ssp. <i>madericola</i> (D. C. McClint.) Rivas Mart. & al.	Ericaceae	Urze-das-vassouras; Urze-durázia	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-6	Micro.	Arbusto	Z10	C2(7)
<i>Erythrina crista-galli</i> L.	Leguminosae (Papilionoideae)	Coraleira; Coralina-crista-de-galo	Neotropical	Marcescente	4-3 (12-3)	4-1	Micro.	Árvore	Z8	C16(3), C17(5)
<i>Eucalyptus ficifolia</i> F. Muell.	Myrtaceae	Eucalipto-de-flor-vermelha	Australiano	Perenifólio	1-12	1-12	Meso.	Árvore	Z9	C1(1), C16(1)
<i>Eucalyptus sideroxylon</i> A. Cunn. ex Wools	Myrtaceae	Eucalipto	Australiano	Perenifólio	1-12	8-9	Meso.	Árvore	Z9	C16(1)
<i>Euphorbia milii</i> Desmoul.	Euphorbiaceae	Mira-mira-não-me-toques	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C8(grupo)
<i>Euphorbia trigona</i> Mill.	Euphorbiaceae	Eufórbia	Áfricotropical; Indomalaio	Perenifólio	1-12	4-6	Micro.	Arbusto suculento	Z10	C10(9), C11(1)
<i>Festuca elatior</i> L.	Gramineae	Relva; Grama	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z5	C1, C2, C16 (tapete)
<i>Ficus benjamina</i> L. var. <i>nuda</i> (Miq.) Barrett	Moraceae	Figueira-da-índia	Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-4	Meso.	Árvore	Z11	C7(2)
<i>Ficus rubiginosa</i> Desf. ex Vent.	Moraceae		Australiano	Perenifólio	1-12	1-4	Micro.	Árvore	Z10	C2(1), C15(2)
<i>Frangula azorica</i> V. Grubow	Rhamnaceae	Ginjeira-brava; Tintureira	Paleártico	Caducifólio	2-10	5-7	Micro.	Árvore	Z9	C2(10), C3(1)
<i>Gazania rigens</i> (L.) Gaertn.	Compositae	Gazania	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z9	C10, C12 (grupo)
<i>Grevillea robusta</i> A. M. Cunn. ex R. Br.	Proteaceae	Grevílea	Australiano	Perenifólio	1-12	4-7	Meso.	Árvore	Z8	C1(4), C3(2), C12(2), C17(4)
<i>Hemerocallis dumortieri</i> E. Morr.	Liliaceae (Hemerocallidaceae)	Hemerocalis; Lírio-dum-dia	Paleártico	Perenifólio	1-12	6-10	Geófito	Herbácea	Z5	C10, C14, C17, C18, C19 (grupo)
<i>Hibiscus rosa-sinensis</i> L.	Malvaceae	Cardeais; Hibiscos; Rosa-da-china	Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C1(5), C2(3), C3(19), C17(5)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Holmskioldia tettensis</i> Vathe	Verbenaceae	Chapéu-chinês; Chapéu-de-mandarim	Áfricotropical ; Paleártico	Perenifólio	1-12	6-11	Micro.	Arbusto	Z10	C2(2), C3(3), C17(4)
<i>Howea forsteriana</i> (C. Moore & F. Muell.) Becc.	Palmae	Quência	Australiano	Perenifólio	1-12	1-9	Micro.	Árvore	Z10	C14(3), C19(3)
<i>Hydrangea macrophylla</i> (Thunb.) Ser.	Hydrangeaceae	Hortênsia; Novelos	Paleártico	Caducifólio	3-12	5-10	Nano.	Arbusto	Z6	C1(grupo), C3(grupo)
<i>Hydrangea serrata</i> (Thunb.)	Hydrangeaceae	Hortênsia	Paleártico	Caducifólio	3-12	5-10	Nano.	Arbusto	Z6	C1(grupo)
<i>Ilex canariensis</i> Poir.	Aquifoliaceae	Azevinho-da-rocha	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-6	Micro.	Árvore	Z10	C2(2)
<i>Ilex perado</i> Ait.	Aquifoliaceae	Perado	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-6	Micro.	Árvore	Z10	C1(6), C2(3), C3(2)
<i>Iresine herbstii</i> Hook.	Amaranthaceae	Iresine	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Caméfito	Herbácea	Z10	C1, C10, C12, C16, C17 (grupo)
<i>Jacaranda mimosifolia</i> D. Don.	Bignoniaceae	Jacarandá	Neotropical	Caducifólio	5-2	4-6; 9-10	Meso.	Árvore	Z9	C1(6), C2(4), C3(3), C4(2), C6(2), C12(1), C16(2), C17(1), C18(5)
<i>Jasminum polyanthum</i> Franch.	Oleaceae	Jasmineiro; Jasmim-dos-poetas	Paleártico	Perenifólio	1-12	2-6	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z8	C1(66), C3(61), C13(2), C15(2), C17(2)
<i>Juniperus cedrus</i> Webb. & Berthel. ssp. <i>maderensis</i> (Menezes) Rivas Mart. & al.	Cupressaceae	Cedro-da-madeira	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-3	Micro.	Árvore	Z10	C1(5), C2(2), C3(4)
<i>Justicia brandegeana</i> Watsch.	Acanthaceae	Beloperone	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C13(grupo)
<i>Justicia carnea</i> Lindl.	Acanthaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	5-10	Nano.	Arbusto	Z12	C11(grupo)
<i>Kalanchoe fedtschenkoi</i> Hamet & Perrier.	Crassulaceae	Calanchoé	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-8	Caméfito	Arbusto suculento	Z11	C10(grupo)
<i>Lagerstroemia indica</i> L.	Lythraceae	Laguerestré-mia; Flor de Merenda; Suspiros	Paleártico; Indomalaio	Caducifólio	3-11	7-9	Micro.	Árvore	Z7	C3(6), C18(5)
<i>Lamium galeobdolon</i> (L.) L.	Labiatae	Aranjo-amarelo	Paleártico	Perenifólio	1-12	10-12	Hemi.	Herbácea	Z4	C1, C3, C16, C17 (mancha)
<i>Lampranthus aureus</i> (L.) N. E. Br.	Aizoaceae	Lamprantos	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	4-12	Fane. trep.	Arbusto trepador e suculento	Z11	C8(grupo)
<i>Laurus novocanariensis</i> Rivas Mart. & al.	Lauraceae	Loureiro	Paleártico	Perenifólio	1-12	11-3	Meso.	Árvore	Z10	C1(2), C2(6), C3(3)
<i>Leptospermum scoparium</i> Forst. & Forst. cvs.	Myrtaceae	Leptospermo; Urze-de-jardim	Australiano; Antártico	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z8	C3(4), C18(5)
<i>Magnolia grandiflora</i> L.	Magnoliaceae	Magnólia	Neártico	Perenifólio	1-12	5-8	Micro.	Árvore	Z6	C1(2), C3(2), C16(2)
<i>Mahonia x media</i> C. Brickell	Berberidaceae	Maónia	Hortícola	Perenifólio	1-12	3-4	Nano.	Arbusto	Z6	C16(14), C17(8)
<i>Mandevilla boliviensis</i> (Hook. f.) Woodson	Apocynaceae	Dipladénia-branca	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	C3(1), C10(2), C12(4), C13(2)
<i>Mandevilla sanderi</i> (Hemsl.) Woodson.	Apocynaceae	Dipladénia - vermelha	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	C3(1), C10(2), C12(7), C13(2)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Musa acuminata</i> L. A. Colla ssp. <i>zebrina</i> (L. B. van Houtte) R. E. Nasution	Musaceae	Bananeira- zebrina	Indomalaio; Australiano	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C2(1), C11(grupo)
<i>Myrica faya</i> Ait.	Myricaceae	Faia-das-ilhas; Samouco	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-5	Micro.	Árvore	Z9	C1(8), C2(5)
<i>Nandina domestica</i> Thunb.	Berberidaceae	Nandina	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-9	Nano.	Arbusto	Z5	C2(9), C3(12), C13(9), C16(4), C17(8), C18(10)
<i>Nolina recurvata</i> (Lem.) Hemsl.	Agavaceae	Nolina; Pata-de-elefante	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-8	Micro.	Árvore	Z9	C14(3), C19(3)
<i>Nymphaea alba</i> L.	Nymphaeaceae	Nenúfar	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-8	Helófito	Herbácea	Z6	C7 (grupo)
<i>Ocotea foetens</i> (Aiton) Baill.	Lauraceae	Til	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Meso.	Árvore	Z10	C1(3), C2(10), C3(3)
<i>Ophiopogon japonicus</i> (L. f.) Ker-Gawl	Liliaceae (Convallariaceae)	Relva-do-japão	Paleártico	Perenifólio	1-12	7-9	Hemi.	Herbácea	Z8	C15, C16 (mancha)
<i>Opuntia microdasys</i> (Lehm.) Pfeiff.	Cactaceae	Cacto	Neártico	Perenifólio	1-12	5-7	Nano.	Arbusto suculento	Z8	C8(6)
<i>Osteospermum barberiae</i> (Harv.) Norl.	Compositae	Estrelas-do-cabo	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Caméfito	Arbusto	Z10	C1, C2, C3, C12, C13, C15, C16 (grupo)
<i>Osteospermum ecklonis</i> (DC.) Norl.	Compositae	Estrelas-do-cabo	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Caméfito	Arbusto	Z10	C1, C3, C14, C19 (grupo)
<i>Pandanus utilis</i> Bory.	Pandanaceae	Pândano	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	9-3	Micro.	Árvore	Z10	C14(1), C16(2), C17(1)
<i>Pandorea jasminoides</i> (Lindl.) Schum.	Bignoniaceae	Bignónia	Australiano	Perenifólio	1-12	4-11	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z9	C1(24)
<i>Parthenocissus tricuspidata</i> (Sieb. & Zucc.) Planch. in DC.	Vitaceae	Vinha-púrpura	Paleártico	Caducifólio	4-12	5-6	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z4	C9, C11 (grupo)
<i>Persea indica</i> (L.) Spreng.	Lauraceae	Vinhático	Paleártico	Perenifólio	1-12	7-9	Meso.	Árvore	Z10	C1(1), C2(5), C3(5)
<i>Petasites fragrans</i> (Vill.) Presl.	Compositae	Sombreiro	Paleártico	Perenifólio	1-12	2-5	Hemi.	Herbácea	Z7	C11, C14, C16 (mancha)
<i>Phoenix canariensis</i> Chabaud.	Palmae	Palmeira-das- Canárias	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-3	Meso.	Árvore	Z11	C8(3), C9(2)
<i>Phormium tenax</i> Forst. & Forst. f.	Agavaceae	Espadana	Antártico	Perenifólio	1-12	6-8	Hemi.	Herbácea	Z8	C8(grupo)
<i>Picconia excelsa</i> (Ait.) DC.	Oleaceae	Pau Branco	Paleártico	Perenifólio	1-12	2-5	Micro.	Árvore	Z10	C1(2), C2(3), C3(1)
<i>Pilea microphylla</i> (L.) Liebm	Urticaceae	Arrozinho	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C6, C9, C10, C12 (mancha)
<i>Pistia stratiotes</i> L.	Araceae	Alface-de- água	Neotropical; Áfricotropical; Indomalaio; Oceânia; Australiano	Perenifólio	1-12	1-12	Hidrófito	Herbácea	Z10	C7 (grupo)
<i>Platanus x acerifolia</i> (Ait.) Willd.	Platanaceae	Plátano	Hortícola	Caducifólio	4-11	4-5	Meso.	Árvore	Z7	C2(1), C3(1)
<i>Plumbago auriculata</i> Lam.	Plumbaginaceae	Plúmbago	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z9	C1(7), C3(11), C10(4), C12(15), C16(9), C17(3)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Plumeria rubra</i> L.	Apocynaceae	Pluméria; Planta-dos- dentes	Neotropical	Caducifólio	5-1	6-12	Micro.	Árvore	Z10	C1(2), C2(3), C14(4), C17(3)
<i>Prunus hixa</i> Willd.	Rosaceae	Gingeira-brava; Azereiro	Paleártico	Perenifólio	1-12	6-8	Meso.	Árvore	Z10	C1(8), C2(11)
<i>Russelia equisetiformis</i> Scdl. & Cham.	Scrophulariaceae	Russélia ; Lágrimas-de- amor	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Herbácea	Z8	C3(8), C17(16)
<i>Salix canariensis</i> C. Sm. ex Link	Salicaceae	Seixo; Seixeiro	Paleártico	Caducifólio	2-12	1-2	Micro.	Árvore	Z11	C2 (7)
<i>Salix x rubens</i> Schrank.	Salicaceae	Vimeiro	Hortícola	Marcescente	1-12 (12-3)	3-5	Micro.	Arbusto	Z4	C1(8), C2, C3 (grupo)
<i>Salvia officinalis</i> L.	Labiatae	Salva	Paleártico	Perenifólio	1-12	6-8	Nano.	Herbácea	Z5	C1, C2, C14, C19 (mancha)
<i>Salvia splendens</i> Sell ex Roem. & Schult.	Labiatae	Camarões	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Herbácea	Z10	C11, C14, C16, C17, C19 (grupo)
<i>Schinus molle</i> L. non hort. ex Engl.	Anacardiaceae	Pimenteira Bastarada; Pimenteira da Índia	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Meso.	Árvore	Z9	C2(2), C3(6), C12(1), C17(2), C18(2)
<i>Senecio cineraria</i> DC.	Compositae	Senécio	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-8	Nano.	Arbusto	Z8	C3, C17 (grupo)
<i>Senna didymobotrya</i> (Fres.) Irwin & Barneby.	Leguminosae (Caesalpinioideae)	Planta-das- pipocas; Cássia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C3 (7)
<i>Sideroxylon mirmulans</i> R. Brown in Buch	Sapotaceae	Marmulano	Paleártico	Perenifólio	1-12	8-1	Micro.	Árvore	Z10	C1(8), C2(21)
<i>Spathodea campanulata</i> Beauv.	Bignoniaceae	Chama-da- floresta; Tulipeiro-africano	Áfricotropical	Caducifólio	1-12 (Variação individual)	1-12	Micro.	Árvore	Z11	C1(8), C3(3), C16(3), C17(2)
<i>Spiraea nipponica</i> Maxim.	Rosaceae	Grinalda-de-noiva	Paleártico	Caducifólio	11-3	4-6	Nano.	Arbusto	Z5	C1(6), C3(9), C17(7)
<i>Strelitzia reginae</i> BanKs ex Dryand	Strelitziaceae	Estrelícia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C14, C16, C17, C19 (grupo)
<i>Streptosolen jamesonii</i> (Benth.) Miers.	Solanaceae	Rapaziada	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-10	Nano.	Arbusto	Z9	C3(grupo)
<i>Tamarix gallica</i> L.	Tamaricaceae	Tamargueira	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-5	Micro.	Arbusto	Z5	C1(14), C2(3), C3(20), C17(2)
<i>Tanacetum parthenium</i> (L.) Schultz-Bip.	Compositae	Artemija; Alfinetes-de- senhora	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-10	Caméfito	Herbácea	Z6	C5(grupo)
<i>Tecomaria capensis</i> (Thunb.) Spach.	Bignoniaceae	Camarões	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C3(5)
<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	Leguminosae (Papilionoideae)	Tipuana	Neotropical	Marcescente	5-4 (3-4)	4-7	Meso.	Árvore	Z9	C1(10), C2(3), C3(4), C4(3), C5(3), C6(1), C12(1), C13(1), C16(3), C17(1)
<i>Tropaeolum majus</i> L.	Tropaeolaceae	Chagas	Neotropical	Sazonal	1-10	2-9	Terófito	Herbácea	Z8	C17 (grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Vaccinium padifolium</i> J. E. Sm. ex Ress	Ericaceae	Uveira-da-serra	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-6	Micro.	Arbusto	Z9	C2(27)
<i>Viburnum opulus</i> L.	Caprifoliaceae	Viburno; Noveleiro	Paleártico	Caducifólio	4-11	4-8	Micro.	Arbusto	Z3	C1(5), C3(7), C16(2), C17(8), C18(10)
<i>Viburnum tinus</i> L.	Caprifoliaceae	Viburno	Paleártico	Perenifólio	1-12	10-4; 7-8	Micro.	Arbusto	Z7	C1(16), C3(7), C16(4), C17(7)
<i>Vinca major</i> L.	Apocynaceae	Pervinca-maior	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea trepadora	Z7	C1, C2, C3, C13, C16, C17 (mancha)
<i>Vinca minor</i> L.	Apocynaceae	Pervinca-menor	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea trepadora	Z4	C2, C3 (mancha)
<i>Viola riviniana</i> Rchb.	Violaceae	Violeta	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z5	C17(grupo)
<i>Viola x witrockiana</i> Gams.	Violaceae	Amores-perfeitos	Hortícola	Perenifólio	1-12	3-8	Hemi.	Herbácea	Z5	C3 (grupo)
<i>Yucca gloriosa</i> L.	Agavaceae	luca	Neártico	Perenifólio	1-12	6-11	Micro.	Arbusto	Z7	C2(3), C3(17)
<i>Zantedeschia aethiopica</i> (L.) Spreng.	Araceae	Jarros	Áfricotropical	Sazonal	10-7	11-5	Geófita	Herbácea	Z8	C7(grupo) 13-07-05 – folhas;

Legenda:

- Plantas que não floriram no período em estudo (Janeiro 2002 – Janeiro 2005): * plantas novas; ** plantas que nunca floriram por falta de aclimação;
- Plantas marcescentes (plantas semiperenifólias e semcaducifólias): 3-2 (**3-4**) – folhas todo o ano mas com renovação significativa em Março e Abril.

Anexo 11
CARACTERIZAÇÃO FITOGEOGRÁFICA DOS JARDINS DO TECNÓPOLO

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Abelia x grandiflora</i> (André) Rehd.	Caprifoliaceae	Abélia	Hortícola	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z5	C1, C4, C6, C7 (grupo)
<i>Abutilon grandifolium</i> (Willd.) Sweet	Malvaceae	Abutilão	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z9	C6(1)
<i>Abutilon pictum</i> (Gillies ex Hook. & Arn.) Walp.	Malvaceae	Abutilão	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z9	C1(1), C4(1)
<i>Abutilon x hybridum</i> hort.	Malvaceae	Abutilão	Hortícola	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z9	C1(2)
<i>Acacia longifolia</i> (Andr.) Willd.	Leguminosae (Mimosoideae)	Acácia-das-espigas	Australiano	Perenifólio	1-12	1-3	Micro.	Árvore	Z8	C4(1), C6(1)
<i>Acacia melanoxylon</i> R. Br.	Leguminosae (Mimosoideae)	Acácia-austrália	Australiano	Perenifólio	1-12	1-4	Meso.	Árvore	Z8	C4(15)
<i>Acalypha godseffiana</i> hort. Sander ex Mast.	Euphorbiaceae	Acálifa	Oceânia	Perenifólio	1-12	2-8	Micro.	Arbusto	Z11	C4(2)
<i>Acalypha hispida</i> Burm.	Euphorbiaceae	Rabo-de-gato-vermelho	Indomalaio; Oceânia	Perenifólio	1-12	7-11	Nano.	Arbusto	Z11	C1(1)
<i>Acalypha wilkesiana</i> Muell. Arg.	Euphorbiaceae	Acálifa	Oceânia	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C1(2), C4(grupo), C7(8)
<i>Acca sellowiana</i> (O. Berg.) Burret	Myrtaceae	Goiabeira-ananás	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-7	Micro.	Árvore	Z8	C1(2)
<i>Achillea millefolium</i> L.	Compositae	Aquileia	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-6	Caméfito	Herbácea	Z2	C1(grupo)
<i>Adansonia digitata</i> L.	Bombacaceae	Baobá; Embondeiro	Áfricotropical	Caducifólio	3-10	Não floriu*	Nano.	Árvore	Z11	C1(1)
<i>Aechmea fulgens</i> Brongn. var. <i>discolor</i> (Morr.) Brongn. ex Bak.	Bromeliaceae	Bromélia	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-8	Hemi.	Herbácea	Z11	C1(grupo)
<i>Aechmea gamosepala</i> Witm.	Bromeliaceae	Bromélia	Neotropical	Perenifólio	1-12	10-2	Hemi.	Herbácea	Z10	C1 (grupo)
<i>Aechmea nudicaulis</i> (L.) Griseb.	Bromeliaceae	Bromélia	Neotropical	Perenifólio	1-12	12-4	Hemi.	Herbácea	Z10	C1(grupo)
<i>Aeonium arboreum</i> (L.) Webb. & Berth.	Crassulaceae	Ensaio; Saião	Paleártico	Perenifólio	1-12	11-4	Nano.	Herbácea suculenta	Z9	C1(grupo), C4(1)
<i>Aeonium decorum</i> Webb ex Bolle	Crassulaceae	Ensaio	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-6	Caméfito	Herbácea suculenta	Z10	C1(grupo)
<i>Aeonium glutinosum</i> (Aiton.) Webb. & Berthel.	Crassulaceae	Farrobo; Ensaio	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-8	Nano.	Herbácea suculenta	Z10	C1(grupo)
<i>Aeonium manriqueorum</i> Bolle.	Crassulaceae	Ensaio	Paleártico	Perenifólio	1-12	6-8	Nano.	Herbácea suculenta	Z10	C1(grupo)
<i>Agapanthus campanulatus</i> F. M. Leighton ssp. <i>patens</i> (F. M. Leighton) F. M. Leighton	Liliaceae (Alliaceae)	Agapanto-anão-variegado	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	5-8	Hemi.	Herbácea	Z9	C1(grupo)
<i>Agapanthus praecox</i> Willd. ssp. <i>orientalis</i> (Leighton) Leighton	Liliaceae	Agapantos; Coroas-de-henrique	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	4-9	Hemi.	Herbácea	Z9	C4, C6 (mancha)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Agathis robusta</i> (C. Moore ex. F. Muell.) Bail.	Araucariaceae	Pinheiro-de-damara; Pinheiro-folha-de-alegra-campo	Australiano	Perenifólio	1-12	3-4	Meso.	Árvore	Z9	C4(1)
<i>Agave americana</i> L.	Agavaceae	Agave; Piteira	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-8	Hemi.	Herbácea suculenta	Z9	C1, C8 (grupo)
<i>Agave angustifolia</i> Haw.	Agavaceae	Agave	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-8	Nano.	Árvore suculenta	Z9	C2(2)
<i>Agave attenuata</i> Salm-Dyck	Agavaceae	Piteira; Agave-pescoço-de-cisne	Neotropical	Perenifólio	1-12	12-3	Nano.	Árvore suculenta	Z9	C2, C8 (grupo)
<i>Ageratina adenophora</i> (Spreng.) R. King. & H. Robinson	Compositae	Abundância	Neotropical	Perenifólio	1-12	3-7	Nano.	Herbácea	Z10	C6, C8 (grupo)
<i>Ajuga reptans</i> L.	Labiatae	Ajuga	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z6	C1 (grupo)
<i>Albizia julibrissin</i> Durazz.	Leguminosae (Mimosoideae)	Árvore-da-seda; Albizia-de-constantinopla	Paleártico	Caducifólio	4-12	5-8	Micro.	Árvore	Z8	C5(1)
<i>Albizia saman</i> F. Muell.	Leguminosae (Mimosoideae)	Enterolóbio; Samaneiro; Árvore-da-chuva	Neotropical	Caducifólio	4-12	7-11	Meso.	Árvore	Z9	C1(1), C4(1), C11(1)
<i>Aleurites moluccana</i> (L.) Willd	Euphorbiaceae	Aleurites; Nós-vômica	Indomalaio	Perenifólio	1-12	6-10	Micro.	Árvore	Z10	C1(1)
<i>Allamanda cathartica</i> L.	Apocynaceae	Alamanda; Flor-de-manteiga	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-12	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z11	C1(1), C4(1)
<i>Allocasuarina verticillata</i> (Lam.) L. A. S. Johnson	Casuarinaceae	Casuarina	Australiano	Perenifólio	1-12	12-3	Micro.	Árvore	Z8	C4(1), C5(1), C6(1)
<i>Aloe arborescens</i> Mill.	Liliaceae (Aloeaceae)	Aloés, Babosas, Foguetes-de-natal	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	11-2	Nano.	Arbusto suculento	Z9	C1(grupo)
<i>Aloe candelabrum</i> Berger.	Liliaceae (Aloeaceae)	Aloés	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	11-2	Micro.	Árvore suculenta	Z9	C1(2)
<i>Aloe capitata</i> Bak.	Liliaceae (Aloeaceae)	Aloés	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	4-5	Hemi.	Herbácea suculenta	Z9	C3(grupo)
<i>Aloe ciliaris</i> Haw.	Liliaceae (Aloeaceae)	Aloés	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	10-6	Fane. trep.	Arbusto trepador e suculento	Z9	C1(grupo)
<i>Aloe excelsa</i> A. Berger.	Liliaceae (Aloeaceae)	Aloés	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-3	Micro	Árvore suculenta	Z9	C1(5), C2(7)
<i>Aloe ferox</i> Mill.	Liliaceae (Aloeaceae)	Aloés	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	12-1	Nano.	Árvore suculenta	Z9	C1(2)
<i>Aloe mitriformis</i> Mill.	Liliaceae (Aloeaceae)	Aloés	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	6-8	Caméfita	Arbusto suculento	Z9	C1 (grupo)
<i>Aloe plicatilis</i> (L.) Mill.	Liliaceae (Aloeaceae)	Aloés	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	2-4	Nano.	Árvore suculenta	Z9	C1(2), C2(2), C8(4)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Aloe pluridens</i> Haw.	Liliaceae (Aloeaceae)	Aloés	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	12-1	Nano.	Arbusto suculento	Z9	C1(grupo)
<i>Aloe saponaria</i> (Ait. f.) Haw.	Liliaceae (Aloeaceae)	Aloés-sabão	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-7	Hemi.	Herbácea suculenta	Z9	C2, C3 (grupo)
<i>Aloe striata</i> Haw.	Liliaceae (Aloeaceae)	Aloés	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	12-5	Caméfito	Arbusto suculento	Z9	C1(grupo)
<i>Aloe vera</i> (L.) Burm.	Liliaceae (Aloeaceae)	Aloé-vera; Babosas	Paleártico; Neotropical	Perenifólio	1-12	11-6	Hemi.	Herbácea suculenta	Z8	C1(grupo)
<i>Aloysia triphylla</i> (L'Hérit.) Britt.	Verbenaceae	Pessegueiro- inglês; Verbena-de- limão	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-10	Nano.	Arbusto	Z8	C1(1)
<i>Alstroemeria haemantha</i> Ruiz & Pav.	Liliaceae (Alstroemeriaceae)	Alstroemeria	Neotropical	Sazonal	4-10	5-9	Geófito	Herbácea	Z7	C1(grupo)
<i>Alstroemeria ligtu</i> L.	Liliaceae (Alstroemeriaceae)	Alstroemeria	Neotropical	Sazonal	4-10	5-9	Geófito	Herbácea	Z8	C1(grupo)
<i>Amaranthus hypocondriacus</i> L.	Amaranthaceae		Neártico	Sazonal	6-1	6-1	Terófito	Herbácea	Z8	C1(1)
<i>Anagallis arvensis</i> L.	Primulaceae	Pimpinella	Paleártico	Sazonal	3-12	3-12	Terófito	Herbácea	Z7	C1 (grupo)
<i>Ananas comosus</i> (L.) Merr.	Bromeliaceae	Ananás	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-7	Hemi.	Herbácea	Z11	C1(8)
<i>Andryala glandulosa</i> Lam. ssp. <i>glandulosa</i>	Compositae	Andriala; Bofe-de-burro	Paleártico	Perenifólio	1-12	6-8	Caméfito	Herbácea	Z11	C1(grupo)
<i>Anemone hupehensis</i> Lem.	Ranunculaceae	Anêmona	Paleártico	Perenifólio	1-12	8-12	Hemi.	Herbácea	Z6	C1, C4(grupo)
<i>Angiopteris evecta</i> (Forst.) Hoffm.	Marattiaceae	Feto-craca	Indomalaio; Australiano	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z10	C1(2)
<i>Annona cherimola</i> Mill.	Annonaceae	Anoneira	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-7	Micro.	Árvore	Z10	C1(2)
<i>Annona muricata</i> L.	Annonaceae	Anoneira	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-7	Micro.	Árvore	Z10	C1(1)
<i>Anthurium andraeanum</i> André.	Araceae	Antúrio	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z11	C1(grupo)
<i>Anthurium coriaceum</i> G. Don	Araceae	Antúrio-de-pedra	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-7	Hemi.	Herbácea	Z11	C1(1)
<i>Antidesma buniis</i> (L.) Spreng.	Euphorbiaceae		Indomalaio; Australiano	Perenifólio	1-12	7-9	Micro.	Árvore	Z10	C4(1)
<i>Apollonias barbuja</i> (Cav.) Bomm.	Lauraceae	Barbusano	Paleártico	Perenifólio	1-12	9-3	Meso.	Árvore	Z10	C1(6)
<i>Araucaria bidwillii</i> Hook. f.	Araucariaceae	Araucária-de- bidwill	Australiano	Perenifólio	1-12	2-3	Meso.	Árvore	Z9	C1(3)
<i>Araucaria heterophylla</i> (Salisb.) Franco	Araucariaceae	Araucária	Oceânia	Perenifólio	1-12	2-3	Macro.	Árvore	Z9	C1(2)
<i>Arbutus unedo</i> L.	Ericaceae	Medronheiro	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Árvore	Z7	C1(2)
<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> H. A. Wendl. & Drude.	Palmae	Palmeira- elegante	Australiano	Perenifólio	1-12	2-10	Meso.	Árvore	Z10	C1(10), C3(4), C10(1)
<i>Arctotis fastuosa</i> Jacq.	Compositae	Margarida-do- cabo	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	3-12	Hemi.	Herbácea	Z9	C1, C4 (grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Argyranthemum dissectum</i> (Lowe) Lowe	Compositae	Estreleira; Pampilhos; Malmequeres	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-7	Nano.	Arbusto	Z10	C1(grupo)
<i>Argyranthemum frutescens</i> (L.) Schultz-Bip.	Compositae	Estrelas; Estreleiras; Pampilhos; Malmequeres	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C1(grupo)
<i>Argyranthemum haematomma</i> (Lowe) Lowe	Compositae	Estreleira; Malmequeres	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-7	Nano.	Arbusto	Z10	C1(grupo)
<i>Argyranthemum pinnatifidum</i> (L. f.) Lowe ssp. <i>pinnatifidum</i>	Compositae	Estrelas; Pampilhos; Malmequeres	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C1(grupo)
<i>Artemisia argentea</i> L'Hérit.	Compositae	Losna	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-7	Nano.	Arbusto	Z11	C1(grupo)
<i>Artocarpus heterophyllus</i> Lam.	Moraceae	Jaca; Jaqueira	Indomalaio	Perenifólio	1-12	5-6	Micro.	Árvore	Z11	C1(2)
<i>Arundo donax</i> L.	Gramineae	Cana-vieira; Cana-da-roca	Paleártico	Perenifólio	1-12	7-10	Hemi.	Herbácea	Z9	C1, C8 (grupo)
<i>Arundo donax</i> L. var. <i>versicolor</i> (Mill.) Stokes	Gramineae	Cana-vieira; Cana-de-roca	Paleártico	Perenifólio	1-12	8-10	Hemi.	Herbácea	Z9	C1(grupo)
<i>Asparagus densiflorus</i> (Kunth) Jassop	Liliaceae (Asparagaceae)	Esparto	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	7-8	Nano.	Herbácea	Z9	C1(grupo)
<i>Asparagus scoparius</i> Lowe	Liliaceae (Asparagaceae)	Esparto	Paleártico	Perenifólio	1-12	12-2	Nano.	Arbusto	Z11	C1(1)
<i>Asparagus setaceus</i> (Kunth) Jassop	Liliaceae (Asparagaceae)	Esparto-de-folha- miúda; Esparto	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	9-12	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z9	C1(1)
<i>Asplenium nidus</i> L.	Aspleniaceae	Feto-ninho	Neotropical	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z11	C1(2)
<i>Aucuba japonica</i> Thunb.	Comaceae (Aucubaceae)	Aucuba	Paleártico; Indomalaio	Perenifólio	1-12	2-4	Micro.	Arbusto	Z7	C1(2)
<i>Averrhoa carambola</i> L.	Oxalidaceae	Carambola	Indomalaio; Oceânia	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Micro.	Árvore	Z11	C1(1)
<i>Bauhinia purpurea</i> L. non hort.	Leguminosae (Caesalpinoideae)	Bauínia	Indomalaio	Perenifólio	1-12	2-7	Micro.	Árvore	Z11	C4(5)
<i>Bauhinia variegata</i> L.	Leguminosae (Caesalpinoideae)	Bauínia; Árvore-de-são- tomé	Indomalaio	Marcescente	5-4 (12-4)	10-6	Micro.	Árvore	Z9	C4(9), C6(5), C8(1)
<i>Bauhinia x blakeana</i> Dunn.	Leguminosae (Caesalpinoideae)	Bauínia	Paleártico	Perenifólio	1-12	12-4	Micro.	Árvore	Z10	C1(1), C4(2), C5(3)
<i>Berberis maderensis</i> Lowe	Berberidaceae	Ameixieira-de- espinho; Fustete	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-5	Micro.	Arbusto	Z10	C1(4)
<i>Bergenia crassifolia</i> (L.) Fritsch.	Saxifragaceae	Bergénia; Couve-de-jardim	Paleártico	Perenifólio	1-12	11-4	Caméfita	Herbácea	Z3	C1, C4, C5, C6, C 11 (grupo)
<i>Bidens ferulifolia</i> (Jacq.) DC.	Compositae		Neártico; Neotropical	Perenifólio	1-12	5-10	Hemi.	Herbácea	Z8	C1(grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Billbergia vittata</i> Brongn. ex Morel.	Bromeliaceae	Bromélia	Neotropical	Perenifólio	1-12	11-2	Hemi.	Herbácea	Z10	C1(grupo)
<i>Bituminaria bituminosa</i> (L.) C. H. Stirt.	Leguminosae	Fedegoso	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z8	C4 (grupo)
<i>Bixa orellana</i> L.	Bixaceae	Anato	Neotropical	Perenifólio	1-12	8-10	Micro.	Árvore	Z10	C1(2)
<i>Blechnum gibbum</i> (Labill.) Mett.	Blechnaceae	Feto	Oceânia	Perenifólio	1-12	-----	Nano.	Arbusto	Z10	C1(1)
<i>Boehmeria nivea</i> (L.) Gaudich.	Urticaceae	Planta-da-seda	Paleártico; Indomalaio	Perenifólio	1-12	8-11	Nano.	Arbusto	Z7	C1(1)
<i>Bougainvillea glabra</i> Choisy	Nyctaginaceae	Buganvília	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	C4 (grupo), C5(1), C6 (grupo), C11(grupo)
<i>Brachychiton acerifolius</i> Cunn. ex. F. Muell.	Sterculiaceae	Árvore-do-fogo	Australiano	Caducifólio	1-5; 8-12	5-8	Micro.	Árvore	Z10	C1(1), C4(3), C6(5), C8(1), C11(1)
<i>Brachychiton discolor</i> F. Muell.	Sterculiaceae		Australiano	Caducifólio	1-5; 8-12	5-8	Micro.	Árvore	Z10	C1(1)
<i>Brachychiton gregorii</i> F. Muell	Sterculiaceae		Australiano	Perenifólio	1-12	5-7	Micro	Árvore	Z9	C1(1)
<i>Brahea dulcis</i> (Kunth) Mart.	Palmae	Palmeira-das-rochas	Neotropical	Perenifólio	1-12	7-9	Micro.	Árvore	Z10	C1(1)
<i>Breynia nivosa</i> (W.G. Sm.) Small.	Euphorbiaceae		Oceânia	Perenifólio	1-12	7-8	Nano.	Arbusto	Z11	C1(2)
<i>Brugmansia arborea</i> (L.) Lagerh.	Solanaceae	Trombeteira	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C1(1), C4(1)
<i>Brugmansia versicolor</i> Lagerh.	Solanaceae	Trombeteira	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C1(1), C4(2), C7(4)
<i>Bulbine frutescens</i> (L.) Willd.	Liliaceae (Asphodelaceae)	Bulbine	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Geófita	Herbácea suculenta	Z9	C1, C4 (grupo)
<i>Butia capitata</i> (Mart.) Becc.	Palmae	Palmeira-da-geleia	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-8	Micro.	Árvore	Z10	C1(1)
<i>Buxus sempervirens</i> L.	Buxaceae	Buxo-comum	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-4; 10-11	Nano.	Arbusto	Z5	C1(sebe), C4(1), C6(1)
<i>Caesalpinia echinata</i> Lam.	Leguminosae (Caesalpinioideae)	Pau-brasil	Neotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Nano..	Árvore	Z11	C1(1)
<i>Caesalpinia pulcherrima</i> (L.) Sw.	Leguminosae (Caesalpinioideae)	Orgulho-de-barbados; Flor-do-paraíso	Neotropical	Perenifólio	1-12	7-2	Micro.	Árvore	Z11	C1(1), C4(1)
<i>Calliandra tweedii</i> Benth.	Leguminosae (Mimosoideae)	Caliandra	Neotropical	Perenifólio	1-12	11-3	Micro.	Arbusto	Z10	C1(1)
<i>Callistemon citrinus</i> (Curtis) Skeels.	Myrtaceae	Martinete	Australiano	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z8	C4(1), C5(1)
<i>Callistemon rigidus</i> R. Br.	Myrtaceae	Martinete	Australiano	Perenifólio	1-12	4-8	Micro.	Arbusto	Z9	C4(2), C6(4), C8(1)
<i>Callistemon viminalis</i> (Sol. ex Gaertn.) G. Don ex Loud.	Myrtaceae	Martinete-chorão	Australiano	Perenifólio	1-12	3-9	Micro.	Arbusto	Z9	C4(4), C5(2)
<i>Calycanthus floridus</i> L.	Calycanthaceae	Carocha (Carolina-allspice)	Neártico	Caducifólio	3-11	3-7	Micro.	Arbusto	Z6	C1(1)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Camellia japonica</i> L.	Theaceae	Camélia; Japoneira	Paleártico	Perenifólio	1-12	11-6	Micro.	Árvore	Z8	C1(2), C4(2)
<i>Camellia sasanqua</i> Thunb.	Theaceae	Camélia	Paleártico	Perenifólio	1-12	11-2	Micro.	Árvore	Z9	C1(1)
<i>Camellia sinensis</i> (L.) Kuntze	Theaceae	Planta-do-chá	Paleártico	Perenifólio	1-12	9-11	Nano.	Arbusto	Z9	C1(4)
<i>Canna indica</i> L.	Cannaceae	Cana-da-índia; Bananeira-de-flor	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Geófito	Herbácea	Z9	C4(grupo)
<i>Canna x generalis</i> L. H. Bail.	Cannaceae	Canas-da-índia; Bananeiras-de-flor	Hortícola	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z9	C1, C4, C6 (grupo)
<i>Cardiospermum grandiflorum</i> Sw.	Sapindaceae	Corriola-dos-balões	Africotropical; Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z10	C6, C8 (grupo)
<i>Carex fraseri</i> Andreus	Gramineae	Carex	Neártico	Perenifólio	1-12	7-9	Hemi.	Herbácea	Z5	C6(grupo)
<i>Carlina salicifolia</i> (L.f.) Cav.	Compositae	Cardo-branco; Carlina	Paleártico	Perenifólio	1-12	6-8	Nano.	Arbusto	Z10	C1(grupo)
<i>Carpobrotus edulis</i> (L.) L. Bol.	Aizoaceae	Bálsamo; Chorão	Africotropical	Perenifólio	1-12	3-8	Fane. trep.	Herbácea suculenta e trepadora	Z9	C5(mancha)
<i>Caryota mitis</i> Lour.	Palmae	Palmeiro-de-rabo-de-peixe	Indomalaio	Perenifólio	1-12	6-8	Micro.	Árvore	Z10	C1(4), C3(1)
<i>Cassia javanica</i> L.	Leguminosae (Caesalpinoideae)	Cássia-rosa; Chuveiro-rosa	Indomalaio	Caducifólio	5-1	6-8	Micro.	Árvore	Z11	C11(1)
<i>Casuarina equisetifolia</i> Forst. & Forst. f.	Casuarinaceae	Casuarina	Indomalaio; Australiano; Oceânia	Perenifólio	1-12	6-11	Meso.	Árvore	Z10	C4(10), C6(3), C8(2)
<i>Cereus uruguayanus</i> Kiesling	Cactaceae	Cacto-vela-de-cera	Neotropical	Perenifólio	1-12	7-8	Nano.	Árvore suculenta	Z9	C1(2)
<i>Cestrum diurnum</i> L. non Weston	Solanaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	6-12	Micro.	Arbusto	Z9	C1(2)
<i>Cestrum nocturnum</i> L.	Solanaceae	Galã-da-noite	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-12	Micro.	Arbusto	Z11	C1(1)
<i>Cestrum roseum</i> HBK.	Solanaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	3-11	Nano.	Arbusto	Z10	C1(1)
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> (Murray) Parl.	Cupressaceae	Cedro-de-oregão	Neártico	Perenifólio	1-12	1-2	Micro.	Árvore	Z6	C1(1), C4(2), C6(2)
<i>Chamaedorea elegans</i> Mart.	Palmae	Palmeira-de-salão; Palmeira-bambu	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-6	Micro.	Arbusto	Z10	C1(2), C2(1), C3(1), C10(1)
<i>Chamaerops humilis</i> L.	Palmae	Palmeira-das-vassouras	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-5	Micro.	Arbusto	Z9	C1(1)
<i>Chambeyronia macrocarpa</i> (Brongn.) Vieill. ex Becc.	Palmae	Palmeira-rubra	Oceânia	Perenifólio	1-12	1-2	Micro.	Árvore	Z10	C1(3), C2(3), C3(4)
<i>Chorisia speciosa</i> A. St. Hil.	Bombacaceae	Sumaúma	Neotropical	Caducifólio	3-11	8-11	Meso.	Árvore	Z10	C2(1), C3(1)
<i>Christella dentata</i> (Forssk.) Brownsey & Jermy	Thelypteridaceae		Africotropical; Indomalaio	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z10	C1(grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Chrysalidocarpus lutescens</i> (Bory) Wendl.	Palmae	Palmeira-amarela; Palmeira-borboleta	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	5-6	Micro.	Arbusto	Z10	C1(2)
<i>Cinnamomum camphora</i> (L.) Sieb.	Lauraceae	Canforeira	Paleártico; Indomalaio	Perenifólio	1-12	2-4	Meso.	Árvore	Z10	C1(2)
<i>Cinnamomum zeylanicum</i> Bl.	Lauraceae	Caneleira; Árvore-da-canel	Indomalaio	Perenifólio	1-12	2-4	Micro.	Árvore	Z11	C1(1), C4(2)
<i>Citrus limon</i> (L.) Burm.	Rutaceae	Limoeiro	Paleártico	Perenifólio	1-12	11-4	Micro.	Árvore	Z9	C1(2)
<i>Citrus sinensis</i> (L.) Osbeck	Rutaceae	Laranjeira	Paleártico	Perenifólio	1-12	2-4	Micro.	Árvore	Z9	C1(2)
<i>Clerodendrum speciosissimum</i> Van Geert	Verbenaceae	Clerodendro	Indomalaio	Perenifólio	1-12	7-12	Nano.	Arbusto	Z11	C1(1)
<i>Clerodendrum thomsoniae</i> Balf. f.	Verbenaceae	Clerodendro	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	5-11	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	C1(1)
<i>Clivia nobilis</i> Lindl.	Amaryllidaceae	Clívia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	2-11	Hemi.	Herbácea	Z10	C1(grupo)
<i>Coccoloba uvifera</i> (L.) L.	Polygonaceae	Uva-do-mar	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-8	Micro.	Árvore	Z11	C1(1)
<i>Cocos nucifera</i> L.	Palmae	Coqueiro	Indomalaio; Oceânia	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Micro.	Árvore	Z12	C1(2)
<i>Codiaeum variegatum</i> (L.) Bl. var. <i>pictum</i> (Lodd.) Muell. Arg.	Euphorbiaceae	Crótone	Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z11	C1(grupo), C4(3)
<i>Coffea arabica</i> L.	Rubiaceae	Cafezeiro; Café	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	4-5; 8-9	Micro.	Arbusto	Z11	C1(6)
<i>Colocasia esculenta</i> (L.) Schott.	Araceae	Inhame	Indomalaio	Perenifólio	1-12	5-6	Geófita	Herbácea	Z10	C1(grupo)
<i>Commelina benghalensis</i> L.	Commelinaceae	Erva-menina; Flor-dum-dia	Indomalaio Áfricotropical;	Perenifólio	1-12	3-9	Hemi.	Herbácea trepadora	Z9	C5(grupo)
<i>Convolvulus althaeoides</i> L.	Convolvulaceae	Campainhas	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-10	Geófita	Herbácea trepadora	Z8	C1(grupo)
<i>Convolvulus massonii</i> Dietr.	Convolvulaceae	Corriola-da-madeira; Convólulos-da-madeira	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-8	Geófita	Herbácea trepadora	Z10	C1(1)
<i>Coprosma repens</i> A. Rich.	Rubiaceae	Coprosma	Antártico; Australiano	Perenifólio	1-12	4-5	Micro.	Arbusto	Z9	C1(1)
<i>Cordyline australis</i> (Forst.) Endl.	Agavaceae	Cordilina	Antártico	Perenifólio	1-12	4-7	Micro.	Árvore	Z9	C1(1)
<i>Cordyline stricta</i> (Sims) Endl.	Agavaceae	Cordiline	Australiano	Perenifólio	1-12	1-6	Nano.	Arbusto	Z10	C1(grupo)
<i>Cordyline terminalis</i> (L.) Kunth.	Agavaceae	Árvore-dos-reis	Indomalaio; Australiano; Oceânia; Antártico	Perenifólio	1-12	11-5	Micro.	Arbusto	Z10	C1(grupo), C10(4)
<i>Coreopsis auriculata</i> L.	Compositae	Margarida-amarela	Neártico	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z4	C1, C4 (grupo)
<i>Comus kousa</i> (Buerger ex Miq.) Hance	Cornaceae		Paleártico	Caducifólio	3-12	6-7	Micro.	Árvore	Z6	C1(1)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Cortaderia selloana</i> (Schult. & Schult. f.) Asch. & Gräbn.	Gramineae	Plumas; Capim-das- pampas	Neotropical	Perenifólio	1-12	7-10	Hemi.	Herbácea	Z6	C4(2)
<i>Corynocarpus laevigata</i> Forst. & Forst. f.	Corynocarpaceae	Loureiro-da-nova- zelândia	Antártico	Perenifólio	1-12	2-5	Micro.	Árvore	Z10	C1(2)
<i>Cotoneaster pannosus</i> Franch.	Rosaceae		Paleártico	Perenifólio	1-12	4-5	Micro.	Arbusto	Z7	C1(1), C4(8), C6(8)
<i>Cotyledon orbiculata</i> L.	Crassulaceae		Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-3	Nano.	Arbusto suculento	Z10	C1(grupo)
<i>Crassula tetragona</i> L.	Crassulaceae	Pinheirinho	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	6-8	Nano.	Arbusto suculento	Z10	C1, C2(grupo)
<i>Crinum moorei</i> Hook. f.	Amaryllidaceae	Crino	Áfricotropical	Sazonal	11-9	4-8	Geófita	Herbácea	Z8	C1(grupo)
<i>Cryptomeria japonica</i> (L.f.) Don	Taxodiaceae	Criptoméria- elegante	Paleártico	Perenifólio	1-12	12-3	Meso.	Árvore	Z7	C4(2), C6(1)
<i>Cuphea ignea</i> A. DC.	Lythraceae	Cigarrinhos	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C1(grupo)
<i>Cupressus lusitanica</i> Mill.	Cupressaceae	Cedro-de-goa; Cedro-das- barracas	Neártico; Neotropical	Perenifólio	1-12	1-3	Meso.	Árvore	Z9	C4(3)
<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartw. ex Gordon	Cupressaceae	Cipreste-de- monterrey; Cedro-de- monterrey	Neártico	Perenifólio	1-12	1-2	Meso.	Árvore	Z8	C1(3), C4(2), C5(1)
<i>Cupressus sempervirens</i> L.	Cupressaceae	Cipreste	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-2	Micro.	Árvore	Z8	C1(5), C4(5), C5(2), C6(1), C8(10)
<i>Curculigo latifolia</i> Dryand.	Hypoxidaceae	Curculigo	Indomalaio	Perenifólio	1-12	6-8	Hemi.	Herbácea	Z10	C1(grupo)
<i>Curcuma longa</i> L.	Zingiberaceae	Açafrão-da-índia	Indomalaio	Perenifólio	1-12	6-8	Geófita	Herbácea	Z10	C1(grupo)
<i>Cyathea australis</i> (R. Br.) Domin	Cyatheaceae	Feto-arbóreo	Australiano	Perenifólio	1-12	-----	Micro.	Árvore	Z9	C1(2)
<i>Cyathea cooperi</i> (F. Mueller) Domin.	Cyatheaceae	Feto-arbóreo	Australiano	Perenifólio	1-12	-----	Micro.	Árvore	Z10	C1(5), C2(11), C3(3), C4(12), C10(2), C11(2)
<i>Cyathea medularis</i> (Forst. f.) Sw.	Cyatheaceae	Feto-arbóreo- negro	Australiano; Oceânia; Antártico	Perenifólio	1-12	-----	Micro.	Árvore	Z9	C1(1)
<i>Cycas circinalis</i> L.	Cycadaceae	Cicas	Indomalaio	Perenifólio	1-12	2-7	Micro.	Árvore	Z10	C1(1)
<i>Cycas revoluta</i> Thunb.	Cycadaceae	Cicas-revoluta; Cicas-de-sagú	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-8	Micro.	Árvore	Z9	C1(1), C10(1)
<i>Cymbidium insigne</i> Rolfe	Orchidaceae	Orquídea-de- haste; Cimbídio	Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-6	Hemi.	Herbácea	Z9	C1(grupo)
<i>Cymbogon citratus</i> (DC. ex Nees) Stapf.	Gramineae	Caninha; Cana-com-cheiro- a-limão	Indomalaio	Perenifólio	1-12	9-10	Hemi.	Herbácea	Z9	C1(2)
<i>Cyperus involucratus</i> Rottb.	Cyperaceae		Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C4 (grupo)
<i>Cyperus papyrus</i> L.	Cyperaceae	Papiros	Áfricotropical; Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C1(grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Cyphomandra crassicaulis</i> (Ortega) Kuntze	Solanaceae	Tomateiro- arbóreo; Tomateiro-inglês	Neotropical	Perenifólio	1-12	3-10	Micro.	Arbusto	Z9	C1(2)
<i>Cyrtomium falcatum</i> (L. f.) Presl.	Dryopteridaceae	Feto-azevinho	Paleártico; Indomalaio; Áfricotropical; Oceânia	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z9	C1(grupo)
<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link	Leguminosae (Papilionoideae)	Giesta	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-7	Micro.	Arbusto	Z5	C1(grupo)
<i>Cytisus striatus</i> (Hill) Rothm.	Leguminosae (Papilionoideae)	Giesta	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-7	Micro.	Arbusto	Z5	C1(grupo)
<i>Dais cotinifolia</i> L.	Thymelaeaceae		Áfricotropical	Perenifólio	1-12	11-2; 7-8	Micro.	Arbusto	Z10	C1(1)
<i>Delonix regia</i> (Bojer) Raf.	Leguminosae (Caesalpinioideae)	Acácia-rubra	Áfricotropical	Caducifólio	6-3	Não floriu*	Micro.	Árvore	Z11	C1(2), C4(3), C11(2)
<i>Dendranthema pacificum</i> (Nak.) Kitam	Compositae		Paleártico	Perenifólio	1-12	10-12	Caméfito	Herbácea	Z7	C4 (grupo)
<i>Dianella caerulea</i> Sims.	Liliaceae (Phormiaceae)		Australiano; Oceânia	Perenifólio	1-12	5-7	Hemi.	Herbácea	Z9	C1(1)
<i>Dietes iridioides</i> (L.) Klatt.	Iridaceae		Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-5	Geófito	Herbácea	Z9	C1 (grupo)
<i>Dioon edule</i> Lindley	Zamiaceae		Neártico	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Nano.	Árvore	Z10	C1(1)
<i>Distictis buccinatoria</i> (DC.) A. Gentry	Bignoniaceae	Dedos-de- senhora	Neotropical	Perenifólio	1-12	3-11	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z11	C2(grupo)
<i>Dombeya cacuminum</i> Hochr..	Sterculiaceae	Dombeia; Aurora	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-4	Micro.	Árvore	Z10	C1(1), C4(5)
<i>Dombeya wallichii</i> (Lindl.) B. D. Jackson	Sterculiaceae	Dombeia; Aurora	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	12-2	Micro.	Árvore	Z10	C1(1), C4(2), C5(1), C6(1)
<i>Doranthos palmeri</i> W. Hill.	Agavaceae	Dorantes	Australiano	Perenifólio	1-12	3-6	Hemi.	Herbácea	Z10	C1(2), C2(7)
<i>Dovyalis caffra</i> (Hook. f. & Harv.) Hook. F.	Flacourtiaceae		Áfricotropical	Perenifólio	1-12	10-11	Micro.	Arbusto	Z9	C1(1)
<i>Dracaena draco</i> L. ssp. <i>draco</i>	Agavaceae	Dragoeiro	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-6	Micro.	Árvore	Z11	C1(6), C2(4), C3(1), C8(20), C9(1), C10(3)
<i>Dracaena marginata</i> Lam.	Agavaceae	Dracena	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu**	Micro.	Arbusto	Z11	C1(3)
<i>Duranta erecta</i> L.	Verbenaceae	Duranta	Neotropical	Perenifólio	1-12	7-1	Micro.	Arbusto	Z10	C6(2), C7(4)
<i>Echinocactus grusonii</i> Hildm.	Cactaceae	Almofada-de- sogra	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-8	Caméfito	Herbácea suculenta	Z9	C1(2)
<i>Echium nervosum</i> Dryand.	Boraginaceae	Massaroco	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-6	Nano.	Arbusto	Z11	C1(grupo), C6(3), C8(1),
<i>Echium plantagineum</i> L.	Boraginaceae	Invejosa	Paleártico	Perenifólio	1-12	2-6	Nano.	Herbácea	Z9	C1, C4 (grupo)
<i>Elaeagnus pungens</i> Thunb.	Elaeagnaceae		Paleártico	Perenifólio	1-12	9-10	Micro.	Arbusto	Z7	C1(2), C4(3)
<i>Elaeagnus umbellata</i> Thunb.	Elaeagnaceae	Groselheira	Paleártico	Caducifólio	3-12	3-8	Micro.	Arbusto	Z7	C4(8), C6(1)
<i>Emilia coccinea</i> (Sims) D. Don.	Compositae	Emilia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Herbácea	Z11	C1(grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Encephalartos lehmannii</i> Lehm.	Zamiaceae	Cica; Encefalartos	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	5-11	Nano.	Árvore	Z9	C1(1)
<i>Encephalartos transvenosus</i> Stapf & Burt Davy.	Zamiaceae	Cica; Encefalartos	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	5-11	Micro.	Árvore	Z9	C10(1)
<i>Ensete ventricosum</i> (Welw.) E.E. Cheesm.	Musaceae	Bananeira-da-abissínia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Terófito	Herbácea	Z10	C1(1)
<i>Epidendrum ibaguense</i> HBK	Orchidaceae	Orquídea-de-cruz	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C1(grupo)
<i>Epipremnum aureum</i> (Lind. & André)	Araceae		Oceânia	Perenifólio	1-12	6-8	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z10	C1(1)
<i>Eranthemum pulchellum</i> André	Acanthaceae	Salva-azul	Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C1(1)
<i>Erica arborea</i> L.	Ericaceae	Urze-arbórea; Urze-molar; Betouro	Paleártico	Perenifólio	1-12	12-4	Micro.	Arbusto	Z8	C1(grupo)
<i>Erica platycodon</i> (Webb & Berthel.) Rivas Mart. & al. <i>ssp. madericola</i> (D. C. McClint.) Rivas Mart. & al.	Ericaceae	Urze-das-vassouras; Urze-durázia	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-6	Micro.	Arbusto	Z10	C1(grupo)
<i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl.	Rosaceae	Nespereira	Paleártico	Perenifólio	1-12	10-12	Micro.	Árvore	Z8	C1(2)
<i>Eriocephalus africanus</i> L.	Compositae	Alecrim-da- virgem;	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-1	Nano.	Arbusto	Z9	C4(grupo)
<i>Erythrina abyssinica</i> Lam. ex DC.	Leguminosae (Papilionoideae)	Coralina-da-abissínia	Áfricotropical	Caducifólio	5-1	1-6; 9-10	Micro.	Árvore	Z10	C4(2), C7(1)
<i>Erythrina atitlanensis</i> Krukoff & Bameby	Leguminosae (Papilionoideae)	Coralina	Neotropical	Marcescente	3-2 (12-2)	12-2	Micro.	Árvore	Z10	C4(2)
<i>Erythrina crista-galli</i> L.	Leguminosae (Papilionoideae)	Coraleira; Coralina-crista-de-galo	Neotropical	Marcescente	4-3 (12-3)	4-1	Micro.	Árvore	Z8	C1(1), C4(3), C6(1)
<i>Erythrina falcata</i> Lour.	Leguminosae (Papilionoideae)	Coralina-falcata	Neotropical	Marcescente	6-5 (1-5)	2-6	Micro.	Árvore	Z10	C4(1), C6(1)
<i>Erythrina lysistemon</i> Hutch.	Leguminosae (Papilionoideae)	Coralina	Áfricotropical	Marcescente	5-4 (12-4)	12-5	Micro.	Árvore	Z10	C4(1), C6(1)
<i>Erythrina speciosa</i> Andrews	Leguminosae (Papilionoideae)	Coralina-elegante	Neotropical	Caducifólio	4-11	12-4	Micro.	Árvore	Z10	C1(1), C4(2), C5(2)
<i>Escallonia bifida</i> Link & Otto	Grossulariaceae	Escalónia	Neotropical	Perenifólio	1-12	3-12	Micro.	Arbusto	Z9	C5(2)
<i>Escallonia rosea</i> Griseb.	Grossulariaceae	Escalónia-cor-de-rosa	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-1	Micro.	Arbusto	Z9	C4(1)
<i>Etlingera elatior</i> (Jack) Rosemary M. Sm.	Zingiberaceae	Bastão-do-imperador; Rosa-de-porcelana; Gingibre-tocha	Indomalaio	Perenifólio	1-12	2-10	Hemi.	Herbácea	Z12	C1 (grupo)
<i>Eucalyptus camaldulensis</i> Dehnh.	Myrtaceae	Eucalipto	Australiano	Perenifólio	1-12	9-11	Meso.	Árvore	Z9	C1(1)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Eucalyptus ficifolia</i> F. Muell.	Myrtaceae	Eucalipto-de-flor-vermelha	Australiano	Perenifólio	1-12	1-12	Meso.	Árvore	Z9	C4(2)
<i>Eucalyptus gunni</i> Hook.	Myrtaceae	Eucalipto	Australiano	Perenifólio	1-12	11-2	Micro.	Árvore	Z8	C5(1)
<i>Eucalyptus orbifolia</i> F. Muell.	Myrtaceae	Eucalipto-de-folha-redonda	Australianao	Perenifólio	1-12	7-1	Micro.	Árvore	Z10	C1(1), C4(2)
<i>Eucalyptus pruinosa</i> Schaner	Myrtaceae	Eucalipto	Australiano	Perenifólio	1-12	11-1	Micro.	Árvore	Z9	C4(1)
<i>Eucomis comosa</i> (Houtt.) Wehrh.	Liliaceae (Hyacinthaceae)	Flor-ananás	Áfricotropical	Sazonal	6-10	7-8	Geófita	Herbácea	Z8	C1(2)
<i>Eugenia uniflora</i> L.	Myrtaceae	Pitangueira	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Árvore	Z10	C1(4)
<i>Euonymus fortunei</i> (Turcz) Hand.- Mazz	Celastraceae	Verdegaio	Paleártico	Perenifólio	1-12	7-8	Micro.	Arbusto	Z5	C1(1)
<i>Euphorbia canariensis</i> L.	Euphorbiaceae	Eufórbia-das-canárias	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-8	Micro.	Arbusto suculento	Z11	C1(3), C2(2)
<i>Euphorbia candelabrum</i> Kotschy	Euphorbiaceae		Áfricotropical	Perenifólio	1-12	12-2	Micro.	Arbusto suculento	Z9	C1(2), C2(3)
<i>Euphorbia cotinifolia</i> L.	Euphorbiaceae	Eufórbia	Neotropical	Caducifólio	3-12	7-11	Micro.	Árvore	Z11	C1(2), C4(2)
<i>Euphorbia grandicornis</i> Goebel.	Euphorbiaceae	Eufórbia-grande-cornuda	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	12-2	Nano.	Arbusto suculento	Z9	C1(grupo)
<i>Euphorbia ingens</i> E. Mey.	Euphorbiaceae	Eufórbia-gigante	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	10-12	Micro.	Arbusto suculento	Z9	C1(1)
<i>Euphorbia milii</i> Desmoul.	Euphorbiaceae	Mira-mira-não-me-toques	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C1(1)
<i>Euphorbia nerifolia</i> L.	Euphorbiaceae	Eufórbia	Indomalaio; Oceânia	Perenifólio	1-12	3-7	Micro.	Arbusto suculento	Z10	C1(4)
<i>Euphorbia piscatoria</i> Ait.	Euphorbiaceae	Figueira-do-inferno	Paleártico	Caducifólio	9-6	4-6	Micro.	Arbusto suculento	Z10	C1(grupo)
<i>Euphorbia pulcherrima</i> Willd. ex Klotzsch.	Euphorbiaceae	Manhã-de-páscoa	Neotropical	Caducifólio	5-2	10-3	Micro.	Arbusto	Z10	C5(4), C6(1), C4(12)
<i>Euphorbia trigona</i> Mill.	Euphorbiaceae	Eufórbia	Africotropical	Perenifólio	1-12	6-8	Micro.	Arbusto suculento	Z10	C1(4)
<i>Euryops chrysanthemoides</i> (DC.) R. Nordenstam	Compositae	Estrelaira-amarela	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z9	C1(grupo)
<i>Euryops pectinatus</i> Cass.	Compositae	Estrelaira-amarela	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z9	C5(2), C4(3)
<i>Farugium japonicum</i> (L.) Kitam.	Compositae	Patás-de-cavalo; Boinas	Paleártico	Perenifólio	1-12	9-2	Hemi.	Herbácea	Z7	C1(grupo)
<i>Fatsia japonica</i> (Thunb.) Decne. & Planch.	Araliaceae	Fátsia; Arália	Paleártico	Perenifólio	1-12	11-12	Micro.	Arbusto	Z8	C1(1)
<i>Felicia amelloides</i> (L.) Voss.	Compositae	Felícia; Margarida-azul	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z9	C1(grupo)
<i>Festuca glauca</i> Vill.	Gramineae	Festuca	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-6	Hemi.	Herbácea	Z3	C1(grupo)
<i>Ficus aspera</i> Forst. f.	Moraceae	Figueira-palhaço	Oceânia	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Árvore	Z11	C1(1)
<i>Ficus benjamina</i> L.	Moraceae	Figueira-da-india	Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-4	Micro.	Árvore	Z11	C1(1)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Ficus binnendykii</i> (Miq.) Miq.	Moraceae	Figueira-de-folha-estreita	Indomalaio	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Micro.	Árvore	Z11	C5(1)
<i>Ficus carica</i> L.	Moraceae	Figueira	Paleártico	Caducifólio	4-12	6-7	Micro.	Árvore	Z8	C1(1)
<i>Ficus elastica</i> Roxb. ex Homem	Moraceae	Borracheira	Indomalaio	Perenifólio	1-12	5-8	Micro.	Árvore	Z11	C4(1), C8(1)
<i>Ficus lyrata</i> Warb.	Moraceae		Áfricotropical	Perenifólio	1-12	4-6	Micro.	Árvore	Z11	C1(1)
<i>Ficus pumila</i> L.	Moraceae	Pastinha	Indomalaio; Paleártico	Perenifólio	1-12	10-12	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z8	C6(muro)
<i>Frangula azorica</i> V. Grubow	Rhamnaceae	Ginjeira-brava; Tintureira	Paleártico	Caducifólio	2-10	5-7	Micro.	Árvore	Z9	C1(2)
<i>Fuchsia triphylla</i> L.	Onagraceae	Mimos; Brincos-de-princesa	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z11	C1(grupo)
<i>Furcraea foetida</i> (L.) Haw.	Agavaceae	Furcreia; Piteira	Neotropical	Perenifólio	1-12	9-12	Hemi.	Herbácea suculenta	Z10	C1(2)
<i>Furcraea selloa</i> K. Koch. var. <i>marginata</i>	Agavaceae	Furcreia; Piteira	Neotropical	Perenifólio	1-12	8-12	Micro.	Árvore suculenta	Z10	C2(2)
<i>Garcinia xanthochymus</i> Hook. f. ex Anderson	Guttiferae	Garcinia; Mangostão	Indomalaio	Perenifólio	1-12	6-7	Micro.	Árvore	Z11	C1(1)
<i>Gazania rigens</i> (L.) Gaertn.	Compositae	Gazania	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z9	C1, C4, C6 (grupo)
<i>Genista tenera</i> (Jacq. Ex Murr.) O. Kuntze	Leguminosae (Papilionoideae)	Piomo	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-7	Nano.	Arbusto	Z10	C1(3)
<i>Geranium robertianum</i> L.	Geraniaceae	Erva-de-são-roberto	Paleártico; Neártico	Perenifólio	1-12	3-9	Hemi.	Herbácea	Z6	C1 (grupo)
<i>Ginkgo biloba</i> L.	Gingkoaceae	Ginco; Árvore-avenca	Paleártico	Caducifólio	4-1	5	Micro.	Árvore	Z4	C1(1)
<i>Globularia salicina</i> Lam.	Globulariaceae	Globulária; Malfurada	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-8	Nano.	Arbusto	Z11	C1(3)
<i>Glottiphyllum fragrans</i> (Salm-Dyck) Schwantes	Aizoaceae		Áfricotropical	Perenifólio	1-12	4-7	Caméfita	Herbácea suculenta	Z9	C1(grupo)
<i>Grevillea rosmarinifolia</i> A. Cunn.	Proteaceae	Grevillea	Australiano	Perenifólio	1-12	11-5	Nano.	Arbusto	Z8	C4(1)
<i>Greyia radlkoferi</i> Szyszyl.	Greyiaceae	Limpa-garrafas-do-transval	Áfricotropical	Marcescente	5-4 (1-4)	2-5	Micro.	Árvore	Z9	C1(1), C4(1)
<i>Guzmania musaica</i> (Lind. & André) Mez.	Bromeliaceae	Gusmânia	Neotropical	Perenifólio	1-12	10-2	Hemi.	Herbácea	Z11	C1 (grupo)
<i>Hebe salicifolia</i> (Forst. f.) Pennell	Scrophulariaceae	Verónica	Neotropical; Antártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z7	C1(1), C4(4)
<i>Hebe speciosa</i> (A. Cunn.) Ckn. & Allan.	Scrophulariaceae	Verónica	Antártico	Perenifólio	1-12	4-10	Nano.	Arbusto	Z9	C1(grupo)
<i>Hebe x franciscana</i> (Eastw.) Souster.	Scrophulariaceae	Verónica	Hortícola	Perenifólio	1-12	5-12	Nano.	Arbusto	Z8	C1 (grupo)
<i>Heberdenia excelsa</i> (Ait.) Banks ex DC	Myrsinaceae	Ademo	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-6	Micro.	Árvore	Z10	C1(1)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Hedera helix</i> L.	Araliaceae	Hera	Paleártico	Perenifólio	1-12	9-10	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z5	C6(muro)
<i>Helichrysum foetidum</i> (L.) Cass.	Compositae	Traqueiro	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	5-10	Terófito	Herbácea	Z9	C1(grupo)
<i>Heliconia bihai</i> (L.) L.	Heliconiaceae	Helicónia	Neotropical	Perenifólio	1-12	7-11	Hemi.	Herbácea	Z11	C1, C8, C9 (grupo)
<i>Heimerocallis dumortieri</i> E. Morr.	Liliaceae (Heimerocallidaceae)	Heimerocalis; Lírio-dum-dia	Paleártico	Perenifólio	1-12	6-10	Geófito	Herbácea	Z5	C1(grupo)
<i>Heimerocallis fulva</i> L.	Liliaceae (Heimerocallidaceae)	Heimerocalis; Lírio-dum-dia	Paleártico	Perenifólio	1-12	6-10	Geófito	Herbácea	Z5	C1(grupo)
<i>Heterocentron macrostachium</i> Naud.	Melastomataceae	Heterocentro	Neotropical	Perenifólio	1-12	10-4	Nano.	Arbusto	Z10	C1(1)
<i>Hibbertia scandens</i> (Willd.) Dryand.	Dilleniaceae	Hibértia	Australiano	Perenifólio	1-12	3-8	Fane.trep.	Arbusto trepador	Z9	C1(1)
<i>Hibiscus arnottianus</i> A. Gray.	Malvaceae	Hibisco	Oceânia	Perenifólio	1-12	6-10	Micro.	Arbusto	Z10	C1(1)
<i>Hibiscus calyphyllus</i> Cav.	Malvaceae	Hibisco-amarelo	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	5-10	Micro.	Arbusto	Z10	C1(1)
<i>Hibiscus elatus</i> Swartz	Malvaceae	Hibisco-arbóreo	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Árvore	Z10	C1(1), C4(1)
<i>Hibiscus hastatus</i> L. f.	Malvaceae	Hibisco	Oceânia	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Árvore	Z11	C4(3)
<i>Hibiscus mutabilis</i> L.	Malvaceae	Rosa-de-algodão	Paleártico	Perenifólio	1-12	6-11	Micro.	Arbusto	Z8	C1(3), C4(6), C6(4)
<i>Hibiscus rosa-sinensis</i> L.	Malvaceae	Cardeais; Hibiscos; Rosa-da-china	Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C1, C4, C5, C7, C8, C11 (grupo)
<i>Hibiscus tiliaceus</i> L.	Malvaceae	Hibisco	Neotropical; Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Árvore	Z10	C4(2)
<i>Holmskioldia sanguinea</i> Retz.	Verbenaceae	Chapéus-de- mandarim; Chapéus- chineses	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C4(10), C5(1)
<i>Hovenia dulcis</i> Thynb.	Rhamnaceae	Hovénia	Paleártico	Caducifólio	3-11	9-10	Micro.	Árvore	Z8	C1(1)
<i>Howea forsteriana</i> (C. Moore & F. Muell.) Becc.	Palmae	Quência	Australiano	Perenifólio	1-12	1-9	Micro.	Árvore	Z10	C1(2), C3(5), C10(3)
<i>Hydrangea macrophylla</i> (Thunb.) Ser.	Hydrangeaceae	Hortênsias; Novelos	Paleártico	Caducifólio	3-12	5-10	Nano.	Arbusto	Z6	C1, C4 (grupo)
<i>Hymenocallis littoralis</i> (Jacq.) Salisb.	Amaryllidaceae	Lírio-aranha	Neotropical	Perenifólio	1-12	9-11	Geófito	Herbácea	Z10	C1(grupo)
<i>Hymenosporum flavum</i> (Hook.) F. Muell.	Pittosporaceae	Himenosporó	Australiano	Perenifólio	1-12	3-8	Micro.	Árvore	Z9	C4(1), C11(1)
<i>Ilex aquifolium</i> L.	Aquifoliaceae	Azevinho- comum; Azevinho- inglês	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-6	Micro.	Árvore	Z6	C1(1)
<i>Ilex canariensis</i> Poir.	Aquifoliaceae	Azevinho-da- rocha	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-6	Micro.	Árvore	Z10	C1(1)
<i>Ilex perado</i> Ait.	Aquifoliaceae	Perado	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-6	Micro.	Árvore	Z10	C1(1)
<i>Lochroma grandiflora</i> Benth..	Solanaceae	Iocroma	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-8	Micro.	Arbusto	Z9	C4(1)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Ipomoea alba</i> L.	Convolvulaceae	Campainhas	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-10	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z10	C1(grupo)
<i>Ipomoea batatas</i> (L.) Poir.	Convolvulaceae	Batata-doce	Neotropical; Oceânia	Perenifólio	1-12	6-10	Geófito	Herbácea trepadora	Z9	C1(grupo)
<i>Ipomoea indica</i> (Burm.) Merrill	Convolvulaceae	Campainhas	Neotropical; Áfricotropical; Indomalaio; Oceânia	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z10	C1(grupo)
<i>Iresine herbstii</i> Hook.	Amaranthaceae	Iresine	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Caméfito	Herbácea	Z10	C1(grupo)
<i>Isatis tinctoria</i> L.	Cruciferae	Pastel	Paleártico	Perenifólio	1-12	12-7	Terófito	Herbácea	Z7	C1(grupo)
<i>Jacaranda mimosifolia</i> D. Don.	Bignoniaceae	Jacarandá	Neotropical	Caducifólio	5-2	4-6; 9-10	Meso.	Árvore	Z9	C4(1)
<i>Jasminum humile</i> L.	Oleaceae	Jasmineiro- amarelo	Paleártico; Indomalaio	Perenifólio	1-12	5-7	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z8	C1(1)
<i>Jasminum mesnyi</i> Hance.	Oleaceae	Jasmineiro- amarelo	Paleártico	Perenifólio	1-12	12-6	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z8	C4(1), C6(grupo)
<i>Jasminum polyanthum</i> Franch.	Oleaceae	Jasmineiro; Jasmim-dos- poetas	Paleártico	Perenifólio	1-12	2-6	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z8	C1(2)
<i>Jatropha curcas</i> L.	Euphorbiaceae	Jatrofa	Neotropical;	Caducifólio	5-1	6-7	Micro.	Árvore	Z10	C1(1)
<i>Juniperus cedrus</i> Webb. & Berthel. ssp. <i>maderensis</i> (Menezes) Rivas Mart. & al.	Cupressaceae	Cedro-da- madeira	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-3	Micro.	Árvore	Z10	C1(13)
<i>Juniperus phoenicea</i> L.	Cupressaceae	Zimbreiro	Paleártico	Perenifólio	1-12	12-2	Micro.	Árvore	Z9	C1(2)
<i>Justicia adhatoda</i> L.	Acanthaceae		Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C1(1), C4(1)
<i>Justicia carnea</i> Lindl.	Acanthaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	5-10	Nano.	Arbusto	Z12	C6(1)
<i>Kalanchoe blossfeldiana</i> Poelln.	Crassulaceae		Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto suculento	Z11	C1(grupo)
<i>Kalanchoe fedtschenkoi</i> Hamet & Perrier.	Crassulaceae		Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-8	Caméfito	Arbusto suculento	Z11	C1(grupo)
<i>Kalanchoe pubescens</i> R. Br. ex Oliver	Crassulaceae		Áfricotropical	Perenifólio	1-12	2-5	Caméfito	Herbácea suculenta	Z11	C1, C2 (grupo)
<i>Kigelia africana</i> (Lam.) Benth.	Bignoniaceae	Árvore-das- salsichas	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	5-7	Micro.	Árvore	Z10	C1(1)
<i>Kniphofia uvaria</i> (L.) Oken.	Liliaceae (Aloaceae)	Foguetes	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	6-8	Hemi.	Herbácea	Z9	C1, C4, C5 (grupo)
<i>Kniphofia x praecox</i> Bak.	Liliaceae (Aloaceae)	Foguetes	Hortícola	Perenifólio	1-12	11-2	Hemi.	Herbácea	Z9	C1, C4 (grupo)
<i>Lagerstroemia indica</i> L.	Lythraceae	Laguerestré-mia; Flor-de- merenda; Suspiros	Paleártico; Indomalaio	Caducifólio	3-11	7-9	Micro.	Árvore	Z7	C1(3)
<i>Lagunaria patersonii</i> (Anderss) G. Don.	Malvaceae	Lagunária	Australiano	Perenifólio	1-12	5-7	Micro.	Árvore	Z10	C1(1)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Lampranthus aurantiacus</i> (DC.) Swantes	Aizoaceae (Mesembryanthemaceae)	Lamprantos	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	4-12	Fane. trep.	Arbusto trepador e suculento	Z11	C1(grupo)
<i>Lampranthus roseus</i> (Willd.) Schwantes	Aizoaceae (Mesembryanthemaceae)	Lamprantos	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	4-12	Fane. trep.	Arbusto trepador e suculento	Z11	C6, C8 (grupo)
<i>Lampranthus spectabilis</i> (Haw.) N.E. Br.	Aizoaceae (Mesembryanthemaceae)	Lamprantos	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Arbusto trepador e suculento	Z11	C6(grupo)
<i>Lantana camara</i> L.	Verbenaceae	Lantana	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C4, C5 (grupo)
<i>Lantana montevidensis</i> (Spreng.) Briq.	Verbenaceae	Lantana	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C1(grupo)
<i>Laurus novocanariensis</i> Rivas Mart. & al.	Lauraceae	Loureiro	Paleártico	Perenifólio	1-12	11-3	Meso.	Árvore	Z10	C1(5)
<i>Lavandula angustifolia</i> Mill.	Labiatae	Alfazema	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z6	C1(grupo)
<i>Lavandula pinnata</i> L. f.	Labiatae	Alfazema	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z11	C1(grupo)
<i>Leonotis leonurus</i> (L.) R. Br.	Labiatae	Rabos-de-leão; Orelhas-de-leão	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	3-11	Nano.	Arbusto	Z9	C1(5), C4(2), C6(3)
<i>Leptospermum scoparium</i> Forst. & Forst.	Myrtaceae	Leptospermo; Urze-de-jardim	Australiano; Antártico	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z8	C4(2)
<i>Leucadendron salignum</i> Bergius x <i>L. lauroleum</i> (Lam.) Fourc.	Proteaceae	Safari-sunset	Hortícola	Perenifólio	1-12	11-2	Micro.	Arbusto	Z9	C4(1)
<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) De Wit.	Leguminosae (Mimosoideae)	Aroma-branco; Leucena	Neártico	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z9	C4(1)
<i>Leucanthemum x superbum</i> (J. Ingram) Bergmans ex Kent	Compositae	Estrelas	Hortícola	Perenifólio	1-12	5-8	Nano.	Herbácea	Z5	C1(grupo)
<i>Ligustrum lucidum</i> Ait. f.	Oleaceae	Ligustro; Alfinheiro	Paleártico	Perenifólio	1-12	6-9	Micro.	Árvore	Z7	C5(1)
<i>Ligustrum obtusifolium</i> Sieb. & Zucc.	Oleaceae	Ligustro; Alfeneiro; Alfenheiro	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-6; 11-12	Micro.	Arbusto	Z3	C1, C2, C11 (sebe)
<i>Ligustrum sinense</i> Lour.	Oleaceae	Ligustro-da-china; Alfenheiro; Alfena	Paleártico	Perenifólio	1-12	6-8	Micro.	Arbusto	Z7	C1(1)
<i>Litchi chinensis</i> Sonn.	Sapindaceae	Lichia	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-6	Micro.	Árvore	Z10	C1(1)
<i>Livistona australis</i> (R. Br.) Mart.	Palmae	Palmeira-de- leque-da-austrália	Australiano	Perenifólio	1-12	4-5	Meso.	Árvore	Z9	C1(6), C2(2)
<i>Livistona chinensis</i> (Jacq.) R. Br. ex Mart.	Palmae	Palmeira-de- leque-da-china	Paleártico	Perenifólio	1-12	2-5	Meso.	Árvore	Z9	C1(4)
<i>Lonchocarpus sericeus</i> (Poir.) Kunth ex DC.	Leguminosae (Papilionoideae)	Loncocarpus	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-1	Meso.	Árvore	Z10	C1(1)
<i>Lonicera hildebrandiana</i> Collett & Hemsl	Caprifoliaceae	Madressilva- gigante	Paleártico; Indomalaio	Perenifólio	1-12	4-7	Fane.trep.	Arbusto trepador	Z9	C1(1)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Lonicera japonica</i> Thunb.	Caprifoliaceae	Madressilva	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-11	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z4	C1(1)
<i>Lotus glaucus</i> Aiton	Leguminosae	Trevina	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-5	Caméfito	Herbácea	Z11	C1(grupo)
<i>Lycianthes rantonnetii</i> Carr.	Solanaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z9	C4(1)
<i>Macadamia integrifolia</i> Maid. & Betch.	Proteaceae	Macadâmia	Australiano	Perenifólio	1-12	2-5	Micro.	Árvore	Z9	C1(2)
<i>Maclura pomifera</i> (Raf.) C. K. Schneid.	Moraceae		Neártico	Caducifólio	3-12	6-8	Micro.	Árvore	Z7	C1(1)
<i>Magnolia grandiflora</i> L.	Magnoliaceae	Magnólia	Neártico	Perenifólio	1-12	5-8	Micro.	Árvore	Z6	C1(1), C4(2)
<i>Magnolia x soulangiana</i> Soul. -Bod.	Magnoliaceae	Magnólia	Hortícola	Caducifólio	3-12	1-3	Micro.	Árvore	Z5	C1(2)
<i>Malpighia glabra</i> L.	Malpighiaceae	Acerola; Cereja-das- antilhas	Neotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Nano.	Arbusto	Z10	C1(1)
<i>Malus floribunda</i> Van Houtte	Rosaceae	Macieira-do-japão	Paleártico	Caducifólio	3-12	4-5	Micro.	Árvore	Z4	C1(1)
<i>Malvaviscus arboreus</i> Cav.	Malvaceae	Malvavisco	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z9	C1(3), C4(4), C6(2), C11(1)
<i>Mandevilla boliviensis</i> (Hook. f.) Woodson	Apocynaceae	Dipladénia- branca	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	C1(1)
<i>Mandevilla splendens</i> (Hook. f.) Woodson	Apocynaceae	Dipladénia-rosa	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	C1(1)
<i>Mangifera indica</i> L.	Anacardiaceae	Mangueiro	Indomalaio	Perenifólio	1-12	11-6	Micro.	Árvore	Z11	C1(1)
<i>Manihot esculenta</i> Crantz.	Euphorbiaceae	Mandioca	Neotropical	Caducifólio	3-12	6-8	Micro.	Arbusto	Z10	C1(2)
<i>Marcetella maderensis</i> (Bomm.) Svent.	Rosaceae	Marcetela	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-6	Nano.	Arbusto	Z10	C1(3)
<i>Markamia lutea</i> (Benth.) Schum.	Bignoniaceae	Marcâmia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Meso.	Árvore	Z11	C1(1), C4(2)
<i>Matthiola maderensis</i> Lowe	Cruciferae	Goivo-da- rocha	Paleártico	Sazonal	2-8	4-7	Terófito	Herbácea	Z10	C1(grupo)
<i>Maytenus umbellata</i> (R. Br.) Mabb.	Celastraceae	Buxo-da- rocha	Paleártico	Perenifólio	1-12	8-9	Micro.	Arbusto	Z11	C1(3)
<i>Medinilla myriantha</i> Merr.	Melastomataceae	Medinila	Indomalaio	Perenifólio	1-12	6-10	Nano.	Arbusto	Z11	C1(1)
<i>Melaleuca armilaris</i> (Sol. ex Gaertn.) Sm.	Myrtaceae	Melaleuca	Australiano	Perenifólio	1-12	3-5	Micro.	Árvore	Z9	C1(2), C4(25), C5(2), C6(5), C8(3)
<i>Melaleuca diosmifolia</i> Andrews	Myrtaceae	Melaleuca	Australiano	Perenifólio	1-12	4-8	Micro.	Arbusto	Z9	C1(1)
<i>Melaleuca hypericifolia</i> Sm.	Myrtaceae	Melaleuca-folha- de-hipericão	Australiano	Perenifólio	1-12	4-9	Micro.	Arbusto	Z9	C6(1), C8(1)
<i>Melia azedarach</i> L.	Meliaceae	Amargoseira; Mélia; Conteira; Lilás-da-índia	Paleártico; Indomalaio	Caducifólio	4-1	4-6	Micro.	Árvore	Z10	C1(1), C4(4), C5(9), C6(9)
<i>Melianthus major</i> L.	Melanthaceae	Meliantos	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	3-5	Micro.	Arbusto	Z9	C1(1), C4(1), C5(2), C6(3)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Metrosideros excelsa</i> Sol. ex Gaertn.	Myrtaceae	Metrosídero; Árvore-de-natal- da-nova-zelândia	Antártico	Perenifólio	1-12	6-7	Meso.	Árvore	Z10	C1(1), C4(3), C6(1)
<i>Monizia edulis</i> Lowe	Umbelliferae	Cenoura-da- rocha; Nozelha	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-5	Nano.	Herbácea	Z10	C1(3)
<i>Monstera deliciosa</i> Liebm.	Araceae	Fruto-delicioso; Costela-de-adão	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z10	C1(1)
<i>Montanoa bipinnatifida</i> (Kunth) K. Kock	Compositae	Malmequer- arbóreo	Neotropical	Perenifólio	1-12	11-5	Micro.	Arbusto	Z10	C1(3), C4(1), C5(1), C6(1), C8(2)
<i>Morus alba</i> L.	Moraceae	Amoreira	Paleártico	Caducifólio	3-12	4-5	Micro.	Árvore	Z5	C1(2)
<i>Musa acuminata</i> Colla	Musaceae	Bananeira	Indomalaio; Australianao	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C3 (grupo)
<i>Musa acuminata</i> L. A. Colla ssp. <i>zebrina</i> (L. B. van Houtte) R. E. Nasution	Musaceae	Bananeira- zebrina	Indomalaio; Australianao	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C1, C2, C3 (grupo)
<i>Musa textilis</i> Née	Musaceae	Bananeira-de- manila	Indomalaio	Perenifólio	1-12	3-10	Hemi.	Herbácea	Z10	C1(grupo)
<i>Musa velutina</i> Wendl. & Drude.	Musaceae	Bananeira-de- jardim	Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z9	C1, C2, C10 (grupo)
<i>Musa x paradisiaca</i> L.	Musaceae	Bananeira-de- prata	Hortícola	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C1(grupo)
<i>Musschia aurea</i> (L. f.) Dumort.	Campanulaceae	Múchia-dourada	Paleártico	Perenifólio	1-12	6-8	Caméfito	Herbácea	Z11	C1(1)
<i>Myrciaria cauliflora</i> (DC.) O. Berg.	Myrtaceae	Jaboticaba	Neotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Micro.	Árvore	Z10	C1(1)
<i>Myrica faya</i> Ait.	Myricaceae	Faia-das-ilhas; Samouco	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-5	Micro.	Árvore	Z9	C1(16), C4(1)
<i>Neodypsis decaryi</i> Jumelle	Palmae	Palmeira- triangular	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	6-7	Micro.	Árvore	Z11	C10(1)
<i>Neoregelia carolinae</i> (Beer) L. B.	Bromeliaceae	Bromélia	Neotropical	Perenifólio	1-12	11-2	Hemi.	Herbácea	Z10	C1(grupo)
<i>Neoregelia johannis</i> (Carrière) L. B. Smith.	Bromeliaceae	Bromélia-ninho- de-passarinho	Neotropical	Perenifólio	1-12	8-1	Hemi.	Herbácea	Z10	C1(grupo)
<i>Neoregelia marmorata</i> (Baker) L. B. Smith.	Bromeliaceae	Bromélia-ninho- de-passarinho	Neotropical	Perenifólio	1-12	11-1	Hemi.	Herbácea	Z10	C1(grupo)
<i>Nepeta x faassenii</i> Bergmans ex Stearn.	Labiatae	Hortelã-de-gato	Hortícola	Perenifólio	1-12	6-9	Nano.	Herbácea	Z3	C1(grupo)
<i>Nephrolepis cordifolia</i> (L.) Presl.	Oleandraceae	Feto	Neotropical; Áfricotropical; Indomalaio; Oceânia; Australianao	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z10	C1(grupo)
<i>Nerium oleander</i> L.	Apocynaceae	Sevadilha; Loendro	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-11	Micro.	Arbusto	Z9	C1, C4, C5, C6, C8 (grupo), C7(3)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Nidularium fulgens</i> Lem.	Bromeliaceae	Bromélia	Neotropical	Perenifólio	1-12	2-7	Hemi.	Herbácea	Z10	C1(grupo)
<i>Nipidium crassifolium</i> (L.) Lellinger	Polypodiaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z10	C1(grupo)
<i>Nolina recurvata</i> (Lem.) Hemsl.	Agavaceae	Nolina; Pata-de-elefante	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-8	Micro.	Árvore	Z9	C1(7), C3(3)
<i>Notholaena marantae</i> (L.) Desv. ssp. <i>subcordata</i> (Cav.) G. Kunkel	Adiantaceae	Queilantes	Paleártico	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z10	C1(1)
<i>Ocotea foetens</i> (Aiton) Baill.	Lauraceae	Til	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Meso.	Árvore	Z10	C1 (33)
<i>Odontonema strictum</i> (Nees) Kuntze	Acanthaceae	Odontonema	Neotropical	Perenifólio	1-12	8-12	Nano.	Arbusto	Z10	C1(1), C4(2)
<i>Olea maderensis</i> (Lowe) Rivas Mart. & Del Arco	Oleaceae	Oliveira-brava; Oliveira-da-rocha; Zambujeiro	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-6	Micro.	Árvore	Z11	C1(2)
<i>Ophiopogon jaburan</i> (Kunth) Lodd	Liliaceae (Convallariaceae)	Relva-do-japão	Paleártico	Perenifólio	1-12	7-9	Hemi.	Herbácea	Z7	C1(grupo)
<i>Ophiopogon japonicus</i> (L. f.) Ker-Gawl	Liliaceae (Convallariaceae)	Relva-do-japão	Paleártico	Perenifólio	1-12	7-9	Hemi.	Herbácea	Z8	C4(mancha)
<i>Ophiopogon planiscapus</i> Nak.	Liliaceae (Convallariaceae)	Relva-preta-do-japão	Paleártico	Perenifólio	1-12	7-9	Hemi.	Herbácea	Z6	C18grupo)
<i>Opuntia tunicata</i> (Lehm.) Link & Otto.	Cactaceae	Cacto	Neártico	Perenifólio	1-12	5-7	Caméfito	Herbácea suculenta	Z9	C1(1)
<i>Ornithogalum thyrsoides</i> Jacq.	Liliaceae (Hyacinthaceae)	Torrões-de-açúcar	Áfricotropical	Sazonal	10-6	5-6	Geófita	Herbácea	Z9	C1(grupo)
<i>Osmanthus heterophyllus</i> (G. Don) P. Green	Oleaceae	Falso-azevinho	Paleártico; Indomalaio	Perenifólio	1-12	4-5	Micro.	Arbusto	Z7	C1(1)
<i>Osteospermum barberiae</i> (Harv.) Norl.	Compositae	Estrelas-do- cabo	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Caméfito	Arbusto	Z10	C5(grupo)
<i>Osteospermum ecklonis</i> (DC.) Norl.	Compositae	Estrelas-do- cabo	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Caméfito	Arbusto	Z10	C1, C5(grupo)
<i>Pachira insignis</i> (Sw.) Savigny	Bombacaceae	Paquira	Neotropical	Perenifólio	1-12	7-8	Micro.	Árvore	Z10	C1(2)
<i>Pandanus utilis</i> Bory	Pandanaceae	Pândano	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	9-3	Micro.	Árvore	Z10	C1(1), C3(1)
<i>Papaver rhoeas</i> L.	Papaveraceae	Papoila	Paleártico	Sazonal	4-8	5-8	Terófito	Herbácea	Z5	C1(grupo)
<i>Paspalum dilatatum</i> Poir.	Gramineae	Erva-rija; Erva-do-governo	Neotropical	Perenifólio	1-12	3-9	Hemi.	Herbácea	Z8	C2, C3 (tapete)
<i>Passiflora mollissima</i> (HBK.) L. H. Bail.	Passifloraceae	Maracujá-banana	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z8	C1(1)
<i>Pelargonium peltatum</i> (L.) L'Hérit.	Geraniaceae	Malvas	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z10	C1(grupo)
<i>Pelargonium zonale</i> (L.) L'Hérit	Geraniaceae	Malva	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C1, C6 (grupo)
<i>Pellaea rotundifolia</i> (Forst.f.) Hook.	Adiantaceae		Australiano; Antártico	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z9	C1(grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Pentas lanceolata</i> (Forssk.) Deflers.	Rubiaceae	Pentas	Áfricotropical; Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C1(grupo)
<i>Persea americana</i> Mill.	Lauraceae	Abacateiro	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-5	Micro.	Árvore	Z10	C1(1)
<i>Phlomis fruticosa</i> L.	Labiatae		Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z7	C4(1), C6(2)
<i>Phoenix canariensis</i> ex. Chabaud.	Palmae	Palmeira-das- canárias	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-3	Meso.	Árvore	Z11	C1(4)
<i>Phoenix dactylifera</i> L.	Palmae	Tamareira	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-3	Meso.	Árvore	Z11	C1(3), C2(1)
<i>Phoenix roebelinii</i> O'Brien.	Palmae	Palmeira-anã	Indomalaio	Perenifólio	1-12	5-7	Micro.	Árvore	Z11	C1(3), C2(2), C3(4), C10(4)
<i>Phormium tenax</i> Forst. & Forst. f.	Agavaceae	Espadana	Antártico	Perenifólio	1-12	6-8	Hemi.	Herbácea	Z8	C1(2)
<i>Photinia x fraseri</i> Dress	Rosaceae	Fotínia	Hortícola	Perenifólio	1-12	4-6	Micro.	Arbusto	Z8	C1(1)
<i>Phyllanthus tenellus</i> Roxb.	Euphorbiaceae	Quebra-pedra	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Herbácea	Z11	C1(grupo)
<i>Phyllis nobla</i> L.	Rubiaceae	Cabreira	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-7	Nano.	Arbusto	Z9	C1(2)
<i>Phyllostachis aurea</i> (Carr.) A. & C. Riv.	Gramineae	Bambu	Paleártico	Perenifólio	1-12	Não floriu**	Hemi.	Herbácea	Z6	C1, C2 (grupo)
<i>Phyllostachys nigra</i> (Lodd. Ex Lindl.) Munro	Gramineae	Bambu-negro	Paleártico	Perenifólio	1-12	Não floriu**	Hemi.	Herbácea	Z5	C1(grupo)
<i>Picconia excelsa</i> (Ait.) DC.	Oleaceae	Pau-branco	Paleártico	Perenifólio	1-12	2-5	Micro.	Árvore	Z10	C1(6)
<i>Pinus canariensis</i> C. Sm.	Pinaceae	Pinheiro-das- canárias	Paleártico	Perenifólio	1-12	2-4	Meso.	Árvore	Z10	C1(3), C4(1)
<i>Pinus pinaster</i> Ait.	Pinaceae	Pinheiro-marítimo	Paleártico	Perenifólio	1-12	2-4	Meso.	Árvore	Z8	C4(3)
<i>Pittosporum eugenioides</i> A. Cunn.	Pittosporaceae	Pitóspero	Antártico	Perenifólio	1-12	3-4	Micro.	Árvore	Z9	C1(1)
<i>Pittosporum tenuifolium</i> Banks & Sol.	Pittosporaceae	Pitóspero	Antártico	Perenifólio	1-12	4-5	Micro.	Árvore	Z9	C1(1)
<i>Pittosporum tobira</i> Ait.	Pittosporaceae	Tobira	Paleártico	Perenifólio	1-12	2-5	Micro.	Árvore	Z9	C1(2), C4(1)
<i>Plantago maderensis</i> Decne.	Plantaginaceae	Plantago-da- madeira	Paleártico	Perenifólio	1-12	2-5	Nano.	Arbusto	Z10	C1(grupo)
<i>Plantago major</i> L.	Plantaginaceae	Plantago-maior	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-8	Hemi.	Herbácea	Z6	C1(grupo)
<i>Platycerium bifurcatum</i> (Cav.) C. Chr.	Polypodiaceae	Feto-de-corno- de-veado	Indomalaio; Oceânia; Australiano	Perenifólio	1-12	-----	Epífita	Herbácea	Z9	C1(2)
<i>Plumbago auriculata</i> Lam.	Plumbaginaceae	Plúmbago	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z9	C2(1), C5(grupo)
<i>Plumeria rubra</i> L. var. <i>acutifolia</i> (Poir.) Woodson.	Apocynaceae	Planta-dos- dentes	Neotropical	Caducifólio	5-1	6-12	Micro.	Árvore	Z10	C1(1), C4(2)
<i>Polyandrococos caudescens</i> (Mart.) Barb. Rodr.	Palmae	Palmito- amargoso	Neotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Micro.	Árvore	Z10	C1(1)
<i>Polygala myrtifolia</i> L.	Polygalaceae	Polígala	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z9	C4(1)
<i>Polygonum aubertii</i> L. Henry	Polygonaceae	Manto-de-noiva	Paleártico	Caducifólio	6-2	7-2	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z4	C1(1)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Polyscias scutellaria</i> (Burm. f.) Fosb.	Araliaceae	Poliscias	Indomalaio; Oceânia	Perenifólio	1-12	Não floriu**	Micro.	Arbustoo	Z11	C1(1)
<i>Portulacaria afra</i> Jacq.	Portulacaceae	Portulacaria	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu**	Nano.	Arbusto suculento	Z9	C1(2)
<i>Pouteria sapota</i> (Jacq.) Moore & Stearn	Sapotaceae	Sapota	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-7	Micro.	Árvore	Z10	E19(1)
<i>Protea neriifolia</i> R. Br.	Proteaceae	Protea-de-folha – estreita; Protea-folha-de- loendro	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	11-2	Nano.	Arbusto	Z9	C1(1)
<i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb.	Rosaceae	Amendoeira	Paleártico	Caducifólio	3-12	2-3	Micro.	Árvore	Z6	C1(1)
<i>Prunus hixa</i> Willd.	Rosaceae	Gingeira Brava; Azereiro	Paleártico	Perenifólio	1-12	6-8	Meso.	Árvore	Z10	C1(2), C6(3)
<i>Psidium guajava</i> L.	Myrtaceae	Goiabeira	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-7	Micro.	Árvore	Z10	C1(3), C5(4)
<i>Psidium littorale</i> Raddi	Myrtaceae	Araçazeiro; Araçaleiro	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-7	Micro.	Árvore	Z10	C1(2)
<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn.	Dennstaedtiaceae	Feiteira	Paleártico; Neártico	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z4	C1, C5 (grupo)
<i>Pteris tremula</i> R. Br.	Pteridaceae	Feto	Australiano; Antártico; Oceânia; Áfricotropical	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z10	C1 (grupo)
<i>Pteris vittata</i> L.	Pteridaceae	Feto	Paleártico; Indomalaio; Australiano Oceânia	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z9	C1 (grupo)
<i>Punica granatum</i> L.	Punicaceae	Romãzeira	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-7	Micro.	Árvore	Z9	C1(2), C4(3)
<i>Pycnostachys urticifolia</i> Hook.	Labiatae		Áfricotropical	Perenifólio	1-12	11-3	Nano.	Arbusto	Z10	C1(2)
<i>Pyracantha angustifolia</i> (Franch.) Schneid.	Rosaceae	Perinhos; Sarça-ardente	Paleártico	Perenifólio	1-12	2-6	Micro.	Arbusto	Z7	C8(1)
<i>Pyrostegia venusta</i> (Ker- Gawl.) Miers	Bignoniaceae	Gaitinhas	Neotropical	Perenifólio	1-12	11-5	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	C1(grupo)
<i>Quercus ilex</i> L.	Fagaceae	Azinheta	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-5	Meso.	Árvore	Z7	C4(1)
<i>Quercus robur</i> L.	Fagaceae	Carvalho-roble	Paleártico	Caducifólio	2-11	3-5	Meso.	Árvore	Z6	C6(1)
<i>Quercus rubra</i> L.	Fagaceae	Carvalho- americano	Neártico	Caducifólio	4-11	4-5	Meso.	Árvore	Z3	C6(1)
<i>Radermachera sinica</i> (Hance) Hemsl.	Bignoniaceae	Árvore-serpente; Boneca-da-china	Indomalaio	Perenifólio	1-12	6-8	Micro.	Árvore	Z10	C1(1)
<i>Ravenala madagascariensis</i> Sonn.	Strelitziaceae	Ravenala; Árvore-do- viajante	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	2-10	Micro.	Árvore	Z11	C1(1), C3(1)
<i>Rhamnus glandulosa</i> Ait.	Rhamnaceae	Sanguinho	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-5	Micro.	Árvore	Z10	C1(1)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Rhapis excelsa</i> (Thunb.) Henry.	Palmae	Palmeira-de-hong-kong; Pameira-de-senhora	Paleártico	Perenifólio	1-12	6-9	Micro.	Arbusto	Z10	C1(1), C3(1), C10(1)
<i>Rhododendron mucronatum</i> G. Don.	Ericaceae	Azálea-japonesa	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z5	C1(grupo)
<i>Rhus coriaria</i> L.	Anacardiaceae	Sumagre	Paleártico	Caducifólio	4-1	7-8	Nano.	Arbusto	Z9	C4(2)
<i>Ricinus communis</i> L.	Euphorbiaceae	Ricino; Carrapateira	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z9	C1, C6 (grupo)
<i>Rondeletia amoena</i> (Planch.) Hemsl.	Rubiaceae	Rondeletia	Neotropical	Perenifólio	1-12	12-4	Micro.	Arbusto	Z10	C1(1)
<i>Rosa mandonii</i> Desegl.	Rosaceae	Roseira	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-7	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	C1(1)
<i>Rosmarinus officinalis</i> L.	Labiatae	Alecrim	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z6	C1(grupo)
<i>Ruellia makoyana</i> Hort. ex Barclay & F. T. Hubbard	Acanthaceae	Planta-veludo	Neotropical	Perenifólio	1-12	9-12	Nano.	Herbácea	Z10	C1(grupo)
<i>Rumex maderensis</i> Lowe	Polygonaceae	Azedas	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-8	Nano.	Herbácea	Z10	C1(grupo)
<i>Rumohra adiantiformis</i> (Forst. f.) Ching.	Dryopteridaceae	Feto-real	Áfricotropical; Australiano; Oceânia; Antártico; Neotropical	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z10	C1(grupo)
<i>Ruscus hypophyllum</i> L.	Liliaceae (Asparagaceae)	Ruscus	Paleártico	Perenifólio	1-12	11-12	Nano.	Herbácea	Z8	C1(grupo)
<i>Russelia equisetiformis</i> Scdl. & Cham.	Scrophulariaceae	Russélia ; Lágrimas-de-amor	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z9	C1(grupo)
<i>Ruta chapelensis</i> L.	Rutaceae	Arruda	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-9	Nano.	Arbusto	Z8	C1(grupo)
<i>Sabal palmetto</i> (Walt.) Lodd. ex Schult. & Schult. f.	Palmae	Palmeira-da-carolina	Neártico	Perenifólio	1-12	6-8	Micro.	Árvore	Z8	C3(1)
<i>Saccharum officinarum</i> L.	Gramineae	Cana-sacarina; Cana-de-açúcar	Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-3	Hemi.	Herbácea	Z9	C1(grupo)
<i>Salix babylonica</i> L.	Salicaceae	Salgueiro-chorão	Paleártico	Marcescente	1-12 (12-3)	3-5	Micro.	Árvore	Z4	C4(3), C6(1)
<i>Salix canariensis</i> C. Sm. ex Link	Salicaceae	Seixo; Seixeiro	Paleártico	Caducifólio	2-12	1-2	Micro.	Árvore	Z11	C1(1), C6(1)
<i>Salix x rubens</i> Schrank.	Salicaceae	Vimeiro	Hortícola	Marcescente	1-12 (12-3)	3-5	Micro.	Arbusto	Z4	C1(1)
<i>Salvia elegans</i> Vahl.	Labiatae	Sálvia	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Herbácea	Z8	C1(grupo)
<i>Salvia guaranitica</i> St.-Hil. ex Benth.	Labiatae	Sálvia	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z9	C1(grupo)
<i>Salvia involucrata</i> Cav.	Labiatae	Sálvia	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z9	C1(1)
<i>Salvia leucantha</i> Cav.	Labiatae	Sálvia-branca	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z9	C1, C4 (grupo)
<i>Salvia sessei</i> Benth.	Labiatae	Sálvia	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z9	C4(2)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Salvia splendens</i> Sell ex Roem. & Scult. cvs.	Labiatae	Camarões; Sálvia	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Herbácea	Z10	C1(grupo)
<i>Sambucus lanceolata</i> R. Br.	Caprifoliaceae	Sabugueiro-da-madeira	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-5	Micro.	Árvore	Z10	C1(1)
<i>Santolina chamaecyparissus</i> L.	Compositae	Santolina	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-8	Caméfito	Arbusto	Z7	C1, C4 (grupo)
<i>Satureja varia</i> (Benth) W. & B. ex Briq. ssp. <i>thymoides</i> (Sol. ex Lowe) var. <i>cacuminicola</i> (Pérez) A. Hansen & Sunding.	Labiatae	Hissopo	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-10	Caméfito	Arbusto	Z10	C1(grupo)
<i>Scadoxus multiflorus</i> (Martyn) Raf. ssp. <i>katherinae</i> (Baker) Friis & Nordal	Amaryllidaceae		Áfricotropical	Sazonal	6-12	3-6	Geófita	Herbácea	Z10	C1(2)
<i>Scaevola aemula</i> R. Br.	Goodeniaceae		Australiano	Perenifólio	1-12	4-9	Hemi.	Herbácea	Z9	C1(grupo)
<i>Schefflera arboricola</i> (Hayata)	Araliaceae	Schefflera	Indomalaio	Perenifólio	1-12	2-4; 7-8	Micro.	Arbusto	Z10	C8(3)
<i>Schinus molle</i> L. non hort. ex Engl.	Anacardiaceae	Pimenteira-bastarda; Pimenteira-da-índia	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Meso.	Árvore	Z9	C1(1), C4(4), C5(4), C6(2)
<i>Schinus terebinthifolius</i> Raddi	Anacardiaceae	Pimenteira-do-brasil	Neotropical	Perenifólio	1-12	8-10	Micro.	Árvore	Z10	C6(5)
<i>Schotia brachypetala</i> Sonder.	Leguminosae (Caesalpinioideae)	Scótia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	3-5	Micro.	Árvore	Z9	C1(1), C4(4), C6(1), C8(1)
<i>Scilla maderensis</i> Mnzs.	Liliaceae	Cila-da-madeira	Paleártico	Sazonal	9-5	10-2	Geófita	Herbácea	Z11	C1(grupo)
<i>Semele androgyna</i> (L.) Kunth.	Liliaceae	Alegra-campo	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-5	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	C1(1)
<i>Senecio serpens</i> G. Rowley	Compositae	Bálsamo-carnudo; Bálsamo-de-canudo	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Caméfito	Arbusto suculento	Z9	C1 (grupo)
<i>Senna corymbosa</i> (Lamk.) Irwin & Barneby	Leguminosae (Caesalpinioideae)	Cássia-corimbosa	Neotropical	Perenifólio	1-12	7-11	Nano.	Arbusto	Z9	C6(2), C8(2)
<i>Senna didymobotrya</i> (Fres.) Irwin & Barneby.	Leguminosae (Caesalpinioideae)	Planta-das-pipocas; Cássia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C1(1), C4(5), C5(1), C6(1)
<i>Senna pendula</i> (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Irwin & Barneby var. <i>glabrata</i> (Vogel) Irwin & Barneby	Leguminosae (Caesalpinioideae)	Chuva-de-ouro; Cássia	Neotropical; Neártico	Perenifólio	1-12	10-1	Micro.	Arbusto	Z9	C4(5), C6(4)
<i>Senna spectabilis</i> (DC.) Irwin & Barneby	Leguminosae (Caesalpinioideae)	Cássia	Neotropical	Caducifólio	3-12	7-11	Micro.	Árvore	Z10	C1(1), C4(1)
<i>Sequoia sempervirens</i> (D. Don) Endl.	Cupressaceae	Sequóia	Neártico	Perenifólio	1-12	2-3	Macro.	Árvore	Z8	C1(1)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Sesbania punicea</i> (Cav.) Benth.	Leguminosae (Papilionoideae)	Sesbania	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-9	Micro.	Arbusto	Z9	C1(2), C4(3), C8(3)
<i>Sideroxylon mirmulans</i> R. Brown in Buch	Sapotaceae	Marmulano	Paleártico	Perenifólio	1-12	8-1	Micro.	Árvore	Z10	C1(8), C2(21)
<i>Smilax pendulina</i> Lowe	Liliaceae	Alegre-campo-de- cachorro; Salsaparrilha	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-5	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	C1(2)
<i>Sobralia macrantha</i> Lindl.	Orchidaceae	Orquidea-de- cana; Sobralia	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-8	Hemi.	Herbácea	Z11	C1(grupo)
<i>Solandra maxima</i> (Sessé & Moc.) P. Green	Solanaceae	Solandra	Neotropical	Perenifólio	1-12	12-7	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	C1, C4, C5, C6 (grupo)
<i>Solanum jasminoides</i> Paxt.	Solanaceae	Jasmim-bastardo	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z9	C1(2)
<i>Solanum muricatum</i> Ait.	Solanaceae	Pêra-melão	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Herbácea	Z9	C1(grupo)
<i>Solanum wrightii</i> Benth.	Solanaceae	Árvore-da-batata	Neotropical	Perenifólio	1-12	3-11	Micro.	Árvore	Z10	C4(2)
<i>Sollya heterophylla</i> Lindl.	Pittosporaceae		Australiano	Perenifólio	1-12	5-7	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z9	C1(1)
<i>Sonchus fruticosus</i> L.fil.	Compositae	Leituga; Língua-de vaca; Serralha-da- rocha	Paleártico	Perenifólio	1-12	6-8	Nano.	Arbusto	Z10	C1(2)
<i>Sonchus ustulatus</i> Lowe ssp. <i>maderensis</i> Aldridge	Compositae	Leituga	Paleártico	Perenifólio	1-12	7-10	Caméfito	Herbácea	Z10	C1(grupo)
<i>Spathiphyllum walsii</i> Reg.	Araceae	Lírio-da-paz; Bandeira-branca; Espatífilo	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z11	C1(grupo)
<i>Spathodea campanulata</i> Beauv.	Bignoniaceae	Chama-da- floresta; Tulipeiro-africano	Áfricotropical	Caducifólio	1-12 (Variação individual)	1-12	Micro.	Árvore	Z11	C4(4), C7(3)
<i>Spiraea cantoniensis</i> Lour.	Rosaceae	Grinalda-de-noiva	Paleártico	Marcescente	3-2 (11-2)	2-9	Nano.	Arbusto	Z6	C1(1)
<i>Stenocarpus sinuatus</i> Endl.	Proteaceae	Árvore-da- roda- do- fogo	Australiano	Perenifólio	1-12	9-10	Micro.	Árvore	Z9	C1(1)
<i>Stenotaphrum secundatum</i> (Walter) Kuntze	Gramineae	Relva; Relva-de-correr	Neotropical; Áfricotropical; Oceânia	Perenifólio	1-12	3-11	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z9	C9, C10 (tapete)
<i>Stokesia laevis</i> (Hill) Greene	Compositae		Neártico	Perenifólio	1-12	12-1	Nano.	Herbácea	Z7	C1(grupo)
<i>Strelitzia nicolai</i> Reg. & Körn.	Strelitziaceae	Estrelícia-gigante	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C2(1), C3(1), C4(1), C5(1), C9(2), C10(1)
<i>Strelitzia reginae</i> Banks ex Dryand var. <i>parvifolia</i> (Aiton) Anon.	Strelitziaceae	Estrelícia; Ave-do-paraiso	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C1, C9, C10 (grupo)
<i>Strelitzia reginae</i> Banks ex Dryand	Strelitziaceae	Estrelícia; Ave-do-paraiso	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C1(grupo), C2(grupo), C9(2), C10(3)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Strelitzia reginae</i> Banks ex Dryand var. <i>junceae</i> (Ker-Gawl.) H. E. Moore	Strelitziaceae	Estrelícia; Ave-do-paraiso	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C1(grupo)
<i>Streptosolen jamesonii</i> (Benth.) Miers.	Solanaceae	Rapaziada	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z9	C4(4)
<i>Strobilanthes kunthianus</i> T. Anders ex Benth.	Acanthaceae		Indomalaio	Perenifólio	1-12	3-5	Nano.	Arbusto	Z11	C4(1)
<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassm.	Palmae	Coqueiro-de-jardim; Palmeira-rainha	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-7	Micro.	Árvore	Z10	C1(2), C2(4), C3(1), C10(2)
<i>Syngonium podophyllum</i> Shott.	Araceae	Singónio	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-7	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z11	C1 (grupo)
<i>Syzygium jambos</i> (L.) Alston.	Myrtaceae	Jambeiro	Indomalaio	Perenifólio	1-12	3-7	Micro.	Árvore	Z10	C1(2), C4(1)
<i>Syzygium malaccense</i> (L.) Merril & Perry	Myrtaceae	Jambeiro	Indomalaio; Australiano	Perenifólio	1-12	4-6	Micro.	Árvore	Z10	C1(1)
<i>Tabebuia chrysantha</i> (Jacq.) Nichols.	Bignoniaceae	Tabebuia	Neotropical	Caducifólio	6-3	Não floriu*	Micro.	Árvore	Z11	C1(1)
<i>Tabebuia pallida</i> (Lindl.) Miers.	Bignoniaceae	Tabebuia	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-10	Micro.	Árvore	Z11	C1(1), C4(1), C5(1)
<i>Tamarindus indica</i> L.	Leguminosae	Tamarindo	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	7-8	Micro.	Árvore	Z11	C1(3)
<i>Taxus baccata</i> L.	Taxaceae	Teixo	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-4	Micro.	Árvore	Z5	C1(1)
<i>Tecoma stans</i> (L.) Juss. ex HBK.	Bignoniaceae	Estenolóbio	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C4(2), C5(4), C6(2)
<i>Tecomaria capensis</i> (Thunb.) Spach.	Bignoniaceae	Camarões	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C2(2)
<i>Teline maderensis</i> Webb et Berth. var. <i>maderensis</i>	Leguminosae (Papilionoideae)	Piomo	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-8	Micro.	Arbusto	Z10	C1(grupo)
<i>Terminalia bellirica</i> (Gaertn.) Roxb.	Combretaceae	Amendoeira-da-índia	Indomalaio	Caducifólio	6-1	Não floriu*	Micro.	Árvore	Z10	C1(1)
<i>Tetradenia riparia</i> (Hochst.) Codd.	Labiatae	Iboza (Moschosma)	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	12-5	Nano.	Arbusto	Z10	C1(2), C4(3), C5(grupo), C6(5)
<i>Tetragonia tetragonoides</i> (Pallas) O. Ktze.	Aizoaceae	Espinafres	Antártico; Australiano	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea trepadora e suculenta	Z8	C1(grupo)
<i>Thespesia populnea</i> (L.) Sol.	Malvaceae		Áfricotropical; Indomalaio; Oceânia; Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Árvore	Z11	C1(1)
<i>Thevetia peruviana</i> (Pers.) Schum.	Apocynaceae	Tevétia	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-7	Micro.	Arbusto	Z10	C1(1)
<i>Thunbergia coccinea</i> Wallich.	Acanthaceae	Tumbérgia	Indomalaio	Perenifólio	1-12	11-4	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	C11(3)
<i>Tibouchina grandifolia</i> Cogn.	Melastomataceae	Aranhas; Tibouchina	Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	C1(2), C6(1)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Tibouchina urvilleana</i> (DC.) Cogn.	Melastomataceae	Aranhas; Tibouchina	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C4(4), C6(6)
<i>Tillandsia cyanea</i> Lindl. ex K. Koch.	Bromeliaceae	Tilândsia	Neotropical	Perenifólio	1-12	8-2	Hemi.	Herbácea	Z10	C1(grupo)
<i>Tillandsia tenuifolia</i> L.	Bromeliaceae	Erva-da-fortuna;	Neotropical	Perenifólio	1-12	3-6	Epífita	Herbácea	Z9	C1(grupo)
<i>Tillandsia usneoides</i> (L.) L.	Bromeliaceae	Tilandsia	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-10	Epífita	Herbácea	Z8	C1(grupo)
<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	Leguminosae (Papilionoideae)	Tipuana	Neotropical	Marcescente	5-4 (3-4)	4-7	Meso.	Árvore	Z9	C1(2), C4(12), C5(6), C6(4), C8(3)
<i>Tithonia diversifolia</i> (Hemsl.) A. Gray.	Compositae	Girassol-mexicano	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z9	C1, C4, C5, C6, C8 (grupo)
<i>Trachelium caeruleum</i> L.	Campanulaceae	Traquélio	Paleártico	Perenifólio	1-12	6-8	Nano.	Herbácea	Z9	C4(grupo)
<i>Tradescantia fluminensis</i> Vell. Conc.	Commelinaceae	Tradescantia	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-6	Hemi.	Herbácea trepadora	Z9	C1(grupo)
<i>Tradescantia pallida</i> (Rose) D. Hunt.	Commelinaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea trepadora	Z8	C5(grupo)
<i>Tradescantia spathacea</i> Sw.	Commelinaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	10-2	Hemi.	Herbácea	Z9	C1(1)
<i>Tradescantia zebrina</i> hort. ex. Bosse	Commelinaceae	Zebrina	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z9	C1(grupo)
<i>Trifolium repens</i> L.	Leguminosae	Trevo	Paleártico	Perenifólio	1-12	2-10	Hemi.	Herbácea	Z4	C1(grupo)
<i>Vaccinium padifolium</i> J. E. Sm. ex R. S.	Ericaceae	Uveira-da-serra	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-6	Micro.	Arbusto	Z9	C1(3)
<i>Verbena rigida</i> Spreng.	Verbenaceae	Verbena-rija	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-9	Caméfito	Herbácea	Z8	C1(grupo)
<i>Verbena x hybrida</i> Groenl. & Ruempl.	Verbenaceae	Verbena	Hortícola	Perenifólio	1-12	6-10	Caméfito	Herbácea	Z9	C1(grupo)
<i>Visnea mocanera</i> L. f.	Theaceae	Mocano	Paleártico	Perenifólio	1-12	11-2	Micro.	Árvore	Z10	C1(1)
<i>Washingtonia filifera</i> (Lind. ex André) H. A. Wendl	Palmae	Palmeira-de-leque-da-califórnia	Neártico	Perenifólio	1-12	5-8	Micro.	Árvore	Z9	C1(8), C2(2), C3(3), C10(1)
<i>Weigela florida</i> (Bunge) A. D.C.	Caprifoliaceae	Pessegueiro-de-jardim	Paleártico	Caducifólio	3-12	4-7	Micro.	Arbusto	Z5	C4(1)
<i>Wigandia caracasana</i> H.B.K.	Hydrophyllaceae	Vigândia	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-5	Micro.	Arbusto	Z10	C6(grupo)
<i>Woodwardia radicans</i> (L.) Sm.	Blechnaceae	Feto-de-botão	Paleártico	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z8	C1(grupo)
<i>Yucca elephantipes</i> Reg.	Agavaceae	Luca-gigante	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-10	Micro.	Arbusto	Z10	C1(3), C2(4)
<i>Yucca gloriosa</i> L.	Agavaceae	Luca	Neártico	Perenifólio	1-12	6-11	Micro.	Arbusto	Z7	C1(4), C2(7), C4(10)
<i>Zamia furfuracea</i> L. f. in Aiton	Zamiaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	6-11	Hemi.	Arbusto	Z10	C1(1)
<i>Ziziphus jujuba</i> Mill.	Rhamnaceae	Jujuba-chinesa	Paleártico	Caducifólio	3-11	Não floriu*	Micro.	Árvore	Z7	C1(1)
<i>Ziziphus mauritiana</i> Lam.	Rhamnaceae	Jujuba-indiana	Indomalaio	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Micro.	Árvore	Z10	C1(1)

Legenda:

- Plantas que não floriram no período em estudo (Janeiro 2002 – Janeiro 2005): * plantas novas; ** plantas que nunca floriram por falta de aclimação;
- Plantas marcescentes (plantas semiperenifólias e semcaducifólias): 3-2 (3-4) – folhas todo o ano mas com renovação significativa em Março e Abril.

Anexo 12
CARACTERIZAÇÃO FITOGEOGRÁFICA DO JARDIM DA POUSADA DA JUVENTUDE

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Abelia x grandiflora</i> (André) Rehd.	Caprifoliaceae	Abélia	Hortícola	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z5	C11(1)
<i>Acalypha godseffiana</i> hort. Sander ex Mast.	Euphorbiaceae	Acálifa	Oceânia	Perenifólio	1-12	2-8	Micro.	Arbusto	Z11	C9(1)
<i>Acalypha wilkesiana</i> Muell. Arg.	Euphorbiaceae	Acálifa; Folha-de-cobre	Oceânia	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C5(2), C9(3), C11(4), C16(1), C22(1)
<i>Adiantum capillus-veneris</i> L.	Adiantaceae	Avenca; Avenca-das-fontes	Paleártico, Neotropical, Áfricotropical, Indomalaio	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z8	C26(grupo)
<i>Aeonium arboreum</i> (L.) Webb & Berth.	Crassulaceae	Ensaio-vermelho; Saião-vermelho	Paleártico	Perenifólio	1-12	11-4	Nano.	Herbácea suculenta	Z9	C2(2), C14(1)
<i>Agapanthus praecox</i> Willd. ssp. <i>orientalis</i> (Leighton) Leighton	Liliaceae	Agapantos; Coroas-de-henrique	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	4-9	Hemi.	Herbácea	Z9	C24, C25(mancha)
<i>Agathis robusta</i> (C. Moore ex F. Muell.) Bail.	Araucariaceae	Pinheiro-de-damara; Pinheiro- com-folha-de-alegra-campo	Australiano	Perenifólio	1-12	3-4	Meso.	Árvore	Z9	C1(1), C5(1), C25(1)
<i>Agave angustifolia</i> Haw.	Agavaceae	Agave	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-8	Nano.	Árvore suculenta	Z9	C2(1)
<i>Agave attenuata</i> Salm-Dyck	Agavaceae	Piteira; Agave-pescoço-de-cisne	Neotropical	Perenifólio	1-12	12-3	Nano.	Árvore suculenta	Z9	C2(7)
<i>Albizia julibrissin</i> Durazz.	Leguminosae (Mimosoideae)	Albícia-de-constantino-pla; Árvore-da-seda	Paleártico	Caducifólio	4-12	5-8	Micro.	Árvore	Z8	C11(2)
<i>Allamanda cathartica</i> L.	Apocynaceae	Alamanda; Flor-de-manteiga	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-12	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z11	C7(1)
<i>Aloe rupestris</i> Bak.	Liliaceae (Aloeaceae)	Aloés	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	2-4	Micro.	Árvore suculenta	Z10	C2(4)
<i>Aloe saponaria</i> (Ait. f.) Haw.	Liliaceae (Aloeaceae)	Aloés-sabão	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-7	Hemi.	Herbácea suculenta	Z9	C2(grupo)
<i>Alpinia zerumbet</i> (Pers.) B. L. Burt & Rosemary M. Sm.	Zingiberaceae	Alpínia; Lírio-de-porcelana	Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C5(1)
<i>Alstroemeria ligtu</i> L.	Liliaceae (Alstroemeriaceae)	Alstroemeria	Neotropical	Sazonal	4-10	5-9	Geófito	Herbácea	Z8	C11(grupo)
<i>Amaranthus caudatus</i> L.	Amaranthaceae		Áfricotropical; Indomalaio; Neotropical	Sazonal	3-10	6-9	Terófito	Herbácea	Z8	C2(1)
<i>Araucaria heterophylla</i> (Salisb.) Franco	Araucariaceae	Araucária	Oceânia	Perenifólio	1-12	2-3	Macro.	Árvore	Z9	C3(1)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> H. A. Wendl. & Drude.	Palmae	Palmeira-elegante	Australiano	Perenifólio	1-12	2-10	Meso.	Árvore	Z10	C2(1), C6(1), C7(6), C9(1), C25(1)
<i>Asclepias curassavica</i> L.	Asclepiadaceae	Planta-da-seda	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z9	C11(1)
<i>Asclepias physocarpa</i> (E. Mey.) Schltr.	Asclepiadaceae	Planta-da-seda; Balões-de-são- joão	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	5-7	Nano.	Arbusto	Z9	C5(1), C6(3)
<i>Asparagus densiflorus</i> (Kunth) Jassop	Liliaceae (Asparagaceae)	Esparto	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	7-8	Nano.	Herbácea	Z9	C23(grupo)
<i>Asparagus setaceus</i> (Kunth) Jassop	Liliaceae (Asparagaceae)	Esparto-de-folha- miúda; Esparto	Africotropical	Perenifólio	1-12	9-12	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z9	C25(grupo)
<i>Begonia minor</i> Jacq.	Begoniaceae	Corações; Begônia- sempre- em-flor	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C2,C9(grupo)
<i>Bergenia crassifolia</i> (L.) Fritsch.	Saxifragaceae	Bergénia; Couve-de- jardim	Paleártico	Perenifólio	1-12	11-4	Caméfito	Herbácea	Z3	C22(grupo)
<i>Billbergia pyramidalis</i> (Sims.) Lindl.	Bromeliaceae	Bromélia	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-8	Hemi.	Herbácea	Z10	C19(grupo)
<i>Billbergia viridiflora</i> H. Wendl.	Bromeliaceae	Bromélia	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-4	Hemi.	Herbácea	Z10	C19(grupo)
<i>Billbergia vittata</i> Brongn. ex Morel.	Bromeliaceae	Bromélia	Neotropical	Perenifólio	1-12	11-2	Hemi.	Herbácea	Z10	C19(grupo)
<i>Bougainvillea glabra</i> Choisy	Nyctaginaceae	Buganvília	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	C7, C8, C9, C11 (grupo)
<i>Bougainvillea spectabilis</i> Willd.	Nyctaginaceae	Buganvília	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	C7 (grupo)
<i>Brachychiton acerifolius</i> Cunn. ex. F. Muell.	Sterculiaceae	Árvore-do-fogo	Australiano	Caducifólio	1-5; 8-12	5-8	Micro.	Árvore	Z10	C8(1)
<i>Brahea amata</i> S. Wats.	Palmae	Palmeira-azul	Neártico; Neotropical	Perenifólio	1-12	7-8	Micro.	Árvore	Z9	C11(2)
<i>Brunfelsia americana</i> L.	Solanaceae	Dama-da-noite	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-7	Micro.	Arbusto	Z10	C11(1)
<i>Brunfelsia pauciflora</i> (Cham. & Scltd.) Benth.	Solanaceae	Brunfelsia; Manacá	Neotropical	Perenifólio	1-12	2-7	Micro.	Arbusto	Z10	C5(1), C15(1), C19(1)
<i>Bulbine frutescens</i> (L.) Willd.	Liliaceae (Asphodelaceae)	Bulbine	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Geófita	Herbácea suculenta	Z9	C9, C11, C17(grupo)
<i>Calendula officinalis</i> L.	Compositae	Calendula	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Terófita	Herbácea	Z6	C19(mancha)
<i>Callistemon rigidus</i> R. Br.	Myrtaceae	Martinete	Australiano	Perenifólio	1-12	4-8	Micro.	Arbusto	Z9	C8(1)
<i>Callistephus chinensis</i> (L.) Nees..	Compositae	Não-me-deixes	Paleártico	Sazonal	3-12	4-12	Terófita	Herbácea	Z6	C2, C11(grupo)
<i>Calodendrum capense</i> (L. f.) Thunb.	Rutaceae	Castanheiro-do- cabo	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	3-6	Micro.	Árvore	Z9	C11(1)
<i>Canna x generalis</i> L. H. Bail.	Cannaceae	Canas-da-índia; Bananeiras-de- flor	Hortícola	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z9	C1, C3, C4, C24 (grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Catharanthus roseus</i> (L.) G. Don.	Apocynaceae	Maravilhas	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Herbácea	Z10	C10 (grupo)
<i>Centranthus ruber</i> (L.) DC.	Valerianaceae	Rosa-da-rocha; Alfinetes	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Caméfito	Herbácea	Z5	C2, C5(grupo)
<i>Centratherum muticum</i> (Humb., Bonpl. & Kunth) Less.	Compositae	Flor-botão	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Caméfito	Herbácea	Z10	C10, C11 (grupo)
<i>Ceratonia siliqua</i> L.	Leguminosae (Caesalpinioideae)	Alfarrobeira	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-9	Micro.	Árvore	Z9	C14(1)
<i>Cercis siliquastrum</i> L.	Leguminosae (Papilionoideae)	Olaia; Árvore-de-judas	Paleártico	Caducifólio	4-11	10-5	Micro.	Árvore	Z7	C16(1)
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> (Murray) Parl.	Cupressaceae	Cedro-de-oregão	Neártico	Perenifólio	1-12	1-2	Micro.	Árvore	Z6	C11(1)
<i>Chamaedorea elegans</i> Mart.	Palmae	Palmeira-de-salão; Palmeira-bambu	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-6	Micro.	Arbusto	Z10	C23(grupo)
<i>Chlorophytum comosum</i> (Thumb.) Jacques	Liliaceae (Anthericaceae)	Fitinhas	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z9	C19, C20(grupo)
<i>Chorisia speciosa</i> A. St. Hil.	Bombacaceae	Sumaúma	Neotropical	Caducifólio	3-11	8-11	Meso.	Árvore	Z10	C2(1)
<i>Cinnamomum camphora</i> (L.) Sieb.	Lauraceae	Canforeira	Paleártico; Indomalaio	Perenifólio	1-12	2-4	Meso.	Árvore	Z10	CC9(1)
<i>Cinnamomum zeylanicum</i> Bl.	Lauraceae	Caneleira; Árvore-da-canel	Indomalaio	Perenifólio	1-12	2-4	Micro.	Árvore	Z11	C4(1)
<i>Clivia miniata</i> Regel	Amaryllidaceae	Clívia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	2-11	Hemi.	Herbácea	Z10	C2, C9(grupo)
<i>Clivia nobilis</i> Lindl.	Amaryllidaceae	Clívia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	2-11	Hemi.	Herbácea	Z10	C11, C20(grupo)
<i>Codiaeum variegatum</i> (L.) Bl. var. <i>pictum</i> (Lodd.) Muell. Arg.	Euphorbiaceae	Crótone	Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z11	C2(8), C5(grupo), C19(2)
<i>Colocasia esculenta</i> (L.) Schott.	Araceae	Inhame	Indomalaio	Perenifólio	1-12	5-6	Geófita	Herbácea	Z10	C11(grupo)
<i>Coprosma repens</i> A. Rich.	Rubiaceae	Doiradinha	Antártico; Australiano	Perenifólio	1-12	4-5	Micro.	Arbusto	Z9	C15(1), C22(2)
<i>Cordyline terminalis</i> (L.) Kunth.	Agavaceae	Árvore-dos-reis	Indomalaio; Australiano; Oceânia; Antártico	Perenifólio	1-12	11-5	Micro.	Arbusto	Z10	C2(1), C22(2)
<i>Cottoneaster pannosus</i> Franch.	Rosaceae		Paleártico	Perenifólio	1-12	4-5	Micro.	Arbusto	Z7	C5(2), C23(2), C24(1), C25(1)
<i>Ctenanthe setosa</i> Eichler.	Marantaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	3-7	Hemi.	Herbácea	Z10	C11(grupo)
<i>Cyathea cooperi</i> (F. Mueller) Domin.	Cyatheaceae	Feto-arbóreo	Australiano	Perenifólio	1-12	-----	Micro.	Árvore	Z10	C9(2)
<i>Cycas circinalis</i> L.	Cycadaceae	Cicas	Indomalaio	Perenifólio	1-12	2-7	Micro.	Árvore	Z10	C11(1), C21(1)
<i>Cycas revoluta</i> Thunb.	Cycadaceae	Cicas-revoluta; Cicas-de-sagú	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-8	Micro.	Árvore	Z9	C7(1), C9(1)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Cyperus involucratus</i> Rottb.	Cyperaceae		Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C9(grupo)
<i>Cyrtomium falcatum</i> (L. f.) Presl.	Dryopteridaceae	Feto-azevinho	Paleártico; Indomalaio; Áfricotropical; Oceânia	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z9	C26(grupo)
<i>Dianthus barbatus</i> L.	Caryophyllaceae	Craveiro	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-7	Nano.	Herbácea	Z4	C2 (grupo)
<i>Dombeya wallichii</i> (Lindl.) B. D. Jackson	Sterculiaceae	Dombeia; Aurora	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	12-2	Micro.	Árvore	Z10	C2(1)
<i>Doranthus palmeri</i> W. Hill.	Agavaceae	Doriantes	Australiano	Perenifólio	1-12	3-6	Hemi.	Herbácea	Z10	C7(1)
<i>Dracaena deremensis</i> Engl.	Agavaceae	Dracena	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	11-12	Micro.	Arbusto	Z11	C2(1), C11(2), C13(1)
<i>Dracaena fragrans</i> (L.) Ker-Gawl.	Agavaceae	Dracena	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	11-1	Micro.	Arbusto	Z12	C2(2), C11(1), C15(2), C20(2)
<i>Drosanthemum floribundum</i> (Haw.) Schwantes	Aizoaceae	Arrozinho	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	5-7	Fane. trep.	Arbusto trepador e suculento	Z9	C9(grupo)
<i>Duranta erecta</i> L.	Verbenaceae	Duranta	Neotropical	Perenifólio	1-12	7-1	Micro.	Arbusto	Z10	C11(1)
<i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl.	Rosaceae	Nespereira	Paleártico	Perenifólio	1-12	10-12	Micro.	Árvore	Z8	C25(1)
<i>Erythrina crista-galli</i> L.	Leguminosae (Papilionoideae)	Coraleira; Coralina-crista-de-galo	Neotropical	Marcescente	4-3 (12-3)	4-1	Micro.	Árvore	Z8	C10(2), C11(1), C12(1), C16(2)
<i>Erythrina lysistemon</i> Hutch.	Leguminosae (Papilionoideae)	Coralina	Áfricotropical	Marcescente	5-4 (12-4)	12-5	Micro.	Árvore	Z10	C11(1)
<i>Eugenia uniflora</i> L.	Myrtaceae	Pitangueira	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Árvore	Z10	C11(4)
<i>Euphorbia cotinifolia</i> L.	Euphorbiaceae	Eufórbia	Neotropical	Caducifólio	3-12	6-11	Micro.	Árvore	Z11	C2(2), C5(1), C23(1), C24(1)
<i>Euphorbia echinus</i> Hook. f. & Coss.	Euphorbiaceae	Eufórbia	Paleártico	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Nano.	Arbusto suculento	Z8	C2(1)
<i>Euphorbia grandicornis</i> Goebel.	Euphorbiaceae	Eufórbia-grande-cornuda	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	12-2	Nano.	Arbusto suculento	Z9	C2(1)
<i>Euphorbia milii</i> Desmoul.	Euphorbiaceae	Mira-mira-não-me-toques	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C2(1), C13(1)
<i>Euphorbia pulcherrima</i> Willd. ex Klotzsch.	Euphorbiaceae	Manhã-de-páscoa	Neotropical	Caducifólio	5-2	10-3	Micro.	Arbusto	Z10	C2(1), C5(4), C6(2), C25(6)
<i>Farfugium japonicum</i> (L.) Kitam.	Compositae	Patás-de cavalo; Boinas	Paleártico	Perenifólio	1-12	6-3	Hemi.	Herbácea	Z7	C23(grupo)
<i>Ficus aspera</i> Forst. f.	Moraceae	Figueira-palhaço	Oceânia	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Árvore	Z11	C11(1)
<i>Ficus elastica</i> Roxb. ex Homem	Moraceae	Borracheira	Indomalaio	Perenifólio	1-12	5-8	Micro.	Árvore	Z11	C9(1)
<i>Fuchsia triphylla</i> L.	Onagraceae	Mimos; Brincos-de-princesa	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z11	C11(grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Furcraea sellosa</i> K. Koch. var. <i>marginata</i>	Agavaceae	Furcreia; Piteira	Neotropical	Perenifólio	1-12	8-12	Micro.	Árvore suculenta	Z10	C2(1)
<i>Gasteria pillansii</i> Kensit.	Liliaceae (Aloecaceae)	Gasteria	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	4-5	Hemi.	Herbácea suculenta	Z9	C2(2)
<i>Goniophlebium subauriculatum</i> (Bl.) Presl.	Polypodiaceae	Feto-de-metro; Feto-chorão	Indomalaio; Australiano; Oceânia	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z10	C25(grupo)
<i>Hedychium gardnerianum</i> Ker-Gawl.	Zingiberaceae	Bananilha; Roca-de-vénus; Conteira	Paleártico; Indomalaio	Perenifólio	1-12	7-10	Hemi	Herbácea	Z9	C2(1)
<i>Helichrysum bracteatum</i> (Vent.) Andrews	Compositae	Margarida-de-papel	Australiano	Sazonal	3-10	4-10	Terófito	Herbácea	Z8	C2(grupo)
<i>Heliconia bihai</i> (L.) L.	Heliconiaceae	Helicónia	Neotropical	Perenifólio	1-12	7-2	Hemi.	Herbácea	Z11	C6(1), C7(1)
<i>Hemerocallis fulva</i> L.	Liliaceae (Hemerocallida-ceae)	Hemerocalis; Lírio-dum-dia	Paleártico	Perenifólio	1-12	6-10	Geófito	Herbácea	Z5	C15(grupo)
<i>Hibiscus hastatus</i> L. f.	Malvaceae	Cardeais	Oceânia	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Árvore	Z11	C16(1)
<i>Hibiscus mutabilis</i> L.	Malvaceae	Rosa-de-algodão	Paleártico	Perenifólio	1-12	6-11	Micro.	Arbusto	Z8	C11(2)
<i>Hibiscus rosa-sinensis</i> L.	Malvaceae	Cardeais; Hibiscos; Rosa-da-china	Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C1(sebe), C2(10), C7(sebe + 1), C8(1), C9(grupo), C11(1), C22(1), C24(grupo)
<i>Hibiscus schizopetalus</i> (Mast.) Hook.	Malvaceae	Lanterna-japonesa	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	3-11	Micro.	Arbusto	Z10	C5(1)
<i>Howea belmoreana</i> (C. Moore & F. Muell.) Becc.	Palmae	Quência	Australiano	Perenifólio	1-12	1-9	Micro	Árvore	Z10	C11(1)
<i>Howea forsteriana</i> (C. Moore & F. Muell.) Becc.	Palmae	Quência	Australiano	Perenifólio	1-12	1-9	Micro.	Árvore	Z10	C2(1), C6(1), C8(1), C11(1), C19(1), C22(1)
<i>Hydrangea macrophylla</i> (Thunb.) Ser.	Hydrangeaceae	Hortênsias; Novelos	Paleártico	Caducifólio	3-12	5-10	Nano.	Arbusto	Z6	C2, C5, C23(grupo)
<i>Ilex aquifolium</i> L.	Aquifoliaceae	Azevinho- comum; Azevinho- inglês	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-6	Micro.	Árvore	Z6	C16(1)
<i>Impatiens walleriana</i> Hook. f.	Balsaminaceae	Maravilhas	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Herbácea	Z9	C2, C11(grupo)
<i>Jacaranda mimosifolia</i> D. Don.	Bignoniaceae	Jacarandá	Neotropical	Caducifólio	5-2	4-7; 9-10	Meso.	Árvore	Z9	C7(1), C13(1)
<i>Kalanchoe fedtschenkoi</i> Hamet & Perrier.	Crassulaceae		Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-8	Caméfito	Arbusto suculento	Z11	C2(grupo)
<i>Lagerstroemia indica</i> L.	Lythraceae	Laguerestré-mia; Flor de Merenda; Suspiros	Paleártico; Indomalaio	Caducifólio	3-11	7-9	Micro.	Árvore	Z7	C1(1), C17(1), C22(1), C24(1)
<i>Lampranthus comptonii</i> (L. Bol.) N. E. Br.	Aizoaceae	Lamprantos-branco; Chorão	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	3-8	Fane. trep.	Arbusto trepador e suculento	Z11	C2, C5 (grupo)
<i>Ligustrum lucidum</i> Ait. f.	Oleaceae	Ligustro; Alfinheiro	Paleártico	Perenifólio	1-12	6-9	Micro.	Árvore	Z7	C5(10), C11(1)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Ligustrum obtusifolium</i> Sieb. & Zucc.	Oleaceae		Paleártico	Perenifólio	1-12	5-6; 11-12	Micro.	Arbusto	Z3	C6, C11, C14(sebe)
<i>Ligustrum ovalifolium</i> Hassk.	Oleaceae	Ligustro	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-7	Nano.	Arbusto	Z5	C2(1)
<i>Ligustrum sinense</i> Lour.	Oleaceae	Ligustro-da-china	Paleártico	Perenifólio	1-12	6-8	Micro.	Arbusto	Z7	C15(1), C16(1)
<i>Magnolia grandiflora</i> L.	Magnoliaceae	Magnólia	Neártico	Perenifólio	1-12	5-8	Micro.	Árvore	Z6	C20(1)
<i>Malvaviscus arboreus</i> Cav.	Malvaceae	Malvavisco	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z9	C2(1), C11(1)
<i>Mangifera indica</i> L.	Anacardiaceae	Mangueiro	Indomalaio	Perenifólio	1-12	11-6	Micro.	Árvore	Z11	C9(2), C10(1)
<i>Mentha spicata</i> L.	Labiatae	Hortelã-de-leite	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Herbácea	Z3	C23(grupo)
<i>Monstera deliciosa</i> Liebm.	Araceae	Fruto-delicioso; Costela-de-adão	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z10	C9(2), C23(grupo)
<i>Musa x paradisiaca</i> L.	Musaceae	Bananeira-de-prata	Hortícola	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C5, C25(grupo)
<i>Nephrolepis cordifolia</i> (L.) Presl.	Oleandraceae	Feto	Neotropical; Áfricotropical; Indomalaio; Oceânia; Australiano	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z10	C9, C21(grupo)
<i>Nerium oleander</i> L.	Apocynaceae	Sevadilha; Loendro	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-11	Micro.	Arbusto	Z9	C2(1), C4(1), C8(1), C11(1)
<i>Papaver somniferum</i> L.	Papaveraceae	Papoila-do-ópio	Paleártico	Sazonal	4-7	5-7	Terófito	Herbácea	Z7	C19(grupo)
<i>Passiflora edulis</i> Sims.	Passifloraceae	Maracujá-roxo	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-11	Fane.trep.	Arbusto trepador	Z10	C25(1)
<i>Pelargonium cucullatum</i> (L.) L'Hérit. ssp. <i>tabulare</i> Volschenk	Geraniaceae	Malva	Africotropical	Perenifólio	1-12	4-9	Nano.	Arbusto	Z10	C22(1), C23(1)
<i>Pelargonium peltatum</i> (L.) L'Hérit. cv.	Geraniaceae	Malva	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z10	C5(grupo)
<i>Pericallis x hybrida</i> R. Nordenstam	Compositae	Cinerária	Hortícola	Sazonal	1-7	3-6	Terófito	Herbácea	Z10	C18(grupo)
<i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) A. W. Hill.	Umbelliferae	Salsa	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Herbácea	Z5	C23(grupo)
<i>Philodendron erubescens</i> K. Koch & Augustin	Araceae	Filodendro	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-6	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z11	C15(1)
<i>Phlebodium aureum</i> (L.) J. Sm.	Polypodiaceae	Polipódio-dourado	Neártico; Neotropical	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z10	C9(grupo)
<i>Phoenix canariensis</i> Chabaud.	Palmae	Palmeira-das-canárias	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-3	Meso.	Árvore	Z11	C7(1)
<i>Phoenix roebelinii</i> O' Brien.	Palmae	Palmeira-anã	Indomalaio	Perenifólio	1-12	5-7	Micro.	Árvore	Z11	C11(1)
<i>Phyllanthus tenellus</i> Roxb.	Euphorbiaceae	Quebra-pedra	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Herbácea	Z11	C1, C2, C6(grupo)
<i>Pilea cadierei</i> Gagnep. & Guillaum.	Urticaceae	Planta-do-alumínio	Indomalaio	Perenifólio	1-12	10-12	Hemi.	Herbácea	Z11	C16, C17(grupo)
<i>Pilea microphylla</i> (L.) Liebm.	Urticaceae	Arrozinho	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C13(grupo)
<i>Pinus halepensis</i> Mill.	Pinaceae	Pinheiro-de-alepo	Paleártico	Perenifólio	1-12	2-4	Micro.	Árvore	Z7	C9(1)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Pittosporum tobira</i> Ait.	Pittosporaceae	Tobira; Faia-da-holanda	Paleártico	Perenifólio	1-12	2-5	Micro.	Árvore	Z9	C1(1)
<i>Platycerium bifurcatum</i> (Cav.) C. Chr.	Polypodiaceae	Feto-de-corno- de-veado	Indomalaio; Oceânia; Australiano	Perenifólio	1-12	-----	Epífita	Herbácea	Z9	C19(1)
<i>Plectranthus barbatus</i> Andrews	Labiatae	Falso-boldo; Boldo-da-terra	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C11(2)
<i>Plumeria rubra</i> L. var. <i>acutifolia</i> (Poir.) Woodson.	Apocynaceae	Planta-dos- dentes	Neotropical	Caducifólio	5-1	6-12	Micro.	Árvore	Z10	C11(1), C22(1)
<i>Pteris vittata</i> L.	Pteridaceae	Feto	Paleártico; Indomalaio; Australiano Oceânia	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z9	C26(1)
<i>Punica granatum</i> L.	Punicaceae	Romãzeira	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-7	Micro.	Árvore	Z9	C3(1), C4(1)
<i>Pyrostegia venusta</i> (Ker- Gawl.) Miers	Bignoniaceae	Gaitinhas	Neotropical	Perenifólio	1-12	11-5	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	C11(1)
<i>Raphiolepis umbellata</i> (Thunb.) Mak.	Rosaceae		Paleártico	Perenifólio	1-12	12-6	Nano.	Arbusto	Z8	C11(2)
<i>Rhododendron mucronatum</i> G. Don.	Ericaceae	Azálea-japonesa	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z5	C19(3)
<i>Rivina humilis</i> L.	Phytolaccaceae	Planta-vermelha	Neártico; Neotropical	Perenifólio	1-12	5-10	Nano.	Herbácea	Z9	C24(grupo)
<i>Ruscus hypophyllum</i> L.	Liliaceae (Asparagaceae)	Ruscos	Paleártico	Perenifólio	1-12	11-12	Nano.	Herbácea	Z8	C11(grupo)
<i>Salvia guaranitica</i> St.-Hil. ex Benth.	Labiatae	Sálvia	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z9	C11(2)
<i>Salvia officinalis</i> L.	Labiatae	Salva	Paleártico	Perenifólio	1-12	6-8	Nano.	Herbácea	Z5	C22(1)
<i>Salvia splendens</i> Sell ex Roem. & Scult.	Labiatae	Camarões; Sálvias	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Herbácea	Z10	C2, C11, C13, C19 (grupo)
<i>Schefflera arboricola</i> (Hayata)	Araliaceae	Schefflera	Indomalaio	Perenifólio	1-12	2-4; 7-8	Micro.	Arbusto	Z10	C11(1), C2(1), C18(1)
<i>Schotia latifolia</i> Jacq.	Leguminosae (Caesalpinoideae)	Scótia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	6-7	Micro.	Árvore	Z9	C17(1)
<i>Senecio serpens</i> G. Rowley	Compositae	Bálsamo-camudo; Bálsamo-de- canudo	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Caméfito	Arbusto suculento	Z9	C2(grupo)
<i>Senna didymobotrya</i> (Fres.) Irwin & Barneby.	Leguminosae (Caesalpinoideae)	Planta-das- pipocas; Cássia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C11(1)
<i>Sesbania punicea</i> (Cav.) Benth.	Leguminosae (Papilionoideae)	Sesbânia	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-9	Micro.	Arbusto	Z9	C24(1)
<i>Solandra maxima</i> (Sessé & Moc.) P. Green	Solanaceae	Solandra	Neotropical	Perenifólio	1-12	12-5	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	C6(1), C11(1)
<i>Solanum wendlandii</i> Hook. f.	Solanaceae	Coração-de- estudante	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-8	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	C10(1)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Spathodea campanulata</i> Beauv.	Bignoniaceae	Chama-da-floresta; Tulipeiro-africano	Áfricotropical	Caducifólio	1-12 (Variação individual)	1-12	Micro.	Árvore	Z11	C2(1), C4(1)
<i>Stenocarpus sinuatus</i> Endl.	Proteaceae	Árvore-da-roda-do-fogo	Australiano	Perenifólio	1-12	9-10	Micro.	Árvore	Z9	C11(2)
<i>Stenotaphrum secundatum</i> (Walter) Kuntze	Gramineae	Relva; Relva-de-correr	Neotropical; Áfricotropical; Oceânia	Perenifólio	1-12	3-11	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z9	C8, C9 (tapete)
<i>Strelitzia nicolai</i> Reg. & Körn.	Strelitziaceae	Estrelícia-gigante	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C13(1)
<i>Strelitzia reginae</i> Banks ex Dryand	Strelitziaceae	Estrelícia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C8(1), C11(11)
<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassm.	Palmae	Coqueiro-de-jardim; Palmeira-rainha	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-7	Micro.	Árvore	Z10	C2(1)
<i>Syzygium jambos</i> (L.) Alston.	Myrtaceae	Jambeiro	Indomalaio	Perenifólio	1-12	3-7	Micro.	Árvore	Z10	C5(1)
<i>Tabebuia heterophylla</i> (D. C.) Britton	Bignoniaceae	Tabebuia	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-8	Micro.	Árvore	Z10	C7(1)
<i>Tagetes patula</i> L.	Compositae	Cravos-de-burro	Neotropical	Sazonal	1-9	3-8	Terófito	Herbácea	Z9	C2, C11, C14 (grupo)
<i>Tibouchina grandifolia</i> Cogn.	Melastomataceae	Aranhas; Tibouchina	Neotropical	Perenifólio	1-12	7-1	Micro.	Arbusto	Z10	C2(1), C5(1)
<i>Tradescantia zebrina</i> hort. ex. Bosse	Commelinaceae	Zebrina	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z9	C11(grupo)
<i>Viola x witrockiana</i> Gams.	Violaceae	Amores-perfeitos	Hortícola	Perenifólio	1-12	3-8	Hemi.	Herbácea	Z5	C2, C6, C11, C18 (grupo)
<i>Washingtonia filifera</i> (Lind. ex André) H. A. Wendl	Palmae	Palmeira-de-leque-da-califórnia	Neártico	Perenifólio	1-12	5-8	Micro.	Árvore	Z9	C24(1)
<i>Wisteria sinensis</i> (Sims) Sweet.	Leguminosae (Papilionoideae)	Lilases; Glícinia	Paleártico	Caducifólio	2-12	2-5; 7-8	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z5	C13(1)
<i>Yucca gloriosa</i> L.	Agavaceae	Lúca	Neártico	Perenifólio	1-12	6-11	Micro.	Arbusto	Z7	C2(1)

Legenda:

- Plantas que não floriram no período em estudo (Janeiro 2002 – Janeiro 2005): * plantas novas; ** plantas que nunca floriram por falta de aclimação;
- Plantas marcescentes (plantas semiperenifólias e semcaducifólias): 3-2 (3-4) – folhas todo o ano mas com renovação significativa em Março e Abril.

Anexo 13
CARACTERIZAÇÃO FITOGEGRÁFICA DA QUINTA DAS CRUZES

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Abelia x grandiflora</i> (André) Rehd.	Caprifoliaceae	Abélia	Hortícola	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z5	C5(1)
<i>Abutilon arboreum</i> Sweet.	Malvaceae	Abutilão-arbóreo	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Árvore	Z9	C8(1)
<i>Acalypha wilkesiana</i> Muell. Arg.	Euphorbiaceae	Acálifa; Folha-de-cobre	Oceânia	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C1(8), C2(5), C6(3), C19(3)
<i>Acca sellowiana</i> (O. Berg.) Burret	Myrtaceae	Goiabeira-ananás	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-7	Micro.	Árvore	Z8	C5(1)
<i>Adiantum capillus-veneris</i> L.	Adiantaceae	Avenca; Avenca-das-fontes	Paleártico, Neotropical, Áfricotropical, Indomalaio	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z8	C1, C9, C17 (grupo)
<i>Adiantum formosum</i> R. Br.	Adiantaceae	Avenca-formosa	Australiano; Antártico	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z9	C9(grupo)
<i>Adiantum radianum</i> C. Presl.	Adiantaceae	Avenca	Neotropical	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z10	C9(grupo)
<i>Aechmea fulgens</i> Brongn. var. <i>discolor</i> (Morr.) Brongn. ex Bak.	Bromeliaceae	Bromélia	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-8	Hemi.	Herbácea	Z11	C15(grupo)
<i>Aeschynanthus lobbianus</i> Hoo	Gesneriaceae	Planta-do-batom	Oceânia	Perenifólio	1-12	10-4	Epífita	Herbácea	Z11	C9(3)
<i>Agathis robusta</i> (C. Moore ex. F. Muell.) Bail.	Araucariaceae	Pinheiro-de-damara Pinheiro-folha- de- alegra-campo	Australiano	Perenifólio	1-12	3-4	Meso.	Árvore	Z9	C2(1), C18(1), C19(1)
<i>Alstroemeria ligtu</i> L.	Liliaceae (Alstroemeriaceae)	Alstroemeria; Açucena-do-peru	Neotropical	Sazonal	4-10	5-9	Geófita	Herbácea	Z8	C19(grupo)
<i>Alternanthera ficoidea</i> (L.) R. Br.	Polygonaceae	Pirriquitos	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Caméfito	Herbácea	Z10	C7(grupo)
<i>Angiopteris evecta</i> (Forst.) Hoffm.	Marattiaceae	Feto-craca	Indomalaio; Australiano	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z10	C18(1), C23(1)
<i>Anthurium andraeanum</i> André.	Araceae	Antúrio	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z11	C9(>100)
<i>Anthurium scherzerianum</i> Schott.	Araceae	Antúrio-rabinho- de-porco	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C9(>100)
<i>Apollonias barbuja</i> (Cav.) Bomm.	Lauraceae	Barbusano	Paleártico	Perenifólio	1-12	9-3	Meso.	Árvore	Z10	C5(1), C20(1)
<i>Araucaria bidwillii</i> Hook. f.	Araucariaceae	Araucária-de- bidwill	Australiano	Perenifólio	1-12	2-3	Meso.	Árvore	Z9	C3(1), C5(1)
<i>Araucaria heterophylla</i> (Salisb.) Franco	Araucariaceae	Araucária	Oceânia	Perenifólio	1-12	2-3	Macro.	Árvore	Z9	C5(1)
<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> H. A. Wendl. & Drude.	Palmae	Palmeira-elegante	Australiano	Perenifólio	1-12	2-10	Meso.	Árvore	Z10	C6(1), C7(2)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Argyranthemum dissectum</i> (Lowe) Lowe	Compositae	Pampilhos; Estrela; Malmequeres	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-7	Nano.	Arbusto	Z10	C12(1)
<i>Argyranthemum haematoma</i> (Lowe) Lowe	Compositae	Pampilhos; Estrela; Malmequeres	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-7	Nano.	Arbusto	Z10	C12(1)
<i>Artemisia argentea</i> L'Hérit.	Compositae	Losna	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-7	Nano.	Arbusto	Z11	C12(1)
<i>Arum italicum</i> Mill. ssp. <i>canariense</i> (Webb & Berthel.) P. C. Boyce	Araceae	Bigalhó	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-5	Geófito	Herbácea	Z10	C12(1)
<i>Asparagus densiflorus</i> (Kunth) Jassop	Liliaceae (Asparagaceae)	Esparto	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	7-8	Nano.	Herbácea	Z9	C19(grupo)
<i>Bauhinia x blakeana</i> Dunn.	Leguminosae (Caesalpinoideae)	Bauínia	Paleártico	Perenifólio	1-12	12-4	Micro.	Árvore	Z10	C6(1)
<i>Begonia minor</i> Jacq.	Begoniaceae	Corações	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C3(grupo)
<i>Begonia x ricinifolia</i> A. Dietr.	Begoniaceae	Corações; Begónias	Hortícola	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C19(grupo)
<i>Billbergia pyramidalis</i> (Sims) Lindl.	Bromeliaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	1-8	Hemi.	Herbácea	Z10	C15, C19(grupo)
<i>Billbergia vittata</i> Brongn. ex Morel.	Bromeliaceae	Bromélia	Neotropical	Perenifólio	1-12	11-2	Hemi.	Herbácea	Z10	C15(grupo)
<i>Bougainvillea glabra</i> Choisy	Nyctaginaceae	Buganvília	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	C1(grupo), C2(2), C9(2), C22(grupo)
<i>Bougainvillea spectabilis</i> Willd.	Nyctaginaceae	Buganvília	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	C1(grupo), C6(1), C8(1), C17(grupo), C19(1)
<i>Brachychiton acerifolius</i> Cunn. ex. F. Muell.	Sterculiaceae	Árvore-do-fogo	Australiano	Caducifólio	1-5; 8-12	5-8	Micro.	Árvore	Z10	C20(1)
<i>Brachychiton x hybridus</i> hort.	Sterculiaceae	Árvore-do-fogo	Hortícola	Caducifólio	1-5; 8-12	6-10	Micro.	Árvore	Z10	C6(1)
<i>Brassavola cucullata</i> (L.) R. Br.	Orchidaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	12-1	Epífita	Herbácea	Z10	C9(grupo)
<i>Brugmansia versicolor</i> Lagerh.	Solanaceae	Trombeteira	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C22(grupo)
<i>Bulbine frutescens</i> (L.) Willd.	Liliaceae (Asphodelaceae)	Bulbine	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Geófito	Herbácea suculenta	Z9	C14(mancha)
<i>Buxus sempervirens</i> L.	Buxaceae	Buxo	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-4; 10-11	Nano.	Arbusto	Z5	C10(sebe)
<i>Calathea louisae</i> Gagnep.	Marantaceae	Calateia	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-7	Hemi.	Herbácea	Z11	C19(grupo)
<i>Callisia fragrans</i> (Lindl.) Wood.	Commelinaceae	Cal	Neotropical	Perenifólio	1-12	3-4	Hemi.	Herbácea trepadora	Z10	C20(grupo)
<i>Callistemon rigidus</i> R. Br.	Myrtaceae	Martinete	Australiano	Perenifólio	1-12	4-8	Micro.	Arbusto	Z9	C2(1)
<i>Callistemon viminalis</i> (Sol. ex Gaertn.) G. Don ex Loud.	Myrtaceae	Martinete- chorão	Australiano	Perenifólio	1-12	3-6	Micro.	Arbusto	Z9	C19(1)
<i>Callistephus chinensis</i> (L.) Nees.	Compositae	Não-me-deixes	Paleártico	Sazonal	3-12	4-12	Terófito	Herbácea	Z6	C1, C10, C17, C19 (grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Calodendrum capense</i> (L. f.) Thunb.	Rutaceae	Castanheiro-do-cabo	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	3-6	Micro.	Árvore	Z9	C5(1)
<i>Canna x generalis</i> L. H. Bail.	Cannaceae	Canas-da-índia; Bananeiras-de-flor	Hortícola	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z9	C19(grupo)
<i>Carlina salicifolia</i> (L.f.) Cav.	Compositae	Carlina; Cardo-branco	Paleártico	Perenifólio	1-12	6-8	Nano.	Arbusto	Z10	C12(1)
<i>Casuarina equisetifolia</i> Forst. & Forst. f.	Casuarinaceae	Casuarina	Indomalaio; Australiano; Oceânia	Perenifólio	1-12	6-11	Meso.	Árvore	Z10	C5(2), C7(1), C8(1), C20(1)
<i>Catharanthus roseus</i> (L.) G. Don.	Apocynaceae	Catarantos; Maravilhas;	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Herbácea	Z10	C1 (grupo)
<i>Cattleya mossiae</i> Hook.	Orchidaceae	Cateleia	Neotropical	Perenifólio	1-12	11-5	Epífita	Herbácea	Z11	C9 (>20)
<i>Cattleya wameryi</i> T. Moore	Orchidaceae	Cateleia	Neotropical	Perenifólio	1-12	10-5	Epífita	Herbácea	Z11	C9(>20)
<i>Celtis australis</i> L.	Ulmaceae	Lodão-bastardo; Conteira	Paleártico	Caducifólio	4-1	5-6	Meso.	Árvore	Z8	C3(1)
<i>Ceratozamia mexicana</i> Brongn.	Zamiaceae	Ceratozamia	Neártico	Perenifólio	1-12	2-6	Nano.	Arbusto	Z10	C6(1)
<i>Cestrum aurantiacum</i> Lindl.	Solanaceae	Jasmim-dourado	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z11	C19(1)
<i>Chamaecyparis nootkatensis</i> (D. Don) Spach.	Cupressaceae	Cipreste-amarelo	Neártico	Perenifólio	1-12	2-3	Meso.	Árvore	Z4	C13(1)
<i>Chamaedorea elegans</i> Mart.	Palmae	Palmeira-de-salão; Palmeira-bambu	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-6	Micro.	Arbusto	Z10	C2, C6, C11(grupo)
<i>Chamaerops humilis</i> L.	Palmae	Palmeira-das-vassouras	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-5	Micro.	Arbusto	Z9	C11(1)
<i>Chambeyronia macrocarpa</i> (Brongn.) Vieill. ex Becc.	Palmae	Palmeira-rubra	Oceânia	Perenifólio	1-12	1-2	Micro.	Árvore	Z10	C15(1)
<i>Chelidonium majus</i> L.	Papaveraceae	Celidónia; Cedronha	Paleártico	Perenifólio	1-12	2-8	Hemi.	Herbácea	Z6	C9(3)
<i>Chorisia speciosa</i> A. St. Hil.	Bombacaceae	Sumaúma	Neotropical	Caducifólio	3-11	8-11	Meso.	Árvore	Z10	C5(1)
<i>Christella dentata</i> (Forssk.) Brownsey & Jermy	Thelypteridaceae		Áfricotropical; Indomalaio;	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z10	C9(grupo)
<i>Cinnamomum camphora</i> (L.) Sieb.	Lauraceae	Canforeira	Paleártico; Indomalaio	Perenifólio	1-12	2-4	Meso.	Árvore	Z10	C13(1)
<i>Cinnamomum zeylanicum</i> Bl.	Lauraceae	Caneleira; Árvore-da-canel	Indomalaio	Perenifólio	1-12	2-4	Micro.	Árvore	Z11	C1(1)
<i>Clematis florida</i> Thunb.	Ranunculaceae	Clematite	Paleártico	Marcescente	3-2 (11-2)	3-6	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z8	C9(2)
<i>Clivia miniata</i> Regel	Amaryllidaceae	Clívia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	2-11	Hemi.	Herbácea	Z10	C19(grupo)
<i>Clivia nobilis</i> Lindl.	Amaryllidaceae	Clívia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	2-11	Hemi.	Herbácea	Z10	C19(grupo)
<i>Codiaeum variegatum</i> (L.) Bl. var. <i>pictum</i> (Lodd.) Muell. Arg.	Euphorbiaceae	Crótone	Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z11	C2(1), C5(2), C6(2), C13(7), C15(2), C19(3)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Coelogyne cristata</i> Lindl.	Orchidaceae	Orquídea	Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-4	Epífita	Herbácea	Z10	C9(grupo)
<i>Coelogyne cristata</i> Lindl. var. <i>hololeuca</i> Rchb. f.	Orchidaceae	Orquídea	Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-4	Epífita	Herbácea	Z10	C9(grupo)
<i>Coelogyne dayana</i> Reichb. f.	Orchidaceae	Orquídea	Indomalaio	Perenifólio	1-12	3-5	Epífita	Herbácea	Z11	C9(>100)
<i>Coffea arabica</i> L.	Rubiaceae	Cafezeiro; Café	Áfrotropical	Perenifólio	1-12	4-5; 8-9	Micro.	Arbusto	Z11	C19(1)
<i>Colletia paradoxa</i> (Spreng) Escal.	Rhamnaceae	Planta-das- âncoras	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-5; 10-11	Micro.	Arbusto	Z9	C2(1)
<i>Convolvulus massonii</i> Dietr.	Convolvulaceae	Corriola-da- madeira; Convólculos-da- madeira	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-8	Geófito	Herbácea trepadora	Z10	C12(1)
<i>Coprosma repens</i> A. Rich.	Rubiaceae	Coprosma; Doiradinha	Antártico; Australiano	Perenifólio	1-12	4-5	Micro.	Arbusto	Z9	C2(1), C13(1)
<i>Cordyline terminalis</i> (L.) Kunth.	Agavaceae	Árvore-dos-reis	Indomalaio; Australiano; Oceânia; Antártico	Perenifólio	1-12	11-5	Micro.	Arbusto	Z10	C2(1), C3(1), C7(1), C19(2)
<i>Cortaderia selloana</i> (Schult. & Schult. f.) Asch. & Gräbn.	Gramineae	Plumas; Capim-das- pampas	Neotropical	Perenifólio	1-12	7-10	Hemi.	Herbácea	Z6	C5(1)
<i>Cosmos bipinnatus</i> Cav.	Compositae	Cosmos	Neártico; Neotropical	Sazonal	3-7	3-6	Terófito	Herbácea	Z8	C1 (grupo)
<i>Cottoneaster pannosus</i> Franch.	Rosaceae		Paleártico	Perenifólio	1-12	4-5	Micro.	Arbusto	Z7	C19(sebe)
<i>Crinum moorei</i> Hook. f.	Amaryllidaceae	Crino	Áfrotropical	Sazonal	11-9	4-8	Geófito	Herbácea	Z8	C16(grupo)
<i>Ctenanthe setosa</i> Eichler	Marantaceae	Maranta-cinza; Tenante	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-8	Hemi.	Herbácea	Z10	C19(grupo)
<i>Cuphea ignea</i> A. DC.	Lythraceae	Cigarinhos	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C9(grupo)
<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartw. ex Gordon	Cupressaceae	Cipreste-de- monterrey; Cedro-de- monterrey	Neártico	Perenifólio	1-12	1-2	Meso.	Árvore	Z8	C7(1)
<i>Cupressus sempervirens</i> L.	Cupressaceae	Cipreste	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-2	Micro.	Árvore	Z8	C1(1), C3(1), C5(4), C19(1)
<i>Cyathea cooperi</i> (F. Mueller) Domin.	Cyatheaceae	Feto-arbóreo	Australiano	Perenifólio	1-12	-----	Micro.	Árvore	Z10	C5(5), C7(1), C8A(6), C9(3), C10(1), C11(3), C13(3)
<i>Cycas circinalis</i> L.	Cycadaceae	Cicas	Indomalaio	Perenifólio	1-12	2-7	Micro.	Árvore	Z10	C6(2)
<i>Cycas revoluta</i> Thunb.	Cycadaceae	Cicas-revoluta; Cicas-d-sagú	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-8	Micro.	Árvore	Z9	C1(7), C2(1), C13(2), C18(3)
<i>Cymbalaria muralis</i> P. Gaertn., Mey. & Scherb.	Scrophulariaceae	Perpétua-de-roma	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-10	Hemi.	Herbácea	Z3	C9(grupo)
<i>Cymbidium insigne</i> Rolfe	Orchidaceae	Orquídea-de- haste; Cimbidio	Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-6	Hemi.	Herbácea	Z9	C9(grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Cymbidium lowianum</i> (Reichb. f.) Reichb. f.	Orchidaceae	Orquídea-de-haste; Címbidio	Indomalaio	Perenifólio	1-12	2-5	Hemi.	Herbácea	Z9	C9(grupo)
<i>Dahlia imperialis</i> Roetzl. ex Ortgies.	Compositae	Dália-imperial	Neotropical	Perenifólio	1-12	11-4	Micro.	Arbusto	Z10	C6(2), C19(1)
<i>Dasyllirion acrotrichum</i> (Schiede) Zucc.	Agavaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	6-9	Nano.	Árvore	Z9	C5(1)
<i>Davallia mariesii</i> Moore ex Bak.	Davalliaceae	Davália	Paleártico; Indomalaio	Perenifólio	1-12	-----	Epífita	Herbácea	Z8	C9(grupo)
<i>Delonix regia</i> (Bojer) Raf.	Leguminosae (Papilionoideae)	Acácia-rubra	Áfricotropical	Caducifólio	6-3	7-9	Micro.	Árvore	Z11	C8(1)
<i>Dendrobium fimbriatum</i> Hook.	Orchidaceae	Dendróbio	Indomalaio	Perenifólio	1-12	2-4	Epífita	Herbácea	Z10	C9(grupo)
<i>Dendrobium nobile</i> Lindley.	Orchidaceae	Dendróbio	Indomalaio	Perenifólio	1-12	2-4	Epífita	Herbácea	Z10	C9(grupo)
<i>Dianthus chinensis</i> L.	Caryophyllaceae	Cravo-chinês	Paleártico	Sazonal	3-8	4-6	Terófito	Herbácea	Z7	C19(grupo)
<i>Dichorisandra thyrsiflora</i> Mikan.	Commelinaceae	Dicorisandra	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C19(2)
<i>Dombeya wallichii</i> (Lindl.) B. D. Jackson	Sterculiaceae	Dombeia; Aurora	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	12-2	Micro.	Árvore	Z10	C2(1), C20(1)
<i>Dovyalis caffra</i> (Hook. f. & Harv.) Hook. F.	Flacourtiaceae		Áfricotropical	Perenifólio	1-12	10-11	Micro.	Arbusto	Z9	C6(1)
<i>Dracaena deremensis</i> Engl.	Agavaceae	Dracena	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	11-12	Micro.	Arbusto	Z11	C2(1)
<i>Dracaena draco</i> L. ssp. <i>draco</i>	Agavaceae	Dragoeiro	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-6	Micro.	Árvore	Z11	C5(1), C8(2), C9(2), C13(1), C20(1)
<i>Dracaena fragrans</i> (L.) Ker-Gawl.	Agavaceae	Dracena	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	11-1	Micro.	Arbusto	Z12	C1(1)
<i>Duranta erecta</i> L.	Verbenaceae	Duranta	Neotropical	Perenifólio	1-12	7-1	Micro.	Arbusto	Z10	C2(1), C6(1)
<i>Echium nervosum</i> Dryand.	Boraginaceae	Massaroco	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-6	Nano.	Arbusto	Z11	C12(6), C20(1)
<i>Eichhornia crassipes</i> (Mart.) Solms-Laub.	Pontederiaceae	Jacinto-de-água	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-10	Hidrófito	Herbácea	Z10	C10(grupo)
<i>Encephalartos lehmannii</i> Lehm.	Zamiaceae		Áfricotropical	Perenifólio	1-12	5-11	Nano.	Árvore	Z9	C1(1), C14(1)
<i>Epidendrum ibaguense</i> HBK	Orchidaceae	Orquídea-de-cruz	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C13, C14(grupo)
<i>Epipremnum aureum</i> (Lind. & André)	Araceae		Oceânia	Perenifólio	1-12	6-8	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z10	C20(1)
<i>Erysimum bicolor</i> (Hornem.) DC.	Cruciferae	Goivo-da-serra	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-5	Nano.	Arbusto	Z10	C12(1)
<i>Erythrina lysistemon</i> Hutch.	Leguminosae (Papilionoideae)	Coralina	Áfricotropical	Marcescente	5-4 (12-4)	12-5	Micro.	Árvore	Z10	C11(1)
<i>Eugenia uniflora</i> L.	Myrtaceae	Pitangueira	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Árvore	Z10	C2(2), C3(1)
<i>Euphorbia piscatoria</i> Ait.	Euphorbiaceae	Figueira-do-inferno	Paleártico	Caducifólio	9-6	4-6	Micro.	Arbusto suculento	Z10	C12(1)
<i>Euphorbia pulcherrima</i> Willd. ex Klotzsch.	Euphorbiaceae	Manhã-de-páscoa	Neotropical	Caducifólio	5-2	10-3	Micro.	Arbusto	Z10	C1(3), C2(1), C19(3)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Fagus sylvatica</i> L.	Fagaceae	Faia-europeia	Paleártico	Caducifólio	4-12	4-5	Meso.	Árvore	Z5	C3(1)
<i>Ficus aspera</i> Forst. f.	Moraceae	Figueira-bronzina	Oceânia	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Árvore	Z11	C5(1), C13(1)
<i>Ficus benjamina</i> L.	Moraceae	Figueira-da-índia- variegada	Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-4	Meso.	Árvore	Z11	C8(1)
<i>Ficus elastica</i> Roxb. ex Homem	Moraceae	Borracheira	Indomalaio	Perenifólio	1-12	5-8	Micro.	Árvore	Z11	C3(1)
<i>Ficus pumila</i> L.	Moraceae	Pastinha	Indomalaio; Paleártico	Perenifólio	1-12	10-12	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z8	C2, C5, C9, C10, C13 C20 (grupo)
<i>Gasteria carinata</i> (Mill.) Duval var. <i>verrucosa</i> (Mill.) Van Jarrsv.	Liliaceae (Aloeaceae)		Áfricotropical	Perenifólio	1-12	4-5	Hemi.	Herbácea suculenta	Z9	C19(6)
<i>Geranium maderense</i> P. F. Yeo	Geraniaceae	Gerânio-da- madeira; Pássaras	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-6	Nano.	Herbácea	Z10	C12(3)
<i>Geranium robertianum</i> L.	Geraniaceae	Erva-de-são- roberto	Paleártico; Neártico	Perenifólio	1-12	3-9	Hemi.	Herbácea	Z6	C9 (grupo)
<i>Goniophlebium subauriculatum</i> (Bl.) Presl.	Polypodiaceae	Feto-de metro; Feto-chorão	Indomalaio; Australiano; Oceânia	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z10	C8, C9, C11, C23 (grupo)
<i>Grevillea robusta</i> A. M. Cunn. ex. R. Br.	Proteaceae	Grevillea	Australiano	Perenifólio	1-12	4-7	Meso.	Árvore	Z8	C8(1)
<i>Hedera canariensis</i> Willd.	Araliaceae	Hera	Paleártico	Perenifólio	1-12	7-10	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	C10, C23(grupo)
<i>Hedychium gardnerianum</i> Ker-Gawl.	Zingiberaceae	Bananiha; Roca-de-vénus; Conteira	Paleártico; Indomalaio	Perenifólio	1-12	7-10	Hemi.	Herbácea	Z9	C5(grupo)
<i>Helichrysum bracteatum</i> (Vent.) Andrews	Compositae	Margarida-de- papel	Australiano	Sazonal	3-10	4-10	Terófito	Herbácea	Z8	C1, C17(grupo)
<i>Heliconia bihai</i> (L.) L.	Heliconiaceae	Helicônia	Neotropical	Perenifólio	1-12	7-11	Hemi.	Herbácea	Z11	C1(10), C11(grupo)
<i>Hemerocallis fulva</i> L.	Liliaceae (Hemerocallidaceae)	Hemerocalis; Lírio-dum-dia	Paleártico	Perenifólio	1-12	6-10	Geófito	Herbácea	Z5	C19(grupo)
<i>Hibiscus elatus</i> Swartz	Malvaceae	Hibisco-arbóreo	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Árvore	Z10	C2(1)
<i>Hibiscus rosa-sinensis</i> L.	Malvaceae	Cardeais; Hibiscos; Rosa-da-china	Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C1(10), C2(14), C3(12), C4(2), C5(7), C8(sebe)
<i>Hippesatrum vittatum</i> (L' Hérit) Herb.	Amaryllidaceae	Raqueis	Neotropical	Sazonal	4-10	4-10	Geófito	Herbácea	Z10	C19, C22 (grupo)
<i>Holmskioldia sanguinea</i> Retz.	Verbenaceae	Chapéus-de- mandarin; Chapéus-chineses	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C6(1)
<i>Howea forsteriana</i> (C. Moore & F. Muell.) Becc.	Palmae	Quência	Australiano	Perenifólio	1-12	1-9	Micro.	Árvore	Z10	C2(2)
<i>Hoya carnosia</i> (L. f.) R. Br.	Asclepiadaceae	Flor-de-cera	Indomalaio	Perenifólio	1-12	5-10	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z10	C9(1)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Hydrangea macrophylla</i> (Thunb.) Ser.	Hydrangeaceae	Hortênsias; Novelos	Paleártico	Caducifólio	3-12	5-10	Nano.	Arbusto	Z6	C1(grupo)
<i>Hymenocallis littoralis</i> (Jacq.) Salisb.	Amaryllidaceae	Lírio-aranha	Neotropical	Perenifólio	1-12	9-11	Geófito	Herbácea	Z10	C19(grupo)
<i>Impatiens walleriana</i> Hook. f.	Balsaminaceae	Maravilhas	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Herbácea	Z9	C23(grupo)
<i>Isoplexis sceptrum</i> (L. f.) Loud.	Scrophulariaceae	Isoplexis; Dedaleira-da-madeira	Paleártico	Perenifólio	1-12	Não floriu**	Nano.	Arbusto	Z10	C12(1)
<i>Jacaranda mimosifolia</i> D. Don.	Bignoniaceae	Jacarandá	Neotropical	Caducifólio	5-2	4-7; 9-10	Meso.	Árvore	Z9	C3(1)
<i>Jasminum odoratissimum</i> L.	Oleaceae	Jasmineiro-amarelo	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z11	C12(1)
<i>Juniperus chinensis</i> L.	Cupressaceae	Juniperos-da-china	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-3	Micro.	Árvore	Z4	C5(1)
<i>Juniperus virginiana</i> L.	Cupressaceae	Zimbro-da-virginia	Neártico	Perenifólio	1-12	3-4	Micro.	Árvore	Z2	C13(1)
<i>Justicia brandegeana</i> Wassh.	Acanthaceae	Beloperone	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C19(2)
<i>Kigelia africana</i> (Lam.) Benth.	Bignoniaceae	Árvore-das-salsichas	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	5-7	Micro.	Árvore	Z10	C15(1)
<i>Kniphofia x praecox</i> Bak.	Liliaceae (Aloeaceae)	Foguetes	Hortícola	Perenifólio	1-12	11-2	Hemi.	Herbácea	Z9	C7(grupo)
<i>Lagerstroemia indica</i> L.	Lythraceae	Laguerestré-mia; Flor-de-merenda; Suspiros	Paleártico; Indomalaio	Caducifólio	3-11	7-9	Micro.	Árvore	Z7	C6(1), C20(2)
<i>Laurus novocanariensis</i> Rivas Mart. & al.	Lauraceae	Loureiro	Paleártico	Perenifólio	1-12	11-3	Meso.	Árvore	Z10	C6(1), C11(1), C12(2)
<i>Lavandula pinnata</i> L. f.	Labiatae	Alfazema	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z11	C12(1)
<i>Ligustrum lucidum</i> Ait. f.	Oleaceae	Ligustro; Alfinheiro	Paleártico	Perenifólio	1-12	6-9	Micro.	Árvore	Z7	C1(1), C3(1), C8(11), C20(1)
<i>Litchi chinensis</i> Sonn.	Sapindaceae	Lichia	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-5	Micro.	Árvore	Z10	C17(1)
<i>Livistona chinensis</i> (Jacq.) R. Br. ex Mart.	Palmae	Livistónia	Paleártico	Perenifólio	1-12	2-5	Meso.	Árvore	Z9	C13(2)
<i>Lonicera japonica</i> Thunb.	Caprifoliaceae	Madressilva	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z4	C2(1)
<i>Magnolia grandiflora</i> L.	Magnoliaceae	Magnólia	Neártico	Perenifólio	1-12	5-8	Micro.	Árvore	Z6	C8(1), C11(1)
<i>Maranta leuconeura</i> E. Morr. var. <i>kerchoviana</i> E. Morr.	Marantaceae	Maranta	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-6	Hemi.	Herbácea	Z11	C19(grupo)
<i>Marcetella maderensis</i> (Bomm.)	Rosaceae	Marcetela	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-6	Nano.	Arbusto	Z10	C12(1)
<i>Markamia lutea</i> (Benth.) Schum.	Bignoniaceae	Marcâmia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Meso.	Árvore	Z11	C6(1)
<i>Melanoselinum decipiens</i> (Schr. & Wendl.) Hoffm.	Umbelliferae	Aipo-de-gado	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-6	Nano.	Herbácea	Z10	C12(1)
<i>Melia azedarach</i> L.	Meliaceae	Mélia; Orgulho-da-índia; Lilás-da-índia	Paleártico; Indomalaio	Caducifólio	4-1	4-6	Micro.	Árvore	Z10	C4(1)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Monizia edulis</i> Lowe	Umbelliferae	Cenoura-da-rocha; Nozelha	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-5	Nano.	Herbácea	Z10	C12(1)
<i>Monstera deliciosa</i> Liebm.	Araceae	Fruto-delicioso; Costela-de-adão	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z10	C7(grupo), C8(1), C20(3)
<i>Montanoa bipinnatifida</i> (Kunth) K. Kock	Compositae	Malmequer- arbóreo	Neotropical	Perenifólio	1-12	11-3	Micro.	Arbusto	Z10	C7(3)
<i>Morus nigra</i> L.	Moraceae	Amoreira	Paleártico	Caducifólio	3-12	4-5	Micro.	Árvore	Z6	C20(1)
<i>Musa x paradisiaca</i> L.	Musaceae	Bananeira-de- prata	Hortícola	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C3(grupo)
<i>Myrica faya</i> Ait.	Myricaceae	Faia-das-ilhas; Samouco	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-5	Micro.	Árvore	Z9	C20(1)
<i>Myrtus communis</i> L.	Myrtaceae	Murta	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-7; 10-11	Micro.	Arbusto	Z8	C2(1)
<i>Neoregelia johanis</i> (Carrière) L. B. Smith.	Bromeliaceae	Bromélia-ninho- de-passarinho	Neotropical	Perenifólio	1-12	10-1	Hemi.	Herbácea	Z10	C15, C19(grupo)
<i>Nephrolepis cordifolia</i> (L.) Presl.	Oleandraceae	Feto	Neotropical; Áfricotropical; Indomalaio; Oceânia; Australiano	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z10	C2, C7, C8, C9, C10 (grupo)
<i>Nerium oleander</i> L.	Apocynaceae	Sevadilha; Loendro	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-11	Micro.	Arbusto	Z9	C2(1), C8(1)
<i>Nolina recurvata</i> (Lem.) Hemsl.	Agavaceae	Nolina; Pata-de-elefante	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-8	Micro.	Árvore	Z9	C6(3)
<i>Ochna serrulata</i> (Hochst.) Walp.	Ochnaceae	Planta-do-rato- mikey	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	2-4	Nano.	Arbusto	Z9	C7(1), C20(3)
<i>Ocotea foetens</i> (Aiton) Baill.	Lauraceae	Til	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Meso.	Árvore	Z10	C5(1), C6(1), C8(1), C12(2), C19(1), C20(1)
<i>Oncidium lanceanum</i> Lindley	Orchidaceae	Orquídea-de- cheiro	Neotropical	Perenifólio	1-12	3-5	Epífita	Herbácea	Z11	C9(>10)
<i>Ophiopogon japonicus</i> (L. f.) Ker-Gawl	Liliaceae (Convallariaceae)	Relva-do-japão	Paleártico	Perenifólio	1-12	7-9	Hemi.	Herbácea	Z8	C1, C8, C10 (mancha)
<i>Oxalis latifolia</i> HBK.	Oxalidaceae	Trevo	Neotropical	Sazonal	10-5	12-4	Geófito	Herbácea	Z9	C9(grupo)
<i>Pandanus utilis</i> Bory	Pandanaceae	Pândano	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	9-3	Micro.	Árvore	Z10	C16(1)
<i>Papaver rhoeas</i> L.	Papaveraceae	Papoila	Paleártico	Sazonal	4-8	5-8	Terófito	Herbácea	Z5	C1(grupo)
<i>Paphiopedilum insigne</i> (Wallich ex Lindl.) Pfitz.	Orchidaceae	Sapatinho	Indomalaio	Perenifólio	1-12	11-4	Hemi.	Herbácea	Z10	C9(>100)
<i>Parietaria judaica</i> L.	Urticaceae	Alfavaca-de-cobra	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-9	Nano.	Arbusto	Z8	C8(grupo)
<i>Penstemon barbatus</i> (Cav.) Roth.	Scrophulariaceae		Neártico	Perenifólio	1-12	7-11	Nano.	Herbácea	Z3	C9, C23 (grupo)
<i>Pericallis x hybrida</i> R. Nordenstam	Compositae	Cinerária	Hortícola	Sazonal	1-7	3-6	Terófito	Herbácea	Z10	C1,C6,C7,C8, C16, C17 (grupo)
<i>Petunia x hybrida</i> hort. Vilm.- Andr.	Solanaceae	Petúnia	Hortícola	Sazonal	2-11	2-11	Terófito	Herbácea	Z9	C10(grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Phalaenopsis amabilis</i> (L.) Blume	Orchidaceae	Falanópsia	Indomalaio; Oceânia; Australiano	Perenifólio	1-12	1-12	Epífita	Herbácea	Z11	C9(20)
<i>Phalaenopsis schilleriana</i> Reichb. f.	Orchidaceae	Falanópsia	Indomalaio	Perenifólio	1-12	10-6	Epífita	Herbácea	Z11	C9(22)
<i>Philodendron erubescens</i> K. Koch & Augustin	Araceae	Filodendro	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-6	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z11	C2(4), C9(2)
<i>Philodendron fendleri</i> K. Krause	Araceae	Filodendro-	Neotropical	Perenifólio	1-12	3-4	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z11	C7(1), C13(1)
<i>Philodendron pinnatifidum</i> Schott.	Araceae	Filodendro	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-6	Hemi.	Arbusto	Z11	C6(1), C8(1)
<i>Phlebodium aureum</i> (L.) J. Sm.	Polypodiaceae	Polipódio-dourado	Neártico; Neotropical	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z10	C9, C19 (grupo)
<i>Phoenix canariensis</i> Chabaud.	Palmae	Palmeira-das- canárias	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-3	Meso.	Árvore	Z11	C3(1), C5(1), C6(1), C8(1)
<i>Phoenix dactylifera</i> L.	Palmae	Tamareira	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-3	Meso.	Árvore	Z11	C3(1)
<i>Phoenix roebelinii</i> O' Brien.	Palmae	Palmeira-anã	Indomalaio	Perenifólio	1-12	5-7	Micro.	Árvore	Z11	C2(1), C7(1), C15(1)
<i>Phormium tenax</i> Forst. & Forst. f.	Agavaceae	Espadana	Antártico	Perenifólio	1-12	6-8	Hemi.	Herbácea	Z8	C6(1)
<i>Phragmipedium shlimii</i> (Lind. & Rchb. f.) Rolfe.	Orchidaceae	Sapatinho-da- américa	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z11	C9(grupo)
<i>Phyllanthus tenellus</i> Roxb.	Euphorbiaceae	Quebra-pedra	Áfrotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Herbácea	Z11	C19(grupo)
<i>Phyllostachys bambusoides</i> Sieb. & Zucc.	Gramineae	Bambu	Paleártico	Perenifólio	1-12	Não floriu**	Hemi.	Herbácea	Z8	C3, C5, C6 (grupo)
<i>Phytolacca dioica</i> (L.) Moq.	Phytolaccaceae	Bela-sombra	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-9	Meso.	Árvore	Z11	C19(1)
<i>Picconia excelsa</i> (Ait.) DC.	Oleaceae	Pau-branco	Paleártico	Perenifólio	1-12	2-5	Micro.	Árvore	Z10	C20(1)
<i>Pilea microphylla</i> (L.) Liebm.	Urticaceae	Arrozinho	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C1, C16, C19 (grupo)
<i>Pilea nummularifolia</i> (Sw.) Wedd.	Urticaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	6-10	Hemi.	Herbácea	Z10	C9(grupo)
<i>Pistia stratiotes</i> L.	Araceae	Alface-de- água	Neotropical; Áfrotropical; Indomalaio; Oceânia; Australiano	Perenifólio	1-12	1-12	Hidrófita	Herbácea	Z10	C23(grupo)
<i>Pittosporum tobira</i> Ait.	Pittosporaceae	Tobira	Paleártico	Perenifólio	1-12	2-5	Micro.	Árvore	Z9	C13(1)
<i>Pittosporum undulatum</i> Vent.	Pittosporaceae	Incenseiro	Australiano	Perenifólio	1-12	2-4	Micro.	Árvore	Z9	C5(1)
<i>Plantago maderensis</i> Decne.	Plantaginaceae	Plantago-da- madeira	Paleártico	Perenifólio	1-12	2-5	Nano.	Arbusto	Z10	C12(1)
<i>Platycerium bifurcatum</i> (Cav.) C. Chr.	Polypodiaceae	Feto-de-corno- de- veado	Indomalaio; Oceânia; Australiano	Perenifólio	1-12	-----	Epífita	Herbácea	Z9	C9(2)
<i>Plumeria rubra</i> L. var. <i>acutifolia</i> (Poir.) Woodson.	Apocynaceae	Planta-dos- dentes; Pluméria	Neotropical	Caducifólio	5-1	6-12	Micro.	Árvore	Z10	C1(2), C2(1), C11(1), C21(1)
<i>Polygonum capitatum</i> Buch.- Ham. ex D. Don	Polygonaceae	Polígono-de- jardim	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z8	C9(grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Pteris vittata</i> L.	Pteridaceae	Feto	Paleártico; Indomalaio; Australiano Oceânia	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z9	C1, C9 (grupo)
<i>Punica granatum</i> L.	Punicaceae	Romãzeira	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-7	Micro.	Árvore	Z9	C1(5), C2(2), C13(1)
<i>Quercus ilex</i> L.	Fagaceae	Azinhiera	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-5	Meso.	Árvore	Z7	C19(1)
<i>Rhapis excelsa</i> (Thunb.) Henry.	Palmae	Palmeira-de-hong- kong; Pameira-de- senhora	Paleártico	Perenifólio	1-12	6-9	Micro.	Arbusto	Z10	C1(1)
<i>Rhododendron mucronatum</i> G. Don.	Ericaceae	Azálea-japonesa	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z7	C3(5), C13(grupo), C19(grupo)
<i>Ruellia graecizans</i> Backer	Acanthaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	8-12	Nano.	Arbusto	Z10	C9(grupo)
<i>Rumohra adiantiformis</i> (Forst. f.) Ching.	Dryopteridaceae		Áfricotropical; Australiano; Oceânia; Antártico; Neotropical	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z10	C9(grupo)
<i>Ruscus streptophyllus</i> P. F. Yeo	Liliaceae	Alegria-campo- anão	Paleártico	Perenifólio	1-12	10-1	Caméfito	Herbácea	Z10	C12(1)
<i>Russelia equisetiformis</i> Scdl. & Cham.	Scrophulariaceae	Russélia ; Lágrimas-de-amor	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z9	C20, C22 (grupo)
<i>Saccharum officinarum</i> L.	Gramineae	Cana-sacarina; Cana-de-açúcar	Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-3	Hemi.	Herbácea	Z9	C19(1)
<i>Salix canariensis</i> C. Sm. ex Link	Salicaceae	Seixo; Seixeiro	Paleártico	Caducifólio	2-12	1-2	Micro.	Árvore	Z11	C2(1)
<i>Sambucus lanceolata</i> R. Br.	Caprifoliaceae	Sabugueiro-da- madeira	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-5	Micro.	Árvore	Z10	C20(1)
<i>Saxifraga stolonifera</i> Meerb.	Saxifragaceae	Saxifraga	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-4	Hemi.	Herbácea	Z5	C2, C9 (grupo)
<i>Scadoxus puniceus</i> (L.) Friss & Nardal.	Amoryllidaceae	Broxa	Áfricotropical	Sazonal	4-9	11-4	Geófito	Herbácea	Z10	C16(17)
<i>Schefflera actinophylla</i> (Endl.) Harms	Araliaceae	Brassaia	Australiano; Oceânia	Perenifólio	1-12	8-10	Meso.	Árvore	Z10	C1(2)
<i>Schotia brachypetala</i> Sonder.	Leguminosae (Caesalpinioidae)	Scótia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	2-5	Micro.	Árvore	Z9	C2(1), C8(1)
<i>Scilla maderensis</i> Mnzs.	Liliaceae	Cila-da- madeira	Paleártico	Sazonal	9-5	10-11	Geófito	Herbácea	Z11	C12(grupo)
<i>Selaginella denticulata</i> (L.) Spring.	Selaginellaceae	Selaginela	Paleártico	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z9	C9(mancha)
<i>Semele androgyna</i> (L.) Kunth.	Liliaceae	Alegria-campo	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-5	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	C20(1)
<i>Senna corymbosa</i> (Lam.) Irwin & Barneby	Leguminosae (Caesalpinioidae)	Cássia-corymbosa	Neotropical	Perenifólio	1-12	7-11	Nano.	Arbusto	Z9	C20(1)
<i>Senna spectabilis</i> (DC.) Irwin & Barneby	Leguminosae (Caesalpinioidae)	Cássia- espectacular	Neotropical	Caducifólio	3-12	7-11	Micro.	Árvore	Z10	C20(1)
<i>Sibthorbia peregrina</i> L.	Scrophulariaceae	Hera-terrestre; Erva-redonda	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-8	Fane. Trep.	Herbácea trepadora	Z10	C12(grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Solanum seaforthianum</i> Andrews	Solanaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	5-11	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	C9(1)
<i>Sonchus fruticosus</i> L.fil.	Compositae	Leituga; Lingua-de vaca; Serralha-da-rocha	Paleártico	Perenifólio	1-12	6-8	Nano.	Arbusto	Z10	C12(1)
<i>Sonchus ustulatus</i> Lowe ssp. <i>maderensis</i> Aldr.	Compositae	Leituga	Paleártico	Perenifólio	1-12	7-10	Caméfito	Herbácea	Z10	C12(1)
<i>Spathodea campanulata</i> Beauv.	Bignoniaceae	Chama-da- floresta; Tulipeiro-africano	Áfricotropical	Caducifólio	1-12 (Variação individual)	1-12	Micro.	Árvore	Z11	C19(1)
<i>Stanhopea costaricensis</i> Reichb. f.	Orchidaceae	Orquídea- passarinho; Passarinhos	Neotropical	Perenifólio	1-12	7-10	Epífita	Herbácea	Z10	C9(grupo)
<i>Stenotaphrum secundatum</i> (Walter) Kuntze	Gramineae	Relva; Relva-de-correr	Neotropical; Áfricotropical; Oceânia	Perenifólio	1-12	3-11	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z9	C2, C5, C6, C8, C11(tapete)
<i>Strelitzia nicolai</i> Reg. & Körn.	Strelitziaceae	Estrelícia-gigante	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C3(1), C5(1)
<i>Strelitzia reginae</i> Banks ex Dryand.	Strelitziaceae	Estrelícia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C1(grupo)
<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassm.	Palmae	Coqueiro-de- jardim; Palmeira-rainha	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-7	Micro.	Árvore	Z10	C1(1)
<i>Syzygium jambos</i> (L.) Alston.	Myrtaceae	Jambeiro	Indomalaio	Perenifólio	1-12	3-7	Micro.	Árvore	Z10	C8(1), C19(1)
<i>Syzygium malaccense</i> (L.) Merril & Perry	Myrtaceae	Jambeiro	Indomalaio; Australiano	Perenifólio	1-12	4-6	Micro.	Árvore	Z10	C12(1)
<i>Tabebuia impetiginosa</i> (DC.) Standley	Bignoniaceae	Tabebuia	Neotropical	Caducifólio	4-1	12-2	Micro.	Árvore	Z9	C19(1)
<i>Tamus edulis</i> Lowe	Dioscoreaceae	Norça	Paleártico	Sazonal	10-6	12-2	Geófito	Herbácea trepadora	Z10	C12(1)
<i>Tecoma stans</i> (L.) Juss. ex HBK.	Bignoniaceae	Estenolóbio	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C20(2)
<i>Tecomandthe dendrophila</i> (Bl.) Schum.	Bignoniaceae	Tecomante	Oceânia	Perenifólio	1-12	4-7	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	C9(1)
<i>Teline maderensis</i> Webb et Berth. var. <i>maderensis</i>	Leguminosae (Papilionoideae)	Piomo	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-8	Micro.	Arbusto	Z10	C12(1)
<i>Tetrapanax papyrifer</i> (Hook.) K. Kock.	Araliaceae	Arália-do-papel	Indomalaio	Perenifólio	1-12	8-1	Micro.	Arbusto	Z8	C20(1)
<i>Teucrium betonicum</i> L' Hérít	Labiatae	Erva-branca; Abrotona	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-8	Nano.	Arbusto	Z10	C12(1)
<i>Thuja occidentalis</i> L.	Cupressaceae	Tuia-ocidental	Neártico	Perenifólio	1-12	5-8	Micro.	Árvore	Z4	C3(1)
<i>Tilia tomentosa</i> Moench.	Tiliaceae	Tília-prateada	Paleártico	Caducifólio	4-11	5-6	Meso.	Árvore	Z6	C6(1)
<i>Tillandsia cyanea</i> Lindl. ex K. Koch.	Bromeliaceae	Tilândsia	Neotropical	Perenifólio	1-12	8-2	Hemi.	Herbácea	Z10	C19(grupo)
<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	Leguminosae (Papilionoideae)	Tipuana; Orgulho da Bolívia	Neotropical	Marcescente	5-4 (3-4)	4-7	Meso.	Árvore	Z9	C5(1), C13(1)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Trachelospermum jasminoides</i> (Lindl.) Lem.	Apocynaceae	Jasmim-de-estrela	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-11	Fane. trep.	Árbusto trepador	Z8	C2(1), C9(2)
<i>Tradescantia pallida</i> (Rose) D. Hunt.	Commelinaceae	Tradescantia	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea trepadora	Z8	C22(grupo)
<i>Tradescantia zebrina</i> hort. ex. Bosse	Commelinaceae	Zebrina	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z9	C1, C9(grupo)
<i>Viola x witrockiana</i> Gams.	Violaceae	Amores-perfeitos	Hortícola	Perenifólio	1-12	3-8	Hemi.	Herbácea	Z5	C1, C17 (grupo)
<i>Visnea mocanera</i> L. f.	Theaceae	Mocano	Paleártico	Perenifólio	1-12	11-2	Micro.	Árvore	Z10	C20(1)
<i>Washingtonia filifera</i> (Lind. ex André) H. A. Wendl	Palmae	Palmeira-de-leque-da-califórnia	Neártico	Perenifólio	1-12	5-8	Micro.	Árvore	Z9	C6(1), 14(1), C20(1)
<i>Washingtonia robusta</i> Wendl.	Palmae	Palmeira-de-leque-mexicana	Neártico	Perenifólio	1-12	4-6	Micro.	Árvore	Z10	C11(1)
<i>Wedelia trilobata</i> (L.) Hitchc.	Compositae	Vedélia	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Herbácea	Z11	C16 (grupo)
<i>steria sinensis</i> (Sims) Sweet.	Leguminosae (Papilionoideae)	Lilases; Glicínia	Paleártico	Caducifólio	2-12	2-5; 7-8	Fane. trep.	Árbusto trepador	Z5	C2(1)
<i>Yucca elephantipes</i> Regel.	Agavaceae	luca	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-10	Micro.	Árbusto	Z10	C20(1)
<i>Zamia furfuracea</i> L. f. in Aiton	Zamiaceae	Zamia	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-11	Hemi.	Árbusto	Z10	C6(1)
<i>Zygopetalum mackayi</i> Hook.	Orchidaceae	Orquídea	Neotropical	Perenifólio	1-12	10-12	Epífita	Herbácea	Z10	C9(1)

Legenda:

- Plantas que não floriram no período em estudo (Janeiro 2002 – Janeiro 2005): * plantas novas; ** plantas que nunca floriram por falta de aclimação;
- Plantas marcescentes (plantas semiperenifólias e semcaducifólias): 3-2 (**3-4**) – folhas todo o ano mas com renovação significativa em Março e Abril.

Anexo 14
CARACTERIZAÇÃO FITOGEOGRÁFICA DA QUINTA DO POÇO

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Abelia x grandiflora</i> (André) Rehd.	Caprifoliaceae	Abélia	Hortícola	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z5	C7(1), C12(1), C15(grupo), C16(1)
<i>Acacia melanoxylon</i> R. Br.	Leguminosae (Mimosoideae)	Acácia-austrália	Australiano	Perenifólio	1-12	1-4	Meso.	Árvore	Z8	C15(1)
<i>Acalypha wilkesiana</i> Muell. Arg.	Euphorbiaceae	Acálifa;	Oceânia	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C10(1), C12(1), C13(grupo), C15(6), C16(2)
<i>Acanthus mollis</i> L.	Acanthaceae	Erva-gigante	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-8	Hemi.	Herbácea	Z6	C1, C2, C3, C16 (grupo)
<i>Acca sellowiana</i> (O. Berg.) Burret	Myrtaceae	Goiabeira-ananás	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-7	Micro.	Árvore	Z8	C12(1), C15(1)
<i>Adiantum capillus-veneris</i> L.	Adiantaceae	Avenca; Avenca-das-fontes	Paleártico, Neotropical, Áfricotropical, Indomalaio	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z8	C10 (grupo)
<i>Aeonium decorum</i> Webb ex Bolle	Crassulaceae	Ensaio	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-6	Caméfito	Herbácea suculenta	Z10	C10(grupo)
<i>Agapanthus praecox</i> Willd. ssp. <i>orientalis</i> (Leighton) Leighton	Liliaceae	Agapantos; Coroas-de-henrique	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	4-9	Hemi.	Herbácea	Z9	C2, C15, C16 (mancha)
<i>Agave attenuata</i> Salm-Dyck	Agavaceae	Piteira; Agave-pescoço-de-cisne	Neotropical	Perenifólio	1-12	12-3	Nano.	Árvore suculenta	Z9	C12(5), C15 (8)
<i>Ageratum houstonianum</i> Mill.	Compositae		Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Terófito	Herbácea	Z8	C12 (grupo)
<i>Aloe saponaria</i> (Ait. f.) Haw.	Liliaceae (Aloeaceae)	Aloés-sabão	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-7	Hemi.	Herbácea suculenta	Z9	C8 (grupo)
<i>Alternanthera ficoidea</i> (L.) R. Br.	Amaranthaceae	Pirriquitos	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Caméfito	Herbácea	Z10	C15 (grupo)
<i>Angiopteris evecta</i> (Forst.) Hoffm.	Marattiaceae	Feto-craca	Indomalaio; Australiano	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z10	C8(1)
<i>Annona cherimola</i> Mill.	Annonaceae	Anoneira	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-7	Micro.	Árvore	Z10	C11(1), C12(1)
<i>Anredera cordifolia</i> (Ten.) Steenis	Basellaceae	Boussingau-Itia; Trepadeira-da-madeira	Neotropical	Caducifólio	6-2	7-9	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z9	C9(1), C15(grupo)
<i>Anthurium andraeanum</i> André	Araceae	Antúrio	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z11	C10 (grupo)
<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> H. A. Wendl. & Drude.	Palmae	Palmeira- elegante	Australiano	Perenifólio	1-12	2-10	Meso.	Árvore	Z10	C12(1)
<i>Argyranthemum frutescens</i> (L.) Schultz-Bip. .	Compositae	Estrelas; Estreleiras; Pampilhos; Malmequeres	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C2(2), C12(grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Argyranthemum pinnatifidum</i> (L. f.) Lowe ssp. <i>pinnatifidum</i>	Compositae	Estrelas; Pampilhos; Malmequeres	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C16(grupo)
<i>Asparagus asparagoides</i> (L.) Druce	Liliaceae (Asparagaceae)	Alegria-campo- miúdo	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	3-4	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z10	C2(grupo)
<i>Asparagus setaceus</i> (Kunth) Jassop	Liliaceae (Asparagaceae)	Esparto-de-folha- miúda; Esparto	Africotropical	Perenifólio	1-12	9-12	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z9	C2, C16 (grupo)
<i>Aspidistra elatior</i> Bl.	Liliaceae (Convallariaceae)		Paleártico	Perenifólio	1-12	6-7	Hemi.	Herbácea	Z8	C3(2)
<i>Asplenium anceps</i> Lowe ex Hook. & Grev.	Aspleniaceae	Falsa-avenca	Paleártico	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z10	C3(grupo)
<i>Beaufortia sparsa</i> R. Br.	Myrtaceae	Limpa-garrafas	Australiano	Perenifólio	1-12	5-7	Nano.	Arbusto	Z9	C15(1)
<i>Begonia minor</i> Jacq.	Begoniaceae	Corações; Begónia- sempre- em-flor	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C3, C10 (grupo)
<i>Begonia x ricinifolia</i> A. Dietr.	Begoniaceae	Corações; Begónias	Hortícola	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C1, C5A, C6 (grupo)
<i>Bergenia crassifolia</i> (L.) Fritsch.	Saxifragaceae	Bergénia; Couve-de- jardim	Paleártico	Perenifólio	1-12	11-4	Caméfito	Herbácea	Z3	C1, C15 (grupo)
<i>Bougainvillea glabra</i> Choisy	Nyctaginaceae	Buganvília	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	C3(2), C10(2), C11(3), C12(2), C12A(2)
<i>Bougainvillea spectabilis</i> Willd.	Nyctaginaceae	Buganvília	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	C3(4)
<i>Breynia nivosa</i> (W.G. Sm.) Small.	Euphorbiaceae		Oceânia	Perenifólio	1-12	7-8	Nano.	Arbusto	Z11	C10(1), C12(3)
<i>Brugmansia versicolor</i> Lagerh.	Solanaceae	Trombeteira	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C14(1)
<i>Bulbine frutescens</i> (L.) Willd.	Liliaceae (Asphodelaceae)	Bulbine	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Geófita	Herbácea suculenta	Z9	C1, C8, C11, C15 (grupo)
<i>Buxus microphylla</i> Sieb. & Zucc.	Buxaceae	Buxo	Paleártico; Indomalaio	Perenifólio	1-12	3-4	Nano.	Arbusto	Z6	C12(boradura)
<i>Buxus sempervirens</i> L.	Buxaceae	Buxo	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-4; 10-11	Nano.	Arbusto	Z5	C12(boradura)
<i>Calendula officinalis</i> L. cvs.	Compositae	Calendula	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Terófita	Herbácea	Z6	C6, C7 (grupo)
<i>Callistemon citrinus</i> (Curtis) Skeels	Myrtaceae	Martinete	Australiano	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z8	C12(1), C13(1)
<i>Callistemon rigidus</i> R. Br.	Myrtaceae	Martinete	Australiano	Perenifólio	1-12	4-8	Micro.	Arbusto	Z9	C12(2)
<i>Canna x generalis</i> L. H. Bail.	Cannaceae	Canas-da-índia; Bananeiras-de-flor	Hortícola	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z9	C1, C3, C12, C16 (grupo)
<i>Cardiospermum grandiflorum</i> Sw.	Sapindaceae	Corriola-dos- balões	Africotropical; Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z10	C11(grupo)
<i>Caryota mitis</i> Lour.	Palmae	Palmeira-rabo-de - peixe	Indomalaio	Perenifólio	1-12	6-8	Micro.	Árvore	Z10	C16A(1)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Ceratonia siliqua</i> L.	Leguminosae (Cesalpinioideae)	Alfarrobeira	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-9	Micro.	Árvore	Z9	C15(1)
<i>Cestrum roseum</i> HBK.	Solanaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	3-11	Nano.	Arbusto	Z10	C13(1)
<i>Chamaedorea elegans</i> Mart.	Palmae	Palmeira-de-salão; Palmeira-bambu	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-6	Micro.	Arbusto	Z10	C16(2)
<i>Chelidonium majus</i> L.	Papaveraceae	Celidónia; Cedronha	Paleártico	Perenifólio	1-12	2-8	Hemi.	Herbácea	Z6	C3 (grupo)
<i>Chlorophytum comosum</i> (Thumb.) Jacques	Liliaceae (Anthericaceae)	Fitinhas	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z9	C1, C2, C6, C8 (grupo)
<i>Chorisia speciosa</i> A. St. Hil.	Bombacaceae	Sumaúma	Neotropical	Caducifólio	3-11	8-11	Meso.	Árvore	Z10	C2(2), C10(1)
<i>Cinnamomum camphora</i> (L.) Sieb.	Lauraceae	Canforeira	Paleártico; Indomalaio	Perenifólio	1-12	2-4	Meso.	Árvore	Z10	C2(1), C6(1), C9(1)
<i>Cinnamomum zeylanicum</i> Bl.	Lauraceae	Caneleira; Árvore-da-canel	Indomalaio	Perenifólio	1-12	2-4	Micro.	Árvore	Z11	C10(1), C12(1)
<i>Clivia miniata</i> Regel	Amaryllidaceae	Clívia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	2-11	Hemi.	Herbácea	Z10	C1, C12 (grupo)
<i>Clivia nobilis</i> Lindl.	Amaryllidaceae	Clívia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	2-11	Hemi.	Herbácea	Z10	C1, C3, C12 (grupo)
<i>Codiaeum variegatum</i> (L.) Bl. var. <i>pictum</i> (Lodd) Muell. Arg.	Euphorbiaceae	Crótone	Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z11	C6(3), C11(4), C12(24), C16(2)
<i>Colocasia esculenta</i> var. <i>fontanesii</i> (Schott) Schott	Araceae	Inhame	Indomalaio	Perenifólio	1-12	5-6	Geófita	Herbácea	Z10	C12(1)
<i>Commelina benghalensis</i> L.	Commelinaceae	Comelina	Indomalaio Áfricotropical;	Perenifólio	1-12	3-9	Hemi.	Herbácea trepadora	Z9	C12 (grupo)
<i>Cordyline terminalis</i> (L.) Kunth.	Agavaceae	Árvore-dos-reis	Indomalaio; Australiano; Oceânia; Antártico	Perenifólio	1-12	11-5	Micro.	Arbusto	Z10	C4(1), C7(1), C8(1)
<i>Cortaderia selloana</i> (Schult. & Schult. f.) Asch. & Gräbn.	Gramineae	Plumas; Erva-das-pampas; Penacho-branco	Neotropical	Perenifólio	1-12	7-10	Hemi.	Herbácea	Z6	C6(1)
<i>Corynocarpus laevigatus</i> Forst. & Forst. f.	Corynocarpaceae	Loureiro-da-nova- zelândia	Antártico	Perenifólio	1-12	2-5	Micro.	Árvore	Z10	C13(1)
<i>Cottoneaster pannosus</i> Franch.	Rosaceae		Paleártico	Perenifólio	1-12	4-5	Micro.	Arbusto	Z7	C11(1)
<i>Crassula ovata</i> (Mill.) Druce.	Crassulaceae	Ensaíão-branco ; Planta-de-jade	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	11-3	Nano.	Arbusto suculento	Z10	C6(grupo)
<i>Crinum x powellii</i> L. H. Bail	Amaryllidaceae	Crino-rosado; Açucena-gigante	Hortícola	Sazonal	11-9	3-8	Geófita	Herbácea	Z6	C15(grupo)
<i>Cryptomeria japonica</i> (L.f.) Don	Taxodiaceae	Criptoméria	Paleártico	Perenifólio	1-12	12-3	Meso.	Árvore	Z7	C7(1)
<i>Cuphea hyssopifolia</i> HBK.	Lythraceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C1(grupo)
<i>Cuphea ignea</i> A. DC.	Lythraceae	Cigarrinhos	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C16(4)
<i>Cupressus sempervirens</i> L.	Cupressaceae	Cipreste	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-2	Micro.	Árvore	Z8	C10(1), C12(1)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Cyathea australis</i> (R. Br.) Domin	Cyatheaceae	Feto-arbóreo	Australiano	Perenifólio	1-12	-----	Micro.	Árvore	Z10	C1(1)
<i>Cyathea cooperi</i> (F. Mueller) Domin.	Cyatheaceae	Feto-arbóreo	Australiano	Perenifólio	1-12	-----	Micro.	Árvore	Z10	C1(4), C2(2), C4(1), C5(2), C6(1), C16(1)
<i>Cymbalaria muralis</i> P. Gaertn., Mey. & Scherb.	Scrophulariaceae	Perpétua-de-roma	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-10	Hemi.	Herbácea	Z3	C3(grupo)
<i>Cyrtomium falcatum</i> (L. f.) Presl.	Dryopteridaceae	Feto-azevinho	Paleártico; Indomalaio; Áfricotropical; Oceânia	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z9	C10 (grupo)
<i>Davallia canariensis</i> (L.) Sm.	Davalliaceae	Cabrinhas	Paleártico	Perenifólio	1-12	-----	Epífita	Herbácea	Z9	C3(grupo)
<i>Dietes iridioides</i> (L.) Klatt.	Iridaceae	Dietes	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-5	Geófito	Herbácea	Z9	C6, C8, C16 (grupo)
<i>Dracaena deremensis</i> Engl.	Agavaceae	Dracena	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	11-12	Micro.	Arbusto	Z11	C6(2)
<i>Dracaena draco</i> L. ssp. <i>draco</i>	Agavaceae	Dragoeiro	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-6	Micro.	Árvore	Z11	C12A(1)
<i>Dracaena fragrans</i> (L.) Ker-Gawl.	Agavaceae	Dracena	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	11-1	Micro.	Arbusto	Z12	C8(1)
<i>Duranta erecta</i> L.	Verbenaceae	Duranta	Neotropical	Perenifólio	1-12	7-1	Micro.	Arbusto	Z10	C2(1), C7(1), C16(2)
<i>Echeveria pulvinata</i> Rose	Crassulaceae	Echevéria-felpuda	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-6	Caméfito	Herbácea suculenta	Z9	C10(grupo)
<i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl.	Rosaceae	Nespereira	Paleártico	Perenifólio	1-12	10-12	Micro.	Árvore	Z8	C12(1), C15(1)
<i>Eriocephalus africanus</i> L.	Compositae	Alecrim-da-argem	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-1	Nano.	Arbusto	Z9	C12(2)
<i>Erythrina abyssinica</i> Lam. ex DC.	Leguminosae (Papilionoideae)	Coralina-da-abissínia	Áfricotropical	Caducifólio	5-1	1-6; 9-10	Micro.	Árvore	Z10	C9(1), C10(2)
<i>Escallonia bifida</i> Link & Otto	Grossulariaceae	Escalónia	Neotropical	Perenifólio	1-12	3-1	Micro.	Arbusto	Z9	C11(1), C12(1), C13(1)
<i>Eucalyptus citriodora</i> Hook.	Myrtaceae	Eucalipto-limão	Australiano	Perenifólio	1-12	12-1	Meso.	Árvore	Z10	C16 (1)
<i>Eugenia uniflora</i> L.	Myrtaceae	Pitangueira	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Árvore	Z10	C2(1), C11(2), C13(4)
<i>Euphorbia pulcherrima</i> Willd. ex Klotzsch.	Euphorbiaceae	Manhã-de-páscoa	Neotropical	Caducifólio	5-2	10-3	Micro.	Arbusto	Z10	C6(1), C12(3), C13(8)
<i>Euryops chrysanthemoides</i> (DC.) R. Nordenstam	Compositae	Estrela-amarela	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z9	C12 (grupo)
<i>Euryops pectinatus</i> Cass.	Compositae	Estrela-amarela	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z9	C6(1), C7(1), C12(3)
<i>Farfugium japonicum</i> (L.) Kitam.	Compositae	Patás-de-cavalo; Boinas	Paleártico	Perenifólio	1-12	10-2	Hemi.	Herbácea	Z7	C8(grupo)
<i>Festuca glauca</i> Vill.	Gramineae	Festuca	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-6	Hemi.	Herbácea	Z3	C4 (grupo)
<i>Ficus elastica</i> Roxb. ex Homem	Moraceae	Borracheira	Indomalaio	Perenifólio	1-12	5-8	Micro.	Árvore	Z11	C15(1)
<i>Ficus pumila</i> L.	Moraceae	Pastinha	Indomalaio; Paleártico	Perenifólio	1-12	10-12	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z8	C12, C12A, C13 (grupo)
<i>Fraxinus excelsior</i> L.	Oleaceae	Freixo	Paleártico	Caducifólio	2-11	1-2	Micro.	Árvore	Z4	C2(1), C16(1)
<i>Gazania rigens</i> (L.) Gaertn.	Compositae	Gazania	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z9	C16(grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Geranium maderense</i> P. F. Yeo	Geraniaceae	Gerânio-da-madeira; Pássaras	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-6	Nano.	Herbácea	Z10	C1, C2, C12, C16 (grupo)
<i>Ginkgo biloba</i> L.	Ginkgoaceae	Ginco; Árvore-avenca	Paleártico	Caducifólio	4-1	5	Micro.	Árvore	Z4	C15(1)
<i>Gleditsia triacanthos</i> L.	Leguminosae (Caesalpinioi-deae)	Espinheiro-da- virgínia	Neártico	Caducifólio	3-11	3-6	Meso.	Árvore	Z3	C11(1), C15(1)
<i>Graptopetalum paraguayense</i> (N. E. Br.) Walth.	Crassulaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	3-6	Caméfito	Herbácea suculenta	Z9	C10(grupo)
<i>Grevillea robusta</i> A. M. Cunn. ex R. Br.	Proteaceae	Grevilea	Australiano	Perenifólio	1-12	4-7	Meso.	Árvore	Z8	C6(1)
<i>Hebe x franciscana</i> (Eastw.) Souster..	Scrophulariaceae	Verónica	Hortícola	Perenifólio	1-12	5-12	Nano.	Arbusto	Z8	C1, C16 (grupo), C15(3)
<i>Hedera helix</i> L.	Araliaceae	Hera	Paleártico	Perenifólio	1-12	9-10	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z5	C12(1)
<i>Hemerocallis dumortieri</i> E. Morr.	Liliaceae (Hemerocallida-ceae)	Hemerocalis; Lírio-dum-dia	Paleártico	Perenifólio	1-12	6-10	Geófito	Herbácea	Z5	C1, C6 (grupo)
<i>Hibiscus hastatus</i> L. f.	Malvaceae	Cardeais	Oceânia	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Árvore	Z11	C14(1)
<i>Hibiscus rosa-sinensis</i> L.	Malvaceae	Cardeais; Hibiscos; Rosa da China	Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C8(1), C10(4), C12(14), C13(2), C15(sebe)
<i>Hibiscus syriacus</i> L.	Malvaceae	Cardeal-roxo; Hibisco-da-síria	Paleártico; Indomalaio	Caducifólio	5-11	7-9	Micro.	Arbusto	Z5	C16(2)
<i>Holmskioldia sanguinea</i> Retz.	Verbenaceae	Chapéus-de- mandarin; Chapéus-chineses	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C12(2), C13(2)
<i>Howea forsteriana</i> (C. Moore & F. Muell.) Becc.	Palmae	Quência	Australiano	Perenifólio	1-12	1-9	Micro.	Árvore	Z10	C5A(1), C8(1), C12(1), C14(1)
<i>Hydrangea macrophylla</i> (Thunb.) Ser.	Hydrangeaceae	Hortênsia; Novelos	Paleártico	Caducifólio	3-12	5-10	Nano.	Arbusto	Z6	C1, C2A, C5 (grupo)
<i>Ilex aquifolium</i> L.	Aquifoliaceae	Azevinho	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-6	Micro.	Árvore	Z6	C8(1)
<i>Ilex canariensis</i> Poir.	Aquifoliaceae	Azevinho-da- rocha	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-6	Micro.	Árvore	Z10	C12(1)
<i>Ilex x altaclarensis</i> (hort. ex Loud.) Dallim.	Aquifoliaceae	Azevinho	Hortícola	Perenifólio	1-12	4-8	Micro.	Árvore	Z6	C8(1)
<i>Impatiens walleriana</i> Hook. f.	Balsaminaceae	Maravilhas	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Herbácea	Z9	C1, C5A, C6, C8, C12 (grupo)
<i>Iresine herbstii</i> Hook.	Amaranthaceae	Iresine	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Caméfito	Herbácea	Z10	C1, C4, C6, C16 (grupo)
<i>Iris germanica</i> L. var. <i>florentina</i> (L.) Dykes	Iridaceae	Lírio-branco	Paleártico	Perenifólio	1-12	2-7	Geófito	Herbácea	Z4	C6(grupo)
<i>Iris germanica</i> L.	Iridaceae	Lírio	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-8	Geófito	Herbácea	Z4	C6(grupo)
<i>Jacaranda mimosifolia</i> D. Don.	Bignoniaceae	Jacarandá	Neotropical	Caducifólio	5-2	4-7; 9-10	Meso.	Árvore	Z9	C2(1), C9(2), C15(6)
<i>Jasminum azoricum</i> L.	Oleaceae	Jasmineiro-branco	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-11	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z11	C11(3)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Jasminum odoratissimum</i> L.	Oleaceae	Jasmineiro- amarelo	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z11	C10 (grupo)
<i>Kalanchoe blossfeldiana</i> Poeckl.	Crassulaceae		Áfricotropical	Perenifólio	1-12	12-9	Nano.	Arbusto suculento	Z11	C16A(grupo)
<i>Kniphofia uvaria</i> (L.) Oken.	Liliaceae (Aloeaceae)	Foguetes	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	6-8	Hemi.	Herbácea	Z9	C6(1)
<i>Lagerstroemia indica</i> L.	Lythraceae	Laguerestrémia; Flor de Merenda; Suspiros	Paleártico; Indomalaio	Caducifólio	3-11	7-9	Micro.	Árvore	Z7	C2(1), C6(1), C16(1)
<i>Lantana camara</i> L.	Verbenaceae	Lantana	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C12(1)
<i>Lantana montevidensis</i> (Spreng.) Briq.	Verbenaceae	Lantana	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C12(3)
<i>Laurus novocanariensis</i> Rivas Mart. & al.	Lauraceae	Loureiro	Paleártico	Perenifólio	1-12	11-3	Meso.	Árvore	Z10	C12(1), C16(1)
<i>Ligustrum lucidum</i> Ait. f.	Oleaceae	Ligustro; Alfinheiro	Paleártico	Perenifólio	1-12	6-9	Micro.	Árvore	Z7	C12(15), C16(1)
<i>Ligustrum ovalifolium</i> Hassk.	Oleaceae	Ligustro; Alfinheiro	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-7	Nano.	Arbusto	Z5	C1, C6, C7, C10, C11, C12(sebe)
<i>Livistona chinensis</i> (Jacq.) R. Br. ex Mart.	Palmae	Palmeira-de- leque-da-china	Paleártico	Perenifólio	1-12	2-5	Meso.	Árvore	Z9	C13(1), C14(1)
<i>Lobularia maritima</i> (L.) Desv.	Cruciferae	Lobulária	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z8	C6(grupo)
<i>Magnolia grandiflora</i> L.	Magnoliaceae	Magnólia	Neártico	Perenifólio	1-12	5-8	Micro.	Árvore	Z6	C10(1)
<i>Magnolia x soulangeana</i> Soul.-Bod.	Magnoliaceae	Magnólia	Hortícola	Caducifólio	3-12	12-4	Micro.	Árvore	Z5	C1(1), C2(4), C16(1)
<i>Mangifera indica</i> L.	Anacardiaceae	Mangueiro	Indomalaio	Perenifólio	1-12	11-6	Micro.	Árvore	Z11	C12(1)
<i>Medinilla magnifica</i> Lindl.	Melastomataceae	Medinila	Indomalaio	Perenifólio	1-12	6-9	Nano.	Arbusto	Z11	C8(1)
<i>Melaleuca armilaris</i> (Sol. ex Gaertn.) Sm.	Myrtaceae	Melaleuca	Australiano	Perenifólio	1-12	3-5	Micro.	Árvore	Z9	C12(1), C14(1)
<i>Melia azederach</i> L.	Meliaceae	Amargoseira; Mélia; Conteira; Lilás-da-índia	Paleártico; Indomalaio	Caducifólio	4-1	4-6	Micro.	Árvore	Z10	C15(2)
<i>Mirabilis jalapa</i> L.	Nyctaginaceae	Boas-noites	Neotropical	Sazonal	3-10	5-11	Geófita	Herbácea	Z8	C2(2), C16(2)
<i>Monstera deliciosa</i> Liebm.	Araceae	Fruto-delicioso; Costela-de-adão	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z10	C15, C16(grupo)
<i>Montanoa bipinnatifida</i> (Kunth) K. Kock	Compositae	Malmequer- arbóreo	Neotropical	Perenifólio	1-12	11-5	Micro.	Arbusto	Z10	C13(1)
<i>Myoporum tenuifolium</i> Forst. f.	Myoporaceae	Miopóro	Australiano	Perenifólio	1-12	2-5	Micro.	Árvore	Z9	C15(1)
<i>Myrtus communis</i> L.	Myrtaceae	Murta	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-7; 10-11	Micro.	Arbusto	Z8	C18(1)
<i>Nephrolepis cordifolia</i> (L.) Presl.	Oleandraceae	Feto	Neotropical; Áfricotropical; Indomalaio; Oceânia; Australiano	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z10	C5, C10 (grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Nerium oleander</i> L.	Apocynaceae	Sevadilha; Loendro	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-11	Micro.	Arbusto	Z9	C2(2), C16(3)
<i>Nicandra physalodes</i> (L.) Gaertn.	Solanaceae	Nicandra	Neotropical	Sazonal	9-6	9-5	Terófito	Herbácea	Z8	C14(grupo)
<i>Nolina recurvata</i> (Lem.) Hemsl.	Agavaceae	Nolina; Pata-de-elefante	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-8	Micro.	Árvore	Z9	C16(1)
<i>Ochna serrulata</i> (Hochst.) Walp.	Ochnaceae	Planta-do-rato- mikey	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	2-4	Nano.	Arbusto	Z9	C1(1), C2(6), C8(1), C10(1), C12(3), C15(2)
<i>Ocotea foetens</i> (Aiton) Baill.	Lauraceae	Til	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Meso.	Árvore	Z10	C15(1), C16(1)
<i>Odontonema strictum</i> (Nees) Kuntze	Acanthaceae	Odontonema	Neotropical	Perenifólio	1-12	8-12	Nano.	Arbusto	Z10	C1(3)
<i>Ophiopogon japonicus</i> (L. f.) Ker-Gawl	Liliaceae (Convallariaceae)	Relva-do-japão	Paleártico	Perenifólio	1-12	7-9	Hemi.	Herbácea	Z8	C2, C12, C16 (mancha)
<i>Osteospermum barberiae</i> (Harv.) Norl.	Compositae	Estrelas-do- cabo	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Caméfito	Arbusto	Z10	C11, C12 (grupo)
<i>Oxalis latifolia</i> HBK.	Oxalidaceae	Trevo	Neotropical	Sazonal	10-5	12-4	Geófito	Herbácea	Z9	C1, C2, C5, C12 (grupo)
<i>Paspalum dilatatum</i> Poir.	Gramineae	Erva-rija; Erva-do-governo	Neotropical	Perenifólio	1-12	3-9	Hemi.	Herbácea	Z8	C12, C14 (tapete)
<i>Pelargonium peltatum</i> (L.) L'Hérit.	Geraniaceae	Malvas	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z10	C6, C7, C16(grupo)
<i>Pericallis x hybrida</i> R. Nordenstam	Compositae	Cinerária	Hortícola	Sazonal	1-7	3-6	Terófito	Herbácea	Z10	C12(grupo)
<i>Persea americana</i> Mill.	Lauraceae	Abacateiro	Neotropical	Perenifólio	1-12	11-5	Micro.	Árvore	Z10	C14(1)
<i>Phlebodium aureum</i> (L.) J. Sm.	Polypodiaceae	Polipódio-dourado	Neártico; Neotropical	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z10	C3 (grupo)
<i>Phoenix canariensis</i> Chabaud.	Palmae	Palmeira-das- canárias	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-3	Meso.	Árvore	Z11	C2(2), C12(11), C15(2), C16(4),
<i>Phoenix reclinata</i> Jacq.	Palmae	Tamareira-do- senegal	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	5-7	Micro.	Árvore	Z11	C12(4), C15(2), C16(1)
<i>Phoenix roebelinii</i> O' Brien.	Palmae	Palmeira-anã	Indomalaio	Perenifólio	1-12	5-7	Micro.	Árvore	Z11	C16(1)
<i>Phormium tenax</i> Forst. & Forst. f.	Agavaceae	Espadana	Antártico	Perenifólio	1-12	6-8	Hemi.	Herbácea	Z8	C12(grupo)
<i>Phyllostachis aurea</i> (Carr.) A. & C. Riv.	Gramineae	Bambu	Paleártico	Perenifólio	1-12	Não floriu**	Hemi.	Herbácea	Z6	C12 (grupo)
<i>Pilea cadierei</i> Gagnep. & Guillaum.	Urticaceae	Planta-do- alúminio	Indomalaio	Perenifólio	1-12	10-12	Hemi.	Herbácea	Z11	C6, C7 (grupo)
<i>Pilea microphylla</i> (L.) Liebm.	Urticaceae	Arrozinho	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C6 (grupo)
<i>Plectranthus forsteri</i> Benth.	Labiatae	Plectratos	Australiano; Oceânia	Perenifólio	1-12	6-11	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z10	C1, C6, C12 (grupo)
<i>Plectranthus oertendahlii</i> T. C. E. Fries.	Labiatae	Plectratos	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	6-12	Caméfito	Herbácea	Z10	C8 (grupo)
<i>Plumeria rubra</i> L. var. <i>acutifolia</i> (Poir.) Woodson.	Apocynaceae	Planta-dos- dentes	Neotropical	Caducifólio	5-1	6-12	Micro.	Árvore	Z10	C14(1)
<i>Polygala myrtifolia</i> L.	Polygalaceae	Polígala	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z9	C12(1)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Polypodium macaronesicum</i> A. E. Bobrov.	Polypodiaceae	Polipódio	Paleártico	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z10	C3(grupo)
<i>Psidium littorale</i> Raddi	Myrtaceae	Araçazeiro; Araçaleiro	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-7	Micro.	Árvore	Z10	C6(1), C12(4), C13(1)
<i>Pteris tremula</i> R. Br.	Pteridaceae	Feto	Australiano; Antártico; Oceânia; Áfricotropical	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z10	C10, C12 (grupo)
<i>Pteris vittata</i> L.	Pteridaceae	Feto	Paleártico; Indomalaio; Australiano Oceânia	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z9	C10 (grupo)
<i>Punica granatum</i> L.	Punicaceae	Romãzeira	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-7	Micro.	Árvore	Z9	C12(2)
<i>Rhododendron mucronatum</i> G. Don.	Ericaceae	Azálea-japonesa	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z5	C4, C5, C6, C8, C15 (grupo)
<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Leguminosae (Papilionoideae)	Robinia	Neártico	Caducifólio	3-12	3-6	Meso.	Árvore	Z3	C15(2)
<i>Rosmarinus officinalis</i> L.	Labiatae	Alecrim	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z6	C12(2), C15(2)
<i>Salvia guaranitica</i> St.-Hil. ex Benth.	Labiatae	Sálvia	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z9	C6, C7 (grupo)
<i>Sambucus nigra</i> L.	Caprifoliaceae	Sabugueiro	Paleártico	Caducifólio	3-12	5-6	Micro.	Árvore	Z5	C16(2)
<i>Sansevieria trifasciata</i> Prain var. <i>laurentii</i> (De Wild.) N. E. Br.	Agavaceae	Língua-de-sogra	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	8-11	Hemi.	Herbácea	Z10	C15 (grupo)
<i>Sansevieria trifasciata</i> Prain	Agavaceae	Língua-de-sogra	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	8-11	Hemi.	Herbácea	Z10	C15(grupo)
<i>Schotia brachypetala</i> Sonder.	Leguminosae (Caesalpinioideae)	Scótia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	2-8	Micro.	Árvore	Z9	C10(1)
<i>Senecio cineraria</i> DC.	Compositae	Senécio	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-8	Nano.	Arbusto	Z8	C4, C6, C8 (grupo)
<i>Senna pendula</i> (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Irwin & Barnby var. <i>glabrata</i> (Vogel) Irwin & Barnby	Leguminosae (Caesalpinioideae)	Chuva-de-ouro; Cássia	Neotropical; Neártico	Perenifólio	1-12	10-1	Micro.	Arbusto	Z9	C12(1)
<i>Solandra maxima</i> (Sessé & Moc.) P. Green	Solanaceae	Solandra	Neotropical	Perenifólio	1-12	12-7	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	C3(5), C15(1)
<i>Solenostemon scutellarioides</i> (L.) Codd.	Labiatae	Cóleos	Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C5, C6, C12, C16 (grupo)
<i>Sonchus fruticosus</i> L.fil.	Compositae	Leituga; Língua de Vaca; Serralha da Rocha	Paleártico	Perenifólio	1-12	6-8	Nano.	Arbusto	Z10	C12(1), C15(1)
<i>Spathodea campanulata</i> Beauv.	Bignoniaceae	Chama-da- floresta; Tulipeiro- africano	Áfricotropical	Caducifólio	1-12 (Variação individual)	1-12	Micro.	Árvore	Z11	C12(1)
<i>Spiraea cantoniensis</i> Lour.	Rosaceae	Grinalda-de-noiva	Paleártico	Marcescente	3-2 (11-2)	2-9	Nano.	Arbusto	Z6	C12(1), C16(2)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Stenotaphrum secundatum</i> (Walter) Kuntze	Gramineae	Relva; Relva-de-correr	Neotropical; Áfricotropical; Oceânia	Perenifólio	1-12	3-11	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z9	C8, C10, C12 (tapete)
<i>Strelitzia reginae</i> Banks ex Dryand	Strelitziaceae	Estrelícia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C13, C14 (grupo)
<i>Streptosolen jamesonii</i> (Benth.) Miers.	Solanaceae	Rapaziada	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z9	C12(6)
<i>Syngonium podophyllum</i> Shott.	Araceae	Singónio	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-7	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z11	C10(grupo)
<i>Syngonium wendlandii</i> Schott.	Araceae	Singónio	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-7	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z11	C10(grupo)
<i>Syzygium jambos</i> (L.) Alston.	Myrtaceae	Jambeiro	Indomalaio	Perenifólio	1-12	3-7	Micro.	Árvore	Z10	C12(1)
<i>Tecomaria capensis</i> (Thunb.) Spach.	Bignoniaceae	Camarões	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C11(1), C12(grupo)
<i>Teline maderensis</i> Webb et Berth. var. <i>maderensis</i>	Leguminosae (Papilionoideae)	Piomo	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-8	Micro.	Arbusto	Z10	C15 (grupo)
<i>Tetradenia riparia</i> (Hochst.) Codd.	Labiatae	Iboza (Moschosma)	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	12-5	Nano.	Arbusto	Z10	C6(10), C7(5)
<i>Thunbergia gregorii</i> S. Moore	Acanthaceae	Tumbérgia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z10	C14(1)
<i>Tibouchina grandifolia</i> Cogn.	Melastomataceae	Aranhas; Tibouchina	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-12	Micro.	Arbusto	Z10	C6(1), C7(1), C15(1)
<i>Tibouchina urvilleana</i> (DC.) Cogn.	Melastomataceae	Aranhas; Tibouchina	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C7(2)
<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	Leguminosae (Papilionoideae)	Tipuana; Orgulho-da-bolívia	Neotropical	Marcescente	5-4 (3-4)	4-7	Meso.	Árvore	Z9	C1(3), C2(2), C4(1), C5(1), C8(2), C15(1), C16(1)
<i>Tradescantia cerinthoides</i> Kunth.	Commelinaceae	Tradesntia	Neotropical	Perenifólio	1-12	2-10	Hemi.	Herbácea trepadora	Z7	C8(grupo)
<i>Tradescantia zebrina</i> hort. ex. Bosse	Commelinaceae	Zebrina	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z9	C1, C8, C15 (grupo)
<i>Viburnum tinus</i> L.	Caprifoliaceae	Viburno	Paleártico	Perenifólio	1-12	10-4; 7-8	Micro.	Arbusto	Z7	C12(3), C15(1)
<i>Wedelia trilobata</i> (L.) Hitchc.	Compositae		Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Herbácea	Z11	C10, C16 (grupo)
<i>Wisteria sinensis</i> (Sims) Sweet.	Leguminosae (Papilionoideae)	Lilases; Glícinia	Paleártico	Caducifólio	2-12	2-5; 7-8	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z5	C12(2), C13(1)
<i>Yucca gloriosa</i> L..	Agavaceae	Iúca	Neártico	Perenifólio	1-12	6-11	Micro.	Arbusto	Z7	C15(1)

Legenda:

- Plantas que não floriram no período em estudo (Janeiro 2002 – Janeiro 2005): * plantas novas; ** plantas que nunca floriram por falta de aclimação;
- Plantas marcescentes (plantas semiperenifólias e semcaducifólias): 3-2 (3-4) – folhas todo o ano mas com renovação significativa em Março e Abril.

Anexo 15
CARACTERIZAÇÃO FITOGEOGRÁFICA DA QUINTA MAGNÓLIA

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Abelia x grandiflora</i> (André) Rehd.	Caprifoliaceae	Abélia	Hortícola	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z5	C15A(1)
<i>Abutilon grandifolium</i> (Willd.) Sweet	Malvaceae	Abutilão	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z9	C17C, C17D (grupo)
<i>Acalypha wilkesiana</i> Muell. Arg.	Euphorbiaceae	Acálifa; Folha- de-cobre	Oceânia	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C12(1), C13(grupo)
<i>Acanthus mollis</i> L.	Acanthaceae	Erva-gigante	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-8	Hemi.	Herbácea	Z6	C15, C17 B (grupo)
<i>Adiantum capillus-veneris</i> L.	Adiantaceae	Avenca; Avenca-das-fontes	Paleártico, Neotropical, Áfricotropical, Indomalaio	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z8	C15B, C17 (grupo)
<i>Adiantum radianum</i> C. Presl.	Adiantaceae	Avenca	Neotropical	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z10	C17 (grupo)
<i>Aechmea caudata</i> var. <i>caudata</i> Lindman	Bromeliaceae	Bromélia	Neotropical	Perenifólio	1-12	3-4	Hemi.	Herbácea	Z11	C9, C13 (grupo)
<i>Aechmea fasciata</i> (Lindl.) Bak.	Bromeliaceae	Bromélia	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C13(grupo)
<i>Aechmea nudicaulis</i> (L.) Griseb.	Bromeliaceae	Bromélia	Neotropical	Perenifólio	1-12	12-4	Hemi.	Herbácea	Z10	C13(grupo)
<i>Agapanthus praecox</i> Willd. ssp. <i>orientalis</i> (Leighton) Leighton	Liliaceae	Agapantos; Coroas-de-henrique	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	4-9	Hemi.	Herbácea	Z9	C1, C2, C5, C9, C12, C15, C15A, C17 (mancha)
<i>Agathis robusta</i> (C. Moore ex. F. Muell.) Bail.	Araucariaceae	Pinheiro-de-damara;	Australiano	Perenifólio	1-12	3-4	Meso.	Árvore	Z9	C8(1), C11(1)
<i>Agave americana</i> L.	Agavaceae	Agave; Piteira	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-8	Hemi.	Herbácea suculenta	Z9	C15A(1)
<i>Agave attenuata</i> Salm-Dyck	Agavaceae	Piteira; Agave-pescoço-de-cisne	Neotropical	Perenifólio	1-12	12-3	Nano.	Árvore suculenta	Z9	C15, C15A, C17B , C17D(grupo)
<i>Ageratina adenophora</i> (Spreng.) R. King. & H. Robinson	Compositae	Abundância	Neotropical	Perenifólio	1-12	3-7	Nano.	Herbácea	Z10	C17, C17B (grupo)
<i>Ageratum houstonianum</i> Mill.	Compositae		Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Terófito	Herbácea	Z8	C11, C15(grupo)
<i>Alocasia macrorrhiza</i> (L.) G. Don.	Araceae	Inhame	Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-8	Hemi.	Herbácea	Z10	C6(1)
<i>Aloe arborescens</i> Mill.	Liliaceae (Aloeaceae)	Aloés, Babosas, Foguetes-de-natal	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	11-2	Nano.	Arbusto suculento	Z9	C11, C17D(grupo)
<i>Aloe mitriformis</i> Mill.	Liliaceae (Aloeaceae)	Aloés	Africotropical	Perenifólio	1-12	6-8	Caméfito	Arbusto suculento	Z9	C16A, C16B, C18 (grupo)
<i>Aloe saponaria</i> (Ait. f.) Haw.	Liliaceae (Aloeaceae)	Aloés-sabão	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-7	Hemi.	Herbácea suculenta	Z9	C12(1)
<i>Aloe vera</i> (L.) Burm.	Liliaceae	Aloé-vera; Babosas	Paleártico; Neotropical	Perenifólio	1-12	11-6	Hemi.	Herbácea suculenta	Z8	C15B(3)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Alpinia zerumbet</i> (Pers.) B. L. Burt & Rosemary M. Sm.	Zingiberaceae	Alpínia; Lírio-de-porcelana	Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C1(grupo)
<i>Alstroemeria ligtu</i> L.	Liliaceae (Alstroemeriaceae)	Alstroemeria	Neotropical	Sazonal	4-10	5-9	Geófito	Herbácea	Z8	C15A(grupo)
<i>Amaryllis belladonna</i> L.	Amaryllidaceae	Açucenas-da-serra; Belas-donas	Áfricotropical	Sazonal	5-7	8-11	Geófito	Herbácea	Z8	C15C(grupo)
<i>Ananas comosus</i> (L.) Merr.	Bromeliaceae	Ananás	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-7	Hemi.	Herbácea	Z11	C13(grupo)
<i>Anredera cordifolia</i> (Ten.) Steenis	Basellaceae	Boussingaultia; Trepadeira-da-madeira	Neotropical	Caducifólio	6-2	7-9	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z9	C17, C17B (grupo)
<i>Apollonias barbujana</i> (Cav.) Bomm.	Lauraceae	Barbusano	Paleártico	Perenifólio	1-12	9-3	Meso.	Árvore	Z10	C1(4)
<i>Araucaria bidwillii</i> Hook. f.	Araucariaceae	Araucária-de-bidwill	Australiano	Perenifólio	1-12	2-3	Meso.	Árvore	Z9	C6(1), C14A(1)
<i>Araucaria heterophylla</i> (Salisb.) Franco	Araucariaceae	Araucária	Oceânia	Perenifólio	1-12	2-3	Macro.	Árvore	Z9	C5(1)
<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> H. A. Wendl. & Drude.	Palmae	Palmeira- elegante	Australiano	Perenifólio	1-12	2-10	Meso.	Árvore	Z10	C8(1), C13(2)
<i>Arctotis fastuosa</i> Jacq.	Compositae	Margarida-do-cabo	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	3-12	Hemi.	Herbácea	Z9	C12(grupo)
<i>Argyranthemum frutescens</i> (L.) Schultz-Bip.	Compositae	Estrelas; Estreleiras; Pampilhos; Malmequeres	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C15A(grupo)
<i>Arundo donax</i> L.	Gramineae	Cana-vieira; Cana-de-roca; Cana	Paleártico	Perenifólio	1-12	7-10	Hemi.	Herbácea	Z9	C17(grupo)
<i>Asparagus asparagoides</i> (L.) Druce	Liliaceae (Asparagaceae)	Alegre-campo-miúdo	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	3-4	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z10	C1(grupo)
<i>Asparagus densiflorus</i> (Kunth) Jassop	Liliaceae (Asparagaceae)	Esparto	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	7-8	Nano.	Herbácea	Z9	C11, C12, C13, C15A, (grupo)
<i>Asparagus setaceus</i> (Kunth) Jassop	Liliaceae (Asparagaceae)	Espargo-de-folha-miúda; Esparto	Africotropical	Perenifólio	1-12	9-12	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z9	C1, C2, C9, C11, C12, C17 (grupo)
<i>Asparagus umbellatus</i> Link ssp. <i>lowei</i> (Kunth) Valdés	Liliaceae (Asparagaceae)	Esparto-da-madeira	Paleártico	Perenifólio	1-12	11-6	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z11	C3, C12 (grupo)
<i>Bambusa vulgaris</i> .	Gramineae	Bambu	Paleártico; Indomalaio	Perenifólio	1-12	Não floriu**	Hemi.	Herbácea	Z10	C5(grupo)
<i>Begonia minor</i> Jacq.	Begoniaceae	Corações; Begónia- sempre-em-flor	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C2A(grupo)
<i>Begonia x ricinifolia</i> A. Dietr.	Begoniaceae	Corações; Begónias	Hortícola	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C18(grupo)
<i>Bergenia crassifolia</i> (L.) Fritsch.	Saxifragaceae	Bergénia; Couve-de- jardim	Paleártico	Perenifólio	1-12	11-4	Caméfito	Herbácea	Z3	C13, C15 (grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Bougainvillea glabra</i> Choisy	Nyctaginaceae	Buganvília	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Árbusto trepador	Z10	C4(7), C8A(grupo), C9A(1), C17D(grupo)
<i>Brachychiton acerifolius</i> Cunn. ex. F. Muell.	Sterculiaceae	Árvore-do- fogo	Australiano	Caducifólio	1-5; 8-12	5-8	Micro.	Árvore	Z10	C16(1)
<i>Brachychiton x hybridus</i> hort.	Sterculiaceae	Árvore-do-fogo	Hortícola	Caducifólio	1-5; 8-12	6-10	Micro.	Árvore	Z10	C4(1)
<i>Brugmansia versicolor</i> Lagerh.	Solanaceae	Trombeteira	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Árbusto	Z10	C1(1)
<i>Butia capitata</i> (Mart.) Becc.	Palmae	Palmeira-da-geleia	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-8	Micro.	Árvore	Z10	C5(1)
<i>Calathea argyraea</i> Köm	Marantaceae	Calateia	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-7	Hemi.	Herbácea	Z11	C16(grupo)
<i>Callistemon rigidus</i> R. Br.	Myrtaceae	Martinete	Australiano	Perenifólio	1-12	4-7	Micro.	Árbusto	Z9	C7(1), C14(1)
<i>Callistephus chinensis</i> (L.) Nees.	Compositae	Não-me-deixes	Paleártico	Sazonal	3-12	4-12	Terófito	Herbácea	Z6	C9A, C12(grupo)
<i>Campsis radicans</i> (L.) Seem.	Bignoniaceae	Campsis	Neártico	Caducifólio	5-12	5-9	Fane. trep.	Árbusto trepador	Z4	C1(grupo)
<i>Canistrum lindenii</i> (Regel) Mez	Bromeliaceae	Bromélia	Neotropical	Perenifólio	1-12	12-3	Hemi.	Herbácea	Z11	C15(grupo)
<i>Canna x generalis</i> L. H. Bail.	Cannaceae	Canas-da-índia; Bananeiras-de- flor	Hortícola	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z9	C7A, C9A, C18 (grupo)
<i>Capsicum frutescens</i> L.	Solanaceae	Pimenteira	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-10	Nano.	Árbusto	Z9	C15A(1), C15B(2), C18(grupo)
<i>Cardiospermum grandiflorum</i> Sw.	Sapindaceae	Corriola-dos- balões	Afrotropical; Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z10	C17(grupo)
<i>Caryota mitis</i> Lour.	Palmae	Palmeira-rabo-de - peixe	Indomalaio	Perenifólio	1-12	6-8	Micro.	Árvore	Z10	C5(1), C9(1), C11(1), C12(1)
<i>Casuarina equisetifolia</i> Forst. & Forst. f.	Casuarinaceae	Casuarina	Indomalaio; Australiano; Oceânia	Perenifólio	1-12	6-11	Meso.	Árvore	Z10	C1(8), C5(4), C15(7), C15A(1), C16(>20), C17(>100)
<i>Catharanthus roseus</i> (L.) G. Don.	Apocynaceae	Maravilhas	Áfrotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Herbácea	Z10	C8, C11, C15, C18 (grupo)
<i>Celtis australis</i> L.	Ulmaceae	Lódão-bastardo; Conteira	Paleártico	Caducifólio	4-1	5-6	Meso.	Árvore	Z8	C11(1), C12(1), C13(1), C17(2)
<i>Centranthus ruber</i> (L.) DC.	Valerianaceae	Rosa-da-rocha; Alfinetes	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Caméfito	Herbácea	Z5	C12, C13, C13A(grupo)
<i>Ceratonia siliqua</i> L.	Leguminosae (Caesalpinioideae)	Alfarrobeira	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-9	Micro.	Árvore	Z9	C13(1)
<i>Ceratozamia mexicana</i> Brongn.	Zamiaceae	Ceratozamia	Neártico	Perenifólio	1-12	2-6	Nano.	Árbusto	Z10	C6(1)
<i>Cereus uruguayanus</i> Kiesling	Cactaceae	Cacto-vela-de-cera	Neotropical	Perenifólio	1-12	7-8	Nano.	Árvore suculenta	Z9	C17C(1)
<i>Chamaecyparis obtusa</i> (Sieb. & Zucc.) Endl.	Cupressaceae	Cedro-dourado	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-2	Micro.	Árvore	Z6	C2(1)
<i>Chamaedorea elegans</i> Mart.	Palmae	Palmeira-de- salão; Palmeira-bambu	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-6	Micro.	Árbusto	Z10	C1(grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Chamaerops humilis</i> L.	Palmae	Palmeira-das-vassouras	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-5	Micro.	Arbusto	Z9	C7(1)
<i>Chambeyronia macrocarpa</i> (Brongn.) Vieill. ex Becc.	Palmae	Palmeira-rubra	Oceânia	Perenifólio	1-12	1-2	Micro.	Árvore	Z10	C5(1), C13(1)
<i>Chorisia speciosa</i> A. St. Hil.	Bombacaceae	Sumaúma	Neotropical	Caducifólio	3-11	8-11	Meso.	Árvore	Z10	C3(1), C8(2), C13A(1), C17C(1)
<i>Christella dentata</i> (Forssk.) Brownsey & Jermy	Thelypteridaceae	Feto	Áfricotropical; Indomalaio	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z10	C13(grupo)
<i>Chrysalidocarpus lutescens</i> (Bory) Wendl.	Palmae	Palmeira-borboleta; Palmeira-amarela	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	6-7	Micro.	Arbusto	Z10	C5(1), C9B(1)
<i>Cinnamomum camphora</i> (L.) Sieb.	Lauraceae	Canforeira	Paleártico; Indomalaio	Perenifólio	1-12	2-4	Meso.	Árvore	Z10	C4(3), C5(1), C8(1), C10(2), C11(4), C13(2), C17(1)
<i>Clivia miniata</i> Regel	Amaryllidaceae	Clívia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	2-11	Hemi.	Herbácea	Z10	C7, C16(grupo)
<i>Clivia nobilis</i> Lindl.	Amaryllidaceae	Clívia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	2-11	Hemi.	Herbácea	Z10	C16(grupo)
<i>Commelina benghalensis</i> L.	Commelinaceae	Erva-menina; Flor-dum-dia	Indomalaio Áfricotropical;	Perenifólio	1-12	3-9	Hemi.	Herbácea trepadora	Z9	C12, C17B (grupo)
<i>Cordyline terminalis</i> (L.) Kunth.	Agavaceae	Árvore-dos-reis	Indomalaio; Australiano; Oceânia; Antártico	Perenifólio	1-12	11-5	Micro.	Arbusto	Z10	C2(4), C12(5), C15A(1)
<i>Cortaderia selloana</i> (Schult. & Schult. f.) Asch. & Gräbn.	Gramineae	Plumas; Erva-das-pampas; Penacho-branco	Neotropical	Perenifólio	1-12	7-10	Hemi.	Herbácea	Z6	C5(grupo)
<i>Corynocarpus laevigatus</i> J. R. Forst. & G. Forst.	Corynocarpaceae	Loureiro-da-nova-zelândia	Antártico	Perenifólio	1-12	2-5	Micro.	Árvore	Z10	C1(1)
<i>Cotoneaster franchetii</i> Bois.	Rosaceae	Pereirinho-de-jardim	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-6	Micro.	Arbusto	Z6	C9(1), C11(1)
<i>Cryptomeria japonica</i> D. Don.	Cupressaceae	Criptoméria	Paleártico	Perenifólio	1-12	12-3	Meso.	Árvore	Z7	C2A(1)
<i>Ctenanthe oppenheimiana</i> (C. J. Morren) K. Schum.	Marantaceae	Tenante	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-8	Hemi.	Herbácea	Z10	C16(grupo)
<i>Cuphea hyssopifolia</i> HBK.	Lythraceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C15A, C18 (grupo)
<i>Cuphea ignea</i> A. DC.	Lythraceae	Cigarrinhos	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C9A(grupo)
<i>Cupressus arizonica</i> Green.	Cupressaceae	Cipreste-do-arizona	Neártico	Perenifólio	1-12	11-1	Micro.	Árvore	Z7	C15(1)
<i>Cupressus funebris</i> Endl.	Cupressaceae	Cipreste-chorão-da-china	Paleártico	Perenifólio	1-12	2-3	Micro.	Árvore	Z7	C2(1), C15(1)
<i>Cupressus lusitanica</i> Mill.	Cupressaceae	Cedro-de-goá; Cedro-das-barracas	Neártico; Neotropical	Perenifólio	1-12	1-3	Meso.	Árvore	Z9	C1(2), C3(1), C4(1), C12(2), C15(5)
<i>Cupressus sempervirens</i> L.	Cupressaceae	Cipreste	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-2	Micro.	Árvore	Z8	C6(1)
<i>Cyathea cooperi</i> (F. Mueller) Domin.	Cyatheaceae	Feto-arbóreo	Australiano	Perenifólio	1-12	-----	Micro.	Árvore	Z10	C15A(1)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Cycas circinalis</i> L.	Cycadaceae	Cicas	Indomalaio	Perenifólio	1-12	2-7	Micro.	Árvore	Z10	C3(2), C7(2)
<i>Cycas revoluta</i> Thunb.	Cycadaceae	Cicas-revoluta; Cicas-de-sagú	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-8	Micro.	Árvore	Z9	C6(2), C7(1), C8(1), C11(1), C15(1)
<i>Cymbalaria muralis</i> P. Gaertn., Mey. & Scherb.	Scrophulariaceae	Perpétua-de-roma	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-10	Hemi.	Herbácea	Z3	C15B (grupo)
<i>Cyperus involucratus</i> Rottb.	Cyperaceae		Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C15B(2), C17(grupo)
<i>Cyrtomium falcatum</i> (L. f.) Presl.	Dryopteridaceae	Feto-azevinho	Paleártico; Indomalaio; Áfricotropical; Oceânia	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z9	C12A, C13, C15 (grupo)
<i>Dasyllirion serratifolium</i> Karw. ex Schult. f.	Agavaceae		Neártico; Neotropical	Perenifólio	1-12	6-9	Nano.	Árvore	Z9	C2(1), C4(1), C11(1)
<i>Deparia petersenii</i> (Kunze) Kato	Woodsiaceae	Feto-de-senhora- do-japão	Indomalaio; Paleártico; Australiano; Oceânia; Antártico	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z9	C15B (grupo)
<i>Diets bicolor</i> (Steud.) Klatt.	Iridaceae	Dites-bicolor	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	4-8	Geófito	Herbácea	Z9	C11(grupo)
<i>Diets iridioides</i> (L.) Klatt.	Iridaceae	Diets	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-5	Geófito	Herbácea	Z9	C11(grupo)
<i>Dioon edule</i> Lindley	Zamiaceae	Dion	Neártico	Perenifólio	1-12	8-11	Nano.	Árvore	Z10	C5(2)
<i>Dombeya wallichii</i> (Lindl.) B. D. Jackson	Sterculiaceae	Dombeia; Aurora	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	12-2	Micro.	Árvore	Z10	C5(1)
<i>Dracaena deremensis</i> Engl.	Agavaceae (Dracaenaceae)	Dracena	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	11-12	Micro.	Arbusto	Z11	C15(1)
<i>Dracaena draco</i> L. ssp. <i>draco</i>	Agavaceae (Dracaenaceae)	Dragoeiro	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-6	Micro.	Árvore	Z11	C12A(2), C17C(2)
<i>Duranta erecta</i> L.	Verbenaceae	Duranta	Neotropical	Perenifólio	1-12	7-1	Micro.	Arbusto	Z10	C6(1)
<i>Echium nervosum</i> Dryand.	Boraginaceae	Massaroco	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-6	Nano.	Arbusto	Z11	C13(2)
<i>Eichhornia crassipes</i> (Mart.) Solms-Laub.	Pontederiaceae	Jacinto-de-água	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-10	Hidrófito	Herbácea	Z10	C11, C15A(grupo)
<i>Emilia coccinea</i> (Sims) D. Don.	Compositae	Emilia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Herbácea	Z11	C15A(grupo)
<i>Encephalartos altensteinii</i> Lehm	Zamiaceae	Cica; Encefalartos	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	7-10	Micro.	Árvore	Z9	C5(1), C8(3)
<i>Encephalartos horridus</i> (Jacq.) Lehm.	Zamiaceae	Cica; Encefalartos	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	7-10	Nano.	Árvore	Z9	C15(1)
<i>Encephalartos lehmannii</i> Lehm.	Zamiaceae	Cica; Encefalartos	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	5-11	Nano.	Árvore	Z9	C2(1), C7(1)
<i>Enterolobium cyclocarpa</i> (Jacq.) Griseb.	Leguminosae (Mimosoideae)	Enterolóbio; Orelha-de-elefante	Neotropical	Caducifólio	5-1	7-8	Meso.	Árvore	Z11	C8(1)
<i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl.	Rosaceae	Nespereira	Paleártico	Perenifólio	1-12	10-12	Micro.	Árvore	Z8	C12(2), C13(1)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Erythrina crista-galli</i> L.	Leguminosae (Papilionoideae)	Coraleira; Coralina-crista-de-galo	Neotropical	Marcescente	4-3 (12-3)	4-1	Micro.	Árvore	Z8	C5(2), C7(1)
<i>Eugenia uniflora</i> L.	Myrtaceae	Pitangueira	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Árvore	Z10	C1(4), C3(12), C15(1)
<i>Euphorbia cotinifolia</i> L.	Euphorbiaceae	Eufórbia	Neotropical	Caducifólio	3-12	6-11	Micro.	Árvore	Z11	C13A(1), C15A(1)
<i>Euphorbia ingens</i> E. Mey.	Euphorbiaceae	Eufórbia-gigante	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	10-12	Micro.	Arbusto suculento	Z9	C17C(1)
<i>Euphorbia pulcherrima</i> Willd. ex Klotzsch.	Euphorbiaceae	Manhã-de-páscoa	Neotropical	Caducifólio	5-2	10-3	Micro.	Arbusto	Z10	C5(2), C9(5), C13A(1), C15B(2)
<i>Euphorbia tirucalli</i> L.	Euphorbiaceae	Eufórbia	Áfricotropical; Indomalaio	Perenifólio	1-12	4-9	Micro.	Arbusto suculento	Z10	C17C(1)
<i>Felicia amelloides</i> (L.) Voss.	Compositae	Felícia ; Margarida-azul	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z9	C12A, C18 (grupo)
<i>Ficus benjamina</i> L. var. <i>nuda</i> (Miq.) Barrett	Moraceae	Figueira-da-índia	Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-4	Meso.	Árvore	Z11	C8(2)
<i>Ficus carica</i> L.	Moraceae	Figueira	Paleártico	Caducifólio	4-12	6-7	Micro.	Árvore	Z8	C15(2)
<i>Ficus elastica</i> Roxb. ex Homem	Moraceae	Borracheira	Indomalaio	Perenifólio	1-12	5-8	Micro.	Árvore	Z11	C17(1)
<i>Ficus pumila</i> L.	Moraceae	Pastinha	Indomalaio; Paleártico	Perenifólio	1-12	10-12	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z8	C11, C13(grupo)
<i>Fuchsia triphylla</i> L.	Onagraceae	Fúcsia; Brincos-de-princesa; Mimos	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z11	C11(1), C15A(3)
<i>Furcraea selloa</i> K. Koch. var. <i>marginata</i> Trel.	Agavaceae	Furcreia; Piteira	Neotropical	Perenifólio	1-12	8-12	Micro.	Árvore suculenta	Z10	C1(1)
<i>Gazania rigens</i> (L.) Gaertn.	Compositae	Gazania	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z9	C5(grupo)
<i>Geranium maderense</i> P. F. Yeo	Geraniaceae	Gerânio-da-madeira; Pássaras	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-6	Nano.	Herbácea	Z10	C12, C13(grupo)
<i>Globularia salicina</i> Lam.	Globulariaceae	Globulária; Malfurada	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-8	Nano.	Arbusto	Z11	C17D(grupo)
<i>Goniophlebium subauriculatum</i> (Bl.) Presl.	Polypodiaceae	Feto-de-metro; Feto-chorão	Indomalaio; Australiano; Oceânia	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z10	C12(grupo)
<i>Grevillea robusta</i> A. M. Cunn. Ex. R. Br.	Proteaceae	Grevília	Australiano	Perenifólio	1-12	4-7	Meso.	Árvore	Z8	C17C(1)
<i>Hedera helix</i> L.	Araliaceae	Hera	Paleártico	Perenifólio	1-12	9-10	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z5	C12, C14(grupo)
<i>Hedychium gardnerianum</i> Ker-Gawl.	Zingiberaceae	Roca-de-vénus; Conteira; Bananilha	Paleártico; Indomalaio	Perenifólio	1-12	7-10	Hemi	Herbácea	Z9	C12A(grupo)
<i>Heliconia bihai</i> (L.) L.	Heliconiaceae	Helicónia	Neotropical	Perenifólio	1-12	7-2	Hemi.	Herbácea	Z11	C5, C7A (grupo)
<i>Hemerocallis dumortieri</i> E. Morr.	Liliaceae (Hemerocallidaceae)	Hemerocalis; Lírio-dum-dia	Paleártico	Perenifólio	1-12	6-10	Geófita	Herbácea	Z5	C13 (grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Hemerocallis fulva</i> L.	Liliaceae (Hemerocallidaceae)	Hemerocalis; Lírio-dum-dia	Paleártico	Perenifólio	1-12	6-10	Geófito	Herbácea	Z5	C10, C15A(grupo)
<i>Hibiscus rosa-sinensis</i> L.	Malvaceae	Cardeais; Hibiscos; Rosa- da- china	Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C1(grupo), C6(2), C8(sebe), C9(sebe), C12(2), C13(3), C15B(1), C15C(sebe), C17C(2)
<i>Hibiscus syriacus</i> L.	Malvaceae	Cardeal-roxo; Hibisco-da- síria	Paleártico; Indomalaio	Caducifólio	5-11	7-9	Micro.	Arbusto	Z5	C7(1)
<i>Homalocladium platycladum</i> (F. Muell.) L. H. Bail.	Polygonaceae	Homalocládio	Oceânia	Perenifólio	1-12	7-8	Nano.	Arbusto	Z11	C15(grupo)
<i>Howea forsteriana</i> (C. Moore & F. Muell.) Becc.	Palmae	Quência	Australiano	Perenifólio	1-12	1-9	Micro.	Árvore	Z10	C8A(2), C10(1), C11(1), C12(1), C13(1)
<i>Hylocereus triangularis</i> (L.) Britt. & Rose	Cactaceae	Rainha-da-noite; Cacto-trepador	Neotropical	Perenifólio	1-12	7-10	Fane. trep.	Arbusto trepador e suculento	Z10	C17, C17B(grupo)
<i>Hypoestes phyllostachya</i> Bak.	Acanthaceae	Hipoestes	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	9-12	Nano.	Arbusto	Z10	C18(grupo)
<i>Impatiens walleriana</i> Hook. f.	Balsaminaceae	Maravilhas	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Herbácea	Z9	C11, C15(grupo)
<i>Ipomoea indica</i> (Burm.) Merrill	Convolvulaceae	Campainhas	Neotropical; Áfricotropical; Indomalaio; Oceânia	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z10	C15A, C17, C17B(grupo)
<i>Iresine herbstii</i> Hook.	Amaranthaceae	Iresine	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Caméfito	Herbácea	Z10	C8, C15, C16(grupo)
<i>Iris germanica</i> L. var. <i>florentina</i> (L.) Dykes	Iridaceae	Lírio-branco	Paleártico	Perenifólio	1-12	2-7	Geófito	Herbácea	Z4	C15A(grupo)
<i>Jacaranda mimosifolia</i> D. Don.	Bignoniaceae	Jacarandá	Neotropical	Caducifólio	5-2	4-7; 9-10	Meso.	Árvore	Z9	C12(1), C13(2), C15(1), C17(1), C17C(1)
<i>Jubaea spectabilis</i> H.B.K.	Palmae	Palmeira-do-vinho- do-chile; Palmeira-do-mel	Neotropical	Perenifólio	1-12	7-8	Micro.	Árvore	Z8	C9(2)
<i>Justicia carnea</i> Lindl.	Acanthaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	5-10	Nano.	Arbusto	Z12	C15(1)
<i>Kalanchoe blossfeldiana</i> Poeckl.	Crassulaceae	Calanchoé	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto suculento	Z11	C5 (grupo)
<i>Kalanchoe daigremontiana</i> Hamet & Perrier	Crassulaceae	Calanchoé	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	12-5	Nano.	Arbusto suculento	Z11	C9A(grupo)
<i>Kalanchoe delagoensis</i> Ecklon & Zeyh.	Crassulaceae	Calanchoé	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	12-9	Nano.	Arbusto suculento	Z11	C16B(grupo)
<i>Kalanchoe fedtschenkoi</i> Hamet & Perrier.	Crassulaceae	Calanchoé	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-8	Caméfito	Arbusto suculento	Z11	C5(grupo)
<i>Kigelia africana</i> (Lam.) Benth.	Bignoniaceae	Árvore-das- salsichas	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	5-10	Micro.	Árvore	Z10	C11(1), C14A(1)
<i>Lagerstroemia indica</i> L.	Lythraceae	Laguerestré-mia; Flor-de- merenda; Suspiros	Paleártico; Indomalaio	Caducifólio	3-11	7-9	Micro.	Árvore	Z7	C2(3)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Lagunaria patersonii</i> (Anderss) G. Don.	Malvaceae	Lagunária	Australiano	Perenifólio	1-12	5-7	Micro.	Árvore	Z10	C5(2)
<i>Lampranthus aurantiacus</i> (DC.) Swannes	Aizoaceae (Mesembryanthemaceae)	Lamprantos	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	4-12	Fane. trep.	Arbusto trepador e suculento	Z11	C5, C15A(grupo)
<i>Lampranthus spectabilis</i> (Haw.) N.E. Br.	Aizoaceae (Mesembryanthemaceae)	Lamprantos	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Caméfito	Herbácea suculenta	Z11	C5(grupo)
<i>Lantana camara</i> L.	Verbenaceae	Lantana	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C9(1), C9A(grupo), C12(1)
<i>Lantana montevidensis</i> (Spreng.) Briq.	Verbenaceae	Lantana	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C9A(grupo)
<i>Laurus novocanariensis</i> Rivas Mart. & al.	Lauraceae	Loureiro	Paleártico	Perenifólio	1-12	11-3	Meso.	Árvore	Z10	C1(1), C13(2)
<i>Leptospermum scoparium</i> Forst. & Forst.	Myrtaceae	Leptospermo; Urze-de-jardim	Australiano; Antártico	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z8	C6(1), C12(1)
<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) De Wit.	Leguminosae (Mimosoideae)	Aroma-branco; Leucena	Neártico	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z9	C13(1), C17(1), C17B, C17C(grupo)
<i>Leucanthemum x superbum</i> (J. Ingram) Bergmans ex Kent	Compositae	Estrelas	Hortícola	Perenifólio	1-12	5-8	Nano.	Herbácea	Z5	C11, C18(grupo)
<i>Ligustrum lucidum</i> Ait. f.	Oleaceae	Ligustro; Alfinheiro	Paleártico	Perenifólio	1-12	6-9	Micro.	Árvore	Z7	C5(1), C8A(sebe), C9(1), C13(sebe), C15(2), C15A(1), C15C(1), C17B(2), C17C(8), C18(4)
<i>Ligustrum obtusifolium</i> Sieb. & Zucc.	Oleaceae	Ligustro; Alfinheiro	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-6; 11-12	Micro.	Arbusto	Z3	C13(sebe)
<i>Livistona chinensis</i> (Jacq.) R. Br. ex Mart.	Palmae	Palmeira-de- leque	Paleártico	Perenifólio	1-12	2-5	Meso.	Árvore	Z9	C1(1), C5(3), C6(1), C8(2), C9(4), C15(1), C15A(3)
<i>Lobelia laxiflora</i> HBK.	Campanulaceae	Lobélia	Neártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z9	C12(4)
<i>Lonchocarpus sericeus</i> (Poir.) Kunth ex DC.	Leguminosae (Papilionoideae)	Loncocarpus	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-1	Meso.	Árvore	Z10	C12(1)
<i>Lonicera japonica</i> Thunb.	Caprifoliaceae	Madressilva	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z4	C5(grupo)
<i>Magnolia grandiflora</i> L.	Magnoliaceae	Magnólia	Neártico	Perenifólio	1-12	5-8	Micro.	Árvore	Z6	C2(1), C2A(2), C4(1), C5(1), C11(1), C12(1), C13(5), C16B(2)
<i>Magnolia x soulangeana</i> Soul.-Bod.	Magnoliaceae	Magnólia	Hortícola	Caducifólio	3-12	12-4	Micro.	Árvore	Z5	C7(1)
<i>Malvaviscus arboreus</i> Cav.	Malvaceae	Malvavisco	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z9	C9(3), C16(5)
<i>Mangifera indica</i> L.	Anacardiaceae	Mangueiro	Indomalaio	Perenifólio	1-12	11-6	Micro.	Árvore	Z11	C3(3)
<i>Markamia lutea</i> (Benth.) Schum.	Bignoniaceae	Marcâmia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Meso.	Árvore	Z11	C5(1), C8(1)
<i>Matthiola incana</i> (L.) R. Br.	Cruciferae	Goivos	Paleártico	Sazonal	1-7	3-7	Terófito	Herbácea	Z6	C7A, C15A(grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Melia azederach</i> L.	Meliaceae	Mélia; Conteira; Lilás-da-índia	Paleártico; Indomalaio	Caducifólio	4-1	4-6	Micro.	Árvore	Z10	C16(1)
<i>Mentha spicata</i> L.	Labiatae	Hortelã-dos- jardins; Hortelã-de-leite	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Herbácea	Z3	C18(grupo)
<i>Mimosa pudica</i> L.	Leguminosae (Mimosoideae)	Sensitiva	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C15A(6)
<i>Mirabilis jalapa</i> L.	Nyctaginaceae	Boas-noites	Neotropical	Sazonal	3-10	5-11	Geófita	Herbácea	Z8	C17, C17B(grupo)
<i>Monstera deliciosa</i> Liebm.	Araceae	Fruto-delicioso; Costela-de-adão	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z10	C1, C8, C15A, C17B, C17C (grupo)
<i>Musa x paradisiaca</i> L.	Musaceae	Bananeira-de- prata	Hortícola	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C16A, C18(grupo)
<i>Nasturtium officinale</i> R. Br.	Cruciferae	Agrião	Paleártico	Perenifólio	1-12	2-10	Helófita	Herbácea	Z6	C15B(grupo)
<i>Neoregelia carolinae</i> (Beer) L. B.	Bromeliaceae	Bromélia	Neotropical	Perenifólio	1-12	11-2	Hemi.	Herbácea	Z10	C15(grupo)
<i>Neoregelia concentrica</i> (Vell.) L. B. Sm.	Bromeliaceae	Bromélia	Neotropical	Perenifólio	1-12	11-1	Hemi.	Herbácea	Z10	C15(grupo)
<i>Neoregelia johannis</i> (Carrière) L. B. Smith.	Bromeliaceae	Bromélia-ninho-de- passarinho	Neotropical	Perenifólio	1-12	8-1	Hemi.	Herbácea	Z10	C15(grupo)
<i>Neoregelia marmorata</i> (Baker) L. B. Smith.	Bromeliaceae	Bromélia-ninho-de- passarinho	Neotropical	Perenifólio	1-12	11-1	Hemi.	Herbácea	Z10	C15(grupo)
<i>Nephrolepis cordifolia</i> (L.) Presl.	Oleandraceae	Feto	Neotropical; Áfrotropical; Indomalaio; Oceânia; Australiano	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z10	C12, C13, C15A (grupo)
<i>Nerium oleander</i> L.	Apocynaceae	Sevadilha; Loendro	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-11	Micro.	Arbusto	Z9	C5 (1), C15B(3), C17(1)
<i>Nicotiana glauca</i> Grah.	Solanaceae	Tabaqueira-azul; Charuto-do-rei	Neotropical	Perenifólio	1-12	3-9	Micro.	Arbusto	Z8	C17D(grupo)
<i>Nolina recurvata</i> (Lem.) Hemsl.	Agavaceae	Nolina; Pata-de-elefante	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-8	Micro.	Árvore	Z9	C5(1), C7(1), C12(1), C15A(1), C15B(1), C18(1)
<i>Ochna serrulata</i> (Hochst.) Walp.	Ochnaceae	Planta-do-rato- mikey	Áfrotropical	Perenifólio	1-12	2-4	Nano.	Arbusto	Z9	C7A(1), C8(1)
<i>Ocotea foetens</i> (Aiton) Baill.	Lauraceae	Til	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Meso.	Árvore	Z10	C5(1), C13(1)
<i>Oenothera fruticosa</i> L.	Onagraceae	Oenotera	Neártico	Sazonal	1-10	3-9	Terófita	Herbácea	Z4	C15, C15A(grupo)
<i>Olea maderensis</i> (Lowe) Rivas Mart. & Del Arco	Oleaceae	Oliveira-brava; Oliveira-da-rocha; Zambujeiro	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-6	Micro.	Árvore	Z11	C1(1)
<i>Ophiopogon jaburan</i> (Kunth) Lodd	Liliaceae (Convallariaceae)	Relva-do-japão	Paleártico	Perenifólio	1-12	7-9	Hemi.	Herbácea	Z7	C18(grupo)
<i>Ophiopogon japonicus</i> (L. f.) Ker-Gawl	Liliaceae (Convallariaceae)	Relva-do-japão	Paleártico	Perenifólio	1-12	7-9	Hemi.	Herbácea	Z8	C11(grupo)
<i>Opuntia ficus-indica</i> (L.) Mill.	Cactaceae	Tabaibeira	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-7	Micro.	Arbusto suculento	Z9	C17C, C17D (grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Origanum vulgare</i> L.	Labiatae	Orégão	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-9	Nano.	Herbácea	Z5	C18(grupo)
<i>Osteospermum barberiae</i> (Harv.) Norl.	Compositae	Estrelas-do- cabo	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Caméfito	Arbusto	Z10	C10, C15 B, C18 (grupo)
<i>Osteospermum ecklonis</i> (DC.) Norl.	Compositae	Estrelas-do- cabo	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Caméfito	Arbusto	Z10	C10, C15B, C18 (grupo)
<i>Oxalis bowiei</i> Lindl.	Oxalidaceae	Trevo	Áfricotropical	Sazonal	6-11	8-10	Geófita	Herbácea	Z9	C18(grupo)
<i>Pandanus utilis</i> Bory	Pandanaceae	Pândano	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	9-3	Micro.	Árvore	Z10	C5(1), C7(1)
<i>Parietaria judaica</i> L.	Urticaceae	Alfavaca; Alfavaca-de-cobra	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-9	Nano.	Arbusto	Z8	C17(grupo)
<i>Paspalum dilatatum</i> Poir.	Gramineae	Erva-rija; Erva-do-governo	Neotropical	Perenifólio	1-12	3-9	Hemi.	Herbácea	Z8	C3, C4,C5,C6,C7, C10 (tapete)
<i>Passiflora edulis</i> Sims	Passifloraceae	Maracujá-roxo; Flor-da-paixão	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-11	Fane.trep.	Arbusto trepador	Z10	C11(1)
<i>Pelargonium inquinans</i> (L.) L'Hérit	Geraniaceae	Malva-vermelha	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C16B(grupo)
<i>Pelargonium peltatum</i> (L.) L'Hérit.	Geraniaceae	Malva	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z10	C5, C12(grupo)
<i>Pericallis x hybrida</i> R. Nordenstam	Compositae	Cinerária	Hortícola	Sazonal	1-7	3-6	Terófito	Herbácea	Z10	C15A(grupo)
<i>Persea indica</i> (L.) Spreng	Lauraceae	Vinhático	Paleártico	Perenifólio	1-12	7-9	Meso.	Árvore	Z10	C13(1), C13A(1)
<i>Philodendron bipinnatifidum</i> Endl.	Araceae	Filodendro	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-7	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	C2(1)
<i>Phlebodium aureum</i> (L.) Sm.	Polypodiaceae	Polipódio-dourado	Neártico; Neotropical	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z10	C7, C15B(grupo)
<i>Phoenix canariensis</i> Chabaud.	Palmae	Palmeira-das- canárias	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-3	Meso.	Árvore	Z11	C4(1), C5(11), C8(4), C9(6), C10(1), C11(1), C15A(2), C12(3), C13(1), C14(1), C15(1), C16 (10), C17(16), C17D(1), C18(1)
<i>Phoenix dactylifera</i> L.	Palmae	Tamareira	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-3	Meso.	Árvore	Z11	C8(1), C16(1), E29(2)
<i>Phoenix reclinata</i> Jacq.	Palmae	Tamareira-do- senegal	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	5-7	Micro.	Árvore	Z11	C3(1), C5(3), C8(1), C8A(1), C9(1), C14 (1), C15(4), C16(4), C17(7), C17D(2)
<i>Phoenix roebelinii</i> O' Brien.	Palmae	Palmeira-anã	Indomalaio	Perenifólio	1-12	5-7	Micro.	Árvore	Z11	C2(3), C5(1), C11(1)
<i>Phormium tenax</i> Forst. & Forst. f.	Agavaceae	Espadana	Antártico	Perenifólio	1-12	6-8	Hemi.	Herbácea	Z8	C16A(1)
<i>Phyllanthus tenellus</i> Roxb.	Euphorbiaceae	Quebra-pedra	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Herbácea	Z11	C11, C15A, C18 (grupo)
<i>Phyllostachis bambusoides</i> Sieb. & Zucc.	Gramineae	Bambu	Paleártico	Perenifólio	1-12	Não floriu**	Hemi.	Herbácea	Z8	C13, C14 (grupo)
<i>Phyllostachys nigra</i> (Lodd. Ex Lindl.) Munro	Gramineae	Bambu Negro	Paleártico	Perenifólio	1-12	Não floriu**	Hemi.	Herbácea	Z5	C18(grupo)
<i>Pimenta racemosa</i> (P. Miller) J. W. Moore	Myrtaceae	Árvore-do-cravinho	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-8	Micro.	Árvore	Z10	C6(2)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Pittosporum undulatum</i> Vent.	Pittosporaceae	Incenseiro	Australiano	Perenifólio	1-12	2-4; 6-7	Micro.	Árvore	Z9	C2A(1), C9(1), C15(1)
<i>Plectranthus barbatus</i> Andrews	Labiatae	Falso-boldo; Boldo-da-terra	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C18(1)
<i>Plectranthus forsteri</i> Benth.	Labiatae	Plectratos	Australiano; Oceânia	Perenifólio	1-12	6-11	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z10	C12, C18 (grupo)
<i>Plumbago auriculata</i> Lam.	Plumbaginaceae	Plumbago	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z9	C8, C17(grupo)
<i>Plumeria rubra</i> L.	Apocynaceae	Pluméria-vermelha	Neotropical	Caducifólio	5-2	6-2	Micro.	Árvore	Z10	C15A(1)
<i>Plumeria rubra</i> L. var. <i>acutifolia</i> (Poir.) Woodson.	Apocynaceae	Planta-dos-dentes	Neotropical	Caducifólio	5-1	6-12	Micro.	Árvore	Z10	C2(1), C18(1)
<i>Podocarpus elatus</i> R. Br. ex Mirb.	Podocarpaceae	Podocarpos	Australiano	Perenifólio	1-12	Não floriu**	Micro.	Árvore	Z9	C5(1)
<i>Polygonum capitatum</i> Buch.- Ham. ex D. Don	Polygonaceae	Polígono-de-jardim	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z8	C11(grupo)
<i>Portulaca oleracea</i> L.	Portulacaceae	Beldroega	Indomalaio	Sazonal	10-2	12-1	Terófito	Herbácea	Z9	C5 (grupo)
<i>Pteris tremula</i> R. Br.	Pteridaceae		Australiano; Antártico; Oceânia; Áfricotropical	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z10	C15B(grupo)
<i>Pteris vittata</i> L.	Pteridaceae	Feto	Paleártico; Indomalaio; Australiano Oceânia	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z9	C13, C15B (grupo)
<i>Punica granatum</i> L.	Punicaceae	Romãzeira	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-7	Micro.	Árvore	Z9	C1(1), C3(1), C5(1), C13(1)
<i>Pyracantha angustifolia</i> (Franch.) Schneid.	Rosaceae	Perinhos; Sarça-ardente	Paleártico	Perenifólio	1-12	2-7	Micro.	Arbusto	Z7	C10(1), C11(2), C13(1)
<i>Pyracantha coccinea</i> Roem.	Rosaceae	Perinhos; Sarça-ardente	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-5	Micro.	Arbusto	Z6	C15C(2)
<i>Pyrostegia venusta</i> (Ker- Gawl.) Miers	Bignoniaceae	Gaitinhas	Neotropical	Perenifólio	1-12	11-5	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	C13(3)
<i>Quercus ilex</i> L.	Fagaceae	Azinhiera	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-5	Meso.	Árvore	Z7	C1(2)
<i>Ravenala madagascariensis</i> Sonn.	Strelitziaceae	Ravenala; Árvore-do-viajante	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	2-10	Micro.	Árvore	Z11	C3(1)
<i>Rhapis excelsa</i> (Thunb.) Henry.	Palmae	Palmeira-de-hong- kong; Pameira-de- senhora	Paleártico	Perenifólio	1-12	6-9	Micro.	Arbusto	Z10	C9(1)
<i>Rhododendron mucronatum</i> G. Don.	Ericaceae	Azálea-japonesa	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z5	C12(2), C15C(grupo)
<i>Roldana petasites</i> (Sims) H. Robinson & Bretell.	Compositae	Senécio	Neotropical	Perenifólio	1-12	12-4; 6-8	Micro.	Arbusto	Z9	C12(1), 12A(grupo), C13(1)
<i>Rosa laevigata</i> Michx.	Rosaceae	Roseira	Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z7	C12(1)
<i>Rudbeckia fulgida</i> Ait.	Compositae	Margarida- amarela	Neártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Herbácea	Z3	C15(grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Ruscus aculeatus</i> L.	Liliaceae (Asparagaceae)	Gilbardeira	Paleártico	Perenifólio	1-12	11-12	Hemi.	Herbácea	Z7	C16(grupo)
<i>Russelia equisetiformis</i> Scdl. & Cham.	Scrophulariaceae	Russélia ; Lágrimas-de-amor	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z9	C13, C15A (grupo)
<i>Ruta chapelensis</i> L.	Rutaceae	Arruda	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-9	Nano.	Arbusto	Z8	C18(1)
<i>Salvia coccinea</i> Juss. ex Murray	Labiatae	Sálvia	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Herbácea	Z8	C12, C15(grupo)
<i>Salvia splendens</i> Sell ex Roem. & Scult.	Labiatae	Camarões; Sálvias	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Herbácea	Z10	C14A, C15 (grupo)
<i>Samolus valerandii</i> L.	Primulaceae		Paleártico	Perenifólio	1-12	5-9	Hemi.	Herbácea	Z6	C17 (grupo)
<i>Schefflera arboricola</i> (Hayata)	Araliaceae	Schefflera	Indomalaio	Perenifólio	1-12	2-4; 7-8	Micro.	Arbusto	Z10	C6(1), C16B(1)
<i>Schinus molle</i> L. non hort. ex Engl.	Anacardiaceae	Pimenteira Bastarada; Pimenteira da Índia	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Meso.	Árvore	Z9	C3(1)
<i>Schotia brachypetala</i> Sonder.	Leguminosae (Caesalpinioideae)	Scótia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	2-5	Micro.	Árvore	Z9	C7(1), C12(1)
<i>Senecio serpens</i> G. Rowley	Compositae	Bálsamo-camudo; Bálsamo-de- canudo	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Caméfito	Arbusto suculento	Z9	C15B(grupo)
<i>Senna corymbosa</i> (Lamk.) Irwin & Barneby	Leguminosae (Caesalpinioideae)	Cássia-corimbosa	Neotropical	Perenifólio	1-12	7-11	Nano.	Arbusto	Z9	C15A(2), C15B(2)
<i>Senna didymobotrya</i> (Fres.) Irwin & Barneby.	Leguminosae (Caesalpinioideae)	Cássia; Planta- das-pipocas	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C5(1)
<i>Senna pendula</i> (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Irwin & Barneby var. <i>glabrata</i> (Vogel) Irwin & Barneby	Leguminosae (Caesalpinioideae)	Chuva-de-ouro; Cássia	Neotropical; Neártico	Perenifólio	1-12	10-1	Micro.	Arbusto	Z9	C13A(1)
<i>Senna x floribunda</i> (Cav.) Irwin & Barneby	Leguminosae (Caesalpinioideae)	Cássia	Australiano	Perenifólio	1-12	6-8	Micro.	Arbusto	Z10	C11(1)
<i>Sequoia sempervirens</i> (D. Don) Endl.	Cupressaceae	Sequóia	Neártico	Perenifólio	1-12	2-3	Macro.	Árvore	Z8	C6(1)
<i>Serissa foetida</i> (L. f.) Lam.	Rubiaceae	Serissa	Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z9	C15(grupo)
<i>Solenostemon scutellarioides</i> (L.) Codd.	Labiatae	Cóleos	Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C11, C15A(grupo)
<i>Spathodea campanulata</i> Beauv.	Bignoniaceae	Chama-da- floresta; Tulipeiro- africano	Áfricotropical	Caducifólio	1-12 (Variação individual)	1-12	Micro.	Árvore	Z11	C7(2), C14A(1)
<i>Spiraea cantoniensis</i> Lour.	Rosaceae	Grinalda-de-noiva	Paleártico	Marcescente	3-2 (11-2)	2-9	Nano.	Arbusto	Z6	C12(2)
<i>Stenotaphrum secundatum</i> (Walter) Kuntze	Gramineae	Relva; Relva-de-correr	Neotropical; Áfricotropical; Oceânia	Perenifólio	1-12	3-11	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z9	C1, C2, C5, C6 (tapete)
<i>Strelitzia nicolai</i> Reg. & Körn.	Strelitziaceae	Estrelícia- gigante	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C1, C5(grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Strelitzia reginae</i> Banks ex Dryand	Strelitziaceae	Estrelícia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C2(3), C14A(grupo), C18(1)
<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassm.	Palmae	Coqueiro-de-jardim; Palmeira-rainha	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-7	Micro.	Árvore	Z10	C4(1), C5(3), C8A(1), C9(2), C13(1), C15(1), C15A(1)
<i>Synadenium grantii</i> Hook. f.	Euphorbiaceae	Sinadénio	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	8-11	Micro.	Arbusto suculento	Z10	C13(1)
<i>Syngonium podophyllum</i> Schott.	Araceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	6-7	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z11	C18(grupo)
<i>Tagetes patula</i> L.	Compositae	Cravos-de-burro	Neotropical	Sazonal	1-9	3-8	Terófito	Herbácea	Z9	C6, C12, C15A (grupo)
<i>Tetradenia riparia</i> (Hochst.) Codd.	Labiatae	Iboza (Moschosma)	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-6	Nano.	Arbusto	Z10	C5(1)
<i>Tibouchina grandifolia</i> Cogn.	Melastomataceae	Aranhas; Tibouchina	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C8(1)
<i>Tithonia diversifolia</i> (Hemsl.) A. Gray.	Compositae	Girassol-do-méxico	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z9	C8(7), C8A(4), C15A(6), C15B(3), C16(1)
<i>Trachaelium caeruleum</i> L.	Campanulaceae	Traquélio	Paleártico	Perenifólio	1-12	6-8	Nano.	Herbácea	Z9	C17(grupo)
<i>Tradescantia fluminensis</i> Vell. Conc.	Commelinaceae	Tradescantia	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-6	Hemi.	Herbácea trepadora	Z9	C11, C18 (grupo)
<i>Tradescantia pallida</i> (Rose) D. Hunt.	Commelinaceae	Tradescantia	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea trepadora	Z8	C12, C16(mancha)
<i>Tradescantia zebrina</i> hort. ex. Bosse	Commelinaceae	Zebrina	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z9	C11, C18 (mancha)
<i>Viburnum tinus</i> L.	Caprifoliaceae	Viburno	Paleártico	Perenifólio	1-12	10-4	Micro.	Arbusto	Z7	C11(3)
<i>Viola x witrockiana</i> Gams.	Violaceae	Amores-perfeitos	Hortícola	Perenifólio	1-12	3-8	Hemi.	Herbácea	Z5	C15B(grupo)
<i>Wallichia caryotoides</i> Roxb.	Palmae		Indomalaio	Perenifólio	1-12	7-8	Hemi.	Arbusto	Z9	C5(1)
<i>Washingtonia filifera</i> (Lind. ex André) H. A. Wendl	Palmae	Palmeira-de-leque-da-califórnia	Neártico	Perenifólio	1-12	5-8	Micro.	Árvore	Z9	C4(2), C5(4), C9(5), C5(1), C8(1)
<i>Washingtonia robusta</i> Wendl.	Palmae	Palmeira-de-leque-mexicana	Neártico	Perenifólio	1-12	4-6	Micro.	Árvore	Z10	C5(3), C7(1), C18(1)
<i>Wigandia caracasana</i> HBK.	Hydrophyllaceae	Vigândia	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-5	Micro.	Arbusto	Z10	C1(3)
<i>Wisteria sinensis</i> (Sims) Sweet.	Leguminosae (Papilionoidae)	Lilases; Glicínia	Paleártico	Caducifólio	2-12	2-5; 7-8	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z5	C2A(2), C12(1), C15(2)
<i>Woodwardia radicans</i> (L.) Sm.	Blechnaceae	Feto-de-botão	Paleártico	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z8	C12, C13 (grupo)
<i>Yucca elephantipes</i> Reg.	Agavaceae	Iuca-gigante	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-10	Micro.	Arbusto	Z10	C6(1)
<i>Yucca gloriosa</i> L.	Agavaceae	Iúca	Neártico	Perenifólio	1-12	6-11	Micro.	Arbusto	Z7	C14(2), C16(2)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Yushania anceps</i> (Mitford) Yi.	Gramineae	Bambu	Paleártico	Perenifólio	1-12	Não floriu**	Hemi.	Herbácea	Z9	C13(grupo)
<i>Zantedeschia aethiopica</i> (L.) Spreng.	Araceae	Jarros	Áfricotropical	Sazonal	10-7	11-5	Geófita	Herbácea	Z8	C15A (grupo)

Legenda:

- Plantas que não floriram no período em estudo (Janeiro 2002 – Janeiro 2005): * plantas novas; ** plantas que nunca floriram por falta de aclimação;
- Plantas marcescentes (plantas semiperenifólias e semicaducifólias): 3-2 (**3-4**) – folhas todo o ano mas com renovação significativa em Março e Abril.

Anexo 16
CARACTERIZAÇÃO FITOGEOGRÁFICA DA QUINTA VIGIA

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Abutilon grandifolium</i> (Willd.) Sweet	Malvaceae	Abutilão	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z9	C3(1)
<i>Acalypha godseffiana</i> hort. Sander ex Mast.	Euphorbiaceae	Acálifa	Oceânia	Perenifólio	1-12	2-8	Micro.	Arbusto	Z11	C11(1)
<i>Acalypha wilkesiana</i> Muell. Arg.	Euphorbiaceae	Acálifa; Folha-de-cobre	Oceânia	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C1(6), C4(1), C11(3)
<i>Achillea millefolium</i> L.	Compositae	Aquilea	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-8	Caméfito	Herbácea	Z2	C2(grupo)
<i>Acokanthera oblongifolia</i> (Hochst.) Codd.	Apocynaceae	Arbusto-das-setas-envenenadas	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	2-4	Micro.	Arbusto	Z9	C1(1), C11(1)
<i>Aechmea caudata</i> Lindm.	Bromeliaceae	Bromélia	Neotropical	Perenifólio	1-12	3-4	Hemi.	Herbácea	Z11	C9(grupo)
<i>Aechmea distichantha</i> Lem.	Bromeliaceae	Bromélia	Neotropical	Perenifólio	1-12	2-7	Hemi.	Herbácea	Z10	C6, C7 (grupo)
<i>Aechmea fasciata</i> (Lindl.) Bak.	Bromeliaceae	Bromélia	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C7(grupo), C11(6)
<i>Aechmea fulgens</i> Brongn. var. <i>discolor</i> (Morr.) Brongn. ex Bak.	Bromeliaceae	Bromélia	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-8	Hemi.	Herbácea	Z11	C1, C7(grupo)
<i>Aechmea nudicaulis</i> (L.) Griseb.	Bromeliaceae	Bromélia	Neotropical	Perenifólio	1-12	12-4	Hemi.	Herbácea	Z10	C11(1)
<i>Aeonium arboreum</i> (L.) Webb & Berth.	Crassulaceae	Ensaio; Saio	Paleártico	Perenifólio	1-12	11-4	Nano.	Herbácea suculenta	Z9	C10(grupo), C11(2)
<i>Agapanthus praecox</i> Willd. ssp. <i>orientalis</i> (Leighton) Leighton	Liliaceae	Agapantos; Coroas-de-henrique	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	4-9	Hemi.	Herbácea	Z9	C3(mancha)
<i>Agathis robusta</i> (C. Moore ex. F. Muell.) Bail.	Araucariaceae	Pinheiro-de-damara; Pinheiro- com-folha-de-alegra-campo	Australiano	Perenifólio	1-12	3-4	Meso.	Árvore	Z9	C11(1)
<i>Ageratum houstonianum</i> Mill.	Compositae		Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Terófito	Herbácea	Z8	C1(grupo)
<i>Aloe arborescens</i> Mill.	Liliaceae (Aloeaceae)	Aloés, Babosas, Foguetes-de-natal	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	11-2	Nano.	Arbusto suculento	Z9	C8(grupo)
<i>Aloe capitata</i> Bak.	Liliaceae (Aloeaceae)	Aloés	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	4-5	Hemi.	Herbácea suculenta	Z9	C1(grupo), C10(1), C11(1)
<i>Aloe ciliaris</i> Haw.	Liliaceae (Aloeaceae)	Aloés	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	10-6	Fane. trep.	Arbusto trepador e suculento	Z9	C1(grupo)
<i>Aloe excelsa</i> A. Berger.	Liliaceae (Aloeaceae)	Aloés	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-3	Micro.	Árvore suculenta	Z9	C1(1), C11(2)
<i>Aloe marlothi</i> A. Berger.	Liliaceae (Aloeaceae)	Aloés	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	3-4	Nano.	Árvore suculenta	Z9	C11(1)
<i>Aloe plicatilis</i> (L.) Mill.	Liliaceae (Aloeaceae)	Aloés	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	2-4	Nano.	Árvore suculenta	Z9	C1(1)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Aloe rupestris</i> Bak.	Liliaceae (Aloaceae)	Aloés	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	2-4	Micro.	Árvore suculenta	Z10	C11(2)
<i>Aloe saponaria</i> (Ait. f.) Haw.	Liliaceae (Aloaceae)	Aloés-sabão	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-7	Hemi.	Herbácea suculenta	Z9	C1(grupo), C11(1)
<i>Aloe vera</i> (L.) Burm.	Liliaceae (Aloaceae)	Aloés-vera	Paleártico; Neotropical	Perenifólio	1-12	11-6	Hemi.	Herbácea suculenta	Z8	C11(2)
<i>Alpinia zerumbet</i> (Pers.) B. L. Burt & Rosemary M. Sm.	Zingiberaceae	Alpinia; Lírio-de-porcelana	Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C1(1)
<i>Alstroemeria ligtu</i> L.	Liliaceae (Alstroemeriaceae)	Alstroemeria	Neotropical	Sazonal	4-10	5-9	Geófita	Herbácea	Z8	C11(grupo)
<i>Alstroemeria psittacina</i> Lehm.	Liliaceae (Alstroemeriaceae)	Alstroemeria; Açucena-do-peru	Neotropical	Sazonal	4-10	5-9	Geófita	Herbácea	Z8	C11(grupo)
<i>Alternanthera ficoidea</i> (L.) R. Br.	Amaranthaceae	Pirriquitos	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Caméfito	Herbácea	Z10	C11(grupo)
<i>Ananas bracteatus</i> (Lindl.) Schult. f.	Bromeliaceae	Ananás-selvagem	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-7	Hemi.	Herbácea	Z11	C6(1), C11(1)
<i>Anthurium andraeanum</i> André.	Araceae	Antúrio	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z11	C2, C4(grupo)
<i>Anthurium coriaceum</i> G. Don	Araceae	Antúrio-de-pedra	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-7	Hemi.	Herbácea	Z11	C4(1)
<i>Antirrhinum majus</i> L.	Scrophulariaceae	Bocas-de-peixe	Paleártico	Sazonal	3-10	3-10	Terófita	Herbácea	Z7	C2, C4(grupo)
<i>Apollonias barbujana</i> (Cav.) Bomm.	Lauraceae	Barbusano	Paleártico	Perenifólio	1-12	9-3	Meso.	Árvore	Z10	C1(1), C2(2), C4(2), C6(1), C9(1)
<i>Aptenia cordifolia</i> (L. f.) Schwantes	Aizoaceae	Apténia; Rosinha-de-sol	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Herbácea trepadora e suculenta	Z9	C2(grupo)
<i>Araucaria columnaris</i> (Forst. f.) Hook.	Araucariaceae	Pinheiro-da-nova - caledónia; Araucária	Oceânia	Perenifólio	1-12	5-7	Macro.	Árvore	Z10	C1(1), C2(1), C4(1)
<i>Araucaria heterophylla</i> (Salisb.) Franco	Araucariaceae	Araucária	Oceânia	Perenifólio	1-12	2-3	Macro.	Árvore	Z9	C11(1)
<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> H. A. Wendl. & Drude.	Palmae	Palmeira-elegante	Australiano	Perenifólio	1-12	2-10	Meso.	Árvore	Z10	C11(4)
<i>Argyranthemum dissectum</i> (Lowe) Lowe	Compositae	Pampilhos; Estreleira; Malmequeres	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-7	Nano.	Arbusto	Z10	C11(1)
<i>Argyranthemum frutescens</i> (L.) Schultz-Bip.	Compositae	Estrelas; Estreleiras; Pampilhos; Malmequeres	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C11(grupo)
<i>Asparagus densiflorus</i> (Kunth) Jassop	Liliaceae (Asparagaceae)	Esparto	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	7-8	Nano.	Herbácea	Z9	C9(grupo)
<i>Asparagus setaceus</i> (Kunth) Jassop	Liliaceae (Asparagaceae)	Esparto-de-folha- miúda; Esparto	Africotropical	Perenifólio	1-12	9-12	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z9	C1(2), C2(10), C4, C9(grupo), C11(3)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Aspidistra elatior</i> Bl.	Liliaceae (Convallariaceae)	Aspidistra	Paleártico	Perenifólio	1-12	6-7	Hemi.	Herbácea	Z8	C4(grupo)
<i>Asplenium nidus</i> L.	Aspleniaceae	Feto-de-ninho	Neotropical	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z11	C2(1)
<i>Bambusa vulgaris</i> Schröd. ex Wendl.	Gramineae	Bambu	Paleártico; Indomalaio	Perenifólio	1-12	Não floriu**	Hemi.	Herbácea	Z10	C3, C4 (grupo)
<i>Begonia minor</i> Jacq.	Begoniaceae	Corações; Begónias	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C11(grupo)
<i>Bergenia crassifolia</i> (L.) Fritsch.	Saxifragaceae	Bergénia; Couve-de-jardim	Paleártico	Perenifólio	1-12	11-4	Caméfito	Herbácea	Z3	C4, C7A, C9, C11 (grupo)
<i>Billbergia vittata</i> Brongn. ex Morel.	Bromeliaceae	Bromélia	Neotropical	Perenifólio	1-12	11-2	Hemi.	Herbácea	Z10	C1(5), C3, C6(3), C7(grupo), C11(3)
<i>Bougainvillea glabra</i> Choisy	Nyctaginaceae	Buganvília	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	C8(grupo), C11(21)
<i>Brachychiton acerifolius</i> Cunn. ex F. Muell.	Sterculiaceae	Árvore-do-fogo	Australiano	Caducifólio	1-5; 8-12	5-8	Micro.	Árvore	Z10	C11(1)
<i>Brugmansia aurea</i> Lagerh.	Solanaceae	Trombeteira	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C11(2)
<i>Brugmansia versicolor</i> Lagerh.	Solanaceae	Trombeteira	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C11(1)
<i>Brugmansia x candida</i> Pers.	Solanaceae	Trombeteira; Belas-noites	Hortícola	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C1(1), C2(1), C11(2)
<i>Brunfelsia pauciflora</i> (Cham. & Scltd.) Benth.	Solanaceae	Brunfêlsia; Manacá	Neotropical	Perenifólio	1-12	2-10	Micro.	Arbusto	Z10	C11(4)
<i>Buxus sempervirens</i> L.	Buxaceae	Buxo	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-4; 10-11	Nano.	Arbusto	Z5	C1, C2, C7, C9 (grupo)
<i>Caesalpinia pulcherrima</i> (L.) Sw.	Leguminosae (Caesalpinioideae)	Orgulho-de- barbados; Flor-do-paraíso	Neotropical	Perenifólio	1-12	7-2	Micro.	Árvore	Z11	C11(1)
<i>Calathea crocata</i> E. Morr. & Joriss.	Marantaceae	Calateia	Neotropical	Perenifólio	1-12	11-2	Hemi.	Herbácea	Z11	C4(grupo)
<i>Calliandra tweedii</i> Benth.	Leguminosae (Mimosoideae)	Caliandra	Neotropical	Perenifólio	1-12	11-3	Micro.	Arbusto	Z10	C4(1)
<i>Callistemon formosus</i> S.T. Blake	Myrtaceae	Martinete	Australiano	Perenifólio	1-12	4-6	Micro.	Arbusto	Z10	C9(1)
<i>Callistephus chinensis</i> (L.) Nees.	Compositae	Não-me-deixes	Paleártico	Sazonal	3-12	4-12	Terófito	Herbácea	Z6	C1, C2(grupo)
<i>Camellia japonica</i> L.	Theaceae	Camélia; Japoneira	Paleártico	Perenifólio	1-12	11-6	Micro.	Árvore	Z8	C11(2)
<i>Canna x generalis</i> L.H. Bail.	Cannaceae	Canas-da-índia; Bananeiras-de- flor	Hortícola	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z9	C1, C9, C11 (grupo)
<i>Capsicum frutescens</i> L.	Solanaceae	Pimenteira	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-10	Nano.	Arbusto	Z9	C1(1), C7(1), C9 (grupo)
<i>Carica papaya</i> L.	Caricaceae	Papaieira	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Árvore	Z10	C4(1)
<i>Catharanthus roseus</i> (L.) G. Don.	Apocynaceae	Catarantos; Maravilhas;	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Herbácea	Z10	C1, C2, C4, C7, C9, C11(grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitoceográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Cedrus deodara</i> (D. Don) G. Don.	Pinaceae	Cedro- deodara; Cedro-dos-himalaias	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-5	Meso.	Árvore	Z7	C9 (1)
<i>Celosia argentea</i> L. gr. Plumosa	Amaranthaceae	Celósia	Indomalaio; Áfricotropical Neotropical	Sazonal	5-12	7-12	Terófito	Herbácea	Z10	C11(grupo)
<i>Centranthus ruber</i> (L.) DC.	Valerianaceae	Rosa-da-rocha; Alfinetes	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Caméfito	Herbácea	Z5	C8, C10 (grupo)
<i>Centratherum muticum</i> (Humb., Bonpl. & Kunth) Less.	Compositae	Flor-botão	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Caméfito	Herbácea	Z10	C11(grupo)
<i>Cereus uruguayanus</i> Kiesling	Cactaceae	Cacto-vela-de-cera	Neotropical	Perenifólio	1-12	7-8	Nano.	Árvore suculenta	Z9	C11(2)
<i>Chamaedorea elegans</i> Mart.	Palmae	Palmeira-de-salão; Palmeira-bambu	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-6	Micro.	Arbusto	Z10	C4(grupo)
<i>Chlorophytum comosum</i> (Thumb.) Jacques	Liliaceae (Anthericaceae)	Fitinhas	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z9	C1, C2 (grupo)
<i>Chorisia speciosa</i> A. St. Hil.	Bombacaceae	Sumaúma	Neotropical	Caducifólio	3-11	8-11	Meso.	Árvore	Z10	C4(1)
<i>Cinnamomum camphora</i> (L.) Sieb.	Lauraceae	Canforeira	Paleártico; Indomalaio	Perenifólio	1-12	2-4	Meso.	Árvore	Z10	C1(1), C3(1), C6(1), C7(1)
<i>Clerodendrum splendens</i> G. Don ex James	Verbenaceae	Clerodendro	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	C11(4)
<i>Clivia miniata</i> Regel	Amaryllidaceae	Clívia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	2-11	Hemi.	Herbácea	Z10	C1, C2, C3, C4, C6, C9 (grupo)
<i>Clivia nobilis</i> Lindl.	Amaryllidaceae	Clívia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	2-11	Hemi.	Herbácea	Z10	C3(grupo)
<i>Codiaeum variegatum</i> (L.) Bl. var. <i>pictum</i> (Lodd) Muell. Arg.	Euphorbiaceae	Crótone	Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z11	C1(3), C2(3), C3(4), C4(2), C5(1), C6(3), C7(1), C7A(2), C9(1), C11(6)
<i>Coelogyne cristata</i> Lindley	Orchidaceae	Orquídea	Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-4	Epífita	Herbácea	Z10	C7(1)
<i>Colocasia esculenta</i> (L.) Schott.	Araceae	Inhame	Indomalaio	Perenifólio	1-12	5-6	Geófito	Herbácea	Z10	C9(grupo)
<i>Convolvulus cneorum</i> L.	Convolvulaceae		Paleártico	Perenifólio	1-12	3-8	Nano.	Arbusto	Z8	C2 (grupo)
<i>Convolvulus massonii</i> Dietr.	Convolvulaceae	Corriola-da-madeira; Convólulos-da-madeira	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-8	Geófito	Herbácea trepadora	Z10	C11(1)
<i>Cordyline stricta</i> (Sims) Endl.	Agavaceae	Cordiline	Australiano	Perenifólio	1-12	1-10	Nano.	Arbusto	Z10	C11(3)
<i>Cordyline terminalis</i> (L.) Kunth.	Agavaceae	Árvore-dos-reis	Indomalaio; Australiano; Oceânia; Antártico	Perenifólio	1-12	11-5	Micro.	Arbusto	Z10	C2(1), C4(1)
<i>Coreopsis auriculata</i> L.	Compositae	Margarida-amarela	Neártico	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z4	C11(grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Cotoneaster horizontalis</i> Decae.	Rosaceae		Paleártico	Perenifólio	1-12	3-5	Nano.	Arbusto	Z5	C11 (grupo)
<i>Crassula coccinea</i> L.	Crassulaceae		Áfricotropical	Perenifólio	1-12	7-8	Nano.	Arbusto suculento	Z10	C10(grupo)
<i>Crassula ovata</i> (Mill.) Druce.	Crassulaceae	Ensaio-branco ; Planta-de-jade	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	11-3	Nano.	Arbusto suculento	Z10	C11(1)
<i>Ctenanthe lubbersiana</i> (E. Morr.) Eichl.	Marantaceae	Maranta-cinza; Tenante	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-8	Hemi.	Herbácea	Z10	C2, C3, C9, C11 (grupo)
<i>Ctenanthe oppenheimiana</i> (E. Morr.) Schum.	Marantaceae	Maranta-variegada	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-8	Hemi.	Herbácea	Z10	C1, C2, C4, C9, C11 (grupo)
<i>Ctenanthe setosa</i> Eichler	Marantaceae	Maranta-cinza	Neotropical	Perenifólio	1-12	3-7	Hemi.	Herbácea	Z10	C11(grupo)
<i>Cuphea ignea</i> A. DC.	Lythraceae	Cigarrinhos	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C1(grupo)
<i>Cyathea cooperi</i> (F. Mueller) Domin.	Cyatheaceae	Feto arbóreo	Australiano	Perenifólio	1-12	-----	Micro.	Árvore	Z10	C1(2), C7(5), C9(5), C11(9)
<i>Cycas revoluta</i> Thunb.	Cycadaceae	Cicas Revoluta; Cicas de Sagú	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-8	Micro.	Árvore	Z9	C2(2), C4(2), C11(2)
<i>Cymbidium insigne</i> Rolfe cvs.	Orchidaceae	Orquídea-de- haste; Cimbidio	Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-8	Hemi.	Herbácea	Z9	C2, C4 (grupo)
<i>Cymbopogon citratus</i> (DC. ex Nees) Stapf.	Gramineae	Cana-de-cheiro	Indomalaio	Perenifólio	1-12	9-10	Hemi.	Herbácea	Z9	C11(grupo)
<i>Cyperus involucratus</i> Rottb.	Cyperaceae		Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C9(grupo)
<i>Cyphomandra crassicaulis</i> (Ortega) Kuntze.	Solanaceae	Tomateiro- arbóreo; Tomateiro-inglês	Neotropical	Perenifólio	1-12	3-10	Micro.	Arbusto	Z9	C2(1)
<i>Cyrtomium falcatum</i> (L. f.) Presl.	Dryopteridaceae	Feto-azevinho	Paleártico; Indomalaio; Áfricotropical; Oceânia	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z9	C9 (grupo)
<i>Davallia canariensis</i> (L.) Sm.	Davalliaceae	Cabrinhas	Paleártico	Perenifólio	1-12	-----	Epífita	Herbácea	Z9	C11(grupo)
<i>Delphinium elatum</i> L. cvs.	Ranunculaceae		Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Herbácea	Z3	C1 (grupo)
<i>Dichondra micrantha</i> Urban.	Convolvulaceae	Relva-redonda	Australiano; Antártico	Perenifólio	1-12	3-6	Hemi.	Herbácea	Z9	C4(tapete)
<i>Dichorisandra thyrsiflora</i> Mikan.	Commelinaceae	Dicorisandra	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C1(1), C7(3), C11(7)
<i>Dicksonia antarctica</i> Labill.	Dicksoniaceae	Feto-arbóreo	Australiano	Perenifólio	1-12	-----	Micro.	Árvore	Z8	C11(3)
<i>Dracaena deremensis</i> Engl.	Agavaceae	Dracena	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	11-12	Micro.	Arbusto	Z11	C1(2), C2(1)
<i>Dracaena draco</i> L. ssp. <i>draco</i>	Agavaceae	Dragoeiro	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-6	Micro.	Árvore	Z11	C1(1), C3(4)
<i>Dracaena fragrans</i> (L.) Ker-Gawl.	Agavaceae	Dracena	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	11-1	Micro.	Arbusto	Z12	C11(2)
<i>Dracaena marginata</i> Lam.	Agavaceae	Dracena	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu**	Micro.	Arbusto	Z11	C4(1)
<i>Echinocactus grusonii</i> Hildm.	Cactaceae	Esfera-dourada	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-8	Caméfito	Herbácea suculenta	Z9	C11(3)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Echinopsis terscheckii</i> (Parmentier ex Pfeiff.) Friedrich & Rowley	Cactaceae	Cacto	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-6	Nano	Arbusto suculento	Z9	C11(1)
<i>Echium nervosum</i> Dryand.	Boraginaceae	Massaroco	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-6	Nano.	Arbusto	Z11	C10(1), C11(1)
<i>Emilia coccinea</i> (Sims) D. Don.	Compositae	Emília	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Herbácea	Z11	C2, C4, C9, C11 (grupo)
<i>Encephalartos transvenosus</i> Stapf & Burtt Davy.	Zamiaceae	Encefalartos	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	5-11	Micro.	Árvore	Z9	C7(1), C11(1)
<i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl.	Rosaceae	Nespereira	Paleártico	Perenifólio	1-12	10-12	Micro.	Árvore	Z8	C9(1)
<i>Erythrina crista-galli</i> L.	Leguminosae (Papilionoideae)	Coralina-cristada; Coralreira	Neotropical	Marcescente	4-3 (12-3)	4-1	Micro.	Árvore	Z8	C1(1), C11(1)
<i>Erythrina speciosa</i> Andrews	Leguminosae (Papilionoideae)	Coralina-elegante	Neotropical	Caducifólio	4-11	12-4	Micro.	Árvore	Z10	C11(2)
<i>Eugenia uniflora</i> L.	Myrtaceae	Pitangueira	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Árvore	Z10	C9(5)
<i>Euphorbia cotinifolia</i> L.	Euphorbiaceae	Eufórbia	Neotropical	Caducifólio	3-12	6-11	Micro.	Árvore	Z11	C7A(1)
<i>Euphorbia grandicomis</i> Goebel.	Euphorbiaceae	Eufórbia-grande- cornuda	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	12-2	Nano.	Arbusto suculento	Z9	C10(1), C11(1)
<i>Euphorbia ingens</i> E. Mey.	Euphorbiaceae	Eufórbia-gigante	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	10-12	Micro.	Arbusto suculento	Z9	C11(4)
<i>Euphorbia milii</i> Desmoul.	Euphorbiaceae	Mira-mira-não- me-toques	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C9(1), C10(2), C11(4)
<i>Euphorbia piscatoria</i> Ait.	Euphorbiaceae	Figueira-do- inferno	Paleártico	Caducifólio	9-6	4-6	Micro.	Arbusto suculento	Z10	C11(1)
<i>Euphorbia trigona</i> Mill.	Euphorbiaceae	Eufórbia	Africotropical	Perenifólio	1-12	6-8	Micro.	Arbusto suculento	Z10	C10(1), C11(1)
<i>Euryops chrysanthemoides</i> (DC.) R. Nordenstam	Compositae	Estreleira-amarela	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z9	C2(9), C11(2)
<i>Farugium japonicum</i> (L.) Kitam.	Compositae	Patas-de- cavalo; Boinas	Paleártico	Perenifólio	1-12	6-3	Hemi.	Herbácea	Z7	C1, C2, C3, C4, C11(grupo)
<i>Felicia amelloides</i> (L.) Voss.	Compositae	Felícia ; Margarida-azul	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z9	C9, C11 (grupo)
<i>Ficus aspera</i> Forst. f.	Moraceae	Figueira-palhaço	Oceânia	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Árvore	Z11	C2(1)
<i>Ficus benjamina</i> L. var. <i>nuda</i> (Miq.) Barrett	Moraceae	Figueira-da-india	Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-4	Meso.	Árvore	Z11	C3(2), C9(3),
<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	Umbelliferae	Funcho	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-8	Hemi.	Herbácea	Z5	C11(grupo)
<i>Fuchsia boliviana</i> Carr.	Onagraceae	Mimos; Brincos-de- princesa	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C11(9)
<i>Fuchsia magellanica</i> Lam.	Onagraceae	Fúcsia; Brincos-de- princesa; Mimos	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z7	C11 (8)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Fuchsia triphylla</i> L.	Onagraceae	Fúcsia; Brincos-de- princesa; Mimos	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z11	C11(7)
<i>Furcraea sellosa</i> K. Koch. var. <i>marginata</i> Trel.	Agavaceae	Piteira	Neotropical	Perenifólio	1-12	8-12	Micro.	Árvore suculenta	Z10	C11(2)
<i>Gasteria bicolor</i> Haw	Liliaceae (Aloeaceae)	Gastéria	Áfrotropical	Perenifólio	1-12	5-6	Hemi.	Herbácea suculenta	Z9	C11(1)
<i>Geranium maderense</i> P. F. Yeo	Geraniaceae	Gerânio-da- madeira; Passaras	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-6	Nano.	Herbácea	Z10	C11(grupo)
<i>Glottiphyllum nelii</i> Schwantes	Aizoaceae		Áfrotropical	Perenifólio	1-12	4-6	Caméfito	Herbácea suculenta	Z9	C10(3)
<i>Graptopetalum paraguayense</i> (N. E. Br.) Walth.	Crassulaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	3-6	Caméfito	Herbácea suculenta	Z9	C10(grupo)
<i>Grevillea robusta</i> A. M. Cunn. ex. R. Br.	Proteaceae	Grevílea	Australiano	Perenifólio	1-12	4-7	Meso.	Árvore	Z8	C4(1)
<i>Guzmania lingulata</i> (L.) Mez.	Bromeliaceae	Bromélia	Neotropical	Perenifólio	1-12	11-5	Hemi.	Herbácea	Z11	C1(5)
<i>Hedera helix</i> L.	Araliaceae	Hera	Paleártico	Perenifólio	1-12	9-10	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z5	C9(grupo)
<i>Hedychium gardnerianum</i> Ker-Gawl.	Zingiberaceae	Bananilha; Roca-de-vnus; Conteira	Paleártico; Indomalaio	Perenifólio	1-12	7-10	Hemi	Herbácea	Z9	C2(8)
<i>Helichrysum bracteatum</i> (Vent.) Andrews	Compositae	Sempre-viva; Margarida-de- papel;	Australiano	Sazonal	3-10	4-10	Terófito	Herbácea	Z8	C1, C2(grupo)
<i>Heliconia bihai</i> (L.) L.	Heliconiaceae	Helicónia	Neotropical	Perenifólio	1-12	7-11	Hemi.	Herbácea	Z11	C11 (grupo)
<i>Hemerocallis dumortieri</i> E. Morr.	Liliaceae (Hemerocallidaceae)	Hemerocalis; Lírio-dum-dia	Paleártico	Perenifólio	1-12	6-10	Geófito	Herbácea	Z5	C11 (grupo)
<i>Hemerocallis fulva</i> L.	Liliaceae (Hemerocallidaceae)	Hemerocalis; Lírio-dum-dia	Paleártico	Perenifólio	1-12	6-10	Geófito	Herbácea	Z5	C11(grupo)
<i>Hibiscus mutabilis</i> L.	Malvaceae	Rosa-de-algodão	Paleártico	Perenifólio	1-12	6-11	Micro.	Arbusto	Z8	C4(1)
<i>Hibiscus rosa-sinensis</i> L.	Malvaceae	Cardeais; Hibiscos; Rosa-da-china	Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C1(7), C3(grupo), C9(9), C11(6)
<i>Hibiscus schizopetalus</i> (Mast.) Hook. f.	Malvaceae	Lanterna-chinesa	Áfrotropical	Perenifólio	1-12	3-11	Micro.	Arbusto	Z10	C11(1)
<i>Hibiscus syriacus</i> L.	Malvaceae	Cardeal-roxo; Hibisco-da-síria	Paleártico; Indomalaio	Caducifólio	5-11	7-9	Micro.	Arbusto	Z5	C4(1)
<i>Holmskioldia sanguinea</i> Retz.	Verbenaceae	Chapéus-de- mandarin; Chapéus-chineses	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C1(1)
<i>Hydrangea macrophylla</i> (Thunb.) Ser.	Hydrangeaceae	Hortênsias; Novelos	Paleártico	Caducifólio	3-12	5-10	Nano.	Arbusto	Z6	C11(20)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Hylocereus triangularis</i> (L.) Britt. & Rose	Cactaceae	Rainha-da-noite; Cacto-trepador	Neotropical	Perenifólio	1-12	7-10	Fane. trep.	Arbusto trepador e suculento	Z10	C8 (grupo)
<i>Hymenocallis littoralis</i> (Jacq.) Salisb.	Amaryllidaceae	Lírio-aranha	Neotropical	Perenifólio	1-12	9-11	Geófita	Herbácea	Z10	C11 (grupo)
<i>Hypoestes phyllostachya</i> Bak.	Acanthaceae	Hipoestes	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	9-12	Nano.	Arbusto	Z10	C11 (grupo)
<i>Impatiens walleriana</i> Hook. f.	Balsaminaceae	Maravilhas	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Herbácea	Z9	C1, C2, C4, C9, C11 (grupo)
<i>Iresine herbstii</i> Hook.	Amaranthaceae	Iresine	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Caméfito	Herbácea	Z10	C11 (grupo)
<i>Jacaranda mimosifolia</i> D. Don.	Bignoniaceae	Jacarandá	Neotropical	Caducifólio	5-2	4-7; 9-10	Meso.	Árvore	Z9	C1(1), C2(3)
<i>Juniperus chinensis</i> L.	Cupressaceae	Cedro-da-china	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-3	Micro.	Árvore	Z4	C9 (1)
<i>Justicia adhatoda</i> L.	Acanthaceae		Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C11(1)
<i>Justicia brandegeana</i> Wassh. and L. B. Sm.	Acanthaceae	Beloperone	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C1(1), C2(5)
<i>Justicia carnea</i> Lindl.	Acanthaceae	Justicia	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-10	Nano.	Arbusto	Z12	C2(2), C7(2), C11(11)
<i>Kalanchoe beharensis</i> Drake.	Crassulaceae	Arbusto-de-feltro	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	12-3	Micro.	Arbusto suculento	Z11	C10(1), C11(2)
<i>Kalanchoe blossfeldiana</i> Poelln.	Crassulaceae	Calanchoé	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto suculento	Z11	C2(grupo)
<i>Kalanchoe delagoneensis</i> Ecklon & Zeyh.	Crassulaceae	Calanchoé	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	12-9	Nano.	Arbusto suculento	Z11	C10(12), C11(grupo)
<i>Kalanchoe fedtschenkoi</i> Hamet & Perrier	Crassulaceae	Calanchoé	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-8	Caméfito	Arbusto suculento	Z11	C1, C2 (grupo)
<i>Kalanchoe gastonis – bonnieri</i> Raym.-Hamet & H. Perrier	Crassulaceae	Calanchoé	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	11-3	Nano.	Arbusto suculento	Z11	C1(2), C2(grupo)
<i>Kniphofia x praecox</i> Bak	Liliaceae (Aloeaceae)	Foguetes	Hortícola	Perenifólio	1-12	11-2	Hemi.	Herbácea	Z9	C1(1), C2(grupo)
<i>Lagerstroemia indica</i> L.	Lythraceae	Laguerestré-mia; Flor-de-merenda; Suspiros	Paleártico; Indomalaio	Caducifólio	3-11	7-9	Micro.	Árvore	Z7	C11(3)
<i>Lampranthus multiradiatus</i> (Jacq.) N. E. Br.	Aizoaceae	Lamprantos; Chorão	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Arbusto trepador e suculento	Z11	C2, C4 (grupo)
<i>Lavandula dentata</i> L.	Labiatae	Alfazema	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z8	C2(grupo)
<i>Lavandula pinnata</i> L. f.	Labiatae	Alfazema; Lavanda	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z11	C1(grupo)
<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) De Wit.	Leguminosae (Mimosoideae)	Aroma-branco; Leucena	Neártico	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z9	C8(grupo)
<i>Leucanthemum x superbum</i> (J. Ingram) Bergmans ex Kent.	Compositae	Estrelas	Hortícola	Perenifólio	1-12	5-8	Nano.	Herbácea	Z5	C11 (grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Ligustrum lucidum</i> Ait. f.	Oleaceae	Ligustro; Alfinheiro	Paleártico	Perenifólio	1-12	6-9	Micro.	Árvore	Z7	C1(1), C2(1)
<i>Limonium sinuatum</i> (L.) Mill. cvs.	Plumbaginaceae	Limônio; Cuidados-eternos	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-11	Nano.	Herbácea	Z9	C1(6), C4(3)
<i>Livistona chinensis</i> (Jacq.) R. Br. ex Mart.	Palmae	Palmeira-de-leque	Paleártico	Perenifólio	1-12	2-5	Meso.	Árvore	Z9	C2 (4), C3(1), C4(1), C5(1), C6(5), C9(15)
<i>Lobularia maritima</i> (L.) Desv.	Cruciferae	Lobulária	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z8	C1, C2, C7 (grupo)
<i>Mackaya bella</i> Harv.	Acanthaceae	Macaia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-7	Micro.	Arbusto	Z10	C2(1)
<i>Magnolia grandiflora</i> L.	Magnoliaceae	Magnólia	Neártico	Perenifólio	1-12	5-8	Micro.	Árvore	Z6	C1(1), C6 (1), C7(2), C11(2)
<i>Magnolia x soulangiana</i> Soul.-Bod.	Magnoliaceae	Magnólia	Hortícola	Caducifólio	3-12	12-4	Micro.	Árvore	Z5	C11(1)
<i>Mangifera indica</i> L.	Anacardiaceae	Mangueiro	Indomalaio	Perenifólio	1-12	11-6	Micro.	Árvore	Z11	C4(2), C11(4)
<i>Maranta leuconeura</i> E. Morr.	Marantaceae	Maranta	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-6	Hemi.	Herbácea	Z11	C4(grupo)
<i>Markamia lutea</i> (Benth.) Schum.	Bignoniaceae	Marcâmia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Meso.	Árvore	Z11	C11(1)
<i>Matthiola incana</i> (L.) R. Br.	Cruciferae	Goivos	Paleártico	Sazonal	1-7	3-7	Terófito	Herbácea	Z6	C2(grupo)
<i>Melianthus major</i> L.	Melanthaceae		Áfricotropical	Perenifólio	1-12	3-5	Micro.	Arbusto	Z9	C11(1)
<i>Mimosa pudica</i> L.	Leguminosae (Mimosoideae)	Sensitiva	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C9(1)
<i>Monizia edulis</i> Lowe	Umbelliferae	Cenoura-da-rocha; Nozelha	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-5	Nano.	Herbácea	Z10	C11(1)
<i>Monstera deliciosa</i> Liebm.	Araceae	Fruto-delicioso; Costela-de-adão	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z10	C1(2), C2(6), C3(1), C9(grupo)
<i>Musa velutina</i> Wendl. & Drude.	Musaceae	Bananeira-de-jardim	Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z9	C11(grupo)
<i>Musa x paradisiaca</i> L.	Musaceae	Bananeira-de-prata	Hortícola	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C1(3), C9(2)
<i>Musschia aurea</i> (L. f.) Dumort.	Campanulaceae	Múchia-dourada	Paleártico	Perenifólio	1-12	6-8	Caméfito	Herbácea	Z11	C11(1)
<i>Nandina domestica</i> Thunb.	Berberidaceae	Nandina	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-9	Nano.	Arbusto	Z5	C4(1), C11(1)
<i>Neoregelia carolinae</i> (Beer) L. B.	Bromeliaceae	Bromélia	Neotropical	Perenifólio	1-12	11-2	Hemi.	Herbácea	Z10	C7(4), C11(3)
<i>Neoregelia johannis</i> (Carrière) L. B. Smith.	Bromeliaceae	Bromélia-ninho-de-passarinho	Neotropical	Perenifólio	1-12	8-1	Hemi.	Herbácea	Z10	C1(grupo), C6(4), C7, C11 (grupo)
<i>Nephrolepis cordifolia</i> (L.) Presl.	Oleandraceae	Feto	Neotropical; Áfricotropical; Indomalaio; Oceânia; Australiano	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z10	C2, C4, C9 (grupo)
<i>Nerium oleander</i> L.	Apocynaceae	Sevadilha; Loendro	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-11	Micro.	Arbusto	Z9	C1(2)
<i>Nicotiana glauca</i> Graham.	Solanaceae	Tabaqueira-azul; Charuteira	Neotropical	Perenifólio	1-12	3-9	Micro.	Arbusto	Z8	C8 (grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Nidularium fulgens</i> Lem.	Bromeliaceae	Bromélia	Neotropical	Perenifólio	1-12	2-7	Hemi.	Herbácea	Z10	C11(1)
<i>Nolina recurvata</i> (Lem.) Hemsl.	Agavaceae	Nolina; Pata-de-elefante	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-8	Micro.	Árvore	Z9	C2(1), C3(1)
<i>Ochna serrulata</i> (Hochst.) Walp.	Ochnaceae	Planta-do-rato- mikey	Áfrotropical	Perenifólio	1-12	2-4	Nano.	Arbusto	Z9	C11(1)
<i>Ocotea foetens</i> (Aiton) Bail.	Lauraceae	Til	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Meso.	Árvore	Z10	C1(2), C2(1), C3(2), C4(2), C9(1), C11(1)
<i>Odontonema strictum</i> (Nees) Kuntze	Acanthaceae	Odontonema; Ramo-de-fogo	Neotropical	Perenifólio	1-12	8-12	Nano.	Arbusto	Z10	C2(grupo), C3(3), C7(2)
<i>Oenothera fruticosa</i> L.	Onagraceae	Oenotera	Neártico	Sazonal	1-10	3-9	Terófito	Herbácea	Z4	C11(grupo)
<i>Ophiopogon jaburan</i> (Kunth) Lodd	Liliaceae (Convallariaceae)	Relva-do-japão	Paleártico	Perenifólio	1-12	7-9	Hemi.	Herbácea	Z7	C11(grupo)
<i>Ophiopogon japonicus</i> (L. f.) Ker-Gawl	Liliaceae (Convallariaceae)	Relva-do-japão	Paleártico	Perenifólio	1-12	7-9	Hemi.	Herbácea	Z8	C3, C4, C6 (mancha)
<i>Opuntia compressa</i> (Salisb.) Macbr.	Cactaceae	Tabaibeira	Neártico	Perenifólio	1-12	5-8	Nano.	Arbusto suculento	Z8	C11(1)
<i>Opuntia ficus-indica</i> (L.) Mill.	Cactaceae	Tabaibeira	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-7	Micro.	Arbusto suculento	Z9	C11(1)
<i>Pelargonium x hortorum</i> L. H. Bail.	Geraniaceae	Malvas	Hortícola	Perenifólio	1-12	4-7	Nano.	Herbácea	Z10	C1, C2, C4, C7 (grupo)
<i>Pericalis aurita</i> (L' Hér.) B. Nord.	Compositae	Erva-de-coelho	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-7	Nano.	Arbusto	Z10	C11(1)
<i>Philodendron bipinnatifidum</i> Endl.	Araceae	Filodendro	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-7	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	C4(1), C7(2)
<i>Phlebodium aureum</i> (L.) Sm.	Polypodiaceae	Polipódio-dourado	Neártico; Neotropical	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z10	C2, C4 (grupo)
<i>Phoenix canariensis</i> ex. Chabaud.	Palmae	Palmeira-das- canárias	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-3	Meso.	Árvore	Z11	C1(1), C2(1), C3(1), C4(2), C5(1), C9(7),
<i>Phoenix dactylifera</i> L.	Palmae	Tamareira	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-3	Meso.	Árvore	Z11	C4(1), C11(1)
<i>Phoenix roebelinii</i> O' Brien.	Palmae	Palmeira Anã	Indomalaio	Perenifólio	1-12	5-7	Micro.	Árvore	Z11	C4(1)
<i>Phytolacca dioica</i> (L.) Moq.	Phytolaccaceae	Bela-sombra	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-9	Meso.	Árvore	Z11	C1(1)
<i>Picconia excelsa</i> (Ait.) DC.	Oleaceae	Pau-branco	Paleártico	Perenifólio	1-12	2-5	Micro.	Árvore	Z10	C4(1)
<i>Pilea cadierei</i> Gagnep. & Guillaum.	Urticaceae	Planta-do- aluminio	Indomalaio	Perenifólio	1-12	10-12	Hemi.	Herbácea	Z11	C7A, C11 (grupo)
<i>Pilea microphylla</i> (L.) Liebm.	Urticaceae	Arrozinho	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C1, C11 (grupo)
<i>Pittosporum tobira</i> Ait.	Pittosporaceae	Tobira; Faia-da-holanda	Paleártico	Perenifólio	1-12	2-5; 7-8	Micro.	Árvore	Z9	C1(2), C2(1)
<i>Platanus x acerifolia</i> (Ait.) Willd.	Platanaceae	Plátano	Hortícola	Caducifólio	4-11	4-5	Meso.	Árvore	Z7	C11(1)
<i>Platycladus orientalis</i> (L. f.) Franco	Cupressaceae	Tuia-oriental	Neártico	Perenifólio	1-12	1-3	Micro.	Árvore	Z6	C9(1)
<i>Plectranthus barbatus</i> Andrews	Labiatae	Falso-boldo; Boldo-da-terra	Áfrotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C9(grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Plectranthus ecklonii</i> Benth.	Labiatae	Plectranto	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	8-11	Nano.	Arbusto	Z10	C2(1), C4(1)
<i>Plumeria rubra</i> L. var. <i>acutifolia</i> (Poir.) Woodson.	Apocynaceae	Planta-dos-dentes	Neotropical	Caducifólio	5-1	6-12	Micro.	Árvore	Z10	C1(1), C3(2)
<i>Pouteria sapota</i> (Jacq.) Moore & Stearn	Sapotaceae	Sapota	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-8	Micro.	Árvore	Z10	C7(1)
<i>Psidium littorale</i> Raddi	Myrtaceae	Araçazeiro; Araçaleiro	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-7	Micro.	Árvore	Z10	C3(1)
<i>Pteris vittata</i> L.	Pteridaceae	Feto	Paleártico; Indomalaio; Australiano: Oceânia	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z9	C7A(grupo)
<i>Punica granatum</i> L.	Punicaceae	Romãzeira	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-7	Micro.	Árvore	Z9	C11(1)
<i>Pycnostachys urticifolia</i> Hook.	Labiatae		Áfricotropical	Perenifólio	1-12	10-3	Nano.	Arbusto	Z10	C7(1), C11(1)
<i>Pyracantha angustifolia</i> (Franch.) Schneid.	Rosaceae	Perinhos; Sarça-ardente	Paleártico	Perenifólio	1-12	2-7	Micro.	Arbusto	Z7	C11(1)
<i>Rhapis excelsa</i> (Thunb.) Henry.	Palmae	Palmeira-de-hong- kong; Pameira-de- senhora	Paleártico	Perenifólio	1-12	6-9	Micro.	Arbusto	Z10	C2(1), C11(1)
<i>Rhododendron mucronatum</i> G. Don.	Ericaceae	Azálea-japonesa	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z5	C2, C7, C11(grupo)
<i>Rosa x damascena</i> Mill.	Rosaceae	Roseira	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-8	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z4	C11(1)
<i>Rosmarinus officinalis</i> L.	Labiatae	Alecrim	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z6	C11 (3)
<i>Rudbeckia fulgida</i> Ait.	Compositae	Margarida- amarela; Susana-de-olhos- negros	Neártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Herbácea	Z3	C11(grupo)
<i>Ruscus hypophyllum</i> L.	Liliaceae (Asparagaceae)	Ruscus	Paleártico	Perenifólio	1-12	11-12	Nano.	Herbácea	Z8	C4, C9, C11 (grupo)
<i>Salvia splendens</i> Sell ex Roem. & Scult.	Labiatae	Camarões; Sálvias	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Herbácea	Z10	C1, C2, C7, C9, C11 (grupo)
<i>Sambucus lanceolata</i> R. Br.	Caprifoliaceae	Sabugueiro-da- madeira	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-5	Micro.	Árvore	Z10	C11(1)
<i>Sansevieria trifasciata</i> Prain var. <i>laurentii</i> (De Wild.) N. E. Br.	Agavaceae	Língua-de-sogra	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	8-11	Hemi.	Herbácea	Z10	C2, C3 (grupo)
<i>Scadoxus puniceus</i> (L.) Friis & Nardal.	Amaryllidaceae	Broxas	Áfricotropical	Sazonal	4-10	11-5	Geófita	Herbácea	Z10	C2, C4 (grupo)
<i>Schefflera arboricola</i> (Hayata)	Araliaceae	Schefflera	Indomalaio	Perenifólio	1-12	2-4; 7-8	Micro.	Arbusto	Z10	C1(1), C3(2)
<i>Schinus molle</i> L. non hort. ex Engl.	Anacardiaceae	Pimenteira- bastarda; Pimenteira-da-índia	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Meso.	Árvore	Z9	C9(1)
<i>Schotia brachypetala</i> Sonder.	Leguminosae (Caesalpinioidae)	Scótia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	2-5	Micro.	Árvore	Z9	C7(1)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Scilla maderensis</i> Mnzs.	Liliaceae	Cila-da-madeira	Paleártico	Sazonal	9-6	10-2	Geófita	Herbácea	Z11	C2 (10), C11(1)
<i>Sedum pachyphyllum</i> Rose.	Crassulaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	1-4	Caméfito	Arbusto suculento	Z8	C10, C11(grupo)
<i>Sedum reflexum</i> L.	Crassulaceae	Arrozinho	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-7	Caméfito	Herbácea suculenta	Z7	C10(grupo)
<i>Semele androgyna</i> (L.) Kunth.	Liliaceae	Alegre-campo	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-5	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	C4(1)
<i>Senecio cineraria</i> DC.	Compositae	Senécio	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-8	Nano.	Arbusto	Z8	C1, C9, C11 (grupo)
<i>Senna didymobotrya</i> (Fres.) Irwin & Barneby.	Leguminosae (Caesalpinioideae)	Planta-das- pipocas; Cássia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C4(1), C11(1)
<i>Sequoia sempervirens</i> (D. Don) Endl.	Cupressaceae	Sequóia	Neártico	Perenifólio	1-12	2-3	Micro.	Árvore	Z8	C11(2)
<i>Serissa foetida</i> (L. f.) Lam.	Rubiaceae	Serissa	Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z9	C11(1)
<i>Sobralia macrantha</i> Lindl.	Orchidaceae	Orquídea-de-cana; Sobralia	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-10	Hemi.	Herbácea	Z11	C11(grupo)
<i>Solandra maxima</i> (Sessé & Moc.) P. Green	Solanaceae	Solandra	Neotropical	Perenifólio	1-12	12-7	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	C1(1)
<i>Solanum crispum</i> Ruiz & Pav.	Solanaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	7-9	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z8	C1(1)
<i>Solenostemon scutellarioides</i> (L.) Codd. cvs.	Labiatae	Cóleos; Basólias	Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C11 (grupo)
<i>Sonchus ululatus</i> Lowe ssp. <i>maderensis</i> Aldridge	Compositae	Leituga	Paleártico	Perenifólio	1-12	7-10	Caméfito	Herbácea	Z10	C11(1)
<i>Spathiphyllum walisii</i> Reg.	Araceae	Lírio-da-paz; Bandeira-branca; Espatífilo	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z11	C4 (grupo)
<i>Spathodea campanulata</i> Beauv.	Bignoniaceae	Chama-da- floresta; Tulipeiro- africano	Áfricotropical	Caducifólio	1-12 (Variação individual)	1-12	Micro.	Árvore	Z11	C1(1)
<i>Stenocarpus sinuatus</i> Endl.	Proteaceae	Árvore-da- roda- do-fogo	Australiano	Perenifólio	1-12	9-10	Micro.	Árvore	Z9	C4(1)
<i>Stenotaphrum secundatum</i> (Walter) Kuntze	Gramineae	Relva; Relva-de-correr	Neotropical; Áfricotropical; Oceânia	Perenifólio	1-12	3-11	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z9	C1, C9 (tapete)
<i>Strelitzia nicolai</i> Reg. & Körn.	Strelitziaceae	Estrelícia -gigante	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C1(1)
<i>Strelitzia reginae</i> Banks ex Dryand	Strelitziaceae	Estrelícia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C1(19), C2(20), C3(10), C4(15), C7(7), C11(15)
<i>Streptosolen jamesonii</i> (Benth.) Miers.	Solanaceae	Rapaziada	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z9	C11(1)
<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassm.	Palmae	Coqueiro-de- jardim; Palmeira-rainha	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-7	Micro.	Árvore	Z10	C4(1)
<i>Tanacetum parthenium</i> (L.) Schultz-Bip.	Compositae	Artemija; Alfinetes- de-senhora	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Caméfito	Herbácea	Z6	C11(grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Tecomathe dendrophila</i> (Bl.) Schum.	Bignoniaceae	Tecomante	Oceânia	Perenifólio	1-12	4-7	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	C1(1)
<i>Teucrium betonicum</i> L' Hérit	Labiatae	Erva-branca; Abrotona	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-8	Nano.	Arbusto	Z10	C11(1)
<i>Thunbergia erecta</i> (Benth.) Anderson.	Acanthaceae	Tumbérgia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C2, C11(grupo)
<i>Tibouchina urvilleana</i> (DC.) Cogn.	Melastomataceae	Aranhas; Tibouchina	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C2(1)
<i>Tillandsia cyanea</i> Lindl. ex K. Koch.	Bromeliaceae	Tilândsia	Neotropical	Perenifólio	1-12	8-2	Hemi.	Herbácea	Z10	C11(1)
<i>Trachelospermum jasminoides</i> (Lindl.) Lem.	Apocynaceae	Jasmim-de-estrela	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-11	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z8	C2(2)
<i>Tradescantia fluminensis</i> Vell. Conc.	Commelinaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	4-6	Hemi.	Herbácea trepadora	Z9	C11(grupo)
<i>Tradescantia pallida</i> (Rose) D. Hunt.	Commelinaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea trepadora	Z8	C9(grupo)
<i>Viburnum tinus</i> L.	Caprifoliaceae	Viburno	Paleártico	Perenifólio	1-12	10-4; 7-8	Micro.	Arbusto	Z7	C11(2)
<i>Wedelia trilobata</i> (L.) Hitchc.	Compositae	Vedélia	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Herbácea	Z11	C9 (grupo)
<i>Wisteria sinensis</i> (Sims.) Sweet.	Leguminosae (Papilionoideae)	Glicínia; Lilases	Paleártico	Caducifólio	2-12	2-5; 7-8	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z5	C7A(1)
<i>Woodwardia radicans</i> (L.) Sm.	Blechnaceae	Feto-de-botão	Paleártico	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z8	C9(grupo)
<i>Yucca elephantipes</i> Reg.	Agavaceae	Iúca	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-10	Micro.	Arbusto	Z10	C3(1), C4(1)
<i>Yucca gloriosa</i> L.	Agavaceae	Iúca	Neártico	Perenifólio	1-12	6-11	Micro.	Arbusto	Z7	C4(4)

Legenda:

- Plantas que não floriram no período em estudo (Janeiro 2002 – Janeiro 2005): * plantas novas; ** plantas que nunca floriram por falta de aclimação;
- Plantas marcescentes (plantas semiperenifólias e semicaducifólias): 3-2 (**3-4**) – folhas todo o ano mas com renovação significativa em Março e Abril.

Anexo 17
CARACTERIZAÇÃO FITOGEGRÁFICA DA QUINTA VILA PASSOS

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Acalypha wilkesiana</i> Muell. Arg.	Euphorbiaceae	Acálifa	Oceânia	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C17(1), C22(1)
<i>Aeonium glutinosum</i> (Aiton.) Webb. & Berthel.	Crassulaceae	Farrobo; Ensaíão	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-8	Nano.	Herbácea suculenta	Z10	C7(grupo)
<i>Agapanthus praecox</i> Willd. ssp. <i>orientalis</i> (Leighton) Leighton	Liliaceae	Agapantos; Coroas-de-henrique	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	4-9	Hemi.	Herbácea	Z9	C13, C17 (grupo)
<i>Agathis robusta</i> (C. Moore ex. F. Muell.) Bail.	Araucariaceae	Pinheiro-de-damara Pinheiro- com-folha-de-alegra-campo	Australiano	Perenifólio	1-12	3-4	Meso.	Árvore	Z9	C2(1)
<i>Agave americana</i> L.	Agavaceae	Agave; Piteira	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-8	Hemi.	Herbácea suculenta	Z9	C8(4), C9(1)
<i>Agave angustifolia</i> Haw.	Agavaceae	Agave	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-8	Nano.	Árvore suculenta	Z9	C8(2), C9(1)
<i>Agave attenuata</i> Salm-Dyck	Agavaceae	Piteira; Agave-pescoço-de-cisne	Neotropical	Perenifólio	1-12	12-3	Nano.	Árvore suculenta	Z9	C22(13)
<i>Ageratum houstonianum</i> Mill.	Compositae		Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Terófito	Herbácea	Z8	C19(grupo)
<i>Aloe excelsa</i> A. Berger.	Liliaceae (Aloeaceae)	Aloés	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	12-2	Micro.	Árvore suculenta	Z9	C8(3)
<i>Aloe mitriformis</i> Mill.	Liliaceae (Aloeaceae)	Aloés	Africotropical	Perenifólio	1-12	6-8	Caméfito	Arbusto suculento	Z9	C4, C6 (grupo)
<i>Aloe plicatilis</i> (L.) Mill.	Liliaceae (Aloeaceae)	Aloés	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	2-4	Nano.	Árvore suculenta	Z9	C4(1), C9(1)
<i>Aloe saponaria</i> (Ait. f.) Haw.	Liliaceae (Aloeaceae)	Aloés-sabão	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-7	Hemi.	Herbácea suculenta	Z9	C8(grupo)
<i>Aloe vera</i> (L.) Burm.	Liliaceae	Aloés-vera; Babosas	Paleártico; Neotropical	Perenifólio	1-12	11-6	Hemi.	Herbácea suculenta	Z8	C4, C6, C8 (grupo)
<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> H. A. Wendl. & Drude.	Palmae	Palmeira-elegante	Australiano	Perenifólio	1-12	2-10	Meso.	Árvore	Z10	C13(1)
<i>Argyranthemum pinnatifidum</i> (L. f.) Lowe ssp. <i>pinnatifidum</i>	Compositae	Estrelas; Pampilhos; Malmequeres	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C8(1)
<i>Asparagus densiflorus</i> (Kunth) Jassop	Liliaceae (Asparagaceae)	Esparto	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	7-8	Nano.	Herbácea	Z9	C9(grupo)
<i>Asparagus setaceus</i> (Kunth) Jassop	Liliaceae (Asparagaceae)	Esparto-de-folha-miúda; Esparto	Africotropical	Perenifólio	1-12	9-12	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z9	C10, C19 (grupo)
<i>Aspidistra elatior</i> Bl.	Liliaceae (Convallariaceae)		Paleártico	Perenifólio	1-12	6-7	Hemi.	Herbácea	Z8	C9 (grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Begonia minor</i> Jacq.	Begoniaceae	Corações; Begónia- sempre- em-flor	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C20 (grupo)
<i>Bergenia crassifolia</i> (L.) Fritsch.	Saxifragaceae	Bergénia; Couve-de- jardim	Paleártico	Perenifólio	1-12	11-4	Caméfito	Herbácea	Z3	C9, C17, C19 (grupo)
<i>Bougainvillea glabra</i> Choisy	Nyctaginaceae	Buganvília	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	C19(2), C20(3)
<i>Brachychiton acerifolius</i> Cunn. ex. F. Muell.	Sterculiaceae	Árvore-do-fogo	Australiano	Caducifólio	1-5; 8-12	5-8	Micro.	Árvore	Z10	C3(1), C10(1)
<i>Callistemon viminalis</i> (Sol. ex Gaertn.) G. Don ex Loud.	Myrtaceae	Martinete-chorão	Australiano	Perenifólio	1-12	3-9	Micro.	Arbusto	Z9	C9(1)
<i>Callistephus chinensis</i> (L.) Nees.	Compositae	Não-me-deixes	Paleártico	Sazonal	3-12	4-12	Terófito	Herbácea	Z6	C19, C20 (grupo)
<i>Canna x generalis</i> L. H. Bail.	Cannaceae	Canas-da-índia; Bananeiras-de- flor	Hortícola	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z9	C10, C19, C20 (grupo)
<i>Cardiospermum grandiflorum</i> Sw.	Sapindaceae	Corriola-dos- balões	Afrotropical; Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z10	C5, C11 (grupo)
<i>Celtis australis</i> L.	Ulmaceae	Lódão-bastardo; Conteira	Paleártico	Caducifólio	4-1	5-6	Meso.	Árvore	Z8	C10(1), C15(1)
<i>Cephalocereus columna- trajani</i> (Karw. Ex Pfeiff.) Schum.	Cactaceae	Cacto	Neotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Nano.	Arbusto suculento	Z9	C4(grupo)
<i>Cercis siliquastrum</i> L.	Leguminosae (Papilionoideae)	Olaia; Árvore-de- judas	Paleártico	Caducifólio	4-11	12-5	Micro.	Árvore	Z7	C9(2)
<i>Cereus jamacaru</i> DC.	Cactaceae	Cacto	Neotropical	Perenifólio	1-12	7-8	Nano.	Árvore suculenta	Z9	C9(1)
<i>Cereus validus</i> Haw.	Cactaceae	Cacto-candelabro	Neotropical	Perenifólio	1-12	7-8	Nano.	Árvore suculenta	Z9	C4(2), C6(1)
<i>Chamaedorea costaricana</i> Oerst.	Palmae	Palmeira-de- salão; Palmeira-bambu	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-6	Micro.	Arbusto	Z10	C10(1)
<i>Chorisia speciosa</i> A. St. Hil.	Bombacaceae	Sumaúma	Neotropical	Caducifólio	3-11	8-11	Meso.	Árvore	Z10	C6(3), C7(3), C8(2)
<i>Cinnamomum camphora</i> (L.) Sieb.	Lauraceae	Canforeira	Paleártico; Indomalaio	Perenifólio	1-12	2-4	Meso.	Árvore	Z10	C17(1)
<i>Citrus sinensis</i> (L.) Osbeck	Rutaceae	Laranjeira	Paleártico	Perenifólio	1-12	2-4	Micro.	Árvore	Z9	C9(1)
<i>Clivia miniata</i> Regel	Amaryllidaceae	Clívia	Áfrotropical	Perenifólio	1-12	2-11	Hemi.	Herbácea	Z10	C9, C10, C17, C19 (grupo)
<i>Clivia nobilis</i> Lindl.	Amaryllidaceae	Clívia	Áfrotropical	Perenifólio	1-12	2-11	Hemi.	Herbácea	Z10	C9, C17 (grupo)
<i>Codiaeum variegatum</i> (L.) Bl. var. <i>pictum</i> (Lodd) Muell. Arg.	Euphorbiaceae	Crótone	Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z11	C7(2), C10(3), C18(2), C19(6)
<i>Cordyline stricta</i> (Sims) Endl.	Agavaceae	Cordilíne	Australiano	Perenifólio	1-12	1-10	Nano.	Arbusto	Z10	C9(4)
<i>Cordyline terminalis</i> (L.) Kunth.	Agavaceae	Árvore-dos-reis	Indomalaio; Australiano; Oceânia; Antártico	Perenifólio	1-12	11-5	Micro.	Arbusto	Z10	C9(1)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Cottoneaster pannosus</i> Franch.	Rosaceae	Pereirinho-de-jardim	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-5	Micro.	Arbusto	Z7	C10(1), C14 (sebe)
<i>Crassula ovata</i> (Mill.) Druce.	Crassulaceae	Ensaio-branco ; Planta-de-jade	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	11-3	Nano.	Arbusto suculento	Z10	C6(2)
<i>Ctenanthe lubbersiana</i> (E. Morr.) Eichl.	Marantaceae	Maranta-cinza; Tenante	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-8	Hemi.	Herbácea	Z10	C9, C20 (grupo)
<i>Cyathea cooperi</i> (F. Mueller) Domin.	Cyatheaceae	Feto-arbóreo	Australiano	Perenifólio	1-12	-----	Micro.	Árvore	Z10	C7(5), C10(1), C22(1)
<i>Dracaena draco</i> L. ssp. <i>draco</i>	Agavaceae	Dragoeiro	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-6	Micro.	Árvore	Z11	C1(1) , C2(1) , C4(1)
<i>Dracaena fragrans</i> (L.) Ker-Gawl.	Agavaceae	Dracena	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	11-1	Micro.	Arbusto	Z12	C5(1)
<i>Duranta erecta</i> L.	Verbenaceae	Duranta; Violeteira-da-brasil	Neotropical	Perenifólio	1-12	7-1	Micro.	Arbusto	Z10	C2(1), C10(2), C17(5)
<i>Echinopsis terscheckii</i> (Parmentier ex Pfeiff.) Friedrich & Rowley	Cactaceae	Cacto	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-6	Nano.	Arbusto suculento	Z9	C4(2)
<i>Eichhornia crassipes</i> (Mart.) Solms-Laub.	Pontederiaceae	Jacinto-de-água	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-10	Hidrófita	Herbácea	Z10	C14A(grupo)
<i>Emilia coccinea</i> (Sims) D. Don.	Compositae	Emilia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Herbácea	Z11	C19 (grupo)
<i>Epipremnum aureum</i> (Lind. & André)	Araceae		Oceânia	Perenifólio	1-12	6-8	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z10	C5(1)
<i>Erythrina crista-galli</i> L.	Leguminosae (Papilionoideae)	Coraleira; Coralina-crista-de-galo	Neotropical	Marcescente	4-3 (12-3)	4-1	Micro.	Árvore	Z8	C21(1), C22(1)
<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.	Myrtaceae	Eucalipto	Australiano	Perenifólio	1-12	11-4	Meso.	Árvore	Z8	C18(1)
<i>Eugenia uniflora</i> L.	Myrtaceae	Pitangueira	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Árvore	Z10	C19(2)
<i>Euphorbia cotinifolia</i> L.	Euphorbiaceae	Eufórbia	Neotropical	Caducifólio	3-12	6-11	Micro.	Árvore	Z11	C19(1), C21(2)
<i>Euphorbia grandicornis</i> Goebel.	Euphorbiaceae	Eufórbia-grande-cornuda	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	12-2	Nano.	Arbusto suculento	Z9	C4(grupo), C8(1)
<i>Euphorbia ingens</i> E. Mey.	Euphorbiaceae	Eufórbia-gigante	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	10-12	Micro.	Arbusto suculento	Z9	C4(6), C8(2)
<i>Euphorbia milli</i> Desmoul.	Euphorbiaceae	Mira-mira-não-me-toques	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C4(2), C8(1)
<i>Euphorbia nerifolia</i> L.	Euphorbiaceae	Eufórbia	Indomalaio; Oceânia	Perenifólio	1-12	3-7	Micro.	Arbusto suculento	Z10	C9(3)
<i>Euphorbia pulcherrima</i> Willd. ex Klotzsch.	Euphorbiaceae	Manhã-de-páscoa	Neotropical	Caducifólio	5-2	10-3	Micro.	Arbusto	Z10	C2(2), C17(2), C22(1)
<i>Euphorbia trigona</i> Mill.	Euphorbiaceae	Eufórbia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	6-8	Micro.	Arbusto suculento	Z10	C8(2)
<i>Gasteria pillansii</i> Kensit.	Liliaceae (Aloecaceae)	Gasteria	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	4-7	Hemi.	Herbácea suculenta	Z9	C9(5)
<i>Grevillea robusta</i> A. M. Cunn. ex. R. Br.	Proteaceae	Grevílea	Australiano	Perenifólio	1-12	4-7	Meso.	Árvore	Z8	C16(4)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Hedera helix</i> L.	Araliaceae	Hera	Paleártico	Perenifólio	1-12	9-10	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z5	C9(3)
<i>Hedychium coronarium</i> Koenig	Zingiberaceae	Conteira; Bananilha	Indomalaio	Perenifólio	1-12	8-10	Hemi.	Herbácea	Z10	C3(grupo)
<i>Heliconia bihai</i> (L.) L.	Heliconiaceae	Helicônia	Neotropical	Perenifólio	1-12	7-10	Hemi.	Herbácea	Z11	C10(1), C17(grupo), C19(grupo)
<i>Hemerocallis dumortieri</i> E. Morr.	Liliaceae (Hemerocallidaceae)	Hemerocalis; Lírio-dum-dia	Paleártico	Perenifólio	1-12	6-10	Geófita	Herbácea	Z5	C10(grupo)
<i>Hibiscus rosa-sinensis</i> L.	Malvaceae	Cardeais; Hibiscos; Rosa-da-china	Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C2(1), C9(sebe), C10(3), C11(sebe), C14(sebe)
<i>Howea forsteriana</i> (C. Moore & F. Muell.) Becc.	Palmae	Quência	Australiano	Perenifólio	1-12	1-9	Micro.	Árvore	Z10	C1(2)C18(2), C19(1), C20(9)
<i>Hydrangea macrophylla</i> (Thunb.) Ser. 'Hortensia'	Hydrangeaceae	Hortênsias; Novelos	Paleártico	Caducifólio	3-12	5-10	Nano.	Arbusto	Z6	C20(3)
<i>Jacaranda mimosifolia</i> D. Don.	Bignoniaceae	Jacarandá	Neotropical	Caducifólio	5-2	4-7; 9-10	Meso.	Árvore	Z9	C3(1), C9(1), C10(1), C19(1)
<i>Kalanchoe blossfeldiana</i> Poelln.	Crassulaceae	Calanchoé	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto suculento	Z11	C7(grupo)
<i>Kalanchoe daigremontiana</i> Hamet & Perrier	Crassulaceae	Calanchoé	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	12-5	Nano.	Arbusto suculento	Z11	C3(1), C4(1)
<i>Kalanchoe fedtschenkoi</i> Hamet & Perrier	Crassulaceae	Calanchoé	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-8	Caméfita	Arbusto suculento	Z11	C7(grupo)
<i>Kalanchoe pubescens</i> R. Br. ex Oliver.	Crassulaceae	Calanchoé	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	2-5	Caméfita	Herbácea suculenta	Z11	C7(grupo)
<i>Kniphofia x praecox</i> Bak.	Liliaceae (Aloeaceae)	Foguetes	Hortícola	Perenifólio	1-12	11-2	Hemi.	Herbácea	Z9	C9(1), C10(grupo)
<i>Lagerstroemia indica</i> L.	Lythraceae	Laguerestré-mia; Flor de Merenda; Suspiros	Paleártico; Indomalaio	Caducifólio	3-11	7-9	Micro.	Árvore	Z7	C10(2), C13(1), C17(1), C21(1)
<i>Leucanthemum x superbum</i> (J. Ingram) Bergmans ex Kent	Compositae	Estrelas	Hortícola	Perenifólio	1-12	5-8	Nano.	Herbácea	Z5	C14 (grupo)
<i>Ligustrum lucidum</i> Ait. f.	Oleaceae	Ligustro; Alfinheiro	Paleártico	Perenifólio	1-12	6-9	Micro.	Árvore	Z7	C16(23)
<i>Livistona chinensis</i> (Jacq.) R. Br. ex Mart.	Palmae	Palmeira-de- leque	Paleártico	Perenifólio	1-12	2-5	Meso.	Árvore	Z9	C13(3)
<i>Magnolia grandiflora</i> L.	Magnoliaceae	Magnólia	Neártico	Perenifólio	1-12	5-8	Micro.	Árvore	Z6	C2(1)
<i>Mangifera indica</i> L.	Anacardiaceae	Mangueiro	Indomalaio	Perenifólio	1-12	11-6	Micro.	Árvore	Z11	C20(1)
<i>Melaleuca leucadendra</i> (L.) L.	Myrtaceae	Melaleuca	Australiano; Oceânia; Indomalaio	Perenifólio	1-12	2-5	Meso.	Árvore	Z9	C6(1)
<i>Monstera deliciosa</i> Liebm.	Araceae	Fruto-delicioso; Costela-de-adão	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z10	C2(1), C3(2), C9, C15 (grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Musa velutina</i> Wendl. & Drude.	Musaceae	Bananeira-de-jardim	Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z9	C10(1)
<i>Nephrolepis cordifolia</i> (L.) Presl.	Oleandraceae	Feto	Neotropical; Áfricotropical; Indomalaio; Oceânia; Australiano	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z10	C10(grupo)
<i>Nerium oleander</i> L.	Apocynaceae	Sevadilha; Loendro	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-11	Micro.	Arbusto	Z9	C3(1), C2(8), C10(sebe), C20(1)
<i>Nolina recurvata</i> (Lem.) Hemsl.	Agavaceae	Nolina; Pata-de-elefante	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-8	Micro.	Árvore	Z9	C4(1), C9(1), C18(2)
<i>Nymphaea capensis</i> Thunb.	Nymphaeaceae	Nenúfar-azul-do-cabo	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	7-9	Helófito	Herbácea	Z9	C5(grupo)
<i>Opuntia monacantha</i> (Willd.) Haw. f. <i>variegata</i>	Cactaceae	Cacto	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-7	Nano.	Arbusto suculento	Z9	C6(1)
<i>Opuntia robusta</i> Wendl. & Pfeiff.	Cactaceae	Cacto; Tabaibeira	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-7	Nano.	Arbusto suculento	Z9	C9(1)
<i>Paspalum dilatatum</i> Poir.	Gramineae	Erva-rija; Erva-do-governo	Neotropical	Perenifólio	1-12	3-9	Hemi.	Herbácea	Z8	C9, C20, C21 (tapete)
<i>Passiflora edulis</i> Sims.	Passifloraceae	Maracujá-roxo	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-11	Fane.trep.	Arbusto trepador	Z10	C5(2)
<i>Pelargonium cucullatum</i> (L.) L' Hérít	Geraniaceae	Malva	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	4-9	Nano.	Arbusto	Z10	C6(1)
<i>Pelargonium peltatum</i> (L.) L'Hérít	Geraniaceae	Malva	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z10	C9(grupo)
<i>Pelargonium zonal</i> (L.) L'Hérít	Geraniaceae	Malva	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C9(grupo)
<i>Philodendron erubescens</i> K. Koch & Augustin	Araceae	Filodendro	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-6	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z11	C13, C15 (grupo)
<i>Philodendron pinnatifidum</i> Schott.	Araceae	Filodendro	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-6	Hemi.	Arbusto	Z11	E10(grupo), E12(6), E25(2), E30(1), E33(1)
<i>Phoenix canariensis</i> ex. Chabaud.	Palmae	Palmeira das Canárias	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-3	Meso.	Árvore	Z11	C2(1), C9(2)
<i>Phyllanthus tenellus</i> Roxb.	Euphorbiaceae	Quebra-pedra	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Herbácea	Z11	C6, C20 (grupo)
<i>Phyllostachis aurea</i> (Carr.) A. & C. Riv.	Gramineae	Bambu	Paleártico	Perenifólio	1-12	Não floriu**	Hemi.	Herbácea	Z6	C9(grupo)
<i>Plumeria rubra</i> L. var. <i>acutifolia</i> (Poir.) Woodson.	Apocynaceae	Planta-dos-dentes	Neotropical	Caducifólio	5-1	6-12	Micro.	Árvore	Z10	C2(1), C10(1)
<i>Psidium guajava</i> L.	Myrtaceae	Goiabeira	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-7	Micro.	Árvore	Z10	C11(1)
<i>Pteris vittata</i> L.	Pteridaceae	Feto	Paleártico; Indomalaio; Australiano; Oceânia	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z9	C6(grupo)
<i>Pyrostegia venusta</i> (Ker-Gawl.) Miers	Bignoniaceae	Gaitinhas	Neotropical	Perenifólio	1-12	11-5	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	C5(2), C12(grupo), C21(1)
<i>Rhododendron mucronatum</i> G. Don.	Ericaceae	Azálea-japonesa	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z5	C10(1), C20(3)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Rosmarinus officinalis</i> L.	Labiatae	Alecrim	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z6	C8(1), C16(1)
<i>Ruscus hypophyllum</i> L.	Liliaceae (Asparagaceae)	Ruscus	Paleártico	Perenifólio	1-12	11-12	Nano.	Herbácea	Z8	C19(grupo)
<i>Salix babylonica</i> L.	Salicaceae	Salgueiro-chorão	Paleártico	Marcescente	1-12 (12-3)	3-5	Micro.	Árvore	Z4	C21(1)
<i>Salvia splendens</i> Sell ex Roem. & Scult.	Labiatae	Camarões; Sálvias	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Herbácea	Z10	C18(grupo)
<i>Sedum pachyphyllum</i> Rose	Crassulaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	1-4	Caméfito	Arbusto suculento	Z8	C7(grupo)
<i>Sedum rubrotinctum</i> R. T. Clausen	Crassulaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	12-2	Caméfito	Arbusto suculento	Z9	C7(grupo)
<i>Senecio serpens</i> G. Rowley	Compositae	Bálsamo-camudo; Bálsamo-de- canudo	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Caméfito	Arbusto suculento	Z9	C6(grupo)
<i>Spathodea campanulata</i> Beauv.	Bignoniaceae	Chama-da- floresta; Tulipeiro- africano	Áfricotropical	Caducifólio	1-12 (Variação individual)	1-12	Micro.	Árvore	Z11	C19(1)
<i>Stenotaphrum secundatum</i> (Walter) Kuntze	Gramineae	Relva; Relva-de-correr	Neotropical; Áfricotropical; Oceânia	Perenifólio	1-12	3-11	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z9	C9, C20, C21 (tapete)
<i>Strelitzia reginae</i> Banks ex Dryand	Strelitziaceae	Estrelícia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C2, C3, C11, C12 (grupo)
<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassm.	Palmae	Coqueiro-de- jardim; Palmeira-rainha	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-7	Micro.	Árvore	Z10	C3(1)
<i>Syngonium erythrophyllum</i> Birdsey & G. S. Bunting.	Araceae	Singónio	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-7	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z10	C9(6)
<i>Tecoma stans</i> (L.) Juss. ex HBK.	Bignoniaceae	Estenolóbio	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C10(1)
<i>Tradescantia spathacea</i> Sw.	Commelinaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	10-2	Hemi.	Herbácea	Z9	C20(1)
<i>Washingtonia filifera</i> (Lind. ex André) H. A. Wendl	Palmae	Palmeira-de-leque- da- califórnia	Neártico	Perenifólio	1-12	5-8	Micro.	Árvore	Z9	C19(2)
<i>Washingtonia robusta</i> H. A. Wendl	Palmae	Palmeira-de-leque- mexicana	Neártico	Perenifólio	1-12	4-6	Micro.	Árvore	Z10	C19(1)
<i>Yucca gloriosa</i> L.	Agavaceae	luca	Neártico	Perenifólio	1-12	6-11	Micro.	Arbusto	Z7	C4(4), C6(1), C8(2)

Legenda:

- Plantas que não floriram no período em estudo (Janeiro 2002 – Janeiro 2005): * plantas novas; ** plantas que nunca floriram por falta de aclimação;
- Plantas marcescentes (plantas semiperenifólias e semcaducifólias): 3-2 (3-4) – folhas todo o ano mas com renovação significativa em Março e Abril.

Anexo 18
CARACTERIZAÇÃO FITOGEGRÁFICA DA QUINTA DO PALHEIRO FERREIRO

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Abelia x grandiflora</i> (André) Rehd.	Caprifoliaceae	Abélia	Hortícola	Perenifólio	1-12	5-9	Nano.	Arbusto	Z5	C6(9), C7(1), C40(3)
<i>Abutilon pictum</i> (Gillies ex Hook. & Arn.) Walp.	Malvaceae	Abutilão; Lanterna-chinesa	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z9	C31(1)
<i>Abutilon x hybridum</i> hort.	Malvaceae	Abutilão; Lanterna-chinesa	Hortícola	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z9	C3(1), C8(2), C31(1)
<i>Acacia baileyana</i> F. Muell.	Leguminosae (Mimosoideae)	Acácia-baileiana	Australiano	Perenifólio	1-12	1-2	Micro.	Árvore	Z8	C1(1)
<i>Acacia dealbata</i> Link.	Leguminosae (Mimosoideae)	Mimosa	Australiano	Perenifólio	1-12	12-3	Meso.	Árvore	Z8	C1(3), C38(2), C40(5)
<i>Acacia longifolia</i> (Andrews) Willd.	Leguminosae (Mimosoideae)	Acácia-das- espigas	Australiano	Perenifólio	1-12	2-6	Micro.	Árvore	Z8	C38(1), C40(1)
<i>Acacia meamsii</i> De Wildeman.	Leguminosae (Mimosoideae)	Mimosa	Australiano	Perenifólio	1-12	1-8	Micro.	Árvore	Z8	C1(4)
<i>Acacia melanoxylon</i> R. Br.	Leguminosae (Mimosoideae)	Acácia-austrália	Australiano	Perenifólio	1-12	1-4	Meso.	Árvore	Z8	C14(>20), C32(>50)
<i>Acacia pravissima</i> F. Muell.	Leguminosae (Mimosoideae)	Acácia	Australiano	Perenifólio	1-12	2-4	Micro.	Árvore	Z8	C23(1)
<i>Acanthus mollis</i> L.	Acanthaceae	Erva-gigante	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-7	Hemi.	Herbácea	Z6	C6, C21, C21B, C25, C30, C34, C35, C40 (grupo)
<i>Acca sellowiana</i> (O. Berg.) Burret	Myrtaceae	Goiabeira-ananás	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-7	Micro.	Árvore	Z8	C21A(1)
<i>Acer palmatum</i> Thunb.	Aceraceae	Ácer-do-japão	Paleártico	Caducifólio	4-11	4	Micro.	Árvore	Z5	C9(1), C16(1)
<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	Aceraceae	Ácer; Sicómoro	Paleártico	Caducifólio	4-11	4	Meso.	Árvore	Z5	C1(2), C33(1)
<i>Achillea millefolium</i> L.	Compositae	Aquileia	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-8	Caméfito	Herbácea	Z2	C11(grupo)
<i>Adiantum capillus-veneris</i> L.	Adiantaceae	Avenca	Paleártico, Neotropical, Áfricotropical, Indomalaio	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z8	C9, C33, C34 (grupo)
<i>Adiantum hispidulum</i> Swartz	Adiantaceae	Feto-pata-de- galinha	Paleártico, Áfricotropical, Indomalaio, Oceânia, Australiano, Antártico	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z10	C33, C34, C35, C36, C38 (grupo)
<i>Adiantum radianum</i> C. Presl.	Adiantaceae	Avenca	Neotropical	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z10	C7, C9 (grupo)
<i>Adiantum reniforme</i> L. ssp. <i>reniforme</i>	Adiantaceae	Feto-redondo; Feto-de-rim	Paleártico	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z10	C33, C34 (grupo)
<i>Aechmea fasciata</i> (Lindl.) Bak.	Bromeliaceae	Bromélia	Neotropical	Perenifólio	1-12	2-6	Hemi.	Herbácea	Z10	C13(grupo)
<i>Aechmea recurvata</i> (Klotzsch) L.B. Sm.	Bromeliaceae	Bromélia	Neotropical	Perenifólio	1-12	2-5	Hemi.	Herbácea	Z9	C15(1), C23(grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Aeonium arboreum</i> (L.) Webb. & Berth.	Crassulaceae	Ensaio; Saião	Paleártico	Perenifólio	1-12	11-4	Nano.	Herbácea suculenta	Z9	C6(1), C9(17), C23(25)
<i>Aeonium balsamiferum</i> Webb & Berth.	Crassulaceae	Ensaio	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-8	Nano.	Herbácea suculenta	Z10	C9(1)
<i>Aeonium glutinosum</i> (Ait.)	Crassulaceae	Ensaio; Farrobo; Saião	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-7	Nano.	Herbácea suculenta	Z10	C7, C9(grupo)
<i>Aesculus x carnea</i> Hayne	Hippocastanaceae	Castanheiro-da- índia; Castanheiro-dos- cavalos	Hortícola	Caducifólio	3-11	4-5	Micro.	Árvore	Z4	C23(1)
<i>Agapanthus campanulatus</i> F. M. Leighton	Liliaceae	Agapantos	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	5-8	Hemi.	Herbácea	Z9	C9, C22(grupo)
<i>Agapanthus praecox</i> Willd. ssp. <i>orientalis</i> (Leighton) Leighton	Liliaceae	Agapantos; Coroas-de- henrique	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	4-9	Hemi.	Herbácea	Z9	C5, C6, C17, C19A, C28A, C31, C32, C40 (mancha)
<i>Agave americana</i> L.	Agavaceae	Piteira	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-8	Hemi.	Herbácea suculenta	Z9	C9(3), C15(2), C31(1)
<i>Agave angustifolia</i> Haw.	Agavaceae	Agave	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-7	Nano.	Árvore suculenta	Z9	C15(1)
<i>Agave attenuata</i> Salm-Dyck	Agavaceae	Piteira; Agave-pescoço- de-cisne	Neotropical	Perenifólio	1-12	3-5	Nano.	Árvore suculenta	Z9	C9(7)
<i>Ageratina adenophora</i> (Spreng.) R. King & H. Robinson	Compositae	Abundância	Neotropical	Perenifólio	1-12	3-7	Nano.	Herbácea	Z10	C33, C34 (grupo)
<i>Ageratina ligustrina</i> (DC.) R. King & H. Robinson	Compositae		Neotropical	Perenifólio	1-12	7-1	Micro.	Arbusto	Z10	C11(1)
<i>Ageratina riparia</i> (Reg.) R. King. & H. Robinson	Compositae	Falsa-abundância	Neotropical	Perenifólio	1-12	2-6	Nano.	Herbácea	Z10	C23, C33, C34 (grupo)
<i>Ageratum houstonianum</i> Mill.	Compositae		Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Terófito	Herbácea	Z8	C8(grupo)
<i>Agonis flexuosa</i> (Willd.) Sweet.	Myrtaceae		Australiano	Perenifólio	1-12	4-6	Micro.	Árvore	Z9	C5(1), C15(1), C21A(1)
<i>Alberta magna</i> E. Meyer	Rubiaceae		Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C11(1), C22(1)
<i>Albuca humilis</i> Bak.	Liliaceae (Hyacinthaceae)		Áfricotropical	Perenifólio	1-12	3-5	Geófito	Herbácea	Z10	C8(2), C11(2), C21(2), C23(3)
<i>Alcea rosea</i> L.	Malvaceae	Malvas	Paleártico	Sazonal	3-10	5-9	Terófito	Herbácea	Z4	C8, C23 (grupo)
<i>Allium triquetrum</i> L.	Liliaceae (Alliaceae)	Alinho; Alho-bravo	Paleártico	Sazonal	12-4	12-4	Geófito	Herbácea	Z8	C1, C9, C23, C33, C34, C40(grupo)
<i>Aloe arborescens</i> Mill.	Liliaceae (Aloeaceae)	Babosas	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	11-1	Nano.	Arbusto suculento	Z9	C9, C15 (grupo)
<i>Aloe aristata</i> Haw.	Liliaceae (Aloeaceae)	Aloés	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	11-1; 7-8	Hemi.	Herbácea suculenta	Z9	C7, C9, C23 (grupo)
<i>Aloe ciliaris</i> Haw.	Liliaceae (Aloeaceae)	Aloés	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	10-6	Fane. trep.	Arbusto trepador e suculento	Z9	C8, C9, C13, C23 (grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Aloe mitriformis</i> Mill.	Liliaceae (Aloaceae)	Aloés	Africotropical	Perenifólio	1-12	6-8	Caméfito	Arbusto suculento	Z9	C9(grupo)
<i>Aloe pratenis</i> Bak.	Liliaceae (Aloaceae)	Aloés	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	12-2	Caméfito	Arbusto suculento	Z9	C9(5)
<i>Aloe rupestris</i> Bak.	Liliaceae (Aloaceae)	Aloés	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	3-4	Micro.	Árvore suculenta	Z10	C9(1)
<i>Alonsoa warsewiczii</i> Reg.	Scrophulariaceae	Alonsoa	Neotropical	Perenifólio	1-12	3-8	Nano.	Arbusto	Z9	C9, C11, C23(grupo)
<i>Alpinia zerumbet</i> (Pers.) B. L. Burt & Rosemary M. Sm.	Zingiberaceae	Alpinia; Lírio-de-porcelana	Indomalaio	Perenifólio	1-12	4-8	Hemi.	Herbácea	Z10	C11(grupo)
<i>Alstroemeria psittacina</i> Lehm.	Liliaceae (Alstroemeriaceae)	Alstroemeria	Neotropical	Sazonal	4-10	5-9	Geófita	Herbácea	Z8	C8 (grupo)
<i>Amaryllis belladonna</i> L.	Amaryllidaceae	Açucenas-da-serra; Belas-donas	Áfricotropical	Sazonal	5-7	8-11	Geófita	Herbácea	Z8	C1,C33, C38, C39 (grupo)
<i>Ananas nanus</i> (L.B. Sm.) L.B. Sm.	Bromeliaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	5-7	Hemi.	Herbácea	Z11	C4(grupo), C23(1)
<i>Anemone hupehensis</i> Lem.	Ranunculaceae	Anémona	Paleártico	Perenifólio	1-12	8-12	Hemi.	Herbácea	Z6	C7, C34(grupo)
<i>Anigozanthos flavidus</i> DC.	Haemodoraceae	Pata-de-canguru	Australiano	Perenifólio	1-12	3-7	Nano.	Herbácea	Z9	C7(grupo), C9 (4), C22(grupo)
<i>Annona cherimola</i> Mill.	Annonaceae	Anoneira	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-7	Micro.	Árvore	Z10	C21(1)
<i>Antirrhinum majus</i> L.	Scrophulariaceae	Bocas-de-peixe	Hortícola	Sazonal	3-10	3-10	Terófita	Herbácea	Z7	C7, C23(grupo)
<i>Aponogeton distachyos</i> L. f.	Aponogetonaceae		Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hidrófita	Herbácea	Z9	C5, C23 (grupo)
<i>Aquilegia alpina</i> L.	Ranunculaceae	Aquilégia	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-8	Hemi.	Herbácea	Z5	C7(8), C9(4)
<i>Araucaria angustifolia</i> (Bertol.) Kuntze.	Araucariaceae	Araucária-do-brasil; Pinheiro-do-brasil	Neotropical	Perenifólio	1-12	2-3	Meso.	Árvore	Z9	C24(1)
<i>Araucaria bidwillii</i> Hook. f.	Araucariaceae	Araucária-de-bidwill	Australiano	Perenifólio	1-12	2-3	Meso.	Árvore	Z9	C19(1)
<i>Araucaria columnaris</i> (Forst. f.) Hook.	Araucariaceae	Pinheiro-da-nova-caledónia; Araucária	Oceânia	Perenifólio	1-12	5-7	Macro.	Árvore	Z10	C38(1)
<i>Araucaria heterophylla</i> (Salisb.) Franco	Araucariaceae	Araucária; Pinheira	Oceânia	Perenifólio	1-12	2-3	Macro.	Árvore	Z9	C3(1), C17(1), C19(1), C38(2)
<i>Araujia sericifera</i> Brot.	Asclepiadaceae	Planta-da-seda	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-9	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z9	C38(2)
<i>Arbutus unedo</i> L.	Ericaceae	Medronheiro	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Árvore	Z7	C5(1)
<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> H. A. Wendl. & Drude.	Palmae	Palmeira-elegante	Australiano	Perenifólio	1-12	4-10	Meso.	Árvore	Z10	C6(3)
<i>Arctotis x hybrida</i> hort.	Compositae	Arctótis; Margarida-africana	Hortícola	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z9	C9,C22, C23 (grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Argyranthemum frutescens</i> (L.) Schultz-Bip.	Compositae	Estrelas; Estreleiras; Pampilhos; Malmequeres	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C7(1), C23(grupo)
<i>Arisarum vulgare</i> Targ.-Tozz.	Araceae		Paleártico	Sazonal	10-3	11-2	Geófita	Herbácea	Z9	C21, C22, C25, 34 (grupo)
<i>Aristea ecklonii</i> Bak.	Iridaceae	Aristeia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	5-7	Geófita	Herbácea	Z10	C9(grupo)
<i>Aristea major</i> Andrews	Iridaceae	Aristeia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	5-7	Geófita	Herbácea	Z10	C9, C11(grupo)
<i>Aristea platycaulis</i> Bak.	Iridaceae	Aristeia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	5-7	Geófita	Herbácea	Z10	C9(grupo)
<i>Aristea woodii</i> N. E. Br.	Iridaceae	Aristeia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	5-7	Geófita	Herbácea	Z10	C9(grupo)
<i>Aristolochia gigantea</i> Mart. & Zucc.	Aristolochiaceae	Cachimbo- holandês	Neotropical	Perenifólio	1-12	7-11	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z11	C22(1)
<i>Aristolochia grandiflora</i> Sw.	Aristolochiaceae	Flor-pelicano	Neotropical	Perenifólio	1-12	7-8	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z11	C9(2)
<i>Artemisia argentea</i> L'Hérit.	Compositae	Losna	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-7	Nano.	Arbusto	Z11	C23(1)
<i>Arthropodium cirrhatum</i> (Forst. f.) R. Br.	Liliaceae		Antártico	Perenifólio	1-12	5-6	Geófita	Herbácea	Z8	C7(4), C10(grupo), C23(12)
<i>Arundo donax</i> L.	Gramineae	Cana-vieira; Cana-da-roca	Paleártico	Perenifólio	1-12	7-10	Hemi.	Herbácea	Z9	C5, C20 (grupo)
<i>Arundo donax</i> L. var. <i>versicolor</i> (Mill.) Stokes	Gramineae	Cana-vieira; Cana-de-roca	Paleártico	Perenifólio	1-12	7-10	Hemi.	Herbácea	Z9	C15 (grupo)
<i>Asclepias curassavica</i> L.	Asclepiadaceae	Planta-da-seda	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z9	C7(1)
<i>Asparagus asparagoides</i> (L.) Druce	Liliaceae (Asparagaceae)	Alegre-campo- miúdo	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	3-4	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z10	C24 (grupo)
<i>Asparagus densiflorus</i> (Kunth) Jassop	Liliaceae (Asparagaceae)	Esparto	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	7-8	Nano.	Herbácea	Z9	C6, C7, C9, C23(grupo)
<i>Asparagus scoparius</i> Lowe	Liliaceae (Asparagaceae)	Esparto	Paleártico	Perenifólio	1-12	12-2	Nano.	Arbusto	Z11	C23(1)
<i>Asparagus setaceus</i> (Kunth) Jassop	Liliaceae (Asparagaceae)	Esparto-de-folha- miúda; Esparto	Africotropical	Perenifólio	1-12	9-12	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z9	C7(grupo)
<i>Asphodelus albus</i> Mill.	Liliaceae (Asphodelaceae)		Paleártico	Perenifólio	1-12	11-4	Geófita	Herbácea	Z6	C15(grupo)
<i>Astelia grandis</i> Hook. f. ex Kirk	Liliaceae (Asteliaceae)		Antártico	Perenifólio	1-12	1-2	Hemi.	Herbácea	Z9	C11(1), C13(1)
<i>Aucuba japonica</i> Thunb.	Comaceae (Aucubaceae)	Aucuba	Paleártico; Indomalaio	Perenifólio	1-12	2-4	Micro.	Arbusto	Z7	C23(1), C24(grupo)
<i>Aurinia saxatilis</i> (L.) Desv.	Cruciferae		Paleártico	Perenifólio	1-12	3-8	Caméfito	Herbácea	Z4	C3, C4, C8, C23(grupo)
<i>Azorina vidalii</i> (H. Wats.) Feer.	Campanulaceae	Vidália	Paleártico	Perenifólio	1-12	7-9	Nano.	Arbusto	Z9	C8(1), C22(2), C23(3)
<i>Babiana plicata</i> Ker-Gawl.	Iridaceae	Babiana	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	2-5	Geófita	Herbácea	Z9	C6(grupo), C8(6), C9(4)
<i>Babiana rubrocyanea</i> (Jacq.) Ker-Gawl.	Iridaceae	Babiana	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-5	Geófita	Herbácea	Z9	C9, C23 (grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Babiana stricta</i> (Ait.) Ker-Gaul.	Iridaceae	Babiana	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	2-5	Geófita	Herbácea	Z9	C6, C11(grupo)
<i>Bambusa multiplex</i> (Lour.) Rausch.	Gramineae	Bambu	Indomalaio	Perenifólio	1-12	Não floriu**	Hemi.	Herbácea	Z9	C34(grupo)
<i>Banksia ericifolia</i> L. f.	Proteaceae	Banksia-co-folhas-de-urze	Australiano	Perenifólio	1-12	10-1	Micro.	Arbusto	Z9	C17(2)
<i>Banksia grandis</i> Willd.	Proteaceae	Banksia-touro	Australiano	Perenifólio	1-12	5-6	Micro.	Árvore	Z9	C21A(1)
<i>Banksia integrifolia</i> L. f.	Proteaceae	Banksia-da-costa	Australiano	Perenifólio	1-12	10-4	Micro.	Árvore	Z9	C14(1)
<i>Banksia serrata</i> L. Saw.	Proteaceae	Banksia-serrote	Australiano	Perenifólio	1-12	5-8	Micro.	Árvore	Z9	C13(1)
<i>Bartlettina sordida</i> (Less.) R. King & H. Robinson	Compositae		Neotropical	Perenifólio	1-12	3-5	Nano.	Arbusto	Z10	C7(2), C9(1), C11(1), C13(2), C23 (1)
<i>Bauhinia variegata</i> L.	Leguminosae (Caesalpinioideae)	Bauínia	Indomalaio	Marcescente	5-4 (12-4)	10-6	Micro.	Árvore	Z9	C3(1), C21A(1)
<i>Begonia x ricinifolia</i> A. Dietr.	Begoniaceae	Corações; Begónia	Hortícola	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C23(grupo)
<i>Berberis heterophylla</i> Juss.	Berberidaceae	Ameixeira-de-espinhos	Neotropical	Caducifólio	4-12	8-9	Nano.	Arbusto	Z8	C7(1)
<i>Berberis thunbergii</i> DC	Berberidaceae	Ameixeira-de-espinhos	Paleártico	Caducifólio	4-12	4-5	Micro.	Arbusto	Z4	C23(1), C11(1), C13(1)
<i>Bergenia crassifolia</i> (L.) Fritsch.	Saxifragaceae	Bergénia; Couve-de-jardim	Paleártico	Perenifólio	1-12	11-4	Caméfito	Herbácea	Z3	C8, C11, C12, C14, C23 (grupo)
<i>Bletilla striata</i> (Thunb.) Rchb. f.	Orchidaceae		Paleártico	Sazonal	12-7	1-6	Geófita	Herbácea	Z7	C7, C9(grupo)
<i>Bomarea carderi</i> Masters	Liliaceae (Alstroemeriaceae)		Neotropical	Perenifólio	1-12	3-8	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z9	C21(1)
<i>Bougainvillea glabra</i> Choisy	Nyctaginaceae	Buganvília	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	C28A(1), C31(1), C32(1)
<i>Brachychiton acerifolius</i> Cunn. ex. F. Muell.	Sterculiaceae	Árvore-do-fogo	Australiano	Marcescente	1-5; 8-12	5-8	Micro.	Árvore	Z10	C21(1), C23(1), C32(1)
<i>Brachychiton populneus</i> R. Br.	Sterculiaceae	Esterculia	Australiano	Perenifólio	1-12	5-6	Meso.	Árvore	Z10	C38 (1)
<i>Brahea dulcis</i> (Kunth) Mart.	Palmae	Palmeira-das-rochas	Neotropical	Perenifólio	1-12	7-9	Micro.	Árvore	Z10	C24(1)
<i>Bromelia balansae</i> Mez	Bromeliaceae	Bromélia	Neotropical	Perenifólio	1-12	3-6	Hemi.	Herbácea	Z9	C23(grupo)
<i>Brugmansia arborea</i> (L.) Lagerh.	Solanaceae	Trombeteira	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C23(1)
<i>Brugmansia aurea</i> Lagerh.	Solanaceae	Trombeteira	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C13(1), C23(1)
<i>Brugmansia sanguinea</i> (Ruiz & Pav.) D. Don.	Solanaceae	Trombeteira	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C11(1), C21(1), C22(2), C23(1)
<i>Brugmansia versicolor</i> Lagerh.	Solanaceae	Trombeteira	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C23(3), C24(2), C34(2)
<i>Brugmansia x candida</i> Pers.	Solanaceae	Trombeteira; Belas-noites	Hortícola	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C7(2), C8(1), C23(2), C24(6), C34(1)
<i>Brugmansia x insignis</i> (Barb. Rodr.) Lockw.	Solanaceae	Trombeteira	Hortícola	Perenifólio	1-12	5-8	Micro.	Arbusto	Z10	C28A(1), C31(1)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Brunfelsia pauciflora</i> (Cham. & Scdl.) Benth.	Solanaceae	Brunfêlsia; Manacá	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-10	Micro.	Arbusto	Z10	C8(1), C23(4)
<i>Buddleja davidii</i> Franch.	Loganiaceae	Budleia	Paleártico	Perenifólio	1-12	6-9	Micro.	Arbusto	Z5	C23 (1)
<i>Bulbine frutescens</i> (L.) Willd.	Liliaceae (Asphodelaceae)	Bulbine	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Geófito	Herbácea suculenta	Z9	C7, C9 (grupo)
<i>Bulbine latifolia</i> (L.f.) Haw	Liliaceae (Asphodelaceae)	Bulbine	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-8	Geófito	Herbácea suculenta	Z9	C9(grupo)
<i>Bulbinella hookeri</i> (Hook. f.) Cheesem.	Liliaceae (Asphodelaceae)	Bulbinela	Antártico	Perenifólio	1-12	1-12	Geófito	Herbácea suculenta	Z8	C7, C8, C10 (grupo)
<i>Burchelia bubalina</i> (L.f.) Sims.	Rubiaceae		Áfricotropical	Perenifólio	1-12	11-5	Micro.	Arbusto	Z9	C21A(1)
<i>Buxus microphylla</i> Sieb. & Zucc.	Buxaceae	Buxo	Paleártico; Indomalaio	Perenifólio	1-12	3-4	Nano.	Arbusto	Z6	C9, C14, C21, C22, C23 , C31 (grupo)
<i>Buxus sempervirens</i> L.	Buxaceae	Buxo	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-4	Nano.	Arbusto	Z5	C5, C17 (sebe)
<i>Buxus sempervirens</i> L. var. <i>arborescens</i>	Buxaceae	Buxo	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-4	Micro.	Arbusto	Z5	C25(10), C35(grupo)
<i>Calceolaria tomentosa</i> Ruiz & Pav.	Scrophulariaceae	Calceolária	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-8	Nano.	Herbácea	Z9	C7, C21, C23 (grupo)
<i>Calendula officinalis</i> L.	Compositae	Calendula	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Terófito	Herbácea	Z6	C7, C8, C9, C23(grupo)
<i>Calliandra tweedii</i> Benth.	Leguminosae (Mimosoideae)	Caliandra	Neotropical	Perenifólio	1-12	12-3	Micro.	Arbusto	Z10	C23(1)
<i>Callicoma serratifolia</i> Andrews	Cunoniaceae		Australiano	Perenifólio	1-12	3-5	Micro.	Árvore	Z9	C8(1)
<i>Callistemon citrinus</i> (Curtis) Skeels.	Myrtaceae	Martinete	Australiano	Perenifólio	1-12	9-6	Micro.	Arbusto	Z8	C5(1), C21A(1)
<i>Callistemon rigidus</i> R. Br.	Myrtaceae	Martinete	Australiano	Perenifólio	1-12	5-8	Micro.	Arbusto	Z9	C5(3),10(1), C11(1), C15(1), C21(2), C22(1)
<i>Callistemon viminalis</i> (Sol. ex Gaertn.) G. Don ex Loud.	Myrtaceae	Martinete-chorão	Australiano	Perenifólio	1-12	4-7	Micro.	Arbusto	Z9	C5(1)
<i>Callistephus chinensis</i> (L.) Nees.	Compositae	Não-me-deixes	Paleártico	Sazonal	3-12	4-12	Terófito	Herbácea	Z6	C22(grupo)
<i>Caltha palustris</i> L.	Ranunculaceae		Paleártico	Perenifólio	1-12	4-5	Helófito	Herbácea	Z3	C9 (3)
<i>Calycanthus floridus</i> L.	Calycanthaceae	Carocha (Carolina- allspice)	Neártico	Caducifólio	4-11	4-7	Micro.	Arbusto	Z6	C22(1), C23(1)
<i>Calycanthus occidentalis</i> Hook. & Arn.	Calycanthaceae	Carocha (Californian- allspice)	Neártico	Caducifólio	4-11	4-8	Micro.	Arbusto	Z7	C23(1)
<i>Camellia granthamiana</i> Sealy.	Theaceae	Camélia-de-hong-kong	Indomalaio	Perenifólio	1-12	10-1	Micro.	Árvore	Z9	C14(2), C21(1), C31(2)
<i>Camellia japonica</i> L.	Theaceae	Camélia; Japoneira	Paleártico	Perenifólio	1-12	11-6	Micro.	Árvore	Z8	C1(94), C5(7), C6 (9), 10(1), C13(18), C14(9), C16 (15), C18(48), C19(13), C19B(37), C21(1), C21C(18), C22(17), C23 (59), C25(27), C5A(16), C6(10), C28(2),

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
										C28A(57), C30(47), C31(32), C33(34), C34 (90), C35 (25), C36(33), C37(163), C38 (248), C39(2), C40(42),
<i>Camellia reticulata</i> Lindl.	Theaceae	Camélia	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-5	Micro.	Árvore	Z8	C8(1), C12(1), C14(5), C18(1), C21C(1)
<i>Camellia saluenensis</i> Stapf ex Bean.	Theaceae	Camélia	Paleártico	Perenifólio	1-12	11-5	Micro.	Árvore	Z8	C14(1)
<i>Camellia sasanqua</i> Thunb.	Theaceae	Camélia	Paleártico	Perenifólio	1-12	11-2	Micro.	Árvore	Z9	C8(1), C12(4), C14(2), C18(4), C19(1), C21(2), C23(1), C25A(1), C34(3)
<i>Canarina canariensis</i> (L.) Kuntze.	Campanulaceae	Canarina	Paleártico	Sazonal	11-6	12-5	Geófita	Herbácea trepadora	Z10	C22 (grupo), 23(2)
<i>Canna indica</i> L.	Cannaceae	Canas-da-índia; Bananeira-de-flor	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Geófita	Herbácea	Z9	C34 (grupo)
<i>Cantua buxifolia</i> Juss. ex Lam.	Polemoniaceae	Flor-sagrada-dos- incas	Neotropical	Perenifólio	1-12	3-6	Micro.	Arbusto	Z9	C11(1), C31(1)
<i>Castanea sativa</i> Mill.	Fagaceae	Castanheiro	Paleártico	Caducifólio	4-12	6-7	Meso.	Árvore	Z5	C33(1), C34(1)
<i>Catalpa bignonioides</i> Walter	Bignoniaceae	Catalpa	Neártico	Caducifólio	5-12	6-7	Micro.	Árvore	Z5	C23(1)
<i>Ceanothus arboreus</i> Greene.	Rhamnaceae	Lilás-da-califórnia	Neártico	Perenifólio	1-12	12-7	Micro.	Arbusto	Z8	C8(1), C23(1), C28A(1), C31(1)
<i>Ceanothus impressus</i> Trel x <i>C. papillosus</i> Torr. & A. Gray.	Rhamnaceae	Lilás-da-califórnia	Neártico	Perenifólio	1-12	12-5	Nano.	Arbusto	Z8	C23(1)
<i>Cedrus deodara</i> (D. Don) G. Don.	Pinaceae	Cedro-deodara; Cedro-dos- himalaias	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-5	Meso.	Árvore	Z7	C19(1)
<i>Cedrus libani</i> A. Rich. ssp. <i>atlantica</i> (Endl.) Battand. & Trabut	Pinaceae	Cedro-do-atlas	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-5	Meso.	Árvore	Z9	C10(1), C21(1), C28A(2)
<i>Celtis australis</i> L.	Ulmaceae	Lódão-bastardo; Conteira; Sementeira	Paleártico	Caducifólio	4-1	5-6	Meso.	Árvore	Z8	C24(1), C25(1), C34(1)
<i>Centranthus ruber</i> (L.) DC.	Valerianaceae	Rosa-da-rocha; Alfinetes	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Caméfito	Herbácea	Z5	C7 (grupo)
<i>Cercis siliquastrum</i> L.	Leguminosae (Papilionoideae)	Olaia; Árvore-de- judas	Paleártico	Caducifólio	4-12	2-5	Micro.	Árvore	Z7	C8(1), C10(2), C22(1), C38 (1)
<i>Cestrum aurantiacum</i> Lindl.	Solanaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z11	C21(1), C22(1)
<i>Cestrum elegans</i> (Brongn.) Schldl.	Solanaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C11(1)
<i>Cestrum fasciculatum</i> (Schldl.) Miers.	Solanaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C23(2)
<i>Cestrum nocturnum</i> L.	Solanaceae	Galã-da-noite	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-12	Micro.	Arbusto	Z11	C2(1), C9(1), C23(1), C31(1)
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> (Murray) Parl.	Cupressaceae	Cedro-de-oregão	Neártico	Perenifólio	1-12	1-2	Micro.	Árvore	Z6	C31(15), C32(7), C38(1)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Chamaecyparis obtusa</i> (Sieb. & Zucc.) Endl.	Cupressaceae		Paleártico	Perenifólio	1-12	1-2	Micro.	Árvore	Z6	C26(1)
<i>Chamaecyparis thyoides</i> (L.) BSP.	Cupressaceae		Neártico	Perenifólio	1-12	Não floriu**	Micro.	Árvore	Z5	C30(1)
<i>Chamaerops humilis</i> L.	Palmae	Palmeira-das-vassouras	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-5	Micro.	Arbusto	Z9	C5(1), C31(1)
<i>Chasmanthe aethiopica</i> (L.) N. E. Br.	Iridaceae	Antoliza	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	11-3	Geófita	Herbácea	Z9	C1, C2A, C4, C5, C17, C20, C33, C34, C38, C40 (grupo)
<i>Chelidonium majus</i> L.	Papaveraceae	Celidónia; Cedronha	Paleártico	Perenifólio	1-12	2-8	Hemi.	Herbácea	Z6	C33 (grupo)
<i>Chlorophytum comosum</i> (Thumb.) Jacques	Liliaceae (Anthericaceae)	Fitinhas	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z9	C10, C11, C23 (grupo)
<i>Christella dentata</i> (Forssk.) Brownsey & Jermy	Dicksoniaceae	Feto	Áfricotropical; Indomalaio;	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z10	C9,C10, C33 (grupo)
<i>Chrysanthemum segetum</i> L.	Compositae	Crisântemo-amarelo	Paleártico	Sazonal	3-7	4-6	Terófita	Herbácea	Z7	C9 (grupo)
<i>Cinnamomum camphora</i> (L.) Sieb.	Lauraceae	Canforeira	Paleártico; Indomalaio	Perenifólio	1-12	2-4	Meso.	Árvore	Z10	C8(1)
<i>Cistus monspeliensis</i> L.	Cistaceae	Esteva	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-8	Nano.	Arbusto	Z8	C9(4)
<i>Citrus bergamia</i> Risso & Poit.	Rutaceae	Bergamota	Paleártico	Perenifólio	1-12	2-5	Micro.	Árvore	Z9	C23(1)
<i>Citrus limon</i> (L.) Burm.	Rutaceae	Limoeiro	Paleártico	Perenifólio	1-12	2-4	Micro.	Árvore	Z9	C24(5)
<i>Citrus x paradisi</i> Macfad.	Rutaceae	Toranja	Hortícola	Perenifólio	1-12	2-4	Micro.	Árvore	Z9	C13(1)
<i>Clematis grandiflora</i> DC.	Ranunculaceae	Clematite	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	2-5	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	C8(1)
<i>Clerodendrum ugandense</i> Prain.	Verbenaceae	Planta-das-borboletas	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	7-9	Micro.	Arbusto	Z10	C10(1), C11(1), C21(1), C23(1)
<i>Clethra arborea</i> Ait.	Clethraceae	Folhado	Paleártico	Perenifólio	1-12	7-8	Micro.	Árvore	Z10	C2(2), C18(1), C28 A(1), C32(1), C38(10)
<i>Clianthus puniceus</i> (G. Don) Sol. ex Lindl.	Leguminosae (Papilionoideae)	Cliantos-branco	Antártico	Perenifólio	1-12	12-6	Micro.	Arbusto	Z8	C23(2)
<i>Clivia miniata</i> Regel	Amaryllidaceae	Clívia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	2-6	Hemi.	Herbácea	Z10	C23, C34 (grupo)
<i>Clivia nobilis</i> Lindl.	Amaryllidaceae	Clívia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	2-6	Hemi.	Herbácea	Z10	C23, C34 (grupo)
<i>Colletia hystrix</i> Clos.	Rhamnaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	3-8	Nano.	Arbusto	Z8	C14(1)
<i>Commelina benghalensis</i> L.	Commelinaceae	Erva-menina; Flor-dum-dia	Indomalaio; Áfricotropical	Perenifólio	1-12	3-9	Hemi.	Herbácea trepadora	Z9	C7(grupo)
<i>Convolvulus canariensis</i> L.	Convolvulaceae	Covóvulos-de-canárias	Paleártico	Perenifólio	1-12	2-6	Geófita	Herbácea trepadora	Z10	C6 (grupo)
<i>Convolvulus cneorum</i> L.	Convolvulaceae		Paleártico	Perenifólio	1-12	3-8	Nano.	Arbusto	Z8	C8, C9, C23 (grupo)
<i>Coprosma repens</i> A. Rich.	Rubiaceae		Antártico; Australiano	Perenifólio	1-12	4-5	Micro.	Arbusto	Z9	C3(1), C7(2), C9(3), C10(1), C11(1)
<i>Cordyline australis</i> (Forst.) Endl.	Agavaceae	Cordilina	Antártico	Perenifólio	1-12	4-6	Micro.	Árvore	Z9	C14(2), C19A(1), C19B(1), C28A(1), C30(1), C34(6)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Cordyline indivisa</i> (Forst.) Steud.	Agavaceae	Cordilina	Antártico	Perenifólio	1-12	3-6	Micro.	Árvore	Z9	C6(1), C9(1), C10(3), C11(2)
<i>Cordyline stricta</i> (Sims) Endl.	Agavaceae	Cordiline	Australiano	Perenifólio	1-12	1-6	Nano.	Arbusto	Z10	C34 (grupo)
<i>Comus capitata</i> Wallich.	Comaceae		Paleártico	Perenifólio	1-12	7-8	Micro.	Árvore	Z8	C10(1), C11(1), C13(2)
<i>Comus florida</i> L.	Comaceae		Neártico	Perenifólio	1-12	7-8	Micro.	Árvore	Z5	C32(1)
<i>Coronilla valentina</i> L. ssp. <i>glauca</i> (L.) Battand.	Leguminosae (Papilionoideae)	Pascoinhas	Paleártico	Perenifólio	1-12	12-6	Nano.	Arbusto	Z9	C2A(grupo), C6(6)
<i>Cortaderia selloana</i> (Schult. & Schult. f.) Asch. & Gräbn.	Gramineae	Plumas; Erva-das-pampas; Penacho-branco	Neotropical	Perenifólio	1-12	7-10	Hemi.	Herbácea	Z6	C39(grupo)
<i>Corylus maxima</i> Mill.	Betulaceae (Corylaceae)		Paleártico	Perenifólio	1-12	7-8	Micro.	Arbusto	Z5	C14(grupo)
<i>Cotoneaster dammeri</i> Schneid.	Rosaceae		Paleártico	Perenifólio	1-12	3-5	Nano.	Arbusto	Z5	C10(3), C14(1)
<i>Cotoneaster horizontalis</i> Decne.	Rosaceae		Paleártico	Perenifólio	1-12	4-5	Nano.	Arbusto	Z5	C3(1), C9(2)
<i>Cotoneaster pannosus</i> Franch.	Rosaceae		Paleártico	Perenifólio	1-12	4-5	Micro.	Arbusto	Z7	C6(3), C8(1), C9(1)
<i>Crassula coccinea</i> L.	Crassulaceae	Crássula-vermelha	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	7-8	Nano.	Arbusto suculento	Z10	C9(grupo)
<i>Crassula multicava</i> Lem.	Crassulaceae	Crássula	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea suculenta	Z10	C9(grupo)
<i>Crataegus laevigata</i> (Poir.) DC	Rosaceae	Pilriteiro	Paleártico	Caducifólio	5-12	5-6	Micro.	Árvore	Z5	C9(1)
<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	Rosaceae	Pilriteiro	Paleártico	Caducifólio	3-11	4-5	Micro.	Árvore	Z5	C11(1)
<i>Crinum asiaticum</i> L.	Amaryllidaceae	Crino	Indomalaio	Perenifólio	1-12	5-8	Geófito	Herbácea	Z10	C34 (grupo)
<i>Crinum moorei</i> Hook. f.	Amaryllidaceae	Crino	Áfricotropical	Sazonal	12-9	4-8	Geófito	Herbácea	Z8	C1, C24, C38(grupo)
<i>Crinum x powellii</i> L. H. Bail.	Amaryllidaceae	Crino; Açucena-gigante	Hortícola	Sazonal	12-9	3-8	Geófito	Herbácea	Z6	C23, C34 (grupo)
<i>Crocasmia x crocosmiiflora</i> (Burb. & Dean) N.E. Br.	Iridaceae	Monbrécias; Hastes-de-são-josé	Hortícola	Perenifólio	1-12	5-9	Geófito	Herbácea	Z7	C1, C38, C40 (grupo)
<i>Cryptomeria japonica</i> D. Don	Taxodiaceae	Criptoméria	Paleártico	Perenifólio	1-12	12-3	Meso.	Árvore	Z7	C3(1), C4(1), C5(2), C11(1), C13(1), C17(9), C19B(2), C23(1), C33(18), C34 (30), C39(2)
<i>Cuphea hyssopifolia</i> HBK.	Lythraceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C9(4)
<i>Cuphea ignea</i> A. DC.	Lythraceae	Cigarrinhos	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C9 (1), C11(3), C13(1), C23(grupo)
<i>Cupressus funebris</i> Endl.	Cupressaceae	Cipreste-chorão-da-china	Paleártico	Perenifólio	1-12	2-3	Micro.	Árvore	Z7	C24(3)
<i>Cupressus lusitanica</i> Mill.	Cupressaceae	Cedro-de-goa; Cedro-das-barracas	Neártico; Neotropical	Perenifólio	1-12	1-3	Meso.	Árvore	Z9	C19B(3)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartw. ex Gordon	Cupressaceae	Cipreste-de-monterrey; Cedro-de-monterrey	Neártico	Perenifólio	1-12	1-2	Meso.	Árvore	Z8	C32(1)
<i>Cupressus sempervirens</i> L.	Cupressaceae	Cipreste	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-2	Micro.	Árvore	Z8	C3(3), C6(45), C23(1), C31(2)
<i>Cyanotis somaliensis</i> C. B. Clarke.	Commelinaceae		Áfricotropical	Perenifólio	1-12	6-7	Hemi.	Herbácea trepadora	Z9	C9 (grupo)
<i>Cyathea australis</i> (R. Br.) Domin	Cyatheaceae	Feto-arbóreo	Australiano	Perenifólio	1-12	-----	Micro.	Árvore	Z9	C31(1), C33(2), C34(1)
<i>Cyathea cooperi</i> (F. Mueller) Domin.	Cyatheaceae	Feto-arbóreo	Australiano	Perenifólio	1-12	-----	Micro.	Árvore	Z10	C28A(4), C33 (6)
<i>Cyathea dealbata</i> (Forst. f.) Sw.	Cyatheaceae	Feto-arbóreo	Antártico	Perenifólio	1-12	-----	Micro.	Árvore	Z9	C33 (1)
<i>Cyathea medullaris</i> (Forst. f.) Sw.	Cyatheaceae	Feto-arbóreo- negro	Australiano; Oceânia; Antártico	Perenifólio	1-12	-----	Micro.	Árvore	Z9	C3(1), C31(1), C33(3), C34(1)
<i>Cycas revoluta</i> Thunb.	Cycadaceae	Cicas-revoluta; Cicas-de-sagú	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-8	Micro.	Árvore	Z9	C10(2), C11(4)
<i>Cymbidium insigne</i> Rolfe	Orchidaceae	Orquídea-de- haste; Címbidio	Indomalaio	Perenifólio	1-12	2-8	Hemi.	Herbácea	Z9	C23(grupo)
<i>Cymbidium lowianum</i> (Reichb. f.) Reichb. f.	Orchidaceae	Orquídea-de- haste; Címbidio	Indomalaio	Perenifólio	1-12	2-5	Hemi.	Herbácea	Z9	C22(10)
<i>Cynara scolymus</i> L.	Compositae	Alcachofra	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-5	Nano.	Herbácea	Z6	C22(10)
<i>Cyphomandra crassicaulis</i> (Ortega) Kuntze	Solanaceae	Tomateiro- arbóreo; Tomateiro-inglês	Neotropical	Perenifólio	1-12	3-10	Micro.	Arbusto	Z9	C22(1)
<i>Cyrtanthus elatus</i> (Jacq.) Traub.	Amaryllidaceae	Cirtantos	Áfricotropical	Sazonal	4 – 9	7 – 8	Geófita	Herbácea	Z9	C9(grupo)
<i>Cyrtanthus obliquus</i> (L. f.) Ait.	Amaryllidaceae	Cirtantos	Áfricotropical	Sazonal	4 – 9	4 – 7	Geófita	Herbácea	Z9	C9(grupo)
<i>Dahlia imperialis</i> Roezl. ex Ortgies.	Compositae	Dália-imperial	Neotropical	Perenifólio	1-12	11-3	Micro.	Arbusto	Z10	C22(1), C23 (3)
<i>Dais cotinifolia</i> L.	Thymelaeaceae		Áfricotropical	Perenifólio	1-12	11-2; 7-8	Micro.	Arbusto	Z10	C13(1)
<i>Davallia canariensis</i> (L.) Sm.	Davalliaceae	Cabrinhas	Paleártico	Perenifólio	1-12	-----	Epífita	Herbácea	Z9	C9, C33, C34, C40 (grupo)
<i>Davidia involucrata</i> Bail.	Nyssaceae (Davidiaceae)		Paleártico	Caducifólio	4-12	4-6	Micro.	Árvore	Z7	C23(1)
<i>Delairea odorata</i> Lem.	Compositae	Tasneirinha	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	12-3	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z9	C33(12)
<i>Delphinium elatum</i> L.	Ranunculaceae	Esporas	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Herbácea	Z3	C7, C8, C21, C22, C23 (grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Deparia petersenii</i> (Kunze) M. Kato.	Woodsiaceae	Feto	Indomalaio; Paleártico; Australiano; Oceânia; Antártico	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z9	C9, C23, C33, C34 (grupo)
<i>Desmodium elegans</i> DC.	Leguminosae (Papilionoideae)		Paleártico	Caducifólio	4-12	6-8	Micro.	Arbusto	Z9	C23(1)
<i>Deutzia gracilis</i> Sieb. & Zucc.	Hydrangeaceae	Deutzia	Paleártico	Caducifólio	4-12	5-8	Nano.	Arbusto	Z4	C23(2)
<i>Deutzia scabra</i> Thunb.	Hydrangeaceae	Deutzia	Paleártico	Caducifólio	4-12	5-8	Nano.	Arbusto	Z5	C11(1), C23(1)
<i>Dianthus barbatus</i> L.	Caryophyllaceae	Craveiro	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-7	Nano.	Herbácea	Z4	C9,C23 (grupo)
<i>Dicksonia antarctica</i> Labill.	Dicksoniaceae	Feto-arbóreo	Australiano	Perenifólio	1-12	-----	Micro.	Árvore	Z8	C33(3), C34(2)
<i>Dicliptera suberecta</i> (Andre) Bremek	Acanthaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	5-8	Nano.	Arbusto	Z8	C23(1)
<i>Dierama pulcherrimum</i> (Hook. f.) Bak.	Iridaceae	Varinha-de-condão	Áfricotropical	Sazonal	3-8	3-8	Geófita	Herbácea	Z9	C9(grupo)
<i>Dietes bicolor</i> (Steud.) Klatt.	Iridaceae	Dites-bicolor	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	4-8	Geófita	Herbácea	Z9	C23(grupo)
<i>Dietes grandiflora</i> N. E. Br.	Iridaceae	Dietes	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	5-8	Geófita	Herbácea	Z9	C7A, C11(grupo)
<i>Dietes robinsoniana</i> (F. Muell.) Klatt.	Iridaceae	Dietes	Australiano	Perenifólio	1-12	2-5	Geófita	Herbácea	Z9	C8 (2), C11(1), C13(3), C23(3)
<i>Digitalis purpurea</i> L.	Scrophulariaceae	Dedaleira	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-6	Nano.	Herbácea	Z5	C23(grupo)
<i>Diosma ericoides</i> L.	Rutaceae	Urze-de-cheiro	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	2-5	Nano.	Arbusto	Z9	C6(sebe)
<i>Diospyros kaki</i> L. f.	Ebenaceae	Dióspiros	Paleártico	Caducifólio	3-11	5-6	Micro.	Árvore	Z8	C21(1), C22(8), C24 (14)
<i>Diospyros virginiana</i> L.	Ebenaceae	Diospiros- americano	Neártico	Caducifólio	4-11	5-6	Micro.	Árvore	Z5	C21(2), C24(1)
<i>Diplazium caudatum</i> (Cav.) Jemy	Woodsiaceae	Feto	Paleártico	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z10	C34 (grupo)
<i>Distictis buccinatoria</i> (DC.) A. Gentry.	Bignoniaceae	Dedos-de-senhora	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-8	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z11	C23(1)
<i>Dombeya cacuminum</i> Hochr..	Sterculiaceae	Dombeia; Aurora	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-4	Micro.	Árvore	Z10	C6(1), C22(1), C23(1)
<i>Dombeya wallichii</i> (Lindl.) B. D. Jackson	Sterculiaceae	Dombeia; Aurora	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	12-2	Micro.	Árvore	Z10	C23(1), C32(1)
<i>Doryanthes palmeri</i> W. Hill.	Agavaceae	Doriantes	Australiano	Perenifólio	1-12	3-6	Hemi.	Herbácea	Z10	C15(1), C23(1), C34(1)
<i>Dracaena draco</i> (L.) L. ssp. <i>draco</i>	Agavaceae	Dragoeiro	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-6	Micro.	Árvore	Z11	C9(1), C21A(1)
<i>Drimys winteri</i> Forst & Forst. f.	Winteraceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	11-5	Micro.	Árvore	Z8	C23(2)
<i>Drosanthemum barwickii</i> L. Bolus	Aizoaceae	Arrozinho	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	3-6	Fane. trep.	Arbusto trepador e suculento	Z9	C9(grupo)
<i>Dryopteris affinis</i> (Lowe) Fraser-Jenk.	Dryopteridaceae	Feto	Paleártico	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z6	C8, C9, C21, C23 (grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Duranta erecta</i> L.	Verbenaceae	Duranta; Violeteira-da-brasil	Neotropical	Perenifólio	1-12	7-1	Micro.	Arbusto	Z10	C1(grupo), C8(1), C34, C39 (grupo)
<i>Dyckia brevifolia</i> Bak.	Bromeliaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	6-11	Caméfito	Herbácea suculenta	Z9	C9(grupo)
<i>Echeveria elegans</i> Rose.	Crassulaceae	Rosa-mexicana	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-9	Caméfito	Herbácea suculenta	Z8	C9, C23(grupo)
<i>Echeveria secunda</i> W. B. Booth.	Crassulaceae	Rosa-mexicana	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-9	Caméfito	Herbácea suculenta	Z8	C9, C23(grupo)
<i>Echium candicans</i> L. f.	Boraginaceae	Massaroco	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-6	Micro.	Arbusto	Z10	C4(1), C23(1)
<i>Echium nervosum</i> Dryand.	Boraginaceae	Massaroco	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-3	Nano.	Arbusto	Z11	C28A(1), C32(1)
<i>Echium plantaginium</i> L.	Boraginaceae	Invejosa	Paleártico	Perenifólio	1-12	2-6	Nano.	Herbácea	Z9	C38, C40 (grupo)
<i>Eichhornia crassipes</i> (Mart.) Solms-Laub.	Pontederiaceae	Jacinto-de-água	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-10	Hidrófita	Herbácea	Z10	C23 (grupo)
<i>Elaeagnus pungens</i> Thunb.	Elaeagnaceae		Paleártico	Perenifólio	1-12	9-10	Micro.	Arbusto	Z7	C1(2), C2(1), C6(1), C19(1), C38 (12)
<i>Encephalartos lehmannii</i> Lehm.	Zamiaceae		Áfrotropical	Perenifólio	1-12	5-11	Nano.	Árvore	Z9	C5(1)
<i>Ensete ventricosum</i> (Welw.) E.E. Cheesm.	Musaceae	Bananeira-da- abissínia	Áfrotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Terófito	Herbácea	Z10	C10(1), C24(1), C25(2), C28A(3)
<i>Epilobium obscurum</i> Schreber	Onagraceae		Paleártico	Sazonal	6-11	7-9	Terófito	Herbácea	Z6	C23 (grupo)
<i>Erica ciliaris</i> L.	Ericaceae	Urze	Paleártico	Perenifólio	1-12	7-9	Nano.	Arbusto	Z7	C23(grupo)
<i>Erica platycodon</i> (Webb & Berthel.) Rivas Mart. & al. ssp. <i>madericola</i> (D. C. McClint.) Rivas Mart. & al.	Ericaceae	Urze-das- vassouras; Urze-durázia	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-6	Micro.	Arbusto	Z10	C32(1)
<i>Erigeron karvinskianus</i> DC.	Compositae	Floricos; Intrometidas; Margaridas	Neotropical	Perenifólio	1-12	3-11	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z7	C7,C8, C9, C43 (grupo)
<i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl.	Rosaceae	Nespereira	Paleártico	Perenifólio	1-12	11-12	Micro.	Árvore	Z8	C6(1), C14(1), C20(2), C30(1), C38(1)
<i>Erythrina crista-galli</i> L.	Leguminosae (Papilionoideae)	Coraleira; Coralina-crista-de- galo	Neotropical	Marcescente	4-3 (12-3)	4-11	Micro.	Árvore	Z8	C9(1)
<i>Erythrina lysistemon</i> Hutch.	Leguminosae (Papilionoideae)	Coralina-cafra	Áfrotropical	Marcescente	5-4 (12-4)	2-5	Micro.	Árvore	Z10	C6(1)
<i>Eschscholzia californica</i> Cham.	Papaveraceae	Papoila-da- califórnia	Neártico	Sazonal	3-6	3-6	Terófito	Herbácea	Z6	C8, C9, C23 (grupo)
<i>Eucalyptus ficifolia</i> F. Muell.	Myrtaceae	Eucalipto- vermelho	Australiano	Perenifólio	1-12	6-10	Meso.	Árvore	Z9	C2(1), C20(1), C21(1), C21A(1), C23(1), C31(3), C32(5), C40(7)
<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.	Myrtaceae	Eucalipto	Australiano	Perenifólio	1-12	12-4	Meso.	Árvore	Z8	C26(1)
<i>Eucalyptus gunni</i> Hook.	Myrtaceae	Eucalipto	Australiano	Perenifólio	1-12	11-2	Micro.	Árvore	Z8	C5(1), C15(1), C17(1)
<i>Eucalyptus robusta</i> Sm.	Myrtaceae	Eucalipto	Australiano	Perenifólio	1-12	1-2	Meso.	Árvore	Z9	C34(2)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Eucalyptus sideroxylon</i> A. Cunn. ex Wools	Myrtaceae	Eucalipto	Australiano	Perenifólio	1-12	8-9	Meso.	Árvore	Z9	C13(1)
<i>Eucomis bicolor</i> Bak.	Liliaceae (Hyacinthaceae)	Flor-ananás	Áfricotropical	Sazonal	6-10	7-8	Geófito	Herbácea	Z8	C8, C13, C23(grupo)
<i>Eucomis comosa</i> (Houtt.) Wehrh.	Liliaceae (Hyacinthaceae)	Flor-ananás	Áfricotropical	Sazonal	6-10	7-8	Geófito	Herbácea	Z8	C8, C11, C13, C23 (grupo)
<i>Euonymus japonicus</i> Thunb.	Celastraceae	Verdegaiço	Paleártico	Perenifólio	1-12	7-8	Micro.	Arbusto	Z7	C40(1)
<i>Euphorbia lathyris</i> L.	Euphorbiaceae	Eufórbia	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-6	Nano.	Herbácea	Z6	C23(2)
<i>Euphorbia marginata</i> Pursh.	Euphorbiaceae		Neártico	Sazonal	5-9	6-7	Terófito	Herbácea	Z4	C8(1), C9(grupo), C23(5)
<i>Euphorbia mellifera</i> Ait.	Euphorbiaceae	Alindres; Figueira-do-inferno	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-5	Micro.	Arbusto	Z10	C9(2), C11(4)
<i>Euphorbia milli</i> Desmoul.	Euphorbiaceae	Mira-mira-não-me-toques	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C7(2), C9(3)
<i>Euphorbia pulcherrima</i> Willd. ex Klotzsch.	Euphorbiaceae	Manhã-de-páscoa	Neotropical	Caducifólio	5-2	11-1	Micro.	Arbusto	Z10	C7(6)
<i>Euryops pectinatus</i> Cass.	Compositae	Estrela-amarela	Áfricotropical	Perenifólio	1 – 12	1-12	Nano.	Arbusto	Z9	C9 (1), C10(1), C11(1), C21(1), C23 (3)
<i>Exochorda giraldii</i> Hesse.	Rosaceae	Exocorda	Paleártico	Caducifólio	2 – 11	2-5	Micro.	Arbusto	Z6	C5(1)
<i>Fagus sylvatica</i> L.	Fagaceae	Faia-europeia	Paleártico	Caducifólio	4-12	4-5	Meso.	Árvore	Z5	C14(1), C38(1), C39(3)
<i>Fagus sylvatica</i> L. var. <i>purpurea</i> (Ait.) Schneid.	Fagaceae	Faia-europeia-de-folha-vermelha	Paleártico	Caducifólio	4-12	4-5	Meso.	Árvore	Z5	C6(1), C14(1), C18(1), C19(1)
<i>Farugium japonicum</i> (L.) Kitam.	Compositae	Patás-de-cavalo; Boínas	Paleártico	Perenifólio	1-12	7-3	Hemi.	Herbácea	Z7	C23(grupo)
<i>Felicia amelloides</i> (L.) Voss.	Compositae	Felícia; Margarida-azul	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z9	C4, C6, C7, C8, C9 (grupo)
<i>Felicia fruticosa</i> (L.) Nichols.	Compositae	Felícia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	3-7	Nano.	Arbusto	Z9	C3, C4,C8, C9(grupo)
<i>Felicia heterophylla</i> (Cass.) Grau.	Compositae	Felícia; Margarida-azul	Áfricotropical	Sazonal	3-6	4-6	Terófito	Herbácea	Z9	C23(grupo)
<i>Ferraria crispa</i> Burm.	Iridaceae	Ferraria	Neotropical	Sazonal	2-5	3-4	Geófito	Herbácea	Z9	C23(grupo)
<i>Fraxinus ornus</i> L.	Oleaceae	Freixo	Paleártico	Caducifólio	4-1	4-5	Micro.	Árvore	Z6	C17(1), C35(1)
<i>Freesia alba</i> (G. L. Mey.) Gumbel.	Iridaceae	Frísia	Áfricotropical	Sazonal	12-4	12-4	Geófito	Herbácea	Z9	C5, C6, C8, C9, C10, C11,C12, C38 (grupo)
<i>Fuchsia arborescens</i> Sims.	Onagraceae	Fúcsia-arborea	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z9	C23(1)
<i>Fuchsia boliviana</i> Carr.	Onagraceae	Mimos; Brincos-de-princesa	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C23(9), C24(3)
<i>Fuchsia magellanica</i> Lam.	Onagraceae	Brincos-de-princesa; Mimos	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z7	C1(grupo)
<i>Fuchsia triphylla</i> L.	Onagraceae	Brincos-de-princesa; Mimos	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z11	C23 (grupo)
<i>Furcraea bedinghausii</i> K. Koch.	Agavaceae	Piteira; Furceia	Neotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Nano.	Árvore suculenta	Z10	C21A(3)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Furcraea selloa</i> K. Koch. var. <i>marginata</i> Trel.	Agavaceae	Furcreia; Piteira	Neotropical	Perenifólio	1-12	8-12	Micro.	Árvore suculenta	Z10	C9(1)
<i>Galactites tomentosa</i> Moench.	Compositae	Cardo; Galactite	Paleártico	Sazonal	2-5	2-5	Terófito	Herbácea	Z9	C37, C38, C40(grupo)
<i>Gardenia augusta</i> (L.) Merrill	Rubiaceae	Gardénia	Paleártico; Indomalaio	Perenifólio	1-12	6-8	Nano.	Arbusto	Z10	C8(1)
<i>Gennaria diphylla</i> (Link) Parl.	Orchidaceae	Genária	Paleártico	Sazonal	12-5	1-4	Geófito	Herbácea	Z10	C5(grupo)
<i>Geranium maderense</i> P. F. Yeo	Geraniaceae	Gerânio-da- madeira; Pássaras	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-6	Nano.	Herbácea	Z10	C23(4)
<i>Geranium robertianum</i> L.	Geraniaceae	Erva-de-são- roberto	Paleártico; Nearctico	Perenifólio	1-12	3-8	Hemi.	Herbácea	Z6	C38 (grupo)
<i>Gerbera jamesonii</i> Bol. ex Adlam.	Compositae	Gerbera	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z8	C6, C9, C10 (grupo)
<i>Ginkgo biloba</i> L.	Ginkgoaceae	Ginco; Árvore - avenca	Paleártico	Caducifólio	4-1	5	Micro.	Árvore	Z4	C6(1), C15(1), C25(1)
<i>Gladiolus callianthus</i> Marais	Iridaceae	Gladíolo	Áfricotropical	Sazonal	6-11	7-10	Geófito	Herbácea	Z11	C9(grupo)
<i>Gladiolus cardinalis</i> Curtis	Iridaceae	Gladíolo	Áfricotropical	Sazonal	5-10	6-8	Geófito	Herbácea	Z10	C9(grupo)
<i>Gladiolus carneus</i> Delaroche	Iridaceae	Gladíolo	Áfricotropical	Sazonal	2-6	3-5	Geófito	Herbácea	Z10	C9(grupo)
<i>Gladiolus communis</i> L. ssp. <i>byzantinus</i> (Mill.) A. Hamilt.	Iridaceae	Gladíolo	Paleártico	Sazonal	2-7	3-6	Geófito	Herbácea	Z6	C9 (grupo)
<i>Gladiolus italicus</i> Mill.	Iridaceae	Gladíolo-silvestre	Paleártico	Sazonal	3-6	3-6	Geófito	Herbácea	Z6	C9(grupo)
<i>Gladiolus natalensis</i> Hook	Iridaceae	Gladíolos	Áfricotropical	Sazonal	2-7	3-6	Geófito	Herbácea	Z10	C11(grupo)
<i>Gladiolus tristis</i> L.	Iridaceae	Gladíolos	Áfricotropical	Sazonal	12-5	1-3	Geófito	Herbácea	Z10	C23(grupo)
<i>Gnidia polystachya</i> Bergius	Thymelaeaceae	Gnidia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C9(5)
<i>Grevillea banksii</i> R. Br.	Proteaceae	Grevilea	Australiano	Perenifólio	1-12	3-5	Micro.	Arbusto	Z9	C21A(1)
<i>Grevillea rosmarinifolia</i> A. Cunn.	Proteaceae	Grevilea	Australiano	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z8	C21A(3)
<i>Greyia sutherlandii</i> Hook. & Harv.	Greyiaceae	Limpa-garrafas-do- transval	Áfricotropical	Marcescente	5-4 (1-4)	1-5	Micro.	Árvore	Z9	C13(1), C17(1)
<i>Gypsophila repens</i> L.	Caryophyllaceae	Gipsofila	Paleártico	Perenifólio	1-12	12-5	Nano.	Herbácea	Z4	C23 (grupo)
<i>Habranthus robustus</i> Herb. ex Sweet.	Amaryllidaceae		Neotropical	Sazonal	6-9	6-8	Geófito	Herbácea	Z10	C9 (grupo)
<i>Haemanthus coccineus</i> L.	Amaryllidaceae	Broxa	Áfricotropical	Sazonal	12-6	7-11	Geófito	Herbácea	Z9	C23(grupo)
<i>Hakea victoria</i> J. Drumm.	Proteaceae	Hakea-real	Australiano	Perenifólio	1-12	11-4	Micro.	Arbusto	Z9	C6(1)
<i>Hebe x franciscana</i> (Eastw.) Souster.	Scrophulariaceae	Verónica	Hortícola	Perenifólio	1-12	5-12	Nano.	Arbusto	Z8	C10(1), C11(1)
<i>Hedera helix</i> L.	Araliaceae	Hera-dos-poetas	Paleártico	Perenifólio	1-12	9-10	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z5	C7(grupo)
<i>Hedera maderensis</i> K. Koch ex A. Ruthf. ssp. <i>maderensis</i>	Araliaceae	Hera	Paleártico	Perenifólio	1-12	7-10	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	C34, C40(grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLOGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Hedychium gardnerianum</i> Ker-Gawl.	Zingiberaceae	Roca-de-vénus; Conteira; Bananilha	Paleártico; Indomalaio	Perenifólio	1-12	7-10	Hemi	Herbácea	Z9	C34 (grupo)
<i>Helichrysum bracteatum</i> (Vent.) Andrews	Compositae	Margarida-de- papel	Australiano	Sazonal	3-10	4-10	Terófito	Herbácea	Z8	C8(grupo)
<i>Heliotropium arborescens</i> L.	Boraginaceae	Heliotrópio	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z9	C8(2), C9(3), C23(2)
<i>Hemerocallis dumortieri</i> E. Morr.	Liliaceae (Hemerocallidaceae)	Hemerocalis; Lírio-dum-dia	Paleártico	Perenifólio	1-12	6-10	Geófito	Herbácea	Z5	C4, C6, C7, C9, C11, C22, C31 (grupo)
<i>Hemerocallis fulva</i> L.	Liliaceae (Hemerocallidaceae)	Hemerocalis; Lírio-dum-dia	Paleártico	Perenifólio	1-12	6-10	Geófito	Herbácea	Z5	C6, C7, C31 (grupo)
<i>Heterocentron macrostachium</i> Naud.	Melastomataceae	Heterocentro	Neotropical	Perenifólio	1-12	11-4	Nano.	Arbusto	Z10	C8, C21, C22, C23(grupo)
<i>Hibbertia scandens</i> (Willd.) Dryand.	Dilleniaceae	Hibertia	Australiano	Perenifólio	1-12	4-8	Fane.trep.	Arbusto trepador	Z9	C22(1), C23(1), C38(10)
<i>Hibiscus rosa-sinensis</i> L.	Malvaceae	Cardeais	Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C21(1), C22(1), C23(2), C31(2)
<i>Hibiscus syriacus</i> L.	Malvaceae	Cardeal-roxo; Hibisco-da- síria	Paleártico; Indomalaio	Caducifólio	5-11	7-9	Micro.	Arbusto	Z5	C23(1)
<i>Hippesatrum vittatum</i> (L' Hérit) Herb.	Amaryllidaceae	Raqueis	Neotropical	Sazonal	4-10	4-10	Geófito	Herbácea	Z10	C11, C13, C23(grupo)
<i>Hoheria populnea</i> A. Cunn.	Malvaceae		Antártico	Perenifólio	1-12	8-9	Micro.	Árvore	Z9	C5(1), C31(1)
<i>Holboellia latifolia</i> Wallich.	Lardizabalaceae		Paleártico	Perenifólio	1-12	5-6	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z8	C9(1)
<i>Holmskioldia sanguinea</i> Retz.	Verbenaceae	Chapéus-de- mandarim; Chapéus-chineses	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C3(1), C22(1), C29A(1)
<i>Hyacinthoides hispanica</i> (Mill.) Roth.	Liliaceae (Hyacinthaceae)	Campainhas-azuis	Paleártico	Sazonal	2-5	2-4	Geófito	Herbácea	Z5	C9, C13(grupo)
<i>Hydrangea aspera</i> D. Don.	Hydrangeaceae	Hortênsia	Paleártico; Indomalaio	Caducifólio	3-12	6-9	Micro.	Arbusto	Z7	C11(1)
<i>Hydrangea macrophylla</i> (Thunb.) Ser.	Hydrangeaceae	Hortênsia; Novelos	Paleártico	Caducifólio	3-12	5-10	Nano.	Arbusto	Z6	C7, C11, C22, C23 (grupo)
<i>Hydrangea quercifolia</i> Bartr.	Hydrangeaceae	Hortênsias	Neártico	Caducifólio	3-12	6-8	Nano.	Arbusto	Z5	C11(2), C23(1)
<i>Hylotelephium spectabile</i> (Boreau) H. Ohba	Crassulaceae		Paleártico	Perenifólio	1-12	8-9	Nano.	Herbácea suculenta	Z5	C9, C23(grupo)
<i>Hymenocallis harrisi</i> ana Herb.	Amaryllidaceae	Lírio-aranha	Neotropical	Perenifólio	1-12	3-7	Geófito	Herbácea	Z10	C23(grupo)
<i>Hymenosporum flavum</i> (Hook.) F. Muell.	Pittosporaceae	Himenosporo	Australiano	Perenifólio	1-12	3-8	Micro.	Árvore	Z9	C13(1), C21A(1), C23(2)
<i>Hypericum canariense</i> L.	Guttiferae	Hiperício-das- canárias	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-11	Micro.	Arbusto	Z11	C11(1), C13(1), C21(1), C22(2)
<i>Hypericum monogynum</i> L.	Guttiferae	Hiperício-da-china	Paleártico; Indomalaio	Perenifólio	1-12	6-8	Micro.	Arbusto	Z9	C11(1), C23(2)
<i>Hypoestes aristata</i> R. Br.	Acanthaceae		Áfricotropical	Perenifólio	1-12	11-2	Nano.	Arbusto	Z9	C3, C23 (grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Iberis amara</i> L.	Cruciferae		Paleártico	Sazonal	3-6	4-6	Terófito	Herbácea	Z7	C7, C9(grupo),
<i>Iberis sempervirens</i> L.	Cruciferae		Paleártico	Perenifólio	1-12	4-6	Caméfito	Herbácea	Z4	C9, C23 (grupo)
<i>Ilex aquifolium</i> L.	Aquifoliaceae	Azevinho- comum; Azevinho- inglês	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-6	Micro.	Árvore	Z6	C10(1)
<i>Ilex x altaclarensis</i> (hort. ex Loud.) Dallim.	Aquifoliaceae	Azevinho	Hortícola	Perenifólio	1-12	5-8	Micro.	Árvore	Z6	C7(1), C10(1), C12(1), C14(3)
<i>Impatiens balsamina</i> L.	Balsaminaceae	Maravilhas	Indomalaio	Sazonal	4-9	6-9	Terófito	Herbácea	Z9	C23(grupo)
<i>Ipomoea cyanea</i> (Lindl.) Green.	Solanaceae	locroma	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z9	C23(1), C31(1)
<i>Ipomoea indica</i> (Burm.) Merrill	Convolvulaceae	Campainhas	Neotropical; Áfricotropical; Indomalaio; Oceânia	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z10	C21(grupo)
<i>Ipomoea lobata</i> (Cerv.) Thell.	Convolvulaceae	Bandeira- espanhola	Neotropical	Sazonal	10-12	10-12	Geófito	Herbácea trepadora	Z10	C8(2), C9(2), C21(3)
<i>Iresine herbstii</i> Hook.	Amaranthaceae	Iresine	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Caméfito	Herbácea	Z10	C21, C22(grupo)
<i>Iris foetidissima</i> L.	Iridaceae	Lírio	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-6	Geófito	Herbácea	Z7	C37(grupo)
<i>Iris germanica</i> L.	Iridaceae	Lírio	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-8	Geófito	Herbácea	Z4	C23(grupo)
<i>Iris japonica</i> Thunb.	Iridaceae	Lírio-do-japão	Paleártico	Perenifólio	1-12	2-8	Geófito	Herbácea	Z8	C23 (grupo)
<i>Iris orientalis</i> Mill.	Iridaceae	Lírio	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-5	Geófito	Herbácea	Z6	C9, C21(grupo)
<i>Iris pseudacorus</i> L.	Iridaceae	Bandeira-amarela	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-5	Helófito	Herbácea	Z5	C9, C23(grupo)
<i>Iris unguicularis</i> Poir.	Iridaceae	Lírio	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Geófito	Herbácea	Z7	C5, C9 (grupo)
<i>Itea ilicifolia</i> Oli.	Grossulariaceae (Iteaceae)		Paleártico	Perenifólio	1-12	7-8	Micro.	Arbusto	Z7	C22(1)
<i>Ixia maculata</i> L.	Iridaceae	Palhinhas; Amêndoas	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	3-5	Geófito	Herbácea	Z10	C8, C9, C15, C38(grupo)
<i>Ixia paniculata</i> Delaroche	Iridaceae	Ixia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	3-6	Geófito	Herbácea	Z10	C9(grupo)
<i>Jacaranda mimosifolia</i> D. Don.	Bignoniaceae	Jacarandá	Neotropical	Caducifólio	6-2	4-6	Meso.	Árvore	Z9	C21(1), C22(1)
<i>Jasminum azoricum</i> L.	Oleaceae	Jasmineiro-branco	Paleártico	Perenifólio	1-12	6-9	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z11	C8(1)
<i>Jasminum odoratissimum</i> L.	Oleaceae	Jasmineiro- amarelo	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-8	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z11	C23(1)
<i>Jasminum polyanthum</i> Franch.	Oleaceae	Jasmineiro; Jasmim-dos- poetas	Paleártico	Perenifólio	1-12	2-6	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z8	C3A(2), C6, C7, C9, C21, C22, C23 (grupo)
<i>Juglans nigra</i> L.	Juglandaceae	Nogueira-negra	Neártico	Caducifólio	5-12	5-6	Meso.	Árvore	Z4	C33(5)
<i>Juglans regia</i> L.	Juglandaceae	Nogueira	Paleártico	Caducifólio	5-12	4-6	Meso.	Árvore	Z4	C21 (1)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Juniperus cedrus</i> Webb. & Berthel. ssp. <i>maderensis</i> (Menezes) Rivas Mart. & al.	Cupressaceae	Cedro-da- madeira	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-3	Micro.	Árvore	Z10	C19B(1), C26(2), C28A(1), C40(3)
<i>Justicia brandegeana</i> Wassh.	Acanthaceae	Beloperone	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C23 (6)
<i>Justicia carnea</i> Lindl.	Acanthaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	5-10	Nano.	Arbusto	Z12	C6(1), C7A(1), C8(1), C23 (grupo)
<i>Justicia rizzinii</i> Wassh.	Acanthaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	12-6	Nano.	Arbusto	Z11	C23(8)
<i>Kalanchoe blossfeldiana</i> Poelln.	Crassulaceae	Calanchoé	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto suculento	Z11	C9(grupo)
<i>Kalanchoe fedtschenkoi</i> Hamet & Perrier	Crassulaceae	Calanchoé	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-8	Caméfito	Arbusto suculento	Z11	C9 (grupo)
<i>Kalanchoe pinnata</i> (Lam.) Pers.	Crassulaceae	Calanchoé	Neotropical; Áfricotropical; Indomalaio; Oceânia	Perenifólio	1-12	2-5	Nano.	Arbusto suculento	Z11	C9(grupo)
<i>Kennedia macrophylla</i> (Meissn.) Benth.	Leguminosae (Papilionoideae)		Australiano	Perenifólio	1-12	4-6	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	C23(1), C32(1)
<i>Kniphofia ensifolia</i> Bak.	Liliaceae (Aloaceae)	Foguetes	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	5-7	Hemi.	Herbácea	Z9	C8(3), C10, C11(grupo)
<i>Kniphofia uvaria</i> (L.) Oken.	Liliaceae (Aloaceae)	Foguetes	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	6-8	Hemi.	Herbácea	Z9	C6, C23 (grupo)
<i>Kniphofia x praecox</i> Bak.	Liliaceae (Aloaceae)	Foguetes	Hortícola	Perenifólio	1-12	11-1	Hemi.	Herbácea	Z9	C7(grupo)
<i>Koeleruteria bipinnata</i> Franch.	Sapindaceae		Paleártico	Caducifólio	5-2	8-10	Micro.	Árvore	Z8	C6(1)
<i>Kohleria eriantha</i> (Benth.) Hanst.	Gesneriaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z11	C7(2)
<i>Lagerstroemia indica</i> L.	Lythraceae	Laguerestré-mia; Flor-de- merenda; Suspiros	Paleártico; Indomalaio	Caducifólio	3-11	7-9	Micro.	Árvore	Z7	C8(2), C21A(1), C23(4)
<i>Lagunaria patersonii</i> (Anderss) G. Don.	Malvaceae	Lagunária	Australiano	Perenifólio	1-12	5-7	Micro.	Árvore	Z10	C32(1)
<i>Lampranthus multiradiatus</i> (Jacq.) N. E. Br.	Aizoaceae (Mesembryanthemaceae)	Lamprantos; Chorão	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Arbusto trepador e suculento	Z11	C31(grupo)
<i>Lampranthus spectabilis</i> (Haw.) N.E. Br.	Aizoaceae (Mesembryanthemaceae)	Lamprantos; Chorão	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Arbusto trepador e suculento	Z11	C9(grupo)
<i>Lantana camara</i> L.	Verbenaceae	Lantana	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C20(3), C31(1)
<i>Lathyrus odoratus</i> L.	Leguminosae (Papilionoideae)	Ervilheira-de- cheiro	Paleártico	Sazonal	3-8	4-8	Terófito	Herbácea trepadora	Z4	C8(3), C9(1), C10(4), C21(1), C22(1), C23(10)
<i>Laurus novocanariensis</i> Rivas Mart. & al.	Lauraceae	Loureiro	Paleártico	Perenifólio	1-12	11-3	Meso.	Árvore	Z10	C1(15), C2(6), C3(1), C19(1), C28A(3), C33(18), C34 (22), C38(10), C39(>50), C40(8)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Lavandula dentata</i> L.	Labiatae	Alfazema; Lavanda	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z8	C9 (grupo)
<i>Lavandula pinnata</i> L. f.	Labiatae	Alfazema	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z11	C9(grupo)
<i>Lavatera trimestris</i> L.	Malvaceae	Lavatera	Paleártico	Sazonal	4-10	6-9	Terófito	Herbácea	Z8	C22, C23(grupo)
<i>Leptospermum petersonii</i> Bail.	Myrtaceae	Leptospermo	Australiano	Perenifólio	1-12	4-10	Micro.	Arbusto	Z9	C21A(2)
<i>Leptospermum scoparium</i> Forst. & Forst.	Myrtaceae	Leptospermo; Urze-de-jardim	Australiano; Antártico	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z8	C5(1), C6(2), C8(1), C14(1), C40(2)
<i>Leucadendron argenteum</i> (L.) R. Br.	Proteaceae	Árvore-de- prata	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	11-1	Micro.	Árvore	Z9	C8(1), C9(1), C14(1)
<i>Leucadendron salignum</i> Bergius x <i>L. laureolum</i> (Lam.) Fourc.	Proteaceae	Safari-sunset	Hortícola	Perenifólio	1-12	11-2	Micro.	Arbusto	Z9	C6(2)
<i>Leucadendron xanthoconus</i> (Kuntze) Schum.	Proteaceae	Leucadendro	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	3-6	Micro.	Arbusto	Z9	C20(1)
<i>Leucojum vernum</i> L. var. <i>vagneri</i> Stapf.	Amaryllidaceae		Paleártico	Sazonal	11-4	11-3	Geófito	Herbácea	Z5	C6, C7, C8, C9 C11(grupo)
<i>Leucospermum patersonii</i> E. Phillips	Proteaceae	Proteia - almofada-de- alfinetes	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	3-5	Micro.	Arbusto	Z9	C6(1), C17(1)
<i>Leucospermum reflexum</i> H. Buek ex Meisn.	Proteaceae	Proteia - almofada-de- alfinetes	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	11-5	Micro.	Arbusto	Z9	C17(1)
<i>Ligustrum lucidum</i> Ait. f.	Oleaceae	Ligustro; Alfinheiro	Paleártico	Perenifólio	1-12	7-9	Micro.	Árvore	Z7	C23(23)
<i>Lilium candidum</i> L.	Liliaceae	Açucena-branca; Açucena-de- nossa-senhora	Paleártico	Sazonal	2-7	4-6	Geófito	Herbácea	Z6	C23(grupo)
<i>Limonium fruticans</i> (Webb) Kuntze	Plumbaginaceae	Limónio	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z11	C7(1), C11(2), C23(4)
<i>Liquidambar styraciflua</i> L.	Hamamelidaceae	Liquidambar	Neártico	Caducifólio	4-11	4-6	Meso.	Árvore	Z5	C2(1), C3(1), C32(1)
<i>Liriodendron tulipifera</i> L.	Magnoliaceae	Tulipeiro-arbóreo	Neártico	Caducifólio	4-11	4-6	Meso.	Árvore	Z4	C5(1), C6(1), C12(1), C39(1)
<i>Livistona australis</i> (R. Br.) Mart.	Palmae	Palmeira-de-leque	Australiano	Perenifólio	1-12	4-5	Meso.	Árvore	Z9	C17(1)
<i>Livistona chinensis</i> (Jacq.) R. Br. ex Mart.	Palmae	Palmeira-de- leque	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-5	Meso.	Árvore	Z9	C18(1)
<i>Lobelia erinus</i> L.	Campanulaceae	Lobélia	Áfricotropical	Sazonal	4-9	5-9	Terófito	Herbácea	Z9	C9 (grupo)
<i>Lobularia maritima</i> (L.) Desv.	Cruciferae	Lobulária	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z8	C8 (grupo)
<i>Lonicera japonica</i> Thunb.	Caprifoliaceae	Madressilva	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-10	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z4	C9(1)
<i>Lunaria annua</i> L.	Cruciferae	Hóstias; Moedas	Paleártico	Sazonal	2-7	3-6	Terófito	Herbácea	Z8	C7, C22 (grupo)
<i>Lupinus luteus</i> L.	Leguminosae (Papilionoideae)	Tremoceiro	Paleártico	Sazonal	12-5	2-4	Terófito	Herbácea	Z6	C15, C17 (grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitoceográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Lychnis coronaria</i> (L.) Desr.	Caryophyllaceae	Licnis	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-8	Nano.	Herbácea	Z4	C8, C9(grupo)
<i>Lychnis flos-jovis</i> (L.) Desr.	Caryophyllaceae	Licnis	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-8	Nano.	Herbácea	Z5	C9 (grupo)
<i>Macfadyena unguis-cati</i> (L.) A. Gentry	Bignoniaceae	Bignónia-unha-de-gato	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-5	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z9	C7(1)
<i>Magnolia coco</i> (Lour.) DC.	Magnoliaceae	Magnólia	Indomalaio	Perenifólio	1-12	7-8	Nano.	Arbusto	Z9	C23(1)
<i>Magnolia denudata</i> Desr.	Magnoliaceae	Magnólia	Indomalaio; Paleártico	Caducifólio	2-11	12-2; 6	Micro.	Árvore	Z6	C23(1)
<i>Magnolia grandiflora</i> L.	Magnoliaceae	Magnólia	Neártico	Perenifólio	1-12	5-8	Micro.	Árvore	Z6	C4(1), C6(3), C17(1), C20(1), C21(1), C21B(4), C24(4), C28(1), C30(2), C31(1)
<i>Magnolia liliflora</i> Desr.	Magnoliaceae	Magnólia	Paleártico	Caducifólio	2-11	12-3	Micro.	Arbusto	Z6	C11(2), C23(1)
<i>Magnolia macrophylla</i> Michx.	Magnoliaceae	Magnólia-de – folhas-grandes	Neártico	Caducifólio	4-11	5-6	Micro.	Árvore	Z6	C8(1), C17(1)
<i>Magnolia stellata</i> (Sieb. & Zucc.) Maxim.	Magnoliaceae	Magnólia-estrela	Paleártico	Caducifólio	2-11	11-3	Micro.	Arbusto	Z4	C6(1), C11(1)
<i>Magnolia x soulangiana</i> Soul. –Bod.	Magnoliaceae	Magnólia	Hortícola	Caducifólio	3-12	12-4	Micro.	Árvore	Z5	C6(2), C8(1), C11(4), C14(1), C21(1), C23(4), C30(2), C34(1), C38(1), C40(9)
<i>Magnolia x thompsoniana</i> (Loud.) Vos.	Magnoliaceae	Magnólia	Hortícola	Caducifólio	3-12	3-6	Micro.	Árvore	Z5	C23(1)
<i>Mahonia aquifolium</i> (Pursh) Nutt.	Berberidaceae	Maónia	Neártico	Perenifólio	1-12	1-3	Nano.	Arbusto	Z5	C11(1)
<i>Mahonia bealei</i> (Fort.) Carr.	Berberidaceae	Maónia	Paleártico	Perenifólio	1-12	12-2	Nano.	Arbusto	Z6	C21A(1)
<i>Mahonia japonica</i> (Thunb.) DC.	Berberidaceae	Maónia	Paleártico; Indomalaio	Perenifólio	1-12	12-2	Micro.	Arbusto	Z6	C9(1)
<i>Mahonia lomariifolia</i> Takeda	Berberidaceae	Maónia	Paleártico; Indomalaio	Perenifólio	1-12	12-2	Micro.	Arbusto	Z7	C22(1), C23(1)
<i>Mahonia x media</i> C. Brickell	Berberidaceae	Maónia	Hortícola	Perenifólio	1-12	3-4	Nano.	Arbusto	Z6	C23(1)
<i>Malcomia maritima</i> (L.) R. Br.	Cruciferae		Paleártico	Sazonal	2-5	2-5	Terófito	Herbácea	Z8	C9, C23 (grupo)
<i>Malus pumila</i> Mill.	Rosaceae	Pereiro	Paleártico	Caducifólio	4-11	4-5	Micro.	Árvore	Z3	C2A(1), C5(1), C21(1)
<i>Malvaviscus arboreus</i> Cav.	Malvaceae	Malvavisco	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z9	C11(1)
<i>Mandevilla splendens</i> (Hook. f.) Woodson	Apocynaceae	Dipladénia	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	C6(1), C30(1)
<i>Matthiola incana</i> (L.) R. Br.	Cruciferae	Goivos	Paleártico	Sazonal	1-7	3-7	Terófito	Herbácea	Z6	C23(grupo)
<i>Melaleuca bracteata</i> F. Meull.	Myrtaceae	Melaleuca	Australiano	Perenifólio	1-12	2-4	Micro.	Árvore	Z9	C21A(1)
<i>Melaleuca ericifolia</i> Sm.	Myrtaceae	Melaleuca	Australiano	Perenifólio	1-12	11-4	Micro.	Árvore	Z9	C5(1), C14(1), C21A(1)
<i>Melaleuca hypericifolia</i> Sm.	Myrtaceae	Melaleuca	Australiano	Perenifólio	1-12	4-9	Micro.	Arbusto	Z9	C21A(1)
<i>Melaleuca linarifolia</i> Sm.	Myrtaceae	Melaleuca	Australiano	Perenifólio	1-12	5-7	Micro.	Árvore	Z9	C17(1)
<i>Melaleuca viridiflora</i> Sol. ex. Gaertn.	Myrtaceae	Melaleuca	Australiano; Oceânia	Perenifólio	1-12	11-8	Micro.	Árvore	Z10	C10(1), C11(1), C12(1), C22(1)
<i>Metasequoia glyptostroboides</i> Hu & Cheng	Cupressaceae	Metassequoia	Paleártico	Caducifólio	4-11	4-5	Micro.	Árvore	Z5	C18(1)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Metrosideros excelsa</i> Sol. ex Gaertn.	Myrtaceae	Metrosídero	Antártico	Perenifólio	1-12	6-7	Meso.	Árvore	Z10	C1(1), C4(1), C1A(1), C26(1), C31(1), C32(1)
<i>Michelia doltsopa</i> Buch.-Ham. ex DC	Magnoliaceae		Paleártico	Perenifólio	1-12	1-3	Micro.	Árvore	Z9	C6(1), C8(1), C14(1), C19(1), C20(1), C23(1), C24(1), C25(1), C28(2), C28A(1), C31(1)
<i>Michelia figo</i> (Lour.) Spreng	Magnoliaceae	Carocha	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-8	Micro.	Árvore	Z9	C21(1), C23(1)
<i>Mirabilis jalapa</i> L.	Nyctaginaceae	Maravilha-do-peru	Neotropical	Sazonal	3-10	5-9	Geófita	Herbácea	Z8	C23(1)
<i>Miscanthus sinensis</i> Anderss.	Gramineae		Paleártico	Perenifólio	1-12	6-8	Hemi.	Herbácea	Z4	C6(grupo)
<i>Monstera deliciosa</i> Liebm.	Araceae	Costela-de-adão	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	C33(grupo)
<i>Montanoa bipinnatifida</i> (Kunth) K. Kock	Compositae	Malmequer-arbóreo	Neotropical	Perenifólio	1-12	11-5	Micro.	Arbusto	Z10	C8(1), C32(1), C34(2)
<i>Moraea polystachya</i> (Thunb.) Ker-Gawl.	Iridaceae		Áfricotropical	Perenifólio	1-12	12-3	Geófita	Herbácea	Z9	C8(1), C9 (grupo)
<i>Muehlenbeckia complexa</i> (Cunn.) Meissn.	Polygonaceae	Trepadeira-de-aramé	Antártico	Perenifólio	1-12	7-9	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z8	C9, C14, C18, C23 (grupo)
<i>Myosotis alpestris</i> F. W. Schmidt	Boraginaceae	Miosotis	Paleártico; Neártico	Perenifólio	1-12	2-6	Caméfita	Herbácea	Z4	C6, C9, C14, C23 (grupo)
<i>Myrica faya</i> Ait.	Myricaceae	Faia-das-ilhas; Samouco	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-5	Micro.	Árvore	Z9	C1(4), C32(1), C33 (3), C38(1)
<i>Myriocarpa longipes</i> Liebm.	Urticaceae	Miriocarpa	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-6	Micro.	Árvore	Z11	C23(1)
<i>Myrtus communis</i> L.	Myrtaceae	Murta	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-7; 10-11	Micro.	Arbusto	Z8	C6(2)
<i>Nandina domestica</i> Thunb.	Berberidaceae		Paleártico	Perenifólio	1-12	5-9	Nano.	Arbusto	Z5	C23(3)
<i>Narcissus bulbocodium</i> L.	Amaryllidaceae	Narciso	Paleártico	Sazonal	11-5	12-3	Geófita	Herbácea	Z6	C9, C11(grupo)
<i>Narcissus pseudonarcissus</i> L.	Amaryllidaceae	Junquinhos	Paleártico	Sazonal	11-5	12-3	Geófita	Herbácea	Z6	C7,C8, C9(grupo)
<i>Narcissus tazetta</i> L.	Amaryllidaceae	Junquinhos	Paleártico	Sazonal	11-5	12-3	Geófita	Herbácea	Z8	C5, C6, C7, C8, C9, C13 (grupo)
<i>Nepeta x faassenii</i> Bergmans ex Stearn.	Labiatae	Hortelã-de-gato	Hortícola	Perenifólio	1-12	6-9	Nano.	Herbácea	Z3	C11(grupo)
<i>Nerine angustifolia</i> Baker	Amaryllidaceae	Nerine	Áfricotropical	Sazonal	1-10	11-12	Geófita	Herbácea	Z11	C9(grupo)
<i>Nerine samiensis</i> Herb.	Amaryllidaceae	Nerine	Áfricotropical	Sazonal	1-10	11-12	Geófita	Herbácea	Z11	C9(grupo)
<i>Nerine undulata</i> Herb.	Amaryllidaceae	Nerine	Áfricotropical	Sazonal	7-10	11-6	Geófita	Herbácea	Z11	C9, C22 (grupo)
<i>Nerium oleander</i> L.	Apocynaceae	Sevadilha; Loendro	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-11	Micro.	Arbusto	Z9	C11(1), C32(1)
<i>Nolina recurvata</i> (Lem.) Hemsl.	Agavaceae	Nolina; Pata-de-elefante	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-8	Micro.	Árvore	Z9	C22(1)
<i>Nothoscordum gracile</i> (Ait.) Stearn.	Liliaceae (Alliaceae)	Alinhos	Neotropical	Sazonal	1-4	1-3	Geófita	Herbácea	Z7	C8, C9, C10, C11, C12 (grupo)
<i>Nymphaea alba</i> L.	Nymphaeaceae	Nenúfar-branco	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-8	Helófita	Herbácea	Z6	C9 (grupo)
<i>Nymphaea capensis</i> Thunb.	Nymphaeaceae	Nenúfar-azul-do-cabo	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	7-9	Helófita	Herbácea	Z9	C6 (grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Ochna serrulata</i> (Hochst.) Walp.	Ochnaceae	Planta-do-rato-mikey	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	2-4	Nano.	Arbusto	Z9	C6(3)
<i>Ocotea foetens</i> (Aiton) Baill.	Lauraceae	Til	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Meso.	Árvore	Z10	C2(1), C23(1), C24(1), C25(1), C30(2), C33(5), C34(1), C38(1), C40(1)
<i>Odontonema strictum</i> (Nees) Kuntze	Acanthaceae	Odontonema	Neotropical	Perenifólio	1-12	8-12	Nano.	Arbusto	Z10	C6(1), C8(1), C10(2), C22(1), C23(3), C30(1)
<i>Oncoba spinosa</i> Forssk.	Flacourtiaceae	Oncoba	Paleártico	Perenifólio	1-12	8-9	Micro.	Arbusto	Z10	C23(2)
<i>Ornithogalum narbonense</i> L.	Liliaceae (Hyacinthaceae)		Paleártico	Sazonal	10-5	1-2	Geófito	Herbácea	Z7	C9(grupo)
<i>Ornithogalum thyrsoides</i> Jacq.	Liliaceae (Hyacinthaceae)	Torrões-de-açúcar	Áfricotropical	Sazonal	10-6	5-6	Geófito	Herbácea	Z9	C9, C23 (grupo)
<i>Osteospermum barberiae</i> (Harv.) Norl.	Compositae	Estrelas-do-cabo	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	3-10	Caméfito	Arbusto	Z10	C9(grupo)
<i>Osteospermum ecklonis</i> (DC.) Norl.	Compositae	Estrelas-do-cabo	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	3-10	Caméfito	Arbusto	Z10	C9(grupo)
<i>Oxalis latifolia</i> HBK.	Oxalidaceae	Trevo	Neotropical	Sazonal	10-5	12-4	Geófito	Herbácea	Z9	C9(grupo)
<i>Oxalis pes-caprae</i> L.	Oxalidaceae	Azedas; Trevo	Áfricotropical	Sazonal	10-5	12-4	Geófito	Herbácea	Z9	C33, C38, C40 (grupo)
<i>Oxalis purpurea</i> L.	Oxalidaceae	Azedas; Trevo-vermelho	Áfricotropical	Sazonal	10-5	12-4	Geófito	Herbácea	Z9	C6, C8, C10, C11, C13 (grupo)
<i>Pachystachys coccinea</i> (Aubl.) Nees.	Acanthaceae	Guarda-do-cardeal	Neotropical	Perenifólio	1-12	11-4	Nano.	Arbusto	Z12	C22(1)
<i>Pamianthe peruviana</i> Stapf	Amaryllidaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	10-12	Geófito	Herbácea	Z10	C9(grupo)
<i>Papaver nudicaule</i> L.	Papaveraceae	Papoila-da-islândia	Paleártico; Neártico	Sazonal	2-7	3-7	Terófito	Herbácea	Z2	C8, C9, C23 (grupo)
<i>Papaver somniferum</i> L.	Papaveraceae	Papoila-do-ópio	Paleártico	Sazonal	4-7	5-7	Terófito	Herbácea	Z7	C23(grupo)
<i>Parthenocissus tricuspidata</i> Planchon	Vitaceae	Vinha-virgem	Paleártico	Caducifólio	4-12	5-6	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z4	C31(1)
<i>Paspalum dilatatum</i> Poir.	Gramineae	Erva-rija; Erva-do-governo	Neotropical	Perenifólio	1-12	3-9	Hemi.	Herbácea	Z8	C18, C19, C23 (tapete)
<i>Passiflora coccinea</i> Aubl.	Passifloraceae	Maracujá-de-flor-vermelha	Neotropical	Perenifólio	1-12	11-5	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	C34(1)
<i>Paulownia tomentosa</i> (Thunb.) Steud.	Scrophulariaceae	Paulónia	Paleártico	Caducifólio	6-11	4-6	Micro.	Árvore	Z5	C6(1), C7(1), C12(1), C40(1)
<i>Pelargonium cucullatum</i> (L.) L.'Hérit	Geraniaceae	Malvas	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	4-9	Nano.	Arbusto	Z10	C6(1), C9(grupo)
<i>Pelargonium peltatum</i> (L.) L'Hérit.	Geraniaceae	Malva	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z10	C9(grupo)
<i>Pelargonium quercifolium</i> (L.) L'Hérit.	Geraniaceae	Malva	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	2-8	Nano.	Arbusto	Z10	C9(grupo)
<i>Pelargonium zonale</i> (L.) L'Hérit	Geraniaceae	Malva	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	2-8	Nano.	Arbusto	Z10	C6(grupo)
<i>Penstemon barbatus</i> (Cav.) Roth.	Scrophulariaceae		Neártico	Perenifólio	1-12	7-11	Nano.	Herbácea	Z3	C13(grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Pentas lanceolata</i> (Forssk.) Deflers.	Rubiaceae	Pentas	Áfrotropical; Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C7(4), C8(7), C23(1)
<i>Pericallis x hybrida</i> R. Nordenstam	Compositae	Cinerária	Hortícola	Sazonal	1-7	3-6	Terófito	Herbácea	Z10	C17, C23(grupo)
<i>Persea indica</i> (L.) Spreng.	Lauraceae	Vinhático	Paleártico	Perenifólio	1-12	7-9	Meso.	Árvore	Z10	C33(3), C34(1)
<i>Petasites fragrans</i> (Vill.) Presl.	Compositae	Sombreiro	Paleártico	Perenifólio	1-12	2-5	Hemi.	Herbácea	Z7	C22, C23(grupo)
<i>Petrea volubilis</i> L.	Verbenaceae	Estrela-azul; Viuvinha	Neotropical	Perenifólio	1-12	3-12	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	C31(1)
<i>Phlebodium aureum</i> (L.) J. Sm.	Polypodiaceae	Polipódio-dourado	Neártico; Neotropical	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z10	C40 (grupo)
<i>Phlomis fruticosa</i> L.	Labiatae		Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z7	C7(1), C11(1), C21(1), C22(4), C23(1)
<i>Phlox paniculata</i> L.	Polemoniaceae		Neártico	Perenifólio	1-12	7-8	Nano.	Herbácea	Z4	C8(grupo)
<i>Phoenix canariensis</i> Chabaud.	Palmae	Palmeira-das- canárias	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-3	Meso.	Árvore	Z11	C2A(1), C31(1), C32(1), C33A(1), C38(2)
<i>Phoenix dactylifera</i> L.	Palmae	Tamareira	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-3	Meso.	Árvore	Z11	C6(1), C24(1)
<i>Phoenix reclinata</i> Jacq.	Palmae	Tamareira-do- senegal	Áfrotropical	Perenifólio	1-12	5-7	Micro.	Árvore	Z11	C24(1)
<i>Phormium colensoi</i> Hook. f.	Agavaceae	Espadana	Antártico	Perenifólio	1-12	6-7	Hemi.	Herbácea	Z8	C9(1), C13(3), C23(1)
<i>Phormium tenax</i> Forst. & Forst. f.	Agavaceae	Espadana	Antártico	Perenifólio	1-12	6-8	Hemi.	Herbácea	Z8	C8(2), C11(2)
<i>Phyllanthus arbuscula</i> (Sw.) J. F. Gmel.	Euphorbiaceae	Filanto	Neotropical	Perenifólio	1-12	7-9	Micro.	Arbusto	Z12	C23(1)
<i>Phyllocladus trichomanoides</i> D. Don.	Phyllocladaceae		Antártico	Perenifólio	1-12	6-8	Micro.	Árvore	Z9	C31(1)
<i>Physalis peruviana</i> L.	Solanaceae	Tomateiro-inglês; Tomate-de-capuz	Neotropical	Perenifólio	1-12	3-10	Nano.	Herbácea	Z8	C22(grupo)
<i>Picconia excelsa</i> (Ait.) DC.	Oleaceae	Pau-branco	Paleártico	Perenifólio	1-12	2-5	Micro.	Árvore	Z10	C28A(4), C40(5)
<i>Picea abies</i> (L.) Karst.	Pinaceae	Espruce-da- noruega	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-5	Micro.	Árvore	Z4	C14(2), C22(1)
<i>Pinus canariensis</i> C. Sm.	Pinaceae	Pinheiro-das- canárias	Paleártico	Perenifólio	1-12	2-4	Meso.	Árvore	Z10	C23(2)
<i>Pinus patula</i> Schiede ex Schdl. & Cham.	Pinaceae	Pinheiro-patula	Neártico	Perenifólio	1-12	2-4	Meso.	Árvore	Z9	C19(1), C38(1)
<i>Pinus pinaster</i> Ait.	Pinaceae	Pinheiro-marítimo	Paleártico	Perenifólio	1-12	2-4	Meso.	Árvore	Z8	C38(2), C39 (>100)
<i>Pinus pinea</i> L.	Pinaceae	Pinheiro-manso	Paleártico	Perenifólio	1-12	2-4	Meso.	Árvore	Z8	C33(3)
<i>Pinus radiata</i> D. Don	Pinaceae	Pinheiro-de- monterrei	Neártico	Perenifólio	1-12	2-4	Meso.	Árvore	Z8	C32(1), C39(>100)
<i>Pittosporum coriaceum</i> Dryand. ex Aiton	Pittosporaceae	Mocano	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-7	Micro.	Árvore	Z10	C33(1)
<i>Pittosporum eugenioides</i> A. Cunn.	Pittosporaceae	Pitósporo	Antártico	Perenifólio	1-12	3-4	Micro.	Árvore	Z9	C21(1), C23(1)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Pittosporum tenuifolium</i> Banks & Sol.	Pittosporaceae	Pitósporo	Antártico	Perenifólio	1-12	4-5	Micro.	Árvore	Z9	C21(3), C25(1), C31(2)
<i>Pittosporum tobira</i> Ait.	Pittosporaceae	Tobira	Paleártico	Perenifólio	1-12	2-5; 7-8	Micro.	Árvore	Z9	C3(1), C4(1), C6(1), C18(1), C21(1), C23(1), C31(1)
<i>Pittosporum undulatum</i> Vent.	Pittosporaceae	Incenseiro	Australiano	Perenifólio	1-12	2-4	Micro.	Árvore	Z9	C1(5), C6(1), C32(6), C33(7), C34(8), C40(5)
<i>Platanus x acerifolia</i> (Ait.) Willd.	Platanaceae	Plátano	Hortícola	Caducifólio	4-11	5	Meso.	Árvore	Z7	C1(52), C2(4), C3(1), C4(1), C14(9), C34(4), C38(31), C40 (51)
<i>Platycladus orientalis</i> (L. f.) Franco	Cupressaceae	Tuia	Neártico	Perenifólio	1-12	1-3	Micro.	Árvore	Z6	C32(1)
<i>Plectranthus ciliatus</i> E. May.	Labiatae		Áfricotropical	Perenifólio	1-12	10-12	Nano.	Herbácea	Z10	C9(grupo)
<i>Plectranthus ecklonii</i> Benth.	Labiatae	Plectranto	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	10-12	Nano.	Arbusto	Z10	C7(3)
<i>Plumbago auriculata</i> Lam.	Plumbaginaceae	Plúmbago	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z9	C2, C20 (grupo)
<i>Podocarpus elongatus</i> (Ait.) L'Hérit.	Podocarpaceae	Podocarpo	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu**	Micro.	Árvore	Z10	C33(1), C34(1)
<i>Podocarpus salignus</i> D. Don.	Podocarpaceae	Podocarpo	Neotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu**	Micro.	Árvore	Z8	C15(1)
<i>Polianthes tuberosa</i> L.	Agavaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	7-9	Geófita	Herbácea	Z9	C9 (grupo)
<i>Polygala myrtifolia</i> L.	Polygalaceae	Poligala	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z9	C11(2)
<i>Polygonum amplexicaule</i> D. Don	Polygonaceae		Paleártico	Perenifólio	1-12	7-9	Nano.	Herbácea	Z5	C8, C11, C23 (grupo)
<i>Polypodium macaronensis</i> A. E. Bobrov.	Polypodiaceae	Polipódio	Paleártico	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z10	C7, C9, C38, C40 (grupo)
<i>Primula malacoides</i> Franch.	Primulaceae	Primerose	Paleártico	Perenifólio	1-12	12-4	Caméfito	Herbácea	Z8	C9, C23 (grupo)
<i>Primula vulgaris</i> Huds.	Primulaceae	Primerose; Primaveras	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-6	Caméfito	Herbácea	Z6	C4(2), C9, C23 (grupo)
<i>Protea cynaroides</i> (L.) L.	Proteaceae	Protea-real	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	10-5	Nano.	Arbusto	Z9	C2A(1), C6(2), C17(2)
<i>Protea magnifica</i> Link x <i>P.</i> <i>burchelli</i> Stapf.	Proteaceae	Protea	Hortícola	Perenifólio	1-12	10-5	Micro.	Arbusto	Z9	C6(4), C8(2)
<i>Protea magnifica</i> Link.	Proteaceae	Protea-rainha	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	10-5	Nano.	Arbusto	Z9	C6(1)
<i>Protea neriifolia</i> R. Br.	Proteaceae	Protea-de-folha – estreita; Proteia- folha-de-loendro	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	11-2	Nano.	Arbusto	Z9	C8(2)
<i>Protea susannae</i> Phillips. x <i>P. neriifolia</i> R. Br.	Proteaceae	Protea	Hortícola	Perenifólio	1-12	10-3	Micro.	Arbusto	Z9	C6(2), C8(2), C17(2)
<i>Prunus avium</i> L.	Rosaceae	Cerejeira	Paleártico	Caducifólio	4-1	4-5	Micro.	Árvore	Z3	C2A(8), C11(1), C31(1), C32(1)
<i>Prunus campanulata</i> Maxim.	Rosaceae	Ameixieira-da- formosa	Paleártico; Indomalaio	Caducifólio	3-11	2	Micro.	Árvore	Z7	C13(1)
<i>Prunus cerasifera</i> Ehrh.	Rosaceae	Ameixieira-de- jardim	Paleártico	Caducifólio	3-11	2-3	Micro.	Árvore	Z4	C2A(4), C21(2), C21A(1), C22(3), C32(1)
<i>Prunus hixa</i> Willd.	Rosaceae	Gingeira-brava; Azereiro	Paleártico	Perenifólio	1-12	6-8	Meso.	Árvore	Z10	C32(1)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Prunus laurocerasus</i> L.	Rosaceae	Loureiro-inglês; Loureiro-cerejo	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-4	Micro.	Árvore	Z7	C34(4), C40(1)
<i>Prunus serrulata</i> Lindl.	Rosaceae	Cerejeira-oriental	Paleártico	Caducifólio	4-1	4-6	Micro.	Árvore	Z5	C11(1), C13(3), C14(1), C23(1)
<i>Prunus x domestica</i> L.	Rosaceae	Ameixeira	Hortícola	Caducifólio	4-11	3-4	Micro.	Árvore	Z5	C21A(1), C23(1), C25(1)
<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn.	Dennstaedtiaceae	Feiteira	Paleártico; Neártico	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z4	C1, C24, C33, C34 (grupo)
<i>Pteris tremula</i> R. Br.	Pteridaceae	Feto	Australiano; Antártico; Oceânia; Áfrotropical	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z10	C9(3), C21(1), C23(2)
<i>Punica granatum</i> L.	Punicaceae	Romãzeira	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-7	Micro.	Árvore	Z9	C13(1)
<i>Pycnostachys urticifolia</i> Hook.	Labiatae		Áfrotropical	Perenifólio	1-12	10-3	Nano.	Arbusto	Z10	C8(1), C11(1)
<i>Pyracantha angustifolia</i> (Franch.) Schneid.	Rosaceae	Perinhos; Sarça-ardente	Paleártico	Perenifólio	1-12	2-6	Micro.	Arbusto	Z7	C6(2), C22(sebe)
<i>Pyracantha coccinea</i> Roem.	Rosaceae	Perinhos; Sarça-ardente	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-5	Micro.	Arbusto	Z6	C25(13)
<i>Pyracantha crenulata</i> (D. Don) Roem.	Rosaceae	Perinhos; Sarça-ardente	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-6	Micro.	Arbusto	Z7	C10(2)
<i>Pyrostegia venusta</i> (Ker- Gawl.) Miers	Bignoniaceae	Gaitinhas	Neotropical	Perenifólio	1-12	11-3	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	C6(1)
<i>Pyrus communis</i> L.	Rosaceae	Pereira	Paleártico	Caducifólio	4-11	4-6	Micro.	Árvore	Z4	C2A(1), C21(1), C21A(1)
<i>Quercus ilex</i> L.	Fagaceae	Azinheira	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-5	Meso.	Árvore	Z7	C14(>50), C40(5)
<i>Quercus robur</i> L.	Fagaceae	Carvalho	Paleártico	Caducifólio	2-11	3-5	Meso.	Árvore	Z6	C1(6), C(2), C4(1), C28A(1), C38(2), C40(12)
<i>Quercus rubra</i> L.	Fagaceae	Carvalho- vermelho- americano	Neártico	Caducifólio	4-11	4-5	Meso.	Árvore	Z3	C4(1), C18(1), C19(1), C28A(8), C31(1), C40(1)
<i>Quercus suber</i> L.	Fagaceae	Sobreiro	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-4	Micro.	Árvore	Z8	C14(1), C40(1)
<i>Quercus x crenata</i> Lam.	Fagaceae	Carvalho	Paleártico	Marcescente	5-4 (3-4)	3-4	Meso.	Árvore	Z6	C31(1)
<i>Radermachera sinica</i> (Hance) Hemsl.	Bignoniaceae	Árvore-serpente; Boneca-da-china	Indomalaio	Perenifólio	1-12	7-9	Micro.	Árvore	Z10	E26(22)
<i>Rhaphiolepis umbellata</i> (Thunb.) Mak.	Rosaceae		Paleártico	Perenifólio	1-12	10-4	Nano.	Arbusto	Z8	C10(1)
<i>Rhododendron arboreum</i> Sm.	Ericaceae	Rododendro	Indomalaio; Paleártico	Perenifólio	1-12	2-5	Micro.	Árvore	Z7	C2(1), C5(1), C6(2), C34(1)
<i>Rhododendron indicum</i> (L.) Sweet	Ericaceae	Azálea	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z6	C5, C6, C31 (grupo)
<i>Rhododendron molle</i> (Bl.) G. Don.	Ericaceae	Azálea	Paleártico	Caducifólio	5-12	5-6	Nano.	Arbusto	Z7	C6(1), C15(2)
<i>Rhododendron mucronatum</i> G. Don.	Ericaceae	Azálea-japonesa	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z5	C5, C6 (grupo) C10(3), C26(3), C28, C31 (grupo)
<i>Rhododendron ponticum</i> L.	Ericaceae	Rododendro; Loendro	Paleártico	Perenifólio	1-12	11-6	Micro.	Árbusto	Z6	C2(2), C23(2), C29(3), C30 (10), C33(2), C34(2), C40(1)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Leguminosae (Papilionoideae)	Robinia	Neártico	Caducifólio	3-12	3-6	Meso.	Árvore	Z3	C23(1)
<i>Robinia x ambigua</i> Poir.	Leguminosae (Papilionoideae)	Robinia	Hortícola	Caducifólio	3-12	4-5	Micro.	Árvore	Z3	C24(3)
<i>Roldana petasites</i> (Sims) H. Robinson & Bretell.	Compositae	Senécio	Neotropical	Perenifólio	1-12	12-3; 6-8	Micro.	Arbusto	Z9	C40(grupo)
<i>Romulea columnae</i> Seb. & Mauri	Iridaceae		Paleártico	Sazonal	2-6	3-5	Geófita	Herbácea	Z8	C9(grupo)
<i>Rosa banksiae</i> Ait.	Rosaceae	Roseira	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z7	C21(1), C22(1)
<i>Rosa gallica</i> L.	Rosaceae	Roseira	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-8	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z5	C6(1)
<i>Rosa laevigata</i> Micchx.	Rosaceae	Roseira	Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z7	C6(grupo), C8(1), C15(grupo), C21(1), C21A(1), C23(1)
<i>Rosa x damascena</i> Mill. var. <i>semperflorens</i> (Duhamel) Rowley	Rosaceae	Rosa-de-quatro- estações	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z4	C8(5), C10(8), C11(8), C12(8), C13(8), C22(2), C23(1)
<i>Rosmarinus officinalis</i> L.	Labiatae	Alecrim	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z6	C9 (2)
<i>Rumohra adiantiformis</i> (Forst. f.) Ching.	Dryopteridaceae	Feto-real	Áfricotropical; Australiano; Oceânia; Antártico; Neotropical	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z10	C21(grupo)
<i>Salix canariensis</i> C. Sm. ex Link	Salicaceae	Seixo; Seixeiro	Paleártico	Caducifólio	2-12	1-2	Micro.	Árvore	Z11	C24(1)
<i>Salvia broussonetii</i> Benth.	Labiatae	Sálvia	Paleártico	Perenifólio	1-12	10-11	Nano.	Arbusto	Z11	C7(1), C23 (1)
<i>Salvia canariensis</i> L.	Labiatae	Sálvia-das- canárias	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-8	Nano.	Arbusto	Z11	C23 (2)
<i>Salvia coccinea</i> Juss. ex Murray	Labiatae	Sálvia	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Herbácea	Z8	C7, C8, C9 (grupo)
<i>Salvia elegans</i> Vahl.	Labiatae	Sálvia	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Herbácea	Z8	C6(grupo)
<i>Salvia guaranitica</i> St.-Hil. ex Benth.	Labiatae	Sálvia	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z9	C7, C8, C11, C23, C34 (grupo)
<i>Salvia involucrata</i> Cav.	Labiatae	Sálvia	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z9	C22(grupo)
<i>Salvia leucantha</i> Cav.	Labiatae	Sálvia -branca	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z9	C23(grupo)
<i>Salvia microphylla</i> Kunth.	Labiatae	Sálvia; Rapazinhos	Neártico; Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z9	C6, C9, C13, C23, C31(grupo)
<i>Salvia sessei</i> Benth.	Labiatae	Sálvia	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z9	C7(grupo)
<i>Salvia splendens</i> Sell ex Roem. & Scult.	Labiatae	Camarões; Sálvias	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Herbácea	Z10	C23(grupo)
<i>Santolina chamaecyparissus</i> L.	Compositae	Santolina	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-5	Caméfito	Arbusto	Z7	C9(grupo)
<i>Saponaria officinalis</i> L.	Caryophyllaceae	Saponária	Paleártico	Perenifólio	1-12	6-9	Hemi.	Herbácea	Z5	C23(grupo)
<i>Saurauia nepaulensis</i> DC.	Actinidiaceae		Indomalaio	Caducifólio	3-12	4-8	Micro.	Árvore	Z9	C6(1), C12(1), C20(1), C22(1), C24 (1), C30(1)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Scadoxus puniceus</i> (L.) Friis & Nordal.	Amaryllidaceae	Broxas	Áfricotropical	Sazonal	5-10	2-5	Geófita	Herbácea	Z10	C23(grupo)
<i>Schotia brachypetala</i> Sonder.	Leguminosae (Caesalpinioideae)	Scótia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	4-8	Micro.	Árvore	Z9	C21(1), C23(1)
<i>Scilla maderensis</i> Mnzs.	Liliaceae	Cila-da-madeira	Paleártico	Sazonal	10-5	11-2	Geófita	Herbácea	Z11	C6, C8(grupo)
<i>Scilla peruviana</i> L.	Liliaceae	Cila	Paleártico	Sazonal	4-7	4-6	Geófita	Herbácea	Z6	C8,C9, C23(grupo)
<i>Scilla siberica</i> Haw.	Liliaceae	Cila	Paleártico	Sazonal	3-6	3-5	Geófita	Herbácea	Z3	C23 (grupo)
<i>Sedum praealtum</i> A. DC.	Crassulaceae	Ensaio-gigante	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-8	Nano.	Herbácea suculenta	Z9	C9(1)
<i>Semele androgyna</i> (L.) Kunth.	Liliaceae	Alegre-campo	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-5	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	C1, C6, C23, C31, C33, C38(grupo)
<i>Senecio cineraria</i> DC.	Compositae	Senécio	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-8	Nano.	Arbusto	Z8	C9, C11, C19 (grupo)
<i>Senecio serpens</i> G. Rowley	Compositae	Bálsamo-camudo; Bálsamo-de- canudo	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Caméfito	Arbusto suculento	Z9	C9, C23 (grupo)
<i>Senecio tamoides</i> DC.	Compositae	Senécio	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	10-6	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z9	C33(grupo)
<i>Sequoia sempervirens</i> (D. Don) Endl	Cupressaceae	Sequóia	Neártico	Perenifólio	1-12	2-3	Macro.	Árvore	Z8	C1(1), C5(1), C33(1), C34(1)
<i>Sibthoria peregrina</i> L.	Scrophulariaceae	Hera-terrestre; Erva-redonda	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-8	Fane. Trep.	Herbácea trepadora	Z10	C34(grupo)
<i>Sisyrinchium striatum</i> Sm.	Iridaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	5-8	Geófita	Herbácea	Z8	C8(grupo), C11(1)
<i>Solanum jasminoides</i> Paxt.	Solanaceae	Jasmim-bastardo	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z9	C6 (1)
<i>Solanum mauritanum</i> Scop.	Solanaceae	Tabaqueira	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C1(12), C38(14), C40(10)
<i>Solanum wendlandii</i> Hook. f.	Solanaceae	Coração-de- estudante	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-8	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	C23(1)
<i>Sonchus fruticosus</i> L.fil.	Compositae	Leituga; Língua de Vaca; Serralha da Rocha	Paleártico	Perenifólio	1-12	6-8	Nano.	Arbusto	Z10	C20(3)
<i>Sophora japonica</i> L.	Leguminosae (Papilionoideae)	Acácia-do-japão; Sófora-do-japão	Paleártico	Caducifólio	4-12	8-9	Micro.	Árvore	Z5	C14(1), C23(1)
<i>Sparaxis fragrans</i> (Jacq.) Ker-Gawl. ssp. <i>grandiflora</i> (Delaroché) Goldbl.	Iridaceae		Áfricotropical	Sazonal	2-6	3-5	Geófita	Herbácea	Z9	C9(grupo)
<i>Sparmannia africana</i> L. f.	Tiliaceae	Esparmânia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	12-8	Micro.	Arbusto	Z10	C22(3), C23(1)
<i>Spiraea cantoniensis</i> Lour.	Rosaceae	Grinalda-de-noiva	Paleártico	Marcescente	3-2 (11-2)	2-9	Nano.	Arbusto	Z6	C3(2), C40(5)
<i>Sprekelia formosissima</i> (L.) Herb.	Amaryllidaceae	Lírio-dos- aztecas	Neotropical	Sazonal	6-8	6-8	Geófita	Herbácea	Z9	C9 (grupo)
<i>Stenocarpus sinuatus</i> Endl.	Proteaceae	Árvore-da- roda- do-fogo	Australiano	Perenifólio	1-12	9-10	Micro.	Árvore	Z9	C8(1), C32(1)
<i>Stenotaphrum secundatum</i> (Walter) Kuntze	Gramineae	Relva; Relva-de-correr	Neotropical; Áfricotropical; Oceânia	Perenifólio	1-12	3-11	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z9	C2A, C6, C8, C10, C11, C12, C13, C18, C19, C23, C24 (tapete)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Strelitzia nicolai</i> Reg. & Körn.	Strelitziaceae	Estrelícia-gigante	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C23(2)
<i>Strelitzia reginae</i> Banks ex Dryand	Strelitziaceae	Estrelícia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C3(3), C4(3), C6(4), C7(grupo), C8(12), C21(grupo), C31(2)
<i>Streptosolen jamesonii</i> (Benth.) Miers.	Solanaceae	Rapaziada	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z9	C3(1), C6(1), C8(1), C9(1), C14(1), C23(1), C31(1)
<i>Strobilanthes kunthianus</i> T. Anders ex Benth.	Acanthaceae		Indomalaio	Perenifólio	1-12	3-5	Nano.	Arbusto	Z11	C3(1), C4(1), C7(2)
<i>Styrax officinalis</i> L.	Styracaceae		Paleártico	Caducifólio	4-12	5-8	Micro.	Arbusto	Z6	C23(1)
<i>Syncarpia glomulifera</i> (Sm.) Nied.	Myrtaceae	Turpentine	Australiano	Perenifólio	1-12	3-5	Meso.	Árvore	Z9	C12(1), C21A(2)
<i>Syzygium jambos</i> (L.) Alston.	Myrtaceae	Jambeiro	Indomalaio	Perenifólio	1-12	3-7	Micro.	Árvore	Z10	C5(1)
<i>Syzygium oleosum</i> (F. Muell) B. Hyland.	Myrtaceae		Australiano	Perenifólio	1-12	7-11	Micro.	Árvore	Z10	C15(1)
<i>Syzygium paniculatum</i> Gaertn.	Myrtaceae		Australiano	Perenifólio	1-12	8-11	Micro.	Árvore	Z10	C13(3), C14(1)
<i>Tanacetum argenteum</i> (Lam.) Willd.	Compositae		Paleártico	Perenifólio	1-12	4-11	Caméfito	Herbácea	Z5	C21, C23(grupo)
<i>Tanacetum parthenium</i> (L.) Schultz-Bip.	Compositae	Artemija	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-10	Caméfito	Herbácea	Z6	C6, C23(grupo)
<i>Taxus baccata</i> L.	Taxaceae	Teixo	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-4	Micro.	Árvore	Z5	C34(2)
<i>Tecomaria capensis</i> (Thunb.) Spach.	Bignoniaceae	Camarões	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C6, C22, C23 (grupo)
<i>Teline maderensis</i> Webb et Berth. var. <i>maderensis</i>	Leguminosae (Papilionoideae)	Piomo	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-8	Micro.	Arbusto	Z10	C6(1), C15(1), C28A(1)
<i>Telopea speciosissima</i> (Sm.) R. Br.	Proteaceae	Telopea; "Waratah"	Australiano	Perenifólio	1-12	2-5	Nano.	Arbusto	Z9	C6(4), C8(1), C17(2)
<i>Tetradenia riparia</i> (Hochst.) Codd.	Labiatae	Iboza (Moschosma)	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	12-5	Nano.	Arbusto	Z10	C6(2), C7(3), C8(1), C10(2), C11(2), C23(1)
<i>Tetrapanax papyrifer</i> (Hook.) K. Kock.	Araliaceae	Arália-do-papel	Indomalaio	Perenifólio	1-12	8-12	Micro.	Arbusto	Z8	C34(grupo)
<i>Teucrium fruticans</i> L.	Labiatae		Paleártico	Perenifólio	1-12	12-5	Nano.	Arbusto	Z8	C6(1), C8(4), C11(1), C22(2), C23(2)
<i>Thuja plicata</i> D. Don.	Cupressaceae	Tuia	Neártico	Perenifólio	1-12	1-3	Micro.	Árvore	Z6	C30(2)
<i>Thunbergia battiscombei</i> Turill.	Acanthaceae	Tumbérgia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	5-7; 12-1	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z11	C21(1)
<i>Thunbergia grandiflora</i> (Roxb. ex Rottl.) Roxb.	Acanthaceae	Tumbérgia	Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	C21(1), C23(1)
<i>Thunbergia gregorii</i> S. Moore	Acanthaceae	Tumbérgia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z10	C21, C22 (grupo)
<i>Thymus vulgaris</i> L.	Labiatae	Segurelha; Cheiros	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-6	Nano.	Arbusto	Z7	C9 (grupo)
<i>Tibouchina grandifolia</i> Cogn.	Melastomataceae	Aranhas; Tibouchina	Neotropical	Perenifólio	1-12	9-1	Micro.	Arbusto	Z10	C23(2), C31(3)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Tibouchina urvilleana</i> (DC) Cogn.	Melastomataceae	Aranhas	Neotropical	Perenifólio	1-12	9-4	Micro.	Arbusto	Z10	C3(1), C6(4), C8(1)
<i>Tilia cordata</i> Mill.	Tiliaceae	Tília-de-folhas-pequenas	Paleártico	Caducifólio	4-11	5-6	Micro.	Árvore	Z3	C6(1)
<i>Tilia tomentosa</i> Moench.	Tiliaceae	Tília-prateada	Paleártico	Caducifólio	4-11	5-7	Meso.	Árvore	Z6	C6(1)
<i>Tillandsia lindenii</i> Reg.	Bromeliaceae	Tilandsia	Neotropical	Perenifólio	1-12	11-4	Hemi.	Herbácea	Z10	C8(1)
<i>Tillandsia tenuifolia</i> L.	Bromeliaceae	Erva-da-fortuna; Planta-do-ar	Neotropical	Perenifólio	1-12	3-6	Epífita	Herbácea	Z9	C5 (2)
<i>Tithonia diversifolia</i> (Hemsl.) A. Gray.	Compositae	Girassol-mexicano	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z9	C8(2), C22(1)
<i>Trachelospermum jasminoides</i> (Lindl.) Lem.	Apocynaceae	Jasmim-de-estrela	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-11	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z8	C6(1), C21(1), C24(1), C31(1)
<i>Trachycarpus fortunei</i> (Hook.) H. A. Wendl.	Palmae	Palmeira-de-moinho-de-vento	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-6	Micro.	Árvore	Z8	C6(1)
<i>Tradescantia cerinthoides</i> Kunth.	Commelinaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	2-10	Hemi.	Herbácea trepadora	Z7	C4(2), C8, C9 (grupo)
<i>Tritonia crocata</i> (L.) Ker-Gaul.	Iridaceae	Palhinhas-vermelhas	Áfricotropical	Sazonal	2-6	3-5	Geófito	Herbácea	Z9	C5, C9, C16 (grupo)
<i>Trochetopsis ebenus</i> Q.C.B. Cronk	Sterculiaceae	Ébano-de-santa-helena	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	10-3	Nano.	Arbusto	Z10	C23(1)
<i>Tropaeolum majus</i> L.	Tropaeolaceae	Chagas	Neotropical	Sazonal	1-10	2-9	Terófito	Herbácea	Z8	C24 (grupo)
<i>Tulbaghia fragrans</i> L.	Liliaceae (Alliaceae)	Tulbáguia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	11-8	Geófito	Herbácea	Z8	C7, C8, C9, C10, C11, C12, C23 (grupo)
<i>Umbilicus rupestris</i> (Salisb.) Dandy	Crassulaceae	Inhame-de-lagartixa	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-6	Hemi.	Herbácea	Z7	C38, C34 (grupo)
<i>Veltheimia bracteata</i> Bak.	Liliaceae (Hyacinthaceae)	Velteimia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	12-4	Geófito	Herbácea	Z9	C21(1)
<i>Verbena bonariensis</i> L.	Verbenaceae	Jarvão; Urgebão	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-12	Nano.	Herbácea	Z7	C9 (grupo)
<i>Verbena peruviana</i> (L.) Britt.	Verbenaceae	Verbena	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-9	Caméfito	Herbácea	Z9	C7, C9, C14, C20, C23 (grupo)
<i>Verbena rigida</i> Spreng.	Verbenaceae	Verbena-rija	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-9	Caméfito	Herbácea	Z8	C6(grupo)
<i>Viburnum opulus</i> L.	Caprifoliaceae	Viburno	Paleártico	Caducifólio	4-11	4-8	Micro.	Arbusto	Z3	C21(1), C23(1)
<i>Viburnum tinus</i> L.	Caprifoliaceae	Viburno	Paleártico	Perenifólio	1-12	11-3; 7-8	Micro.	Arbusto	Z7	C6(1), C15(3)
<i>Vicia sativa</i> L.	Leguminosae (Papilionoideae)	Ervilhaca	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-6	Terófito	Herbácea trepadora	Z6	C17(grupo)
<i>Vicia sepium</i> L.	Leguminosae (Papilionoideae)	Ervilhaca-brava	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-6	Terófito	Herbácea trepadora	Z6	C9, C20(grupo)
<i>Vinca major</i> L.	Apocynaceae	Pervinca	Paleártico	Perenifólio	1-12	2-8	Hemi.	Herbácea trepadora	Z7	C34, C37(grupo)
<i>Viola riviniana</i> Rchb.	Violaceae	Violeta	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z5	C9, C23, C43 (grupo)
<i>Viola x witrockiana</i> Gams.	Violaceae	Amores-perfeitos	Hortícola	Perenifólio	1-12	3-8	Hemi.	Herbácea	Z5	C8, C23 (grupo)
<i>Vitex agnus-castus</i> L.	Verbenaceae	Árvore-da-castidade	Paleártico	Caducifólio	5-12	7-11	Micro.	Arbusto	Z7	C6(1), C23(3)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Wachendorfia thyrsiflora</i> Burm.	Haemodoraceae		Áfricotropical	Perenifólio	1-12	5-6	Geófito	Herbácea	Z10	C22(1), C23 (3)
<i>Washingtonia robusta</i> Wendl.	Palmae	Palmeira-de-leque-mexicana	Neártico	Perenifólio	1-12	4-6	Micro.	Árvore	Z10	C17(1)
<i>Watsonia borbonica</i> (Pourr.) Goldbl.	Iridaceae		Áfricotropical	Perenifólio	1-12	3-7	Geófito	Herbácea	Z10	C9, C21, C22 (grupo)
<i>Watsonia borbonica</i> (Pourr.) Goldbl. ssp. <i>ardemei</i> (Sander) Goldbl.	Iridaceae		Áfricotropical	Perenifólio	1-12	3-7	Geófito	Herbácea	Z10	C22 (grupo)
<i>Watsonia tabularis</i> Mathews & L. Bol.	Iridaceae		Áfricotropical	Perenifólio	1-12	3-7	Geófito	Herbácea	Z10	C6(1), C22(grupo)
<i>Weigela florida</i> (Bunge) A. D.C.	Caprifoliaceae	Pessegueiro-de-jardim; Veigela	Paleártico	Caducifólio	3-12	4-7	Micro.	Arbusto	Z5	C5(1), C23(1)
<i>Wigandia caracasana</i> HBK.	Hydrophyllaceae	Vigândia	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-5	Micro.	Arbusto	Z10	C10(2)
<i>Wisteria floribunda</i> (Willd.) DC	Leguminosae (Papilionoideae)	Glicínia-do-japão	Paleártico	Caducifólio	2-11	3-6	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z5	C6(1), C13(1)
<i>Wisteria sinensis</i> (Sims) Sweet.	Leguminosae (Papilionoideae)	Lilases; Glicínia	Paleártico	Caducifólio	2-11	2-5; 7-8	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z5	C4(1), C6(4), C21(3), C23(1), C31(2)
<i>Woodwardia radicans</i> (L.) Sm.	Blechnaceae	Feto-de-botão	Paleártico	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z8	C34(grupo)
<i>Xanthorrhoea quadrangulata</i> F. Muell.	Liliaceae (Xanthorrhoeaceae)	Árvore-relva (Grass tree)	Australiano	Perenifólio	1-12	2-5	Nano.	Árvore	Z9	C11(1), C21A(1)
<i>Yucca gloriosa</i> L.	Agavaceae	luca	Neártico	Perenifólio	1-12	6-11	Micro.	Arbusto	Z7	C5(3), C6(1), C10(1), C21A(1), C40(3)
<i>Zantedeschia aethiopica</i> (L.) Spreng.	Araceae	Jarros	Áfricotropical	Sazonal	10-7	11-5	Geófito	Herbácea	Z8	C1, C33, C34, C38, C40 (grupo)
<i>Zinnia elegans</i> Jacq.	Compositae	Zinia	Neotropical	Sazonal	6-10	7-8	Terófito	Herbácea	Z8	C9, C23(grupo)

Legenda:

- Plantas que não floriram no período em estudo (Janeiro 2002 – Janeiro 2005): * plantas novas; ** plantas que nunca floriram por falta de aclimação;
- Plantas marcescentes (plantas semiperenifólias e semicaducifólias): 3-2 (**3-4**) – folhas todo o ano mas com renovação significativa em Março e Abril.

Anexo 19
CARACTERIZAÇÃO FITOGEOGRÁFICA DA QUINTA MONTE PALACE

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Abelia x grandiflora</i> (André) Rehd.	Caprifoliaceae	Abélia	Hortícola	Perenifólio	1-12	4-8	Nano.	Arbusto	Z5	C36(3), C37(6), C54(2), C61(6)
<i>Abutilon megapotamicum</i> (Spreng.) St.-Hil. & Naudin.	Malvaceae	Abutilão; Lanternas	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z9	C66(7)
<i>Acacia melanoxylon</i> R. Br.	Leguminosae (Mimosoideae)	Acácia-austrália	Australiano	Perenifólio	1-12	1-4	Meso.	Árvore	Z8	C14(3), C15(10)
<i>Acca sellowiana</i> (O. Berg.) Burret	Myrtaceae	Goiabeira-ananás	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-7	Micro.	Árvore	Z8	C38(2)
<i>Acer palmatum</i> Thunb.	Aceraceae	Acer-do-japão	Paleártico	Caducifólio	4-11	4	Micro.	Árvore	Z5	C39(4)
<i>Acoelorrhaphe wrightii</i> (Griseb. & H. A. Wendl.) H. A. Wendl. ex Becc.	Palmae	Palmeira-de-serra	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-5	Micro.	Árvore	Z10	C4(1), C9(1), C56(2), C58(1)
<i>Acorus gramineus</i> Ait.	Araceae (Acoraceae)	Ácoro	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-8	Helófita	Herbácea	Z5	C60(grupo)
<i>Adiantum aneitense</i> Carr.	Adiantaceae	Feto	Oceânia	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z10	C6, C12, C12A (grupo)
<i>Adiantum capillus-veneris</i> L.	Adiantaceae	Avenca	Paleártico, Neotropical, Áfricotropical, Indomalaio	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z8	C20, C21, C23, C23A, C32, C33, C33A, C34, C50, C53, C55, C61
<i>Adiantum formosum</i> R. Br.	Adiantaceae	Avenca-formosa	Australiano; Antártico	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z9	C6, C12, C16(grupo)
<i>Adiantum hispidulum</i> Swartz	Adiantaceae	Feto-pata-de-galinha	Paleártico, Áfricotropical, Indomalaio, Oceânia, Australiano, Antártico	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z10	C1, C12A, C20, C23, C23A, C29, C50, C53 (grupo)
<i>Adiantum radianum</i> C. Presl.	Adiantaceae	Avenca	Neotropical	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z10	C12, C12A, C50, C52 (grupo)
<i>Adiantum reniforme</i> L. var. <i>reniforme</i>	Adiantaceae	Feto-redondo; Feto-de-rim	Paleártico	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z10	C1 (grupo)
<i>Aeonium glutinosum</i> (Aiton.) Webb. & Berthel.	Crassulaceae	Farrobo; Ensaíão	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-8	Nano.	Herbácea suculenta	Z10	C1 (grupo)
<i>Agapanthus praecox</i> Willd. ssp. <i>orientalis</i> (Leighton) Leighton	Liliaceae	Agapantos; Coroas-de-henrique	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	4-9	Hemi.	Herbácea	Z9	C20, C21, C22, C23A, C40 (mancha)
<i>Agathis robusta</i> (C. Moore ex. F. Muell.) Bail.	Araucariaceae	Pinheiro-de-damara; Pinheiro-com-folha-de-alegre-campo	Australiano	Perenifólio	1-12	3-4	Meso.	Árvore	Z9	C5(1), C37(2)
<i>Agave angustifolia</i> Haw.	Agavaceae	Agave	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-8	Nano.	Árvore suculenta	Z9	C37(2)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Ageratina adenophora</i> (Spreng.) R. King. & H. Robinson	Compositae	Abundância	Neotropical	Perenifólio	1-12	3-7	Nano.	Herbácea	Z10	C1, C34(grupo)
<i>Ageratina riparia</i> (Reg.) R. King. & H. Robinson	Compositae	Falsa- abundância	Neotropical	Perenifólio	1-12	2-6	Nano.	Herbácea	Z10	C1,C30(grupo)
<i>Ajuga reptans</i> L.	Labiatae	Erva-férrea	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z6	C30(grupo)
<i>Allium giganteum</i> Reg.	Liliaceae (Alliaceae)	Alho-gigante	Paleártico	Sazonal	3-6	4-7	Geófita	Herbácea	Z6	C50, C55(grupo)
<i>Allium triquetrum</i> L.	Liliaceae (Alliaceae)	Alhinho; Alho-bravo	Paleártico	Sazonal	12-4	12-4	Geófita	Herbácea	Z8	C27, C31, C32, C54, C55, C61 (grupo)
<i>Aloe arborescens</i> Mill.	Liliaceae	Babosas	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	11-2	Nano.	Arbusto suculento	Z9	C37, C59 (grupo)
<i>Aloe vera</i> (L.) Burm.	Liliaceae	Aloé-vera; Babosas	Paleártico; Neotropical	Perenifólio	1-12	11-6	Hemi.	Herbácea suculenta	Z8	C37(grupo)
<i>Aloysia triphylla</i> (L'Hérit.) Britt.	Verbenaceae	Pessegueiro- inglês; Verbena-de- limão	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-10	Nano.	Arbusto	Z8	C50(1), C54(1), C61(1)
<i>Amaryllis belladonna</i> L.	Amaryllidaceae	Açucenas-da- serra; Belas-donas	Áfricotropical	Sazonal	5-7	8-11	Geófita	Herbácea	Z8	C20, C21, C22, C33 (grupo)
<i>Anemia dregeana</i> Kunze	Schizaeaceae		Áfricotropical	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z10	C23A(grupo)
<i>Anemone hupehensis</i> Lem.	Ranunculaceae	Anémoma	Paleártico	Perenifólio	1-12	8-12	Hemi.	Herbácea	Z6	C37, C66(grupo)
<i>Angiopteris evecta</i> (Forst.) Hoffm.	Marattiaceae	Feto-craca	Indomalaio; Australiano	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z10	C12(2)
<i>Antirrhinum majus</i> L.	Scrophulariaceae	Bocas-de-peixe; Boca-de-lobo	Paleártico	Sazonal	3-10	3-10	Terófita	Herbácea	Z7	C55(grupo)
<i>Apollonias barbujana</i> (Cav.) Bomm.	Lauraceae	Barbusano	Paleártico	Perenifólio	1-12	9-3	Meso.	Árvore	Z10	C1(12), C33(1), C39(1)
<i>Aponogeton distachyos</i> L. f.	Aponogetonaceae		Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hidrófita	Herbácea	Z9	C16, C60 (grupo)
<i>Aquilegia alpina</i> L.	Ranunculaceae	Aquilégia	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-8	Hemi.	Herbácea	Z5	C10, C42, C51, C54, C55 (grupo)
<i>Araucaria bidwillii</i> Hook. f.	Araucariaceae	Araucária-de- bidwill	Australiano	Perenifólio	1-12	2-3	Meso.	Árvore	Z9	C37(1)
<i>Araucaria heterophylla</i> (Salisb.) Franco	Araucariaceae	Araucária	Oceânia	Perenifólio	1-12	2-3	Macro.	Árvore	Z9	C50(1), C58(2)
<i>Arbutus unedo</i> L.	Ericaceae	Medronheiro	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Árvore	Z7	C33(1), C37(1)
<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> H. A. Wendl. & Drude.	Palmae	Palmeira- elegante	Australiano	Perenifólio	1-12	2-10	Meso.	Árvore	Z10	C2(5), C9(6), C47(1), C54(38), C55(52), C58(5), C59(10), C62(1), C66(5)
<i>Arctotis x hybrida</i> hort.	Compositae	Arctótis; Margarida- africana	Hortícola	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z9	C33A, C34, C47A, C54 (grupo)
<i>Areca catechu</i> L.	Palmae	Palmeira-do-bétel	Indomalaio	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Micro.	Árvore	Z11	C46(1)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Argyranthemum pinnatifidum</i> (L. f.) Lowe ssp. <i>pinnatifidum</i>	Compositae	Estrelas; Pampilhos; Malmequeres	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C1(>50)
<i>Arum italicum</i> Mill. ssp. <i>canariense</i> (Webb & Berthel.) P. C. Boyce	Araceae	Bigalhó	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-5	Geófito	Herbácea	Z10	C9(grupo), C29(8), C30(6), C55(>50)
<i>Asclepias fruticosa</i> L.	Asclepiadaceae	Planta-da-seda	Áfrotropical	Perenifólio	1-12	5-11	Nano.	Arbusto	Z8	C55(3)
<i>Asparagus densiflorus</i> (Kunth) Jassop	Liliaceae (Asparagaceae)	Esparto	Áfrotropical	Perenifólio	1-12	7-8	Nano.	Herbácea	Z9	C37, C60(grupo)
<i>Asparagus macowanii</i> Baker	Liliaceae (Asparagaceae)	Esparto	Áfrotropical	Perenifólio	1-12	6-8	Nano.	Arbusto	Z10	C60(grupo)
<i>Asparagus setaceus</i> (Kunth) Jassop	Liliaceae (Asparagaceae)	Esparto-de-folha- miúda; Esparto	Áfrotropical	Perenifólio	1-12	9-12	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z9	C37 (grupo)
<i>Asplenium anceps</i> Lowe ex Hook. & Grev.	Aspleniaceae	Falsa-avenca	Paleártico	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z10	C1(grupo)
<i>Astilboides tabularis</i> (Hemsl.) Engl.	Saxifragaceae		Paleártico	Perenifólio	1-12	5-8	Hemi.	Herbácea	Z7	C12A, C60(grupo)
<i>Athyrium filix-femina</i> (L.) Roth.	Woodsiaceae	Feto-de-senhora	Paleártico; Neártico	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z5	C12A(grupo)
<i>Aucuba japonica</i> Thunb.	Comaceae (Aucubaceae)	Aucuba	Paleártico; Indomalaio	Perenifólio	1-12	2-4	Micro.	Arbusto	Z7	C55(1)
<i>Babiana rubrocyanea</i> (Jacq.) Ker-Gawl	Iridaceae	Babiana	Áfrotropical	Perenifólio	1-12	1-5	Geófito	Herbácea	Z9	C50(grupo)
<i>Baeckea virgata</i> (Forst. & Forst. f.) Andrews.	Myrtaceae	Urze-miúda	Australiano	Perenifólio	1-12	6-8	Nano.	Arbusto	Z9	C3(2), C36(1), C51(1), C55(2)
<i>Begonia bowerae</i> Ziesenh.	Begoniaceae	Corações; Begónia	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-9	Caméfito	Herbácea	Z10	C12(grupo)
<i>Begonia maculata</i> Raddi	Begoniaceae	Corações; Begónia	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-9	Nano.	Herbácea	Z10	C12 (grupo)
<i>Begonia manicata</i> Brongn. ex Cels.	Begoniaceae	Corações; Begónia	Neotropical	Perenifólio	1-12	2-11	Hemi.	Herbácea	Z10	C12, C35(grupo)
<i>Begonia minor</i> Jacq.	Begoniaceae	Corações; Begónia- sempre- em-flor	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C53 (grupo)
<i>Begonia serratifolia</i> Lmsch.	Begoniaceae	Begónia	Oceânia	Perenifólio	1-12	3-8	Nano.	Herbácea	Z10	C8(10), C10(4), C50(grupo)
<i>Begonia x ricinifolia</i> A. Dietr.	Begoniaceae	Corações; Begónias	Hortícola	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C2, C8, C50, C53, C54 (grupo)
<i>Bencomia caudata</i> (Aiton.) Webb & Berthel.	Rosaceae	Bencómia	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-4	Micro.	Arbusto	Z10	C1(5)
<i>Bergenia crassifolia</i> (L.) Fritsch.	Saxifragaceae	Bergénia; Couve-de-jardim	Paleártico	Perenifólio	1-12	11-4	Caméfito	Herbácea	Z3	C25, C44 (grupo)
<i>Betula pendula</i> Roth.	Betulaceae	Bétula; Vidoeiro-branco	Paleártico	Caducifólio	4-11	3-4	Micro.	Árvore	Z2	C30(12), C31(1), C32(1), C55(10), C58(10)
<i>Billbergia nutans</i> H. Wendl. ex Reg.	Bromeliaceae	Bromélia	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-7	Hemi.	Herbácea	Z10	C59(grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Billbergia zebrina</i> (Herb.) Lindl.	Bromeliaceae	Bromélia	Neotropical	Perenifólio	1-12	12-1	Hemi.	Herbácea	Z10	C55(grupo)
<i>Blechnum gibbum</i> (Labill.) Mett.	Blechnaceae	Feto	Oceânia	Perenifólio	1-12	-----	Nano.	Arbusto	Z10	C12(2)
<i>Blechnum spicant</i> (L.) Roth.	Blechnaceae	Feto-de-pente	Paleártico; Neártico	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z4	C1(grupo)
<i>Bougainvillea glabra</i> Choisy	Nyctaginaceae	Buganvília	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	C49(1), C60(1)
<i>Brachychiton acerifolius</i> Cunn. ex. F. Muell.	Sterculiaceae	Árvore-do fogo	Australiano	Caducifólio	1-5; 8-12	5-8	Micro.	Árvore	Z10	C54(1), C55(3)
<i>Brugmansia aurea</i> Lagerh.	Solanaceae	Trombeteira	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C5(3)
<i>Brugmansia x candida</i> Pers.	Solanaceae	Trombeteira; Belas-noites	Hortícola	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C62(1)
<i>Brunfelsia pauciflora</i> (Cham. & Scltd.) Benth.	Solanaceae	Brunfelsia; Manacá	Neotropical	Perenifólio	1-12	2-10	Micro.	Arbusto	Z10	C10(1), C36(2), C65(2)
<i>Bulbine latifolia</i> (L.f.) Haw	Liliaceae (Asphodelaceae)	Bulbine	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-6	Geófita	Herbácea suculenta	Z9	C7(3)
<i>Butia capitata</i> (Mart.) Becc.	Palmae	Palmeira-da- geleia	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-8	Micro.	Árvore	Z10	C58(8)
<i>Buxus microphylla</i> Sieb. & Zucc.	Buxaceae	Buxo	Paleártico; Indomalaio	Perenifólio	1-12	3-4	Nano.	Arbusto	Z6	C35 (8), C37(1), C56(grupo)
<i>Buxus sempervirens</i> L.	Buxaceae	Buxo-comum	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-4; 10-11	Nano.	Arbusto	Z5	C22, C28, C29, C30, C31, C32, C33, C34, C40, C41 (bord.)
<i>Buxus sempervirens</i> L. var. <i>arborescens</i>	Buxaceae	Buxo-comum	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-4	Micro.	Abusto	Z5	C20(1), C33A(1)
<i>Calendula officinalis</i> L.	Compositae	Calendula	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Terófita	Herbácea	Z6	C55 (grupo)
<i>Callistemon citrinus</i> (Curtis) Skeels	Myrtaceae	Martinete	Australiano	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z8	C22(2), C49(1)
<i>Callistemon rigidus</i> R. Br.	Myrtaceae	Martinete	Australiano	Perenifólio	1-12	4-8	Micro.	Arbusto	Z9	C38(1), C54(2)
<i>Callistephus chinensis</i> (L.) Nees.	Compositae	Não-me-deixes	Paleártico	Sazonal	3-12	4-12	Terófita	Herbácea	Z6	C50, C52, C53, C55(manha)
<i>Callitriche palustris</i> L.	Callitrichaceae	Estrela-de-água	Neártico	Perenifólio	1-12	7-8	Hidrófita	Herbácea	Z8	C12(manha)
<i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull.	Ericaceae	Caluna	Paleártico; Neártico	Perenifólio	1-2	6-10	Nano.	Arbusto	Z4	C29, C30, C31, C33, C35, C36, C55 (grupo)
<i>Calycanthus floridus</i> L.	Calycanthaceae	Carocha (Carolina Allspice)	Neártico	Caducifólio	3-11	3-7	Micro.	Arbusto	Z6	C50(1)
<i>Camellia japonica</i> L.	Theaceae	Camélia; Japoneira	Paleártico	Perenifólio	1-12	11-6	Micro.	Árvore	Z8	C2(3), C20(8), C28(5), C39(2), C42(1), C47(1), C48(1), C49(1), C51(1), C58(1), C61(1), C62(4), C63(3)
<i>Canna indica</i> L.	Cannaceae	Cana-da-índia; Bananeira-de-flor	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Geófita	Herbácea	Z9	C60(grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Carduus squarrosus</i> (DC.) Lowe	Compositae	Cardo-branco	Paleártico	Sazonal	4-9	6-8	Terófito	Herbácea	Z10	C1(grupo)
<i>Carex oshimensis</i> Nak.	Cyperaceae		Paleártico	Perenifólio	1-12	7-9	Hemi.	Herbácea	Z8	C12, C12A (grupo)
<i>Carlina salicifolia</i> (L.f.) Cav.	Compositae	Cardo-branco; Carlina	Paleártico	Perenifólio	1-12	6-8	Nano.	Arbusto	Z10	C1(1)
<i>Casuarina equisetifolia</i> Forst. & Forst. f.	Casuarinaceae	Casuarina	Indomalaio; Australiano; Oceânia	Perenifólio	1-12	6-11	Meso.	Árvore	Z10	C20(1)
<i>Cedronella canariensis</i> (L.) W. & B.	Labiatae	Hortelã-de- cabra; Hortelã-de- burro	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-8	Nano.	Herbácea	Z10	C1, C53 (grupo)
<i>Cedrus deodara</i> (D. Don) G. Don.	Pinaceae	Cedro-deodara; Cedro-dos- himalaia	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-5	Meso.	Árvore	Z7	C33(1)
<i>Cedrus libani</i> A. Rich. ssp. <i>atlantica</i> (Endl.) Battand. & Trabut	Pinaceae	Cedro-do-atlas	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-5	Meso.	Árvore	Z9	C29(1), C30(1), C35(1), C55(1)
<i>Cercis siliquastrum</i> L.	Leguminosae (Papilionoideae)	Olaia; Árvore-de- judas	Paleártico	Caducifólio	4-11	10-5	Micro.	Árvore	Z7	C59(3)
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> (Murray) Parl.	Cupressaceae	Cedro-de- oregão	Neártico	Perenifólio	1-12	1-2	Micro.	Árvore	Z6	C20(1), C21(2), C22(1), C23(3), C23A(1), C28(2), C29(4), C30(9), C31(6), C32(6), C33(14), C37(2), C41(2)
<i>Chamaecyparis nootkatensis</i> (D. Don) Spach.	Cupressaceae	Cedro	Neártico	Perenifólio	1-12	2-3	Meso.	Árvore	Z4	C6A(1), C7(1), C8(1), C9(2), C10(1)
<i>Chamaecyparis obtusa</i> (Sieb. & Zucc.) Endl.	Cupressaceae	Cedro-anão	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-2	Micro.	Árvore	Z6	C6(3), C9(4), C30(2), C53(1)
<i>Chamaedorea elegans</i> Mart.	Palmae	Palmeira-de- salão; Palmeira-bambu	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-6	Micro.	Arbusto	Z10	C37(grupo), C47(1)
<i>Chamaedorea erumpens</i> H. E. Moore.	Palmae	Palmeira- bambu	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-6	Micro.	Arbusto	Z10	C12A(1)
<i>Chamaerops humilis</i> L.	Palmae	Palmeira-das- vassouras	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-5	Micro.	Arbusto	Z9	C9(1), C57(1), C58(1)
<i>Chambeyronia macrocarpa</i> (Brongn.) Vieill. ex Becc.	Palmae	Palmeira-rubra	Oceânia	Perenifólio	1-12	1-2	Micro.	Árvore	Z10	C58(2)
<i>Chamelaucium uncinatum</i> Schauer.	Myrtaceae	Flor-de-cera	Australiano	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C54(5)
<i>Chasmanthe aethiopica</i> (L.) N. E. Br.	Iridaceae	Antoliza	Áfrotropical	Perenifólio	1-12	11-3	Geófito	Herbácea	Z9	C49 (grupo)
<i>Chlorophytum comosum</i> (Thumb.) Jacques	Liliaceae (Anthericaceae)	Fitinhas	Áfrotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z9	C12, C12A, C66 (grupo)
<i>Choisya ternata</i> HBK.	Rutaceae	Laranjeira-do- mexico	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z7	C47(1), C47A(2), C51(1)
<i>Christella dentata</i> (Forssk.) Brownsey & Jermy	Thelypteridaceae	Feto	Áfrotropical; Indomalaio	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z10	C28, C33 (grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitoceográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Chrysalidocarpus lutescens</i> (Bory) Wendl.	Palmae	Palmeira- amarela; Palmeira- borboleta	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	6-7	Micro.	Arbusto	Z10	C22(2), C58(1)
<i>Cistus salvifolius</i> L.	Cistaceae	Esteva; Saganzo	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-7	Nano.	Arbusto	Z8	C1(grupo)
<i>Citrus limon</i> (L.) Burm.	Rutaceae	Limoeiro	Paleártico	Perenifólio	1-12	11-4	Micro.	Árvore	Z9	C55(1)
<i>Citrus sinensis</i> (L.) Osbeck	Rutaceae	Laranjeira	Paleártico	Perenifólio	1-12	2-4	Micro.	Árvore	Z9	C50(1), C60(1)
<i>Clematis aristata</i> R. Br.	Ranunculaceae	Clematite-da- austrália	Australiano	Perenifólio	1-12	6-9	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z8	C49(2)
<i>Clethra arborea</i> Ait.	Clethraceae	Folhado	Paleártico	Perenifólio	1-12	7-10	Micro.	Árvore	Z10	C1(67), C10(2), C58(1)
<i>Clivia miniata</i> Regel	Amaryllidaceae	Clívia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	2-11	Hemi.	Herbácea	Z10	C5, C22, C60 (grupo)
<i>Clivia nobilis</i> Lindl.	Amaryllidaceae	Clívia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	2-11	Hemi.	Herbácea	Z10	C22 (grupo)
<i>Coelogyne cristata</i> Lindl.	Orchidaceae	Orquídea	Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-4	Epífita	Herbácea	Z10	C18(grupo)
<i>Commelina benghalensis</i> L.	Commelinaceae	Erva-menina; Flor-dum-dia	Indomalaio Áfricotropical;	Perenifólio	1-12	3-9	Hemi.	Herbácea trepadora	Z9	C1, C37, C52, C55 (grupo)
<i>Cordylone australis</i> (Forst.) Endl.	Agavaceae	Cordilina	Antártico	Perenifólio	1-12	4-7	Micro.	Árvore	Z9	C38(7), C61(1), C62(1), C64(2)
<i>Cordylone indivisa</i> (Forst.) Steud.	Agavaceae	Cordilina	Antártico	Perenifólio	1-12	3-6	Micro.	Árvore	Z9	C7(1), C8(22),
<i>Cordylone stricta</i> (Sims) Endl.	Agavaceae	Cordilina	Australiano	Perenifólio	1-12	1-10	Nano.	Arbusto	Z10	C10, C15 (grupo)
<i>Cordylone terminalis</i> (L.) Kunth.	Agavaceae	Árvore-dos-reis	Indomalaio; Australiano; Oceânia; Antártico	Perenifólio	1-12	11-5	Micro.	Arbusto	Z10	C42(1), C50(4), C51(3), C54 (2)
<i>Comus sanguinea</i> L.	Comaceae		Paleártico	Caducifólio	4-12	5-8	Micro.	Arbusto	Z5	C55(1)
<i>Corylus avellana</i> L.	Betulaceae (Corylaceae)		Paleártico	Caducifólio	4-12	3-4	Micro.	Árvore	Z4	C51(1)
<i>Corynocarpus laevigatus</i> Forst. & Forst. f.	Corynocarpaceae	Loureiro-da-nova- zelândia	Antártico	Perenifólio	1-12	2-5	Micro.	Árvore	Z10	C37(1)
<i>Cotyledon macrantha</i> De Smet.	Crassulaceae	Orelhas-de-porco	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	12-4	Caméfito	Arbusto suculento	Z10	C37(grupo)
<i>Crassula multicava</i> Lem.	Crassulaceae	Crássula	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea suculenta	Z10	C50(grupo)
<i>Crassula ovata</i> (Mill.) Druce.	Crassulaceae	Ensaio-branco ; Planta-de-jade	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	11-3	Nano.	Arbusto suculento	Z10	C50(1)
<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	Rosaceae	Piriteiro	Paleártico	Caducifólio	3-11	4-5	Micro.	Árvore	Z5	C23A(1), C42(1)
<i>Crinum moorei</i> Hook. f.	Amaryllidaceae	Crino	Áfricotropical	Sazonal	11-9	4-8	Geófito	Herbácea	Z8	C5, C8, C21, C27, C58 (grupo)
<i>Crocossia x crocosmiflora</i> (Burb. & Dean) N.E. Br.	Iridaceae	Monbrécias; Hastes-de-são- josé	Hortícola	Perenifólio	1-12	5-9	Geófito	Herbácea	Z7	C5, C10, C33, C41, C60 (grupo)
<i>Cryptomeria japonica</i> (L.f.) Don	Taxodiaceae	Criptoméria	Paleártico	Perenifólio	1-12	12-3	Meso.	Árvore	Z7	C2(1), C5(2), C8A(1), C22(2), C55(2)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Ctenanthe oppenheimiana</i> (C. J. Morren) K. Schum.	Marantaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	4-8	Hemi.	Herbácea	Z10	C12(grupo)
<i>Ctenanthe setosa</i> (Roscoe) Eichl.	Marantaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	3-7	Hemi.	Herbácea	Z10	C12, C12A (grupo)
<i>Culcita macrocarpa</i> C. Presl.	Dicksoniaceae	Feto-abrum; Feto-cabelinho	Paleártico	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z9	C10(2), C12(5), C12A(1)
<i>Cupressus arizonica</i> Green.	Cupressaceae	Cedro-do-arizona	Neártico	Perenifólio	1-12	11-1	Micro.	Árvore	Z7	E30(1)
<i>Cupressus lusitanica</i> Mill.	Cupressaceae	Cedro-de-goá; Cedro-das- barracas	Neártico; Neotropical	Perenifólio	1-12	1-3	Meso.	Árvore	Z9	C5(1), C8(1), C35(1), C52(2), C55(1), C59(1)
<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartw. ex Gordon	Cupressaceae	Cipreste-de- monterrey; Cedro-de- monterrey	Neártico	Perenifólio	1-12	1-2	Meso.	Árvore	Z8	C5(2), C30(1), C36(3), C55(8)
<i>Cupressus sempervirens</i> L.	Cupressaceae	Cipreste	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-2	Micro.	Árvore	Z8	C19(2), C20(1), C23(4), C28(5), C29(3), C30(2), C31(3), C32(2), C36(5), C37(3), C40(3), C41(1), C48(4), C54(1), C55(1)
<i>Cyathea australis</i> (R. Br.) Domin	Cyatheaceae	Feto-arbóreo	Australiano	Perenifólio	1-12	-----	Micro.	Árvore	Z9	C5(>100), C7(12), C10(>100), C11(>50), C37(12), C52(2), C60(12)
<i>Cyathea cooperi</i> (F. Mueller) Domin.	Cyatheaceae	Feto-arbóreo	Australiano	Perenifólio	1-12	-----	Micro.	Árvore	Z10	C12A(67), C20(20), C21(34), C22(73), C23(12), C23A(10), C28(8), C29(14), C30(18), C31(5), C32(6), C33(22), C33A(6), C36(2), C52(4), C54(>100), C60(14)
<i>Cyathea leichhardtiana</i> (F. Muell.)	Cyatheaceae	Feto-arbóreo	Australiano	Perenifólio	1-12	-----	Micro.	Árvore	Z9	C42(1)
<i>Cyathea medularis</i> (Forst. f.) Sw.	Cyatheaceae	Feto-arbóreo- negro	Australiano; Oceânia; Antártico	Perenifólio	1-12	-----	Micro.	Árvore	Z9	C37(1)
<i>Cycas revoluta</i> Thunb.	Cycadaceae	Cicas-revoluta; Cicas-de-sagú	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-8	Micro.	Árvore	Z9	C2(101), C6(5), C12(65), C13(95), C14(224), C15(50), C21(163), C22(2), C34(2), C35(3), C36(3), C38(5), C39(27), C41(12), C43(2), C45(8), C46(3), C47(22), C48(17), C53 (67), C54(43), C55(2), C60(15), C66(3)
<i>Cycas thouarsii</i> R. Br. ex Gaudich	Cycadaceae	Cicas	Indomalaio; Áfricotropical	Perenifólio	1-12	4-8	Micro.	Árvore	Z10	C39(1), C66(2)
<i>Cymbalaria muralis</i> P. Gaertn., Mey. & Scherb.	Scrophulariaceae	Perpétua-de-roma	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-10	Hemi.	Herbácea	Z3	C1, C20, C30, C32 (grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Cymbidium insigne</i> Rolfe	Orchidaceae	Orquídea-de-haste; Cimbidio	Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-6	Hemi.	Herbácea	Z9	C50(>100), C51(>200)
<i>Cyperus involucratus</i> Rottb.	Cyperaceae		Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C18, C60 (grupo)
<i>Cyperus papyrus</i> L.	Cyperaceae	Papiros	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C60, C65 (grupo)
<i>Cyphomandra crassicaulis</i> (Ortega) Kuntze	Solanaceae	Tomateiro-arbóreo; Tomateiro-inglês	Áfricotropical; Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C5(1)
<i>Cyrtomium falcatum</i> (L.f.) Presl.	Dryopteridaceae	Feto-azevinho	Paleártico; Indomalaio; Áfricotropical; Oceânia	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z9	C12A(1), C30(1), C55(grupo)
<i>Daboecia cantabrica</i> (Huds.) K. Koch.	Ericaceae	Daboécia	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-10	Nano.	Arbusto	Z7	C33A, C34, C35, C55 (grupo)
<i>Darmera peltata</i> Voss.	Saxifragaceae		Neártico	Perenifólio	1-12	3-5	Hemi.	Herbácea	Z5	C60(grupo)
<i>Dasyllirion acrotrichum</i> (Schiede) Zucc.	Agavaceae (Dracaenaceae)		Neotropical	Perenifólio	1-12	6-9	Nano.	Árvore	Z9	C37(1)
<i>Davallia canariensis</i> (L.) Sm.	Davalliaceae	Cabrinhas	Paleártico	Perenifólio	1-12	-----	Epífita	Herbácea	Z9	C1, C22, C23, C23A, C30, C39 (grupo)
<i>Delairea odorata</i> Lem.	Compositae	Tasneirinha	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	12-3	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z9	C5, C8, C10 (grupo)
<i>Dendranthema x grandiflorum</i> Kitam.	Compositae	Crisântemo-das-floristas	Hortícola	Perenifólio	1-12	10-12	Nano.	Herbácea	Z4	C54, C55 (grupo)
<i>Deparia petersenii</i> (Kunze) Kato	Woodsiaceae	Feto-de-senhora-do-japão	Indomalaio; Paleártico; Australiano; Oceânia; Antártico	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z9	C12, C12A (grupo)
<i>Dianella caerulea</i> Sims.	Liliaceae (Phormiaceae)		Australiano; Oceânia	Perenifólio	1-12	5-7	Hemi.	Herbácea	Z9	C10(1)
<i>Dichondra micrantha</i> Urban.	Convolvulaceae	Relva-redonda	Australiano; Antártico	Perenifólio	1-12	3-6	Hemi.	Herbácea	Z9	C30, C32, C36 (tapete)
<i>Dichorisandra thyrsiflora</i> Mikan.	Commelinaceae	Dicorisandra	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C50(1)
<i>Dicksonia antarctica</i> Labill.	Dicksoniaceae	Feto Arbóreo	Australiano	Perenifólio	1-12	-----	Micro.	Árvore	Z8	C6A(1), C7(1), C12A(1), C60(7)
<i>Dioon edule</i> Lindley	Zamiaceae		Neártico	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Nano.	Árvore	Z10	C41(2)
<i>Diospyros kaki</i> L. f.	Ebenaceae	Dióspiros	Paleártico	Caducifólio	3-11	5-6	Micro.	Árvore	Z8	C55(1)
<i>Diplazium caudatum</i> (Cav.) Jermy	Woodsiaceae	Feto	Paleártico	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z10	C1, C12, C12A, C18 (grupo)
<i>Dombeya wallichii</i> (Lindl.) B. D. Jackson	Sterculiaceae	Dombeia; Aurora	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	12-2	Micro.	Árvore	Z10	C55(1)
<i>Doodia caudata</i> (Cav.) R. Br.	Blechnaceae	Feto	Australiano; Antártico	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z9	C1, C12 (grupo)
<i>Dracaena deremensis</i> Engl.	Agavaceae (Dracaenaceae)	Dracena	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	11-12	Micro.	Arbusto	Z11	C10(3)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Dracaena draco</i> (L.) L. ssp. <i>draco</i>	Agavaceae	Dragoeiro	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-6	Micro.	Árvore	Z11	C1(36), C32(2), C36(5), C38(2), C42(3), C49(1), C54(3)
<i>Dracaena marginata</i> Lam.	Agavaceae	Dracena	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu**	Micro.	Arbusto	Z11	C5(3)
<i>Drimiopsis maculata</i> Lindl. & Paxt.	Liliaceae (Hyacinthaceae)		Áfricotropical	Perenifólio	1-12	5-7	Geófita	Herbácea	Z10	C12, C12A (grupo)
<i>Duchesnea indica</i> (Andrews) Focke.	Rosaceae	Morangueiro-selvagem	Paleártico; Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea trepadora	Z6	C1, C15, C23A, C31, C32, C36, C37, C55, C61 (mancha)
<i>Duranta erecta</i> L.	Verbenaceae	Duranta	Neotropical	Perenifólio	1-12	7-1	Micro.	Arbusto	Z10	C5(5), C51(1)
<i>Echium candicans</i> L. f.	Boraginaceae	Massaroco	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-6	Micro.	Arbusto	Z10	C1(12),
<i>Echium nervosum</i> Dryand.	Boraginaceae	Massaroco	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-6	Nano.	Arbusto	Z11	C1(15), C61(1), C62(1)
<i>Eichhornia crassipes</i> (Mart.) Solms-Laub.	Pontederiaceae	Jacinto-de-água	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-10	Hidrófita	Herbácea	Z10	C60(grupo)
<i>Elaeagnus angustifolia</i> L.	Elaeagnaceae	Oliveira-do-paraiso	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-6	Micro.	Árvore	Z7	C57(2)
<i>Elaeagnus pungens</i> Thumb.	Elaeagnaceae		Paleártico	Perenifólio	1-12	9-10	Micro.	Arbusto	Z7	C62(1)
<i>Encephalartos altensteinii</i> Lehm	Zamiaceae	Cica; Encefalartos	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	7-10	Micro.	Árvore	Z9	C15(1), C19(2), C23(3), C23A(3), C28(1), C34(1), C41(3), C66(1)
<i>Encephalartos altensteinii</i> Lehm x <i>E. arenarius</i> R. A. Dyer.	Zamiaceae	Cica; Encefalartos	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	6-10	Micro.	Árvore	Z9	C20(3), C23(1), C23A(3), C36(1), C37(2), C41(1), C46(1)
<i>Encephalartos altensteinii</i> Lehm x <i>E. latifrons</i> Lehm.	Zamiaceae	Cica; Encefalartos	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	7-10	Micro.	Árvore	Z9	C23(1)
<i>Encephalartos altensteinii</i> Lehm x <i>E. lehmannii</i> Lehm.	Zamiaceae	Cica; Encefalartos	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu**	Micro.	Árvore	Z9	C23(1)
<i>Encephalartos altensteinii</i> Lehm x <i>E. longifolius</i> (Jacq.) Lehm.	Zamiaceae	Cica; Encefalartos	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	7-10	Micro.	Árvore	Z9	C23(2), C23A(5), C44(3)
<i>Encephalartos altensteinii</i> Lehm. x <i>E. princeps</i> R. A. Dyer.	Zamiaceae	Cica; Encefalartos	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu**	Micro.	Árvore	Z9	C23(1), C23A(4)
<i>Encephalartos altensteinii</i> Lehm. x <i>E. trispinosus</i> (Hook) R. A. Dyer	Zamiaceae	Cica; Encefalartos	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	7-11	Micro.	Árvore	Z9	C20(1), C23(5), C23A(4), C28(2), C33(1), C35(1), C37(1), C41(5), C43(1)
<i>Encephalartos altensteinii</i> Lehm. x <i>E. villosus</i> Lem.	Zamiaceae	Cica; Encefalartos	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	6-11	Micro.	Árvore	Z9	C19(1), C23(1), C33A(1), C35(1), C38(3), C41(1)
<i>Encephalartos arenarius</i> R. A. Dyer.	Zamiaceae	Cica; Encefalartos	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	7-11	Nano.	Árvore	Z9	C15(1), C20(5), C23(7), C23A(4), C28(2), C41(2), C46(4)
<i>Encephalartos arenarius</i> R. A. Dyer. x <i>E. trispinosus</i> (Hook) R. A. Dyer	Zamiaceae	Cica; Encefalartos	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	7-11	Nano.	Árvore	Z9	C20(2), C23(4), C23A(4), C28(1), C41(4)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Encephalartos arenarius</i> R. A. Dyer. x <i>E. horridus</i> (Jacq.) Lehm.	Zamiaceae	Cica; Encefalartos	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu**	Nano.	Árvore	Z9	C41(1)
<i>Encephalartos arenarius</i> R. A. Dyer. x <i>E. lehmannii</i> Lehm.	Zamiaceae	Cica; Encefalartos	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu**	Nano.	Árvore	Z9	C20(6)
<i>Encephalartos caffer</i> (Thunb.) Lehm.	Zamiaceae	Cica; Encefalartos	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu**	Caméfito	Arbusto	Z9	C20(2), C23(1), C23A(2)
<i>Encephalartos chimanimaniensis</i> R. A. Dyer & Verd.	Zamiaceae	Cica; Encefalartos	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu**	Nano.	Árvore	Z9	C23(1)
<i>Encephalartos cupidus</i> R. A. Dyer	Zamiaceae	Cica; Encefalartos	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu**	Caméfito	Arbusto	Z9	C20(3), C41(1)
<i>Encephalartos cycadifolius</i> (Jacq.) Lehm.	Zamiaceae	Cica; Encefalartos	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	4-9	Nano.	Arbusto	Z9	C19(2), C20(10), C23A(1), C41(2)
<i>Encephalartos dolomiticus</i> Lavranos & Goode	Zamiaceae	Cica; Encefalartos	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu**	Nano.	Árvore	Z9	C23(1)
<i>Encephalartos dyerianus</i> Lavranos & Goode	Zamiaceae	Cica; Encefalartos	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	6-11	Micro.	Árvore	Z9	C35(1)
<i>Encephalartos eugene-maraisii</i> I. Verd.	Zamiaceae	Cica; Encefalartos	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	6-11	Micro.	Árvore	Z9	C23(1), C28(2), C35(2), C36(1)
<i>Encephalartos ferox</i> G. Bertol.	Zamiaceae	Cica; Encefalartos	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu**	Nano.	Arbusto	Z9	C19(1), C23(1), C23A(6)
<i>Encephalartos ferox</i> G. Bertol. x <i>E. natalensis</i> R. A. Dyer & Verd.	Zamiaceae	Cica; Encefalartos	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu**	Micro.	Árvore	Z9	C23(1)
<i>Encephalartos friderici-guilielmii</i> Lhem.	Zamiaceae	Cica; Encefalartos	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	5-10	Micro.	Árvore	Z9	C19(4), C23(4), C23A(2), C41(4), C43(2)
<i>Encephalartos ghellinckii</i> Lem.	Zamiaceae	Cica; Encefalartos	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu**	Micro.	Árvore	Z9	C19(1), C20(5), C23(1), C41(4), C44(1)
<i>Encephalartos heenanii</i> R. A. Dyer	Zamiaceae	Cica; Encefalartos	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu**	Micro.	Árvore	Z9	C41(2)
<i>Encephalartos horridus</i> (Jacq.) Lehm.	Zamiaceae	Cica; Encefalartos	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	5-10	Nano.	Árvore	Z9	C19(4), C23(4), C23A(2), C35(1), C41(6), C43(2), C44(1)
<i>Encephalartos horridus</i> (Jacq.) Lehm. x <i>E. lehmannii</i> Lehm.	Zamiaceae	Cica; Encefalartos	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	5-10	Nano.	Árvore	Z9	C17(1), C23(3), C23A(4), C37(1), C41(1)
<i>Encephalartos horridus</i> (Jacq.) Lehm. x <i>E. longifolius</i> (Jacq.) Lehm.	Zamiaceae	Cica; Encefalartos	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	5-10	Nano.	Árvore	Z9	C23(1), C41(2)
<i>Encephalartos inopinus</i> R. A. Dyer	Zamiaceae	Cica; Encefalartos	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu**	Micro.	Árvore	Z9	C23(1), C23A(1), C36(1), C41(1), C43(1)
<i>Encephalartos laevifolius</i> Stapf & Burtt-Davy	Zamiaceae	Cica; Encefalartos	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu**	Micro.	Árvore	Z9	C23(1), C23A(2), C35(1), C41(1)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Encephalartos lanatus</i> Stapf & Burt-Davy	Zamiaceae	Cica; Encefalartos	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	5-10	Nano.	Árvore	Z9	C20(1), C36(2)
<i>Encephalartos latifrons</i> Lehm.	Zamiaceae	Cica; Encefalartos	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	5-11	Micro.	Árvore	Z9	C17(1), C19(2), C22(4), C23(11), C23A(4), C36(1), C41(3), C43(1), C45(3), C46(3), C54(1),
<i>Encephalartos latifrons</i> Lehm. x <i>E. longifolius</i> (Jacq.) Lehm.	Zamiaceae	Cica; Encefalartos	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu**	Micro.	Árvore	Z9	C41(1)
<i>Encephalartos latifrons</i> Lehm. x <i>E. trispinosus</i> (Hook) R. A. Dyer	Zamiaceae	Cica; Encefalartos	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	5-10	Micro.	Árvore	Z9	C41(1)
<i>Encephalartos lebomboensis</i> I. Verd.	Zamiaceae	Cica; Encefalartos	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	5-10	Micro.	Árvore	Z9	C15(1), C19(1), C23(4), C23A(4), C28(3), C41(2), C43(1), C66(1),
<i>Encephalartos lehmannii</i> Lehm.	Zamiaceae	Cica; Encefalartos	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	5-11	Nano.	Árvore	Z9	C17(1), C19(1), C20(16), C23(8), C23A(2), C28(3), C36(1), C39 (1), C41(5), C43(1), C44(1), C46(3), C54(3)
<i>Encephalartos lehmannii</i> Lehm. x <i>E. longifolius</i> (Jacq.) Lehm.	Zamiaceae	Cica; Encefalartos	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu**	Micro.	Árvore	Z9	C23(1), C23A(4), C41(4)
<i>Encephalartos lehmannii</i> Lehm. x <i>E. trispinosus</i> (Hook) R. A. Dyer	Zamiaceae	Cica; Encefalartos	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu**	Nano.	Árvore	Z9	C20(1), C23(2)
<i>Encephalartos longifolius</i> (Jacq.) Lehm.	Zamiaceae	Cica; Encefalartos	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	5-10	Micro.	Árvore	Z9	C19(3), C23(2), C23A(12), C28(1), C41(4), C43(1), C45(1)
<i>Encephalartos longifolius</i> (Jacq.) Lehm. x <i>E. trispinosus</i> (Hook) R. A. Dyer	Zamiaceae	Cica; Encefalartos	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu**	Micro.	Árvore	Z9	C23A(1)
<i>Encephalartos manikensis</i> (Gilliland) Gilliland	Zamiaceae	Cica; Encefalartos	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	5-11	Nano.	Árvore	Z9	C23(9), C23A(1), C36(1)
<i>Encephalartos middelburgensis</i> Robertse, Vorster & Van der Westhuizen	Zamiaceae	Cica; Encefalartos	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu**	Micro.	Árvore	Z9	C23(1), C23A(1), C41(1)
<i>Encephalartos munchii</i> R. A. Dyer & I. Verd.	Zamiaceae	Cica; Encefalartos	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu**	Nano.	Árvore	Z9	C23(1), C23A(3), C41(1)
<i>Encephalartos natalensis</i> R. A. Dyer & Verd.	Zamiaceae	Cica; Encefalartos	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	6-11	Micro.	Árvore	Z9	C17(1), C22(6), C23(5), C23A(10), C28(1), C36(2), C41(4)
<i>Encephalartos ngoyanus</i> I. Verd.	Zamiaceae	Cica; Encefalartos	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	6-11	Hemi.	Arbusto	Z9	C20(1), C23(1), C23A(3), C41(1)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Encephalartos paucidentatus</i> Stapf & Burt Davy	Zamiaceae	Cica; Encefalartos	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu**	Micro.	Árvore	Z9	C23(3), C23A(1)
<i>Encephalartos princeps</i> R. A. Dyer	Zamiaceae	Cica; Encefalartos	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	6-11	Micro.	Árvore	Z9	C19(4), C20(5), C23(5), C23A(4), C28(1), C34(1), C41(9)
<i>Encephalartos senticosus</i> Vorster	Zamiaceae	Cica; Encefalartos	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	5-10	Micro.	Árvore	Z9	C17(1), C23A(3), C41(3), C43(1), C45(1)
<i>Encephalartos transvenosus</i> Stapf & Burt Davy.	Zamiaceae	Cica; Encefalartos	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	5-11	Micro.	Árvore	Z9	C15(1), C23(1), C23A(2), C41(2), C48(1)
<i>Encephalartos trispinosus</i> (Hook) R. A. Dyer	Zamiaceae	Cica; Encefalartos	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	5-11	Nano.	Árvore	Z9	C14(1), C19(2), C20(19), 23(15), C23A(9), C35(1), C36(2), C37(2), C41(1), C44(2), C45(1)
<i>Encephalartos umbeluziensis</i> R. A. Dyer	Zamiaceae	Cica; Encefalartos	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu**	Hemi.	Arbusto	Z9	C23(1), C23A(1), C32(1)
<i>Encephalartos villosus</i> Lem.	Zamiaceae	Cica; Encefalartos	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	4-11	Hemi.	Arbusto	Z9	C23(2), C23A(5), C39(4), C41(1)
<i>Encephalartos woodii</i> Sander x <i>E. natalensis</i> R. A. Dyer & Verd.	Zamiaceae	Cica; Encefalartos	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	5-11	Micro.	Árvore	Z9	C23(2), C39(2)
<i>Epidendrum ibaguense</i> HBK	Orchidaceae	Orquídea-de-cruz	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C55(1)
<i>Epipremnum aureum</i> (Lind. & André)	Araceae		Oceânia	Perenifólio	1-12	6-8	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z10	C3(9), C50(1)
<i>Erica arborea</i> L.	Ericaceae	Urze-arbórea; Urze-molar; Betouro	Paleártico	Perenifólio	1-12	12-4	Micro.	Arbusto	Z8	C1(51), C55(23)
<i>Erica australis</i> L.	Ericaceae	Urze-espanhola	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-7	Nano.	Arbusto	Z9	C33, C34, C35 (grupo)
<i>Erica camea</i> L.	Ericaceae	Urze-de- inverno	Paleártico	Perenifólio	1-12	11-2	Nano.	Arbusto	Z5	C35, C36, C55 (grupo)
<i>Erica ciliaris</i> L.	Ericaceae	Urze	Paleártico	Perenifólio	1-12	7-10	Nano.	Arbusto	Z7	C33, C34, C35, C55 (grupo)
<i>Erica cinerea</i> L.	Ericaceae	Urze-das- camapainhas	Paleártico	Perenifólio	1-12	6-8	Nano.	Arbusto	Z5	C33, C33A, C34, C35, C36, C55 (grupo)
<i>Erica erigena</i> R. Ross.	Ericaceae	Urze-irlandesa	Paleártico	Perenifólio	1-12	12-3	Nano.	Arbusto	Z7	C35, C36, C55 (grupo)
<i>Erica lusitanica</i> Rudolphi.	Ericaceae	Urze-portuguesa	Paleártico	Perenifólio	1-12	12-4	Micro.	Arbusto	Z8	C55(grupo)
<i>Erica platycodon</i> (Webb & Berthel.) Rivas Mart. & al. ssp. <i>madericola</i> (D. C. McClint.) Rivas Mart. & al.	Ericaceae	Urze-das- vassouras; Urze-durázia	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-6	Micro.	Arbusto	Z10	C1(26), C20(1)
<i>Erica tetralix</i> L.	Ericaceae	Urze	Paleártico	Perenifólio	1-12	6-10	Caméfito	Arbusto	Z3	C35, C55 (grupo)
<i>Erica vagans</i> L.	Ericaceae	Urze	Paleártico	Perenifólio	1-12	6-10	Nano.	Arbusto	Z5	C35, C36, C55 (grupo)
<i>Erica x darleyensis</i> Bean.	Ericaceae	Urze	Hortícola	Perenifólio	1-12	12-4	Nano.	Arbusto	Z6	C33, C34, C35 (grupo)
<i>Erigeron karvinskianus</i> DC.	Compositae	Floricos; Intrometidas; Margaridas	Neotropical	Perenifólio	1-12	3-11	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z7	C1,C20, C50, C51 (grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Erysimum bicolor</i> (Homem.) DC.	Cruciferae	Goivo-da-serra	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-5	Nano.	Arbusto	Z10	C1(16)
<i>Erythrina abyssinica</i> Lam. ex DC.	Leguminosae (Papilionoideae)	Coralina-da-abissínia	Áfricotropical	Caducifólio	5-1	3-6	Micro.	Árvore	Z10	C55(1)
<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.	Myrtaceae	Eucalipto	Australiano	Perenifólio	1-12	11-4	Meso.	Árvore	Z8	C5(1)
<i>Euonymus japonicus</i> Thunb.	Celastraceae	Verdegaio	Paleártico	Perenifólio	1-12	7-8	Micro.	Arbusto	Z7	C40(sebe), C51(3)
<i>Euphorbia mellifera</i> Ait.	Euphorbiaceae	Alindres; Figueira-do-inferno	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-5	Micro.	Arbusto	Z10	C1(25)
<i>Euphorbia milli</i> Desmoul. var. <i>breonii</i> (Nois.) Ursch & Leandri.	Euphorbiaceae	Mira-mira-não-me-toques	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C48(1), C61(1)
<i>Euphorbia piscatoria</i> Ait.	Euphorbiaceae	Figueira-do-inferno	Paleártico	Caducifólio	9-6	4-6	Micro.	Arbusto suculento	Z10	C1(32)
<i>Euphorbia pulcherrima</i> Willd. ex Klotzsch.	Euphorbiaceae	Manhã-de-páscoa	Neotropical	Caducifólio	5-2	10-3	Micro.	Arbusto	Z10	C50(1)
<i>Euryops pectinatus</i> (L.) Cass.	Compositae	Estrela-amarela	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z9	C55(2)
<i>Fagus sylvatica</i> L.	Fagaceae	Faia-europeia	Paleártico	Caducifólio	4-12	4-5	Meso.	Árvore	Z5	C5(7), C22(6), C55(4)
<i>Fagus sylvatica</i> L. var. <i>purpurea</i> (Ait.) Schneid.	Fagaceae	Faia-europeia; Faia-de-cobre	Paleártico	Caducifólio	4-12	4-5	Meso.	Árvore	Z5	C5(1), C8(2), C55(2)
<i>Farfugium japonicum</i> (L.) Kitam.	Compositae	Patás-de-cavalo; Boinas	Paleártico	Perenifólio	1-12	6-3	Hemi.	Herbácea	Z7	C5, C50, C55, C61 (grupo)
<i>Festuca donax</i> Lowe	Gramineae	Palha-carga	Paleártico	Perenifólio	1-12	6-7	Hemi.	Herbácea	Z10	C1(grupo)
<i>Ficus benjamina</i> L.	Moraceae	Figueira-da-índia	Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-4	Micro.	Árvore	Z11	C5(1), C39(2)
<i>Ficus pumila</i> L.	Moraceae	Pastinha	Indomalaio; Paleártico	Perenifólio	1-12	10-12	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z8	C20, C49, C66 (grupo)
<i>Fragaria vesca</i> L.	Rosaceae	Morangueiro-selvagem	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-4	Hemi.	Herbácea trepadora	Z4	C1(mancha)
<i>Fraxinus excelsior</i> L.	Oleaceae	Freixo	Paleártico	Caducifólio	2-11	1-2	Micro.	Árvore	Z4	C59 (1)
<i>Freesia alba</i> (G. L. Mey.) Gumbel.	Iridaceae	Frisia	Áfricotropical	Sazonal	12-4	12-4	Geófita	Herbácea	Z9	C39, C50, C55 (grupo)
<i>Fuchsia arborescens</i> Sims.	Onagraceae	Fúcsia -arbórea	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z9	C10(2), C12A(1), C20(1), C26(1), C28(2), C61(1)
<i>Fuchsia boliviana</i> Carr.	Onagraceae	Fúcsia; Brincos-de-princesa; Mimos	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C5(15), C10(6), C16(2), C18(3), C21(3), C22(1), C30(4), C34(1), C37(2), C50(2), C55(>50)
<i>Fuchsia triphylla</i> L.	Onagraceae	Fúcsia; Brincos-de-princesa; Mimos	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z11	C49(grupo)
<i>Furcraea bedinghausii</i> K. Koch.	Agavaceae	Piteira; Furcreia	Neotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Nano.	Herbácea suculenta	Z10	C8A(1)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Genista tenera</i> (Jacq. Ex Murr.) O. Kuntze	Leguminosae (Papilionoideae)	Piomo	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-7	Nano.	Arbusto	Z10	C1(1)
<i>Geranium maderense</i> P. F. Yeo	Geraniaceae	Gerânio-da-madeira; Pássaras	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-6	Nano.	Herbácea	Z10	C1, C4(grupo)
<i>Geranium palmatum</i> Cav.	Geraniaceae	Gerânio-de- folha-de-anêmona	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-12	Nano.	Herbácea	Z10	C1, C4 (grupo)
<i>Geranium robertianum</i> L.	Geraniaceae	Erva-de-são-roberto	Paleártico; Neártico	Perenifólio	1-12	3-9	Hemi.	Herbácea	Z6	C1, C37, C55 (grupo)
<i>Ginkgo biloba</i> L.	Ginkgoaceae	Ginco; Árvore - avenca	Paleártico	Caducifólio	4-1	5	Micro.	Árvore	Z4	C41(1)
<i>Globularia salicina</i> Lam.	Globulariaceae	Globulária; Malfurada	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-8	Nano.	Arbusto	Z11	C1(grupo)
<i>Gnidia polystachya</i> Bergius	Thymelaeaceae	Gnidia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C39(1), C49(3), C55(4)
<i>Goniophlebium subauriculatum</i> (Bl.) Presl.	Polypodiaceae	Feto-de- metro; Feto-chorão	Indomalaio; Australiano; Oceânia	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z10	C66(grupo)
<i>Grevillea robusta</i> A. M. Cunn. ex. R. Br.	Proteaceae	Grevílea	Australiano	Perenifólio	1-12	4-7	Meso.	Árvore	Z8	C18(1)
<i>Heberdenia excelsa</i> (Ait.) Banks ex DC	Myrsinaceae	Aderno	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-6	Micro.	Árvore	Z10	C1(2)
<i>Hedera helix</i> L.	Araliaceae	Hera	Paleártico	Perenifólio	1-12	9-10	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z5	C60(grupo)
<i>Hedera maderensis</i> K. Koch ex A. Rutherf. ssp. <i>maderensis</i>	Araliaceae	Hera	Paleártico	Perenifólio	1-12	7-10	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	C12A, C20, C21, C28, C49 (grupo)
<i>Hedychium gardnerianum</i> Ker-Gawl.	Zingiberaceae	Bananiha; Roca-de-vénus; Conteira	Paleártico; Indomalaio	Perenifólio	1-12	7-10	Hemi	Herbácea	Z9	C12, C12A , C26 (grupo)
<i>Helichrysum devium</i> Johns.	Compositae	Perpétua-de-são-lourenço	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-6	Nano.	Arbusto	Z11	C1(grupo)
<i>Helichrysum melaleucum</i> Rchb. ex Holl	Compositae	Perpétua-branca	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-8	Nano.	Arbusto	Z10	C1(8)
<i>Heliotropium arborescens</i> L.	Boraginaceae	Heliotrópio	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z9	C55(grupo)
<i>Hibiscus rosa-sinensis</i> L.	Malvaceae	Cardeais	Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C55(2), C62(5)
<i>Hibiscus syriacus</i> L.	Malvaceae	Cardeal-roxo; Hibisco-da- síria	Paleártico; Indomalaio	Caducifólio	5-11	7-9	Micro.	Arbusto	Z5	C45(2), C47(2), C54(2), C62(1), C64(6).
<i>Hippesatrum vittatum</i> (L' Hérit) Herb.	Amaryllidaceae	Raqueis	Neotropical	Sazonal	4-10	4-10	Geófita	Herbácea	Z10	C50(grupo)
<i>Holmskioldia sanguinea</i> Retz.	Verbenaceae	Chapéus-de-mandarim; Chapéus-chineses	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C55(1)
<i>Howea belmoreana</i> (C. Moore & F. Muell.) Becc.	Palmae	Quência	Australiano	Perenifólio	1-12	1-9	Micro	Árvore	Z10	C58(1)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Howea forsteriana</i> (C. Moore & F. Muell.) Becc.	Palmae	Quência	Australiano	Perenifólio	1-12	1-9	Micro.	Árvore	Z10	C58(2), C66(1)
<i>Hydrangea macrophylla</i> (Thunb.) Ser.	Hydrangeaceae	Hortênsias; Novelos	Paleártico	Caducifólio	3-12	5-10	Nano.	Arbusto	Z6	C5, C20, C21, C22, C54, C55, C62 (grupo)
<i>Hymenocallis speciosa</i> (Salisb.) Salisb.	Amaryllidaceae	Lírio-aranha	Neotropical	Perenifólio	1-12	11-1	Geófito	Herbácea	Z10	C60(grupo)
<i>Hypericum grandifolium</i> Choisy	Guttiferae	Malfurada; Hipericão	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-7	Nano.	Arbusto	Z10	C1(9)
<i>Hypericum lancasteri</i> N. Robson	Guttiferae	Hipericão	Paleártico	Perenifólio	1-12	7-8	Nano.	Arbusto	Z7	C55, C65(grupo)
<i>Ilex aquifolium</i> L.	Aquifoliaceae	Azevinho- comum; Azevinho- inglês	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-6	Micro.	Árvore	Z6	C2(1), C5(1), C10(1), C30(3), C51(1), C61(1)
<i>Ilex canariensis</i> Poir.	Aquifoliaceae	Azevinho-da- rocha	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-6	Micro.	Árvore	Z10	C1(5)
<i>Ilex perado</i> Ait.	Aquifoliaceae	Perado	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-6	Micro.	Árvore	Z10	C1(9)
<i>Ilex x altaclarensis</i> (hort. ex Loud.) Dallim.	Aquifoliaceae	Azevinho	Hortícola	Perenifólio	1-12	12-8	Micro.	Árvore	Z6	C50(4), C51(3), C52(3), C61(1)
<i>Impatiens hawkeri</i> Bull.	Balsaminaceae	Maravilhas	Hortícola	Sazonal	4-9	5-8	Terófito	Herbácea	Z10	C12, C12A, C18 (grupo)
<i>Impatiens sodenii</i> Engl. & Warb. ex Engl.	Balsaminaceae	Maravilhas	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Herbácea	Z10	C5(grupo)
<i>Impatiens walleriana</i> Hook. f.	Balsaminaceae	Maravilhas	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Herbácea	Z9	C10, C30, C31, C33, C33A, C34, C65 (grupo)
<i>Iresine herbstii</i> Hook.	Amaranthaceae	Iresine	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Caméfito	Herbácea	Z10	C47, C54, C55 (grupo)
<i>Iris ensata</i> Thunb.	Iridaceae	Lírio	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-6	Geófito	Herbácea	Z4	C55(grupo)
<i>Iris germanica</i> L.	Iridaceae	Lírio	Paleártico	Perenifólio	1-12	2-7	Geófito	Herbácea	Z4	C54, C55 (grupo)
<i>Iris germanica</i> L. var. <i>florentina</i> (L.) Dykes	Iridaceae	Lírio	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-8	Geófito	Herbácea	Z4	C61(grupo)
<i>Iris pseudacorus</i> L.	Iridaceae	Bandeira-amarela; Lírio-amarelo	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-6	Helófito	Herbácea	Z5	C55, C60 (grupo)
<i>Isoplexis sceptrum</i> (L. f.) Loud.	Scrophulariaceae	Isoplexis; Dedaleira-da- madeira	Paleártico	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Nano.	Arbusto	Z10	C1(17)
<i>Ixia maculata</i> L.	Iridaceae	Palhinhas; Amêndoas	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	3-5	Geófito	Herbácea	Z10	C1(grupo)
<i>Jasminum odoratissimum</i> L.	Oleaceae	Jasmineiro- amarelo	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-6	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z11	C1(3)
<i>Juglans nigra</i> L.	Juglandaceae	Nogueira-preta	Neártico	Caducifólio	5-12	5-6	Meso.	Árvore	Z4	C5(1), C6A(1), C12(1), C12A(3), C58(1)
<i>Juniperus cedrus</i> Webb. & Berthel. ssp. <i>maderensis</i> (Menezes) Rivas Mart. & al.	Cupressaceae	Cedro-da- madeira	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-3	Micro.	Árvore	Z10	C1(55), C11(21), C20(9), C21(18), C22(24), C30(1), C55(2), C56(1)
<i>Juniperus chinensis</i> L.	Cupressaceae	Cedro-da -china	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-3	Micro.	Árvore	Z4	C30(4), C31(3), C32(3), C33(5), C33A(2), C34(4), C35(2), C36(1), C55(52)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Juniperus communis</i> L.	Cupressaceae	Cedro	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-3	Micro.	Árvore	Z2	C33(1), C55(5)
<i>Justicia rizzinii</i> Wassh.	Acanthaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	12-3	Nano.	Arbusto	Z11	C55(1)
<i>Kalanchoe daigremontiana</i> Hamet & Perrier	Crassulaceae	Calanchoé	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	12-5	Nano.	Arbusto suculento	Z11	C49(grupo)
<i>Kniphofia uvaria</i> (L.) Oken.	Liliaceae (Aloeaceae)	Foguetes	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	6-8	Hemi.	Herbácea	Z9	C32(1), C50 (grupo)
<i>Kohleria eriantha</i> (Benth.) Hanst.	Gesneriaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z11	C50(6), C61(núcleo)
<i>Lagerstroemia indica</i> L.	Lythraceae	Laguerestré-mia; Flor-de- merenda; Suspiros	Paleártico; Indomalaio	Caducifólio	3-11	7-8	Micro.	Árvore	Z7	C62(1)
<i>Lampranthus roseus</i> (Willd.) Schwantes	Aizoaceae (Mesembryanthemaceae)	Lamprantos; Chorão	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	4-10	Fane. trep.	Arbusto trepador e suculento	Z11	C60(grupo)
<i>Laurus novocanariensis</i> Rivas Mart. & al.	Lauraceae	Loureiro	Paleártico	Perenifólio	1-12	11-3	Meso.	Árvore	Z10	C1(85), C8(3), C20(4), C21(9), C22(8), C28(2), C29(4), C30(5), C36(1),
<i>Lavandula angustifolia</i> Mill.	Labiatae	Alfazema; Lavanda	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z6	C9(grupo)
<i>Lavandula dentata</i> L.	Labiatae	Alfazema; Lavanda	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z8	C9, C42(grupo)
<i>Lavandula pinnata</i> L. f.	Labiatae	Alfazema	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z11	C1(grupo)
<i>Lemna minor</i> L.	Lemnaceae	Pastinha; Lentilha-de- água	Indomalaio; Australiano	Perenifólio	1-12	6-10	Hidrófita	Herbácea	Z4	C6, C12A, C16 (mancha)
<i>Leonotis leonurus</i> (L.) R. Br.	Labiatae	Rabos-de-leão; Orelhas-de-leão	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	3-11	Nano.	Arbusto	Z9	C55(grupo)
<i>Leptospermum scoparium</i> Forst. & Forst.	Myrtaceae	Leptospermo; Urze-de-jardim	Australiano; Antártico	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z8	C22(1), C23A(1), C32(1), C33(1), C42(1), C54 (sebe), C55(sebe)
<i>Leucadendron argenteum</i> (L.) R. Br.	Proteaceae	Árvore-de- prata	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	11-1	Micro.	Árvore	Z9	C54(9)
<i>Leucadendron conicum</i> (Lam.) I. Williams	Proteaceae	Leucadendro	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	10-2	Micro.	Arbusto	Z9	C38(1)
<i>Leucadendron eucalyptifolium</i> H. Buek ex Meisn.	Proteaceae	Leucadendro	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	12-2	Micro.	Arbusto	Z9	C38(10)
<i>Leucadendron laureolum</i> (Lam.) Fourc.	Proteaceae	Leucadendro	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	11-5	Micro.	Arbusto	Z9	C54(1)
<i>Leucadendron salicifolium</i> (Salisb.) I. Williams	Proteaceae	Leucadendro	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	11-2	Nano.	Arbusto.	Z9	C55(2)
<i>Leucadendron salignum</i> Bergius x <i>L. laureolum</i> (Lam.) Fourc.	Proteaceae	Safari-sunset	Hortícola	Perenifólio	1-12	11-2	Micro.	Arbusto	Z9	C38(14), C55(22)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Leucanthemum x superbum</i> (J. Ingram) Bergmans ex Kent	Compositae	Estrelas	Hortícola	Perenifólio	1-12	5-8	Nano.	Herbácea	Z5	C50, C54 (grupo)
<i>Leucospermum conocarpodendron</i> L. ssp. <i>viridum</i> Rourke	Proteaceae	Proteia- - almofada-de- alfinetes	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	11-5	Micro.	Arbusto	Z9	C38(2)
<i>Leucospermum cordifolium</i> (Salisb. ex Knight) Fourc.	Proteaceae	Proteia- almofada- de- alfinetes	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	12-8	Micro.	Arbusto	Z9	C55(6)
<i>Leucospermum glabrum</i> E. Phillips.	Proteaceae	Proteia- - almofada-de- alfinetes	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	11-3	Micro.	Arbusto	Z9	C38(5)
<i>Leucospermum praemorsum</i> (Meisn.) E. Phillips.	Proteaceae	Proteia- - almofada-de- alfinetes	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-4	Micro.	Arbusto	Z9	C55(1)
<i>Leucospermum reflexum</i> H. Buek ex Meisn.	Proteaceae	Proteia- - almofada-de- alfinetes	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	11-5	Micro.	Arbusto	Z9	C54(3)
<i>Leucospermum reflexum</i> H. Buek ex Meisn. var. <i>luteum</i> Rourke	Proteaceae	Proteia- - almofada-de- alfinetes	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	11-7	Micro.	Arbusto	Z9	C54(1)
<i>Leucospermum royenifolium</i> (Salisb. ex Knight) Stapf	Proteaceae	Proteia-almofada- de-alfinetes	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	12-7	Micro.	Arbusto	Z9	C54(1)
<i>Leycesteria formosa</i> Wallich	Caprifoliaceae		Paleártico	Caducifólio	4-12	5-7	Micro.	Arbusto	Z7	C10(1)
<i>Ligustrum lucidum</i> Ait. f.	Oleaceae	Ligustro; Alfinheiro	Paleártico	Perenifólio	1-12	6-9	Micro.	Árvore	Z7	C8(1)
<i>Ligustrum ovalifolium</i> Hassk.	Oleaceae	Ligustro; Alfinheiro	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-7	Nano.	Arbusto	Z5	C9(2), C33(1), C34(sebe), C44(7), C47(2), C50(16), 53(19), C54(1), C55(4), C66(2)
<i>Lilium candidum</i> L.	Liliaceae	Lírio-branco	Paleártico	Sazonal	2-7	4-6	Geófito	Herbácea	Z6	C54, C55 (grupo)
<i>Lilium lancifolium</i> Thunb.	Liliaceae	Lírio	Paleártico	Sazonal	3-10	5-9	Geófito	Herbácea	Z6	C38, C52, C53 (grupo)
<i>Liriodendron tulipifera</i> L.	Magnoliaceae	Tulipeiro- arbóreo	Neártico	Caducifólio	4-11	4-6	Meso.	Árvore	Z4	C55(1)
<i>Livistona chinensis</i> (Jacq.) R. Br. ex Mart.	Palmae	Palmeira-de- leque-da-china	Paleártico	Perenifólio	1-12	2-5	Meso.	Árvore	Z9	C37(1), C58(1)
<i>Lonicera japonica</i> Thunb.	Caprifoliaceae	Madressilva	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z4	C20 (grupo)
<i>Lotus uliginosus</i> Schkuhr	Leguminosae (Papilionoideae)	Lótus	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-8	Hemi.	Herbácea	Z6	C33A(grupo)
<i>Luzula maxima</i> (Rich.) DC.	Juncaceae	Luzula	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-5	Hemi.	Herbácea	Z6	C12, C12A (grupo)
<i>Macrozamia communis</i> L. Jonhson	Zamiaceae	Macrozamia	Australiano	Perenifólio	1-12	6-10	Nano.	Árvore	Z9	C23A(1)
<i>Macrozamia moorei</i> F. Muell.	Zamiaceae	Macrozamia	Australiano	Perenifólio	1-12	6-10	Micro.	Árvore	Z9	C19(1)
<i>Magnolia grandiflora</i> L.	Magnoliaceae	Magnólia	Neártico	Perenifólio	1-12	5-8	Micro.	Árvore	Z6	C39(1), C23(2)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Magnolia x soulangiana</i> Soul.-Bod.	Magnoliaceae	Magnólia	Hortícola	Caducifólio	3-12	12-4	Micro.	Árvore	Z5	C50(2), C6(2)
<i>Mahonia japonica</i> (Thunb.) DC.	Berberidaceae	Maónia	Paleártico; Indomalaio	Perenifólio	1-12	12-2	Micro.	Arbusto	Z6	C8A(2)
<i>Malvaviscus arboreus</i> Cav.	Malvaceae	Malvavisco	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z9	C55(1)
<i>Maytenus umbellata</i> (R. Br.) Mabb.	Celastraceae	Buxo-da-rocha	Paleártico	Perenifólio	1-12	8-9	Micro.	Arbusto	Z11	C1(3)
<i>Melanoselinum decipiens</i> (Schrad. & Wendl.) Hoffm.	Umbelliferae	Aipo-de-gado	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-6	Nano.	Herbácea	Z10	C1(grupo)
<i>Metrosideros excelsa</i> Sol. ex Gaertn.	Myrtaceae	Metrosídero; Árvore-de-natal- da-nova-zelândia	Antártico	Perenifólio	1-12	6-7	Meso.	Árvore	Z10	C5(1), C38(1)
<i>Michelia figo</i> (Lour.) Spreng	Magnoliaceae	Carocha	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-8	Micro.	Árvore	Z9	C5(1), C58(1), C62(3)
<i>Monstera deliciosa</i> Liebm.	Araceae	Fruto-delicioso; Costela-de-adão	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z10	C5(4), C12(1)
<i>Montanoa bipinnatifida</i> (Kunth) K. Kock	Compositae	Malmequer- arbóreo	Neotropical	Perenifólio	1-12	12-4	Micro.	Arbusto	Z10	C55(grupo)
<i>Musschia wollastonii</i> Lowe	Campanulaceae	Múchia-de- wollaston	Paleártico	Perenifólio	1-12	Não floriu**	Nano.	Arbusto	Z10	C1(7)
<i>Myrica faya</i> Ait.	Myricaceae	Faia-das-ilhas; Samouco	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-5	Micro.	Árvore	Z9	C1(53), C22(1), C23(1), C23A(1) C33(2), C55(1), C59(1)
<i>Narcissus pseudonarcissus</i> L.	Amaryllidaceae	Narcisos	Paleártico	Sazonal	11-5	12-3	Geófito	Herbácea	Z6	C33, C39, C44, C54, C55 (grupo)
<i>Narcissus tazetta</i> L.	Amaryllidaceae	Junquinhos	Paleártico	Sazonal	11-5	12-3	Geófito	Herbácea	Z8	C54, C55 (grupo)
<i>Neodypsis decaryi</i> Jumelle	Palmae	Palmeira- triangular	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	6-7	Micro.	Árvore	Z11	C58(1)
<i>Neoregelia compacta</i> (Mez) L. B. Smith	Bromeliaceae	Bromélia	Neotropical	Perenifólio	1-12	12-1	Hemi.	Herbácea	Z10	C12(grupo)
<i>Nephrolepis cordifolia</i> (L.) Presl.	Oleandraceae	Feto	Neotropical; Áfricotropical; Indomalaio; Oceânia; Australiano	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z10	C12, C55(grupo)
<i>Nephrolepis exaltata</i> (L.) Schott.	Oleandraceae	Feto	Neotropical; Áfricotropical; Indomalaio; Oceânia; Australiano	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z10	C12, C55(grupo)
<i>Nerium oleander</i> L.	Apocynaceae	Sevadilha; Loendro	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-11	Micro.	Arbusto	Z9	C49(6)
<i>Nolina recurvata</i> (Lem.) Hemsl.	Agavaceae	Nolina; Pata-de-elefante	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-8; 10-12	Micro.	Árvore	Z9	C36(15), C37(12), C42(1), C43(1), C50 (>100), C66(4)
<i>Nothoscordum gracile</i> (Ait.) Stearn.	Liliaceae (Alliaceae)	Alinho; Alho-americano	Neotropical	Sazonal	1-4	1-3	Geófito	Herbácea	Z7	C54, C55, C61 (grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Ochna serrulata</i> (Hochst.) Walp.	Ochnaceae	Planta-do-rato-mikey	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	2-4	Nano.	Arbusto	Z9	C12A(1)
<i>Ocotea foetens</i> (Aiton) Baill.	Lauraceae	Til	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Meso.	Árvore	Z10	C1(105), C8(1), C22(2), C33(1), C34(1)
<i>Odontonema strictum</i> (Nees) Kuntze	Acanthaceae	Odontonema	Neotropical	Perenifólio	1-12	8-12	Nano.	Arbusto	Z10	C10(1)
<i>Olea europaea</i> L.	Oleaceae	Oliveira	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-6	Micro.	Árvore	Z8	C9(3), C42(1), C59(4)
<i>Ophiopogon jaburan</i> (Kunth) Lodd	Liliaceae (Convallariaceae)	Relva-do-japão	Paleártico	Perenifólio	1-12	7-9	Hemi.	Herbácea	Z7	C12(grupo)
<i>Ophiopogon japonicus</i> (L. f.) Ker-Gawl	Liliaceae (Convallariaceae)	Relva-do-japão	Paleártico	Perenifólio	1-12	7-9	Hemi.	Herbácea	Z8	C19, C20, C21, C22, C23, C23A, C28, C34, C37, C41 (mancha)
<i>Orontium aquaticum</i> L.	Araceae		Neártico	Perenifólio	1-12	6-9	Helófito	Herbácea	Z7	C16, C55, C60 (grupo)
<i>Osteospermum barberae</i> (Harv.) Norl.	Compositae	Estrelas-do- cabo	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Caméfito	Arbusto	Z10	C18, C37, C50 (grupo)
<i>Osteospermum ecklonis</i> (DC.) Norl.	Compositae	Estrelas-do- cabo	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Caméfito	Arbusto	Z10	C18 (grupo)
<i>Oxalis pes-caprae</i> L.	Oxalidaceae	Azedas; Trevo	Áfricotropical	Sazonal	10-5	12-4	Geófito	Herbácea	Z9	C50, C53, C54 (grupo)
<i>Oxalis vulcanicola</i> J. D. Sm.	Oxalidaceae	Trevo-dourado	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Geófito	Herbácea	Z8	C12, C12A (grupo)
<i>Pandanus utilis</i> Bory.	Pandanaceae	Pândano	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	9-3	Micro.	Árvore	Z10	C50(1), C51(1)
<i>Paphiopedilum insigne</i> (Wallich. ex Lindl.) Pfitz.	Orchidaceae	Sapatinhos	Indomalaio	Perenifólio	1-12	11-4	Hemi.	Herbácea	Z10	C50(>500), C51(>200)
<i>Parietaria judaica</i> L.	Urticaceae	Alfavaca; Alfavaca-de-cobra	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-9	Nano.	Arbusto	Z8	C50(grupo)
<i>Passiflora edulis</i> Sims.	Passifloraceae	Maracujá-roxo	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-11	Fane.trep.	Arbusto trepador	Z10	C1(2), C32(1)
<i>Passiflora mollissima</i> (HBK.) L. H. Bail.	Passifloraceae	Maracujá-banana	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z8	C47A(4)
<i>Pelargonium citronellum</i> J. J. A. van der Walt	Geraniaceae	Malva-limão	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	3-11	Nano.	Arbusto	Z10	C9, C15, C23 (grupo)
<i>Pelargonium graveolens</i> L'Hérit	Geraniaceae	Malva	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	3-6	Nano.	Arbusto	Z10	C42(grupo)
<i>Pelargonium x hortorum</i> L. H. Bail.	Geraniaceae	Malvas	Hortícola	Perenifólio	1-12	4-7	Nano.	Herbácea	Z10	C20, C39, C42 (grupo)
<i>Peperomia glabella</i> (Sw.) A. Dietr.	Piperaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	7-10	Caméfito	Herbácea	Z11	C12(1)
<i>Pericalis aurita</i> (L' Hérit.) B. Nord.	Compositae	Erva-de- coelho	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-7	Nano.	Arbusto	Z10	C1 (grupo)
<i>Persea indica</i> (L.) Spreng.	Lauraceae	Vinhático	Paleártico	Perenifólio	1-12	7-9	Meso.	Árvore	Z10	C1(5)
<i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) A. W. Hill.	Umbelliferae	Salsa	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Herbácea	Z5	C54(grupo)
<i>Peucedanum lowei</i> (Coss.) Menezes	Umbelliferae	Imperatória; Peucedano	Paleártico	Perenifólio	1-12	7-10	Hemi.	Herbácea	Z10	C1(13)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitoceográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Philodendron bipinnatifidum</i> Endl.	Araceae	Filodendro	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-6	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z11	C51(grupo)
<i>Philodendron callosum</i> K. Krause	Araceae	Filodendro	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-7	Hemi.	Herbácea	Z12	C61(grupo)
<i>Philodendron pinnatifidum</i> Schott	Araceae	Filodendro	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-6	Hemi.	Arbusto	Z11	C7(1)
<i>Phlebodium aureum</i> (L.) J. Sm.	Polypodiaceae	Polipódio-dourado	Neártico; Neotropical	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z10	C12, C12A (grupo)
<i>Phlomis fruticosa</i> L.	Labiatae		Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z7	C55(1)
<i>Phoenix canariensis</i> ex. Chabaud.	Palmae	Palmeira-das-canárias	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-3	Meso.	Árvore	Z11	C21(1), C23(2), C23A(1), C38(3), C58(1)
<i>Phoenix dactylifera</i> L.	Palmae	Tamareira	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-3	Meso.	Árvore	Z11	C42(1)
<i>Phoenix reclinata</i> Jacq.	Palmae	Tamareira-do-senegal	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	5-7	Micro.	Árvore	Z11	C27(2)
<i>Phoenix roebelinii</i> O'Brien.	Palmae	Palmeira-anã	Indomalaio	Perenifólio	1-12	5-7	Micro.	Árvore	Z11	C45(1), C58(4)
<i>Phormium tenax</i> Forst. & Forst. f.	Agavaceae	Espadana	Antártico	Perenifólio	1-12	6-8	Hemi.	Herbácea	Z8	C55(grupo)
<i>Photinia x fraseri</i> Dress	Rosaceae	Fotínia	Hortícola	Perenifólio	1-12	4-6	Micro.	Arbusto	Z8	C53A(2)
<i>Phyllanthus tenellus</i> Roxb.	Euphorbiaceae	Quebra-pedra	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Herbácea	Z11	C50 (grupo)
<i>Phyllis nobla</i> L.	Rubiaceae	Cabreira	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-8	Nano.	Arbusto	Z9	C1 (grupo)
<i>Phyllostachys aurea</i> (Carr.) A. & C. Riv.	Gramineae	Bambu	Paleártico	Perenifólio	1-12	Não floriu**	Hemi.	Herbácea	Z6	C8, C22, C28, C42, C59(grupo)
<i>Phyllostachys nigra</i> (Lodd. Ex Lindl.) Munro	Gramineae	Bambu Negro	Paleártico	Perenifólio	1-12	Não floriu**	Hemi.	Herbácea	Z8	C12A (grupo)
<i>Picconia excelsa</i> (Ait.) DC.	Oleaceae	Pau Branco	Paleártico	Perenifólio	1-12	2-5	Micro.	Árvore	Z10	C1(12), C37(1), C41(1)
<i>Picea pungens</i> Engelm.	Pinaceae	Abeto-azul; Abeto-do-colorado	Neártico	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Micro.	Árvore	Z2	C50(2)
<i>Pieris floribunda</i> (Pursh ex Sims) Benth. & Hook	Ericaceae	Pieris	Neártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z5	C52(3)
<i>Pilea nummularifolia</i> (Sw.) Wedd.	Urticaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	6-10	Hemi.	Herbácea	Z10	C4, C12, C12A (grupo)
<i>Pimpinella anisum</i> L.	Umbelliferae	Anis; Erva-doce	Paleártico	Sazonal	3-9	6-8	Terófito	Herbácea	Z6	C50(6)
<i>Pinus pinaster</i> Ait.	Pinaceae	Pinheiro- marítimo	Paleártico	Perenifólio	1-12	2-4	Meso.	Árvore	Z8	C1(5), C13(3) C21(3), C22(14), C31(1), C33(1)
<i>Pistia stratiotes</i> L.	Araceae	Alface-de- água	Neotropical; Áfricotropical; Indomalaio; Oceânia; Australiano	Perenifólio	1-12	1-12	Hidrófito	Herbácea	Z10	C6, C16, C60 (grupo)
<i>Pittosporum coriaceum</i> Dryand. ex Ainton	Pittosporaceae	Mocano	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-7	Micro.	Árvore	Z10	C15(2), C23 (5), C23A(1)
<i>Plantago lanceolata</i> L.	Plantaginaceae	Tanchagem	Paleártico	Perenifólio	1-12	6-7	Hemi.	Herbácea	Z6	C1(grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Plantago maderensis</i> Decne.	Plantaginaceae	Plantago-da-madeira	Paleártico	Perenifólio	1-12	2-5	Nano.	Arbusto	Z10	C1(grupo)
<i>Plantago malato-belizii</i> Lawalrée	Plantaginaceae	Tanchagem- de-malato-beliz	Paleártico	Perenifólio	1-12	6-7	Hemi.	Herbácea	Z10	C1(grupo)
<i>Platynerium bifurcatum</i> (Cav.) C. Chr.	Polypodiaceae	Feto-de-corno- de-veado	Indomalaio; Oceânia; Australiano	Perenifólio	1-12	-----	Epífita	Herbácea	Z9	C40(1), C41(2), C42(1)
<i>Platycladus orientalis</i> (L.) Franco	Cupressaceae	Tuia-oriental	Neártico	Perenifólio	1-12	1-3	Micro.	Árvore	Z6	C29(3), C30(3), C35(2)
<i>Plectranthus barbatus</i> Andrews	Labiatae	Falso-boldo; Boldo-da-terra	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C54(2), C55(12)
<i>Plectranthus ecklonii</i> Benth.	Labiatae	Plectranto	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	10-12	Nano.	Arbusto	Z10	C55(5)
<i>Polygala myrtifolia</i> L.	Polygalaceae	Polígala	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z9	C1(4), C22(2)
<i>Polygonum capitatum</i> Buch.-Ham. ex D. Don	Polygonaceae	Polígono-de-jardim	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z8	C1, C50, C53 (grupo)
<i>Polypodium macaronesicum</i> A. E. Bobrov	Polypodiaceae	Polipódio	Paleártico	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z10	C1, C55 (grupo)
<i>Pontederia cordata</i> L.	Pontederiaceae	Pontederia	Neártico; Neotropical	Perenifólio	1-12	5-10	Helófito	Herbácea	Z10	C6, C16, C55 (grupo)
<i>Populus nigra</i> L.	Salicaceae	Choupo-negro; Álamo	Paleártico	Caducifólio	4-11	3-4	Micro.	Árvore	Z2	C55(2)
<i>Primula vulgaris</i> Huds. .	Primulaceae	Primerose; Primaveras	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-6	Caméfito	Herbácea	Z6	C50, C51(grupo)
<i>Protea magnifica</i> Link x <i>E. burchelli</i> Stapf.	Proteaceae	Protea	Hortícola	Perenifólio	1-12	10-5	Micro.	Arbusto	Z9	C55(2)
<i>Protea aurea</i> (Burm. f.) Rourke	Proteaceae	Protea-peteca	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	11-1; 6-7	Micro.	Arbusto	Z9	C38(2), C54(1)
<i>Protea compacta</i> R. Br.	Proteaceae	Protea	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	11-1	Micro.	Arbusto	Z9	C38(1), C54(1), C55(2)
<i>Protea cynaroides</i> (L.) L.	Proteaceae	Protea-real	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	10-5	Nano.	Arbusto	Z9	C55(>50)
<i>Protea eximia</i> (Salisb. ex Knight) Fourc.	Proteaceae	Protea	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	11-2	Micro.	Arbusto	Z9	C38(1), C55(1)
<i>Protea grandiceps</i> Tratt.	Proteaceae	Protea-vermelha; Protea-princesa	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	11-2	Nano.	Arbusto	Z9	C54 (1)
<i>Protea laurifolia</i> Thunb.	Proteaceae	Protea-de-folha-cinzenta	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	10-2	Micro.	Arbusto	Z9	C55(3)
<i>Protea lepidocarpodendron</i> (L.) L.	Proteaceae	Protea-negra	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	11-2	Nano.	Arbusto	Z9	C55(1)
<i>Protea magnifica</i> Link.	Proteaceae	Protea-rainha	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	10-5	Nano.	Arbusto	Z9	C54(2)
<i>Protea mundi</i> Klotzsch.	Proteaceae	Protea-floresta	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	10-7	Micro.	Arbusto	Z9	C38(2), C54(2)
<i>Protea neriifolia</i> R. Br.	Proteaceae	Protea-de-folha – estreita; Proteia-folha-de-loendro	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	11-2	Nano.	Arbusto	Z9	C38(2), C54(7), C55(12)
<i>Protea repens</i> (L.) L.	Proteaceae	Protea-comum	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	6-12	Micro.	Arbusto	Z9	C22(1), C38(2), C54(3)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Prunella grandiflora</i> (L.) Scholler	Labiatae	Erva-férrea	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-9	Nano.	Herbácea	Z5	C1,C55(grupo)
<i>Prunella vulgaris</i> L.	Labiatae	Erva-férrea	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-9	Caméfito	Herbácea	Z3	C5, C10(grupo)
<i>Prunus x domestica</i> L.	Rosaceae	Ameixieira	Hortícola	Caducifólio	4-11	3-4	Micro.	Árvore	Z5	C58(1)
<i>Pseudotsuga menziesii</i> (Mirb.) Franco	Pinaceae	Pseudotsuga; Abeto-de-douglas	Neártico	Perenifólio	1-12	1-2	Micro.	Árvore	Z4	C2(3), C18(1), C20(2), C21(2), C23A(1)
<i>Psidium guajava</i> L.	Myrtaceae	Goiabeira	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-7	Micro.	Árvore	Z10	C55(1)
<i>Pteris cretica</i> L.	Pteridaceae		Paleártico; Áfricotropical; Indomalaio	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z10	C12, C12A, C23 (grupo)
<i>Pteris incompleta</i> Cav.	Pteridaceae	Feto-de-palma	Paleártico	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z9	C1, C12, C12A (grupo)
<i>Pteris vittata</i> L.	Pteridaceae	Feto	Paleártico; Indomalaio; Australiano; Oceânia	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z9	C34, C36, C50, C55, C60, C61(grupo)
<i>Punica granatum</i> L.	Punicaceae	Romãzeira	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-7	Micro.	Árvore	Z9	C55(1)
<i>Pycnostachys urticifolia</i> Hook.	Labiatae		Áfricotropical	Perenifólio	1-12	10-3	Nano.	Arbusto	Z10	C5(2), C51(1), C54 (1)
<i>Quercus ilex</i> L.	Fagaceae	Azinheira	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-5	Meso.	Árvore	Z7	C23A(2)
<i>Quercus robur</i> L.	Fagaceae	Carvalho	Paleártico	Caducifólio	2-11	3-5	Meso.	Árvore	Z6	C23A(1), C29(2), C30(1), C32(1), C33A(1), C40(1), C41(3), C45(2), C47(1), C54(3)
<i>Quercus rubra</i> L.	Fagaceae	Carvalho- vermelho- americano	Neártico	Caducifólio	4-11	4-5	Meso.	Árvore	Z3	C7(1), C22(9), C29(1), C30(5), C31(1), C32(4), C55(10)
<i>Radermachera sinica</i> (Hance) Hemsl.	Bignoniaceae	Árvore-serpente; Boneca-da-china	Indomalaio	Perenifólio	1-12	7-9	Micro.	Árvore	Z10	C52(3)
<i>Ranunculus cortusifolius</i> Willd.	Ranunculaceae	Ranúnculo; Doiradinha	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-6	Hemi.	Herbácea	Z10	C1(grupo)
<i>Rhamnus glandulosa</i> Ait.	Rhamanceae	Sanguinho	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-5	Micro.	Árvore	Z10	C1(5)
<i>Rhaphiolepis umbellata</i> (Thunb.) Mak.	Rosaceae		Paleártico	Perenifólio	1-12	10-6	Nano.	Arbusto	Z8	C12(3)
<i>Rhododendron arboreum</i> Sm.	Ericaceae	Rododendro	Indomalaio; Paleártico	Perenifólio	1-12	2-5	Micro.	Árvore	Z7	C22(9), C48(1), C62(2), C63(3)
<i>Rhododendron catawbiense</i> Michx.	Ericaceae	Rododendro	Neártico	Perenifólio	1-12	12-5	Micro.	Arbusto	Z5	C30(5)
<i>Rhododendron indicum</i> (L.) Sweet	Ericaceae	Azálea	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z6	C22, C29, C30, C55 (grupo)
<i>Rhododendron molle</i> (Bl.) G. Don.	Ericaceae	Azálea	Paleártico	Caducifólio	5-12	5-6	Nano.	Arbusto	Z7	C30, C31, C33 (grupo)
<i>Rhododendron mucronatum</i> G. Don.	Ericaceae	Azálea-japonesa	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z5	C5, C12, C12A, C22, C29, C30, C55, C62, C63, C64 (grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Rhododendron ponticum</i> L.	Ericaceae	Rododendro; Loendro	Paleártico	Perenifólio	1-12	11-6	Micro.	Árbusto	Z6	C29(3), C30(14), C33(1)
<i>Roldana petasites</i> (Sims) H. Robinson & Bretell.	Compositae	Senécio	Neotropical	Perenifólio	1-12	12-4; 6-8	Micro.	Arbusto	Z9	C5(1), C6A(1), C8(1)
<i>Rosa x damascena</i> Mill. var. <i>semperflorens</i> (Duhamel) Rowley	Rosaceae	Rosa-de-quatro-estações	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z4	C49(3)
<i>Rosmarinus officinalis</i> L.	Labiatae	Alecrim	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z6	C47(1)
<i>Ruscus streptophyllus</i> P. F. Yeo	Liliaceae	Alegre-campo-anão	Paleártico	Perenifólio	1-12	10-1	Caméfito	Herbácea	Z10	C1(grupo)
<i>Sabal palmetto</i> (Walt.) ex Schult. et Schult. f.	Palmae	Palmeira-da-carolina	Neártico	Perenifólio	1-12	6-8	Micro.	Árvore	Z8	C56(1), C58(2)
<i>Saccharum officinarum</i> L.	Gramineae	Cana-sacarina; Cana-de-açúcar	Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-3	Hemi.	Herbácea	Z9	C54(grupo)
<i>Sagittaria lancifolia</i> L.	Alismataceae	Sagitária	Neártico; Neotropical	Perenifólio	1-12	5-10	Helófito	Herbácea	Z9	C16, C55, C60 (grupo)
<i>Salix canariensis</i> C. Sm. ex Link	Salicaceae	Seixo; Seixeiro	Paleártico	Caducifólio	2-12	1-2	Micro.	Árvore	Z11	C1(5)
<i>Salix x rubens</i> Schrank.	Salicaceae	Vimeiro	Hortícola	Marcescente	1-12 (12-3)	3-5	Micro.	Arbusto	Z4	C55(1)
<i>Salvia involucrata</i> Cav.	Labiatae	Sálvia	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z9	C55(1)
<i>Salvia sessei</i> Benth.	Labiatae	Sálvia	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z9	C55(1)
<i>Salvia splendens</i> Sell ex Roem. & Schult.	Labiatae	Camarões	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Herbácea	Z10	C18(grupo)
<i>Sambucus lanceolata</i> R. Br. In Buch.	Caprifoliaceae	Sabugueiro-da-madeira	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-5	Micro.	Árvore	Z10	C1(2)
<i>Saxifraga maderensis</i> Don.	Saxifragaceae	Saxifraga-da-madeira	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-6	Hemi.	Herbácea	Z10	C1(grupo)
<i>Schefflera actinophylla</i> (Endl.) Harms	Araliaceae	Brassaia	Australiano; Oceânia	Perenifólio	1-12	8-10	Meso.	Árvore	Z10	C18(1)
<i>Schefflera elegantissima</i> (Veitch ex Mast.) Lowry & Frodin	Araliaceae	Falsa-arália	Oceânia	Perenifólio	1-12	11-2	Micro.	Arbusto	Z10	C37(2), C39(1), C55(9)
<i>Scilla maderensis</i> Mnzs.	Liliaceae	Cila-da-madeira	Paleártico	Sazonal	9-6	11-12	Geófito	Herbácea	Z11	C1(1)
<i>Scrophularia hirta</i> Lowe	Scrophulariaceae	Escrofulária	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-7	Nano.	Herbácea	Z10	C1(grupo)
<i>Sechium edule</i> (Jacq.) Sw.	Cucurbitaceae	Pepinela; Caiota; Chuchu	Neotropical	Perenifólio	1-12	7-9	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z10	C50(2)
<i>Selaginella kraussiana</i> (Kunze) A. Braun.	Sellaginellaceae	Selaginela	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z9	C1, C31, C33, C34, C55, C60 (mancha)
<i>Semele androgyna</i> (L.) Kunth.	Liliaceae	Alegre-campo	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-5	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	C1(12), C7(1), C22(1), C58(4)
<i>Sequoia sempervirens</i> (D. Don) Endl.	Cupressaceae	Sequóia	Neártico	Perenifólio	1-12	2-3	Macro.	Árvore	Z8	C2(1), C5(2), C7(1), C37(1), C39(2)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Sibthorbia peregrina</i> L.	Scrophulariaceae	Hera-terrestre; Erva-redonda	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-8	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z10	C1, C15, C23A, C31, C32, C33, C61 (grupo)
<i>Sideroxylon mirmulans</i> R. Brown in Buch	Sapotaceae	Marmulano	Paleártico	Perenifólio	1-12	8-1	Micro.	Árvore	Z10	C1(1)
<i>Sobralia macrantha</i> Lindl.	Orchidaceae	Orquídea-de-cana; Sobralia	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-10	Hemi.	Herbácea	Z11	C8, C51(grupo)
<i>Solanum mauritianum</i> Scop.	Solanaceae	Tabaqueira	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C8(1)
<i>Sonchus fruticosus</i> L.fil.	Compositae	Leituga; Língua de Vaca; Serralha da Rocha	Paleártico	Perenifólio	1-12	6-8	Nano.	Arbusto	Z10	C1(17), C23(1)
<i>Sonchus pinnatus</i> Ait.	Compositae	Leituga	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-7	Nano.	Arbusto	Z10	C1(9), C54(1)
<i>Sophora japonica</i> L.	Leguminosae (Papilionoideae)	Acácia-do- japão; Sófora-do-japão	Paleártico	Caducifólio	4-12	7-9	Micro.	Árvore	Z5	C55(1)
<i>Spathodea campanulata</i> Beauv.	Bignoniaceae	Chama-da- floresta; Tulipeiro- africano	Áfricotropical	Caducifólio	1-12 (Variação individual)	Não floriu**	Micro.	Árvore	Z11	C55(1)
<i>Stangeria eriopus</i> (Kunze) Baillon	Stangeriaceae	Cica	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	6-10	Caméfito	Arbusto	Z9	C23(1)
<i>Stenocarpus sinuatus</i> Endl.	Proteaceae	Árvore da Roda do Fogo	Australiano	Perenifólio	1-12	9-10	Micro.	Árvore	Z9	C36(2), C41(1), C47(1)
<i>Strelitzia nicolai</i> Reg. & Körn.	Strelitziaceae	Estrelícia -gigante	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C45(grupo)
<i>Strelitzia reginae</i> Banks ex Dryand.	Strelitziaceae	Estrelícia; Ave do Paraíso	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C7(grupo), C50(1), C54, C55(grupo)
<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassm.	Palmae	Coqueiro-de- jardim; Palmeira-rainha	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-7	Micro.	Árvore	Z10	C58(3)
<i>Synadenium grantii</i> Hook. f.	Euphorbiaceae	Sinadénio	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	8-11	Micro.	Arbusto suculento	Z10	C50(1)
<i>Syzygium jambos</i> (L.) Alston.	Myrtaceae	Jambeiro	Indomalaio	Perenifólio	1-12	3-7	Micro.	Árvore	Z10	C50(3), C54(1)
<i>Taxus baccata</i> L.	Taxaceae	Teixo	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-4	Micro.	Árvore	Z5	C30(2), C33(1), C34(1), C55(8)
<i>Tecomaria capensis</i> (Thunb.) Spach.	Bignoniaceae	Camarões	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C18(5)
<i>Teline maderensis</i> Webb et Berth. var. <i>maderensis</i>	Leguminosae (Papilionoideae)	Piorno	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-8	Micro.	Arbusto	Z10	C1(>50)
<i>Tetragonia tetragonoides</i> (Pallas) O. Ktze.	Aizoaceae	Espinafre; Espinafre-da-nova- zelândia	Antártico; Australiano	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea trepadora e suculenta	Z8	C49(grupo)
<i>Teucrium abutiloides</i> L' Hérít.	Labiatae	Abrotona -amarela	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-8	Nano.	Arbusto	Z10	C1(8)
<i>Teucrium betonicum</i> L' Hérít	Labiatae	Erva-branca; Abrotona	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-8	Nano.	Arbusto	Z10	C1(10)
<i>Thuja occidentalis</i> L.	Cupressaceae	Tuia-ocidental; Tuia-do-canadá	Neártico	Perenifólio	1-12	5-8	Micro.	Árvore	Z4	C8(1), C29(2), C30(1), C33A(1), C34(1), C55(8)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Thuja plicata</i> D. Don.	Cupressaceae	Tuia-gigante	Neártico	Perenifólio	1-12	1-3	Micro.	Árvore	Z6	C9(1), C30(2), C33(1), C34(1)
<i>Tibouchina grandifolia</i> Cogn.	Melastomataceae	Aranhas; Tibouchina	Neotropical	Perenifólio	1-12	9-1	Micro.	Arbusto	Z10	C6(4)
<i>Tibouchina urvilleana</i> (DC.) Cogn.	Melastomataceae	Aranhas; Tibouchina	Neotropical	Perenifólio	1-12	8-5	Micro.	Arbusto	Z10	C5(1), C10(1), C18(1), C19(5), C28(4), C37(1), C39(7)
<i>Tilia cordata</i> Mill	Tiliaceae	Tília-de-pequenas-folhas	Paleártico	Caducifólio	4-11	5-6	Micro.	Árvore	Z3	C54(1)
<i>Tilia x vulgaris</i> Hayne	Tiliaceae	Tília-comum	Hortícola	Caducifólio	4-12	6-7	Micro.	Árvore	Z3	C45(1)
<i>Tolmiea menziesii</i> Torr. & A. Gray	Saxifragaceae		Neártico	Perenifólio	1-12	4-7	Hemi.	Herbácea	Z7	C12(grupo)
<i>Tolpis succulenta</i> (Dryand. in Ait.) Lowe	Compositae	Visco	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-9	Hemi.	Herbácea	Z10	C1(grupo)
<i>Trachelospermum jasminoides</i> (Lindl.) Lem.	Apocynaceae	Jasmim-de-estrela	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-11	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z8	C55(grupo)
<i>Trachycarpus fortunei</i> (Hook.) H. A. Wendl.	Palmae	Palmeira-de-moinho-de-vento	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-6	Micro.	Árvore	Z8	C4(4), C4A(7), C9(2), C58(1), C62(1), C64(1)
<i>Tradescantia fluminensis</i> Vell. Conc.	Commelinaceae	Tradescantia	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-6	Hemi.	Herbácea trepadora	Z9	C16, C32 (grupo)
<i>Tradescantia zebrina</i> hort. ex. Bosse	Commelinaceae	Zebrina	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z9	C55(grupo)
<i>Typha angustifolia</i> L.	Typhaceae		Paleártico; Neártico	Perenifólio	1-12	6-9	Helófito	Herbácea	Z3	C60(grupo)
<i>Ulmus glabra</i> Huds.	Ulmaceae	Ulmeiro	Paleártico	Caducifólio	3-12	4	Micro.	Árvore	Z3	C55(2), C58(1)
<i>Umbilicus rupestris</i> (Salisb.) Dandy	Crassulaceae	Inhame-de-lagartixa	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-6	Hemi.	Herbácea	Z7	C1, C15(grupo)
<i>Uncinia uncinata</i> (L. f.) Kukenthal	Cyperaceae		Antártico	Perenifólio	1-12	8-9	Hemi.	Herbácea	Z8	C12(grupo)
<i>Vaccinium padifolium</i> J. E. Sm. ex Ress	Ericaceae	Uveira-da-serra	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-6	Micro.	Arbusto	Z9	C1(8)
<i>Vicia sativa</i> L.	Leguminosae (Papilionoideae)	Ervilhaca	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-6	Terófito	Herbácea trepadora	Z6	C1, C55(grupo)
<i>Viola riviniana</i> Rchb.	Violaceae	Violeta	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z5	C33A, C36, C53, C55 (grupo)
<i>Washingtonia filifera</i> (Lind. ex André) H. A. Wendl	Palmae	Palmeira-de-leque-da-califórnia	Neártico	Perenifólio	1-12	5-8	Micro.	Árvore	Z9	C56(1), C57(1)
<i>Washingtonia robusta</i> Wendl.	Palmae	Palmeira-de-leque-do-méxico	Neártico	Perenifólio	1-12	4-6	Micro.	Árvore	Z10	C54(16), C62(1)
<i>Watsonia borbonica</i> (Pourr.) Goldbl ssp. <i>ardernei</i> (Sander) Goldbl.	Iridaceae	Hastes-de-são-josé	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	3-7	Geófito	Herbácea	Z10	C42(grupo)
<i>Watsonia borbonica</i> (Pourr.) Goldbl.	Iridaceae	Hastes-de-são-josé	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	3-7	Geófito	Herbácea	Z10	C49(grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Weigela florida</i> (Bunge) A. D.C.	Caprifoliaceae	Pessegueiro-de-jardim; Veigela	Paleártico	Caducifólio	3-12	4-7	Micro.	Arbusto	Z5	C50(3), C51(3), C58(1), C569(5)
<i>Wisteria floribunda</i> (Willd.) DC	Leguminosae (Papilionoidae)	Glicinia-do-japão	Paleártico	Caducifólio	2-12	3-6	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z5	C15(1), C18(1)
<i>Wisteria sinensis</i> (Sims) Sweet.	Leguminosae (Papilionoidae)	Lilases; Glicinia	Paleártico	Caducifólio	2-12	2-5; 7-8	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z5	C15(2), C18(2)
<i>Woodwardia radicans</i> (L.) Sm.	Blechnaceae	Feto-de-botão	Paleártico	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z8	C1, C12A, C22, C23A, C30, C31, C32, C33, C33A, C35, C37, C42, C63, C64 (grupo)
<i>Xanthorrhoea australis</i> R. Br.	Liliaceae (Xanthorrhoeaceae)	Árvore-relva (Grass Tree)	Australiano	Perenifólio	1-12	2-5	Nano.	Árvore	Z9	C37(1)
<i>Xanthorrhoea johnsonii</i> A. Lee	Liliaceae (Xanthorrhoeaceae)	Árvore-relva (Grass Tree)	Australiano	Perenifólio	1-12	3-5	Nano.	Árvore	Z9	C42(2)
<i>Yucca elephantipes</i> Reg.	Agavaceae	luca-gigante	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-10	Micro.	Arbusto	Z10	C6(2), C6A(1), C34(1), C37(14), C38(1)
<i>Yucca gloriosa</i> L.	Agavaceae	luca	Neártico	Perenifólio	1-12	6-11	Micro.	Arbusto	Z7	C4A(4), C22(2), C30(2), C48(3), C54(3), C59(3)
<i>Yucca rostrata</i> Engelm.	Agavaceae	luca	Neártico	Perenifólio	1-12	5-7	Micro.	Arbusto	Z8	C37(1)
<i>Zamia furfuracea</i> L. f. in Aiton	Zamiaceae	Zamia	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-11	Hemi.	Arbusto	Z10	C23(1), C54(3)
<i>Zantedeschia aethiopica</i> (L.) Spreng.	Araceae	Jarros	Áfricotropical	Sazonal	10-7	11-5	Geófito	Herbácea	Z8	C22, C29, C33, C34, C37(grupo)

Legenda:

- Plantas que não floriram no período em estudo (Janeiro 2002 – Janeiro 2005): * plantas novas; ** plantas que nunca floriram por falta de aclimação;
- Plantas marcescentes (plantas semiperenifólias e semcaducifólias): 3-2 (**3-4**) – folhas todo o ano mas com renovação significativa em Março e Abril.

Anexo 20
CARACTERIZAÇÃO FITOGEOGRÁFICA DA QUINTA PALMEIRA

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Abelia graebneriana</i> Rehd.	Caprifoliaceae	Abélia	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-10	Nano.	Arbusto	Z5	C17 (2)
<i>Abelia x grandiflora</i> (André) Rehd.	Caprifoliaceae	Abélia	Hortícola	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z5	C17(2)
<i>Abutilon x hybridum</i> hort.	Malvaceae	Abutilão	Hortícola	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z9	C7(6), C22(1)
<i>Acacia linifolia</i> (Vent.) Willd.	Leguminosae (Mimoidaeae)	Acácia; Mimosa	Australiano	Perenifólio	1-12	1-2	Micro.	Árvore	Z9	C15(5), C16(1)
<i>Acacia meamsii</i> De Wildeman.	Leguminosae (Mimoidaeae)	Mimosa	Australiano	Perenifólio	1-12	1-8	Micro.	Árvore	Z8	C3(8), C16(1)
<i>Acacia podalyriifolia</i> G. Don.	Leguminosae (Mimoidaeae)	Acácia	Australiano	Perenifólio	1-12	12-3	Micro.	Árvore	Z8	C16(5)
<i>Acacia salicina</i> Lindl.	Leguminosae (Mimoidaeae)	Acácia	Australiano	Perenifólio	1-12	12-2	Micro.	Árvore	Z9	C13(3), C16(8)
<i>Acalypha wilkesiana</i> Muell. Arg.	Euphorbiaceae	Acálifa; Folha- de-cobre	Oceânia	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C14(1)
<i>Acanthus mollis</i> L.	Acanthaceae	Erva-gigante	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-8	Hemi.	Herbácea	Z6	C1, C2, C3, C4 (grupo)
<i>Acca sellowiana</i> (O. Berg.) Burret	Myrtaceae	Goiabeira-ananás	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-7	Micro.	Árvore	Z8	C2(3)
<i>Achillea millefolium</i> L.	Compositae	Aquileia	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-8	Caméfito	Herbácea	Z2	C18(grupo)
<i>Adiantum capillus-veneris</i> L.	Adiantaceae	Avenca; Avenca-das-fontes	Paleártico, Neotropical, Áfricotropical, Indomalaio	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z8	C2(grupo)
<i>Adiantum reniforme</i> L. var. <i>reniforme</i>	Adiantaceae	Feto-redondo; Feto-de-rim	Paleártico	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z10	C3(grupo)
<i>Aechmea fasciata</i> (Lindl.) Bak.	Bromeliaceae	Bromélia	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C2(grupo), C7(1)
<i>Aechmea fulgens</i> Brongn.	Bromeliaceae	Bromélia	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-8	Hemi.	Herbácea	Z11	C8(grupo)
<i>Aeonium arboreum</i> (L.) Webb & Berth.	Crassulaceae	Ensaio; Saião	Paleártico	Perenifólio	1-12	11-4	Nano.	Herbácea suculenta	Z9	C27(grupo)
<i>Aeonium castello-paivae</i> Bolle.	Crassulaceae	Ensaio	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-7	Nano.	Herbácea suculenta	Z10	C16A(grupo)
<i>Aeonium glutinosum</i> (Aiton.) Webb. & Berthel.	Crassulaceae	Farobo; Ensaio	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-8	Nano.	Herbácea suculenta	Z10	C2, C3, C16, C17, C21(grupo)
<i>Agapanthus camapanulatus</i> F. M. Leighton	Liliaceae	Agapantos	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	5-8	Hemi.	Herbácea	Z9	C6(grupo)
<i>Agapanthus praecox</i> Willd. ssp. <i>orientalis</i> (Leighton) Leighton	Liliaceae	Agapantos; Coroas-de-henrique	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	4-9	Hemi.	Herbácea	Z9	C1, C2, C9, C12, C13 (mancha)
<i>Agathis robusta</i> (C. Moore ex. F. Muell.) Bail.	Araucariaceae	Pinheiro-de-damara; Pinheiro-de-alegra-campo	Australiano	Perenifólio	1-12	3-4	Meso.	Árvore	Z9	C25(1)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Agave americana</i> L.	Agavaceae	Agave; Piteira	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-8	Hemi.	Herbácea suculenta	Z9	C2, C13, C14, C25 (grupo)
<i>Agave attenuata</i> Salm-Dyck	Agavaceae	Piteira; Agave-pescoço-de-cisne	Neotropical	Perenifólio	1-12	12-3	Nano.	Árvore suculenta	Z9	C2 (>50)
<i>Ageratina adenophora</i> (Spreng.) R. King. & H. Robinson	Compositae	Abundância	Neotropical	Perenifólio	1-12	3-7	Nano.	Herbácea	Z10	C1, C2 (grupo)
<i>Ageratina riparia</i> (Reg.) R. King. & H. Robinson	Compositae	Falsa-abundância	Neotropical	Perenifólio	1-12	2-6	Nano.	Herbácea	Z10	C3 (grupo)
<i>Ageratum houstonianum</i> Mill.	Compositae		Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Terófito	Herbácea	Z8	C2, C11, C22 (grupo)
<i>Agonis flexuosa</i> (Willd.) Sweet.	Myrtaceae		Australiano	Perenifólio	1-12	4-7	Micro.	Árvore	Z9	C7(1), C16(1)
<i>Alcea rosea</i> L.	Malvaceae	Malvas	Paleártico	Sazonal	3-10	5-9	Terófito	Herbácea	Z4	C18), C23(grupo)
<i>Aloe arborescens</i> Mill.	Liliaceae (Aloeaceae)	Aloés, Babosas, Foguetes-de-natal	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	11-2	Nano.	Arbusto suculento	Z9	C2, C3, C16, C25, C27, C28, C29 (grupo)
<i>Aloe aristata</i> Haw.	Liliaceae (Aloeaceae)	Aloé	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	11-1; 7-8	Hemi.	Herbácea suculenta	Z9	C24 (grupo)
<i>Aloe candelabrum</i> Berger.	Liliaceae (Aloeaceae)	Aloés	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	11-2	Micro.	Árvore suculenta	Z9	C8(3)
<i>Aloe ciliaris</i> Haw.	Liliaceae (Aloeaceae)	Aloés	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	10-6	Fane. trep.	Arbusto trepador e suculento	Z9	C3, C17 (grupo)
<i>Aloe comosa</i> Marloth & A. Berger	Liliaceae (Aloeaceae)	Aloés	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	11-12	Caméfito	Arbusto suculento	Z9	C24(1)
<i>Aloe excelsa</i> A. Berger.	Liliaceae (Aloeaceae)	Aloés	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-3	Micro.	Árvore suculenta	Z9	C14(5), C27(1)
<i>Aloe ferox</i> Mill.	Liliaceae (Aloeaceae)	Aloés	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	12-2	Nano.	Árvore suculenta	Z9	C27(2)
<i>Aloe mitriformis</i> Mill.	Liliaceae (Aloeaceae)	Aloés	Africotropical	Perenifólio	1-12	6-8	Caméfito	Arbusto suculento	Z9	C16A, C24(grupo)
<i>Aloe saponaria</i> (Ait. f.) Haw.	Liliaceae (Aloeaceae)	Aloés-sabão	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-7	Hemi.	Herbácea suculenta	Z9	C24 (grupo)
<i>Aloe vera</i> (L.) Burm.	Liliaceae (Aloeaceae)	Aloé-vera; Babosas	Paleártico; Neotropical	Perenifólio	1-12	11-6	Hemi.	Herbácea suculenta	Z8	C24(1)
<i>Alpinia zerumbet</i> (Pers.) B. L. Burt & Rosemary M. Sm.	Zingiberaceae	Alpínia; Lírio-de-porcelana	Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C10 (grupo)
<i>Alstroemeria ligtu</i> L.	Liliaceae (Alstroemeria-ceae)	Alstroemeria	Neotropical	Sazonal	4-10	5-9	Geófito	Herbácea	Z8	C21(grupo)
<i>Alstroemeria psittacina</i> Lehm.	Liliaceae (Alstroemeria-ceae)	Alstroemeria	Neotropical	Sazonal	4-10	5-9	Geófito	Herbácea	Z8	C1, C5 (grupo)
<i>Amaryllis belladonna</i> L.	Amaryllidaceae	Açucenas-da-serra; Belas-donas	Áfricotropical	Sazonal	5-7	8-11	Geófito	Herbácea	Z8	C1, C2 (grupo)
<i>Anemone x hybrida</i> Paxt.	Ranunculaceae	Anémone	Hortícola	Perenifólio	1-12	8-12	Hemi.	Herbácea	Z6	C5(grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Annona cherimola</i> Mill.	Annonaceae	Anoneira	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-7	Micro.	Árvore	Z10	C1(3), C2(2), C4(1), C16A(1)
<i>Anomatheca laxa</i> (Thunb.) Goldbl.	Iridaceae		Áfricotropical	Sazonal	4-9	6-7	Geófito	Herbácea	Z8	C20(grupo)
<i>Anredera cordifolia</i> (Ten.) Steenis	Basellaceae	Trepadeira-da- madeira; Boussingaultia	Neotropical	Caducifólio	6-2	7-9	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z9	C16 (grupo)
<i>Anthurium andraeanum</i> André.	Araceae	Antúrio	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z11	C2(grupo)
<i>Antirrhinum majus</i> L.	Scrophulariaceae	Bocas-de-peixe	Paleártico	Sazonal	3-10	3-10	Terófito	Herbácea	Z7	C19, C21, C22 (grupo)
<i>Apollonias barbuja</i> (Cav.) Bomm.	Lauraceae	Barbusano	Paleártico	Perenifólio	1-12	9-3	Meso.	Árvore	Z10	C2(8), C16(6), C28(5)
<i>Araucaria bidwillii</i> Hook. f.	Araucariaceae	Araucária-de- bidwill	Australiano	Perenifólio	1-12	2-3	Meso.	Árvore	Z9	C16(1)
<i>Araujia sericifera</i> Brot.	Asclepiadaceae	Corriola-de-seda	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-9	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z9	C2(grupo)
<i>Arbutus unedo</i> L.	Ericaceae	Medronheiro	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Árvore	Z7	C4A(1), C13(1)
<i>Arctotis x hybrida</i> hort.	Compositae	Arctótis; Margarida- africana	Hortícola	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z9	C19, C22(grupo)
<i>Argyranthemum frutescens</i> (L.) Schultz-Bip	Compositae	Estreleira; Margaridas	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C7(2)
<i>Arundo donax</i> L.	Gramineae	Cana-vieira; Cana-de-roca; Cana	Paleártico	Perenifólio	1-12	7-10	Hemi.	Herbácea	Z9	C1, C2 (grupo)
<i>Asclepias fruticosa</i> L.	Asclepiadaceae	Planta-da-seda	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	5-11	Nano.	Arbusto	Z8	C5, C6 (grupo)
<i>Asparagus asparagoides</i> (L.) Druce	Liliaceae (Asparagaceae)	Alegre-campo- miúdo	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	3-4	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z10	C1, C2, C5, C13A, C22, C28 (grupo)
<i>Asparagus densiflorus</i> (Kunth) Jassop	Liliaceae (Asparagaceae)	Esparto	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	7-8	Nano.	Herbácea	Z9	C7, C13(grupo)
<i>Asparagus scoparius</i> Lowe	Liliaceae (Asparagaceae)	Esparto	Paleártico	Perenifólio	1-12	12-2	Nano.	Arbusto	Z11	C3(1)
<i>Asparagus setaceus</i> (Kunth) Jassop	Liliaceae (Asparagaceae)	Espargo-de-folha- miúda; Esparto	Africotropical	Perenifólio	1-12	9-12	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z9	C1, C3, C24 (grupo)
<i>Asparagus umbellatus</i> Link ssp. <i>lowei</i> (Kunth) Valdés	Liliaceae (Asparagaceae)	Esparto-da- madeira	Paleártico	Perenifólio	1-12	11-6	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z11	C1(1), C2, C16, C25, C27, C28, C29(grupo)
<i>Asplenium anceps</i> Lowe ex Hook. & Grev.	Aspleniaceae	Falsa-avenca	Paleártico	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z10	C17(22)
<i>Atriplex halimus</i> L.	Chenopodiaceae	Salgadeira	Paleártico	Perenifólio	1-12	7-8	Nano.	Arbusto	Z6	C6(1), C18(1)
<i>Babiana rubrocyanea</i> (Jacq.) Ker-Gawl.	Iridaceae	Babiana	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-5	Geófito	Herbácea	Z9	C21(grupo)
<i>Babiana stricta</i> (Ait.) Ker- Gawl.	Iridaceae	Babiana	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	2-5	Geófito	Herbácea	Z9	C7, C17, C21, C22 (grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Baeckea virgata</i> (Forst. & Forst. f.) Andrews.	Myrtaceae	Béquia	Australiano	Perenifólio	1-12	6-8	Nano.	Arbusto	Z9	C7(1), C22(2)
<i>Bambusa vulgaris</i> Schräd. ex Wendl.	Gramineae	Bambu	Paleártico; Indomalaio	Perenifólio	1-12	Não floriu**	Hemi.	Herbácea	Z10	C7, C28, C29 (grupo)
<i>Bassia scoparia</i> (L.) A. J. Scott f. <i>trichophylla</i> (Schmeiss) Schinz & Thell.	Chenopodiaceae	Pinheirinho	Paleártico	Sazonal	6-11	8-9	Terófito	Herbácea	Z8	C22 (grupo)
<i>Bauhinia aculeata</i> L.	Leguminosae (Caesalpinoideae)	Bauínia	Neotropical	Perenifólio	1-12	3-7	Micro.	Árvore	Z9	C24 (1)
<i>Bauhinia variegata</i> L.	Leguminosae (Caesalpinoideae)	Bauínia; Árvore-das- orquídeas	Indomalaio	Marcescente	5-4 (12-4)	10-6	Micro.	Árvore	Z9	C2(1), C20(1)
<i>Begonia minor</i> Jacq.	Begoniaceae	Corações; Begónia- sempre- em-flor	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C5(1)
<i>Billbergia nutans</i> H. Wendl. ex Reg.	Bromeliaceae	Bromélia	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-7	Hemi.	Herbácea	Z10	C13A(grupo)
<i>Billbergia vittata</i> Brongn. ex Morel.	Bromeliaceae	Bromélia	Neotropical	Perenifólio	1-12	11-2	Hemi.	Herbácea	Z10	C7, C8 (grupo)
<i>Billbergia x windii</i> hort. Makoy ex E. Morr.	Bromeliaceae	Planta-da- amizade; Lágrimas-da- rainha	Hortícola	Perenifólio	1-12	11-2	Hemi.	Herbácea	Z10	C14 (grupo)
<i>Bituminaria bituminosa</i> (L.) C. H. Stirt.	Leguminosae	Fedegosos	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z8	C1, C3 (grupo)
<i>Bougainvillea glabra</i> Choisy	Nyctaginaceae	Buganvília	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	C2, C21, C24 (grupo)
<i>Bougainvillea spectabilis</i> Willd.	Nyctaginaceae	Buganvília	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	C2, C3, C25 (grupo)
<i>Bouvardia ternifolia</i> (Cav.) Schldl.	Rubiaceae	Bouvardia	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-8	Nano.	Arbusto	Z9	C20(1)
<i>Brachychiton acerifolius</i> Cunn. ex F. Muell.	Sterculiaceae	Árvore-do-fogo	Australiano	Caducifólio	1-5; 8-12	5-8	Micro.	Árvore	Z10	C1(3), C12(6)
<i>Brachychiton discolor</i> F. Muell.	Sterculiaceae	Árvore-do-fogo	Australiano	Caducifólio	1-5; 8-12	5-8	Micro.	Árvore	Z10	C12(1)
<i>Brachychiton populneus</i> R. Br.	Sterculiaceae	Esterculia	Australiano	Perenifólio	1-12	5-6	Meso.	Árvore	Z10	C15(2)
<i>Breynia nivosa</i> (W.G. Sm.) Small.	Euphorbiaceae	Breínia	Oceânia	Perenifólio	1-12	7-8	Nano.	Arbusto	Z11	C6(1)
<i>Brugmansia arborea</i> (L.) Lagerh.	Solanaceae	Trombeteira	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C11(1)
<i>Brugmansia aurea</i> Lagerh.	Solanaceae	Trombeteira	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C11(1)
<i>Brugmansia sanguinea</i> (Ruiz & Pav.) D. Don.	Solanaceae	Trombeteira	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C11(1)
<i>Brugmansia versicolor</i> Lagerh.	Solanaceae	Trombeteira	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C11 (grupo), C23A(1)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Brunfelsia pauciflora</i> (Cham. & Scdl.) Benth.	Solanaceae	Brunfêlsia; Manacá	Neotropical	Perenifólio	1-12	2-10	Micro.	Arbusto	Z10	C5(7), C17(1)
<i>Bulbine frutescens</i> (L.) Willd.	Liliaceae (Asphodelaceae)	Bulbine	Áfrotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Geófito	Herbácea suculenta	Z9	C22(grupo)
<i>Bulbinella hookeri</i> (Hook. f.) Cheesem.	Liliaceae (Asphodelaceae)	Bulbinella	Antártico	Perenifólio	1-12	1-12	Geófito	Herbácea suculenta	Z8	C22 (grupo)
<i>Buxus microphylla</i> Sieb. & Zucc.	Buxaceae	Buxo	Paleártico; Indomalaio	Perenifólio	1-12	3-4	Nano.	Arbusto	Z6	C5, C6, C19 (grupo)
<i>Buxus sempervirens</i> L.	Buxaceae	Buxo	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-4; 10-11	Nano.	Arbusto	Z5	C9(grupo)
<i>Calceolaria tomentosa</i> Ruiz & Pav.	Scrophulariaceae	Calceolária	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-8	Nano.	Herbácea	Z9	C2, C5 (grupo)
<i>Callisia fragrans</i> (Lindl.) Wood.	Commelinaceae	Calisia	Neotropical	Perenifólio	1-12	3-4	Hemi.	Herbácea trepadora	Z10	C4A(grupo)
<i>Callistemon linearis</i> DC.	Myrtaceae	Martinete	Australiano	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z9	C8(1)
<i>Callistemon rigidus</i> R. Br.	Myrtaceae	Martinete	Australiano	Perenifólio	1-12	4-8	Micro.	Arbusto	Z9	C1(1), C21(2)
<i>Camellia japonica</i> L.	Theaceae	Camélia; Japoneira	Paleártico	Perenifólio	1-12	11-6	Micro.	Árvore	Z8	C6(1), C4(1)
<i>Canistrum aurantiacum</i> H. E. Moore	Bromeliaceae	Cabeça-vermelha	Neotropical	Perenifólio	1-12	12-1	Hemi.	Herbácea	Z11	C11 (grupo)
<i>Canna indica</i> L.	Cannaceae	Canas-da-índia; Bananeiras-de- flor	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Geófito	Herbácea	Z9	C16(grupo)
<i>Canna x generalis</i> L. H. Bail.	Cannaceae	Canas-da-índia; Bananeiras-de- flor	Hortícola	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z9	C4, C7, C25 (grupo),
<i>Capparis spinosa</i> L.	Capparidaceae	Alcaparra	Paleártico; Indomalaio	Perenifólio	1-12	6-11	Nano.	Arbusto	Z8	C22(1)
<i>Caralluma burchardii</i> N.E. Br.	Asclepiadaceae	Caraluma	Paleártico	Perenifólio	1-12	9-12	Caméfito	Herbácea suculenta	Z9	C16A, C19, C24 (grupo)
<i>Cardiospermum grandiflorum</i> Sw.	Sapindaceae	Corriola-dos- balões	Áfrotropical; Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z10	C1, C2, C29 (grupo)
<i>Cassia javanica</i> L.	Leguminosae (Caesalpinioideae)	Cássia-rosa; Chuveiro-rosa	Indomalaio	Caducifólio	5-1	6-8	Micro.	Árvore	Z11	C11(1)
<i>Casuarina equisetifolia</i> Forst. & Forst. f.	Casuarinaceae	Casuarina	Indomalaio; Australiano; Oceânia	Perenifólio	1-12	6-11	Meso.	Árvore	Z10	C9(1)
<i>Catharanthus roseus</i> (L.) G. Don.	Apocynaceae	Maravilhas	Áfrotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Herbácea	Z10	C2, C5, C5A, C6, C21 (grupo)
<i>Ceanothus arboreus</i> Greene	Rhamnaceae		Neártico	Perenifólio	1-12	12-7	Micro.	Arbusto	Z8	C12A(1), C17(1)
<i>Cedrus libani</i> A. Rich. ssp. <i>atlantica</i> (Endl.) Battand. & Trabut	Pinaceae	Cedro-do-atlas	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-5	Meso.	Árvore	Z9	C24(1)
<i>Celtis australis</i> L.	Ulmaceae	Lódão-bastardo; Conteira; Sementeira	Paleártico	Caducifólio	4-1	5-6	Meso.	Árvore	Z8	C1(1), C2(1), C3(12), C16(10), C16A(1), C28(3), C29(5)
<i>Centranthus ruber</i> (L.) DC.	Valerianaceae	Rosa-da-rocha; Alfinetes	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Caméfito	Herbácea	Z5	C2, C19, C21,C22 (grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Centratherum muticum</i> (Humb., Bonpl. & Kunth) Less.	Compositae	Flor-botão	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Caméfito	Herbácea	Z10	C18, C22, C23 (grupo)
<i>Cestrum aurantiacum</i> Lindl.	Solanaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z11	C10 (5)
<i>Cestrum parqui</i> L'Hérit	Solanaceae	Galã-da-noite	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-11	Nano.	Arbusto	Z9	C5(1)
<i>Chamaerops humilis</i> L.	Palmae	Palmeira-das- vassouras	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-5	Micro.	Arbusto	Z9	C12(1)
<i>Chasmanthe aethiopica</i> (L.) N. E. Br.	Iridaceae	Antoliza	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	11-3	Geófito	Herbácea	Z9	C5, C16, C25 (grupo)
<i>Chlorophytum comosum</i> (Thumb.) Jacques	Liliaceae (Anthericaceae)	Fitinhas	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z9	C2, C9, C22 (grupo)
<i>Chorisia speciosa</i> A. St. Hil.	Bombacaceae	Sumaúma	Neotropical	Caducifólio	3-11	8-11	Meso.	Árvore	Z10	C1(1), C25(1), C29(1)
<i>Cinnamomum camphora</i> (L.) Sieb.	Lauraceae	Canforeira	Paleártico; Indomalaio	Perenifólio	1-12	2-4	Meso.	Árvore	Z10	C9(1), C13(2), C15(1), C25(1)
<i>Citrus limon</i> (L.) Burm.	Rutaceae	Limoeiro	Paleártico	Perenifólio	1-12	11-4	Micro.	Árvore	Z9	C26 (12)
<i>Citrus sinensis</i> (L.) Osbeck	Rutaceae	Laranjeira	Paleártico	Perenifólio	1-12	2-4	Micro.	Árvore	Z9	C26 (10)
<i>Clematis aristata</i> R. Br.	Ranunculaceae	Clematite-da- austrália	Australiano	Perenifólio	1-12	6-9	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z8	C10(grupo), C12(1), C17(2)
<i>Clematis armandii</i> Franch.	Ranunculaceae	Clematite	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-4	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z5	C5(2)
<i>Clerodendrum splendens</i> G. Don ex James	Verbenaceae	Clerodendro	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	C20(2), C21, C22(1)
<i>Clivia miniata</i> Regel	Amaryllidaceae	Clívia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	2-11	Hemi.	Herbácea	Z10	C13(grupo)
<i>Clivia nobilis</i> Lindl.	Amaryllidaceae	Clívia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	2-11	Hemi.	Herbácea	Z10	C4(grupo)
<i>Clytostoma callistigioides</i> Bur. & Schum.	Bignoniaceae	Clitostoma	Neotropical	Perenifólio	1-12	3-7	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z9	C28(1)
<i>Coelogyne mooreana</i> hort. ex Rolfe x <i>C. beccarii</i> Rchb. f.	Orchidaceae	Orquídea	Hortícola	Perenifólio	1-12	6-7	Epífita	Herbácea	Z11	C6(grupo)
<i>Colocasia esculenta</i> (L.) Schott.	Araceae	Inhame	Indomalaio	Perenifólio	1-12	5-6	Geófito	Herbácea	Z10	C1(grupo)
<i>Combretum paniculatum</i> Vent.	Combretaceae	Combreto	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	11-6	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	C22(1)
<i>Commelina benghalensis</i> L.	Commelinaceae	Erva-menina; Flor-dum-dia	Indomalaio Áfricotropical;	Perenifólio	1-12	3-9	Hemi.	Herbácea trepadora	Z9	C1, C4 (grupo)
<i>Convolvulus floridus</i> L. f.	Convolvulaceae	Convólulos	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-6	Micro.	Arbusto	Z10	C18(2)
<i>Cordyline stricta</i> (Sims) Endl.	Agavaceae	Cordilina	Australiano	Perenifólio	1-12	1-10	Nano.	Arbusto	Z10	C2(grupo)
<i>Cordyline terminalis</i> (L.) Kunth.	Agavaceae	Árvore-dos-reis	Indomalaio; Australiano; Oceânia; Antártico	Perenifólio	1-12	11-5	Micro.	Arbusto	Z10	C5(1), C12A(3)
<i>Comus nuttallii</i> Aud.	Cornaceae		Neártico	Caducifólio	3-12	6-7	Micro.	Árvore	Z7	C22(1)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Coronilla valentina</i> L. ssp. <i>glauca</i> (L.) Battand.	Leguminosae (Papilionoideae)	Pascoinhas	Paleártico	Perenifólio	1-12	12-6	Nano.	Arbusto	Z9	C2(1), C14(2), C17(1)
<i>Cortaderia selloana</i> (Schult. & Schult. f.) Asch. & Gräbn.	Gramineae	Plumas; Erva-das-pampas; Penacho-branco	Neotropical	Perenifólio	1-12	7-10	Hemi.	Herbácea	Z6	C9(4), C10(grupo)
<i>Crassula multicauda</i> Lem.	Crassulaceae	Crássula	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea suculenta	Z10	C2, C17 (grupo)
<i>Crassula ovata</i> (Mill.) Druce.	Crassulaceae	Ensaio-branco ; Planta-de-jade	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	11-3	Nano.	Arbusto suculento	Z10	C24, C27, C28 (grupo)
<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	Rosaceae	Pilriteiro	Paleártico	Caducifólio	3-11	4-5	Micro.	Árvore	Z5	C16(1)
<i>Crinum moori</i> Hook. f.	Amaryllidaceae	Crino	Áfricotropical	Sazonal	11-9	4-8	Geófita	Herbácea	Z8	C1, C3, C7 (grupo)
<i>Crinum x powellii</i> L. H. Bail.	Amaryllidaceae	Crino-rosado; Acucena-gigante	Hortícola	Sazonal	11-9	3-8	Geófita	Herbácea	Z6	C23 (grupo)
<i>Cupressus lusitanica</i> Mill.	Cupressaceae	Cedro-de-goa; Cedro-das- barracas	Neártico; Neotropical	Perenifólio	1-12	1-3	Meso.	Árvore	Z9	C10(1), C13(1), C25(1)
<i>Cupressus sempervirens</i> L.	Cupressaceae	Cipreste	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-2	Micro.	Árvore	Z8	C2(1), C9(1), C21(2)
<i>Cycas revoluta</i> Thunb.	Cycadaceae	Cicas-revoluta; Cicas-de-sagú	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-8	Micro.	Árvore	Z9	C14(1)
<i>Cymbalaria muralis</i> P. Gaertn., Mey. & Scherb.	Scrophulariaceae	Perpétua-de-roma	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-10	Hemi.	Herbácea	Z3	C3, C17 (grupo)
<i>Cymbidium insigne</i> Rolfe.	Orchidaceae	Orquídea-de- haste; Cimbidio	Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-8	Hemi.	Herbácea	Z9	C2(grupo)
<i>Cyperus involucratus</i> Rottb.	Cyperaceae		Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C2, C22 (grupo)
<i>Cyphomandra crassicaulis</i> (Ortega) Kuntze	Solanaceae	Tomateiro- arbóreo; Tomateiro-inglês	Neotropical	Perenifólio	1-12	3-10	Micro.	Arbusto	Z9	C7(1)
<i>Cyrtomium falcatum</i> (L.f.) Presl.	Dryopteridaceae	Feto-azevinho	Paleártico; Indomalaio; Áfricotropical; Oceânia	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z9	C18, C20 (grupo)
<i>Dais cotinifolia</i> L.	Thymelaeaceae		Áfricotropical	Perenifólio	1-12	11-2; 7-8	Micro.	Arbusto	Z10	C16(1), C17(1), C22(1), C24 (1)
<i>Davallia canariensis</i> (L.) Sm.	Davalliaceae	Cabrinhas	Paleártico	Perenifólio	1-12	-----	Epífita	Herbácea	Z9	C2, C13 (grupo)
<i>Deparia petersenii</i> (Kunze) M. Kato	Woodsiaceae	Feto	Indomalaio; Paleártico; Australiano; Oceânia; Antártico	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z9	C13, C17 (grupo)
<i>Dichorisandra thyrsiflora</i> Mikan.	Commelinaceae	Dicorisandra	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C6(grupo)
<i>Dietes grandiflora</i> N. E. Br.	Iridaceae	Dietes	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	4-8	Geófita	Herbácea	Z9	C1, C2, C3, C4, C7, C24 (grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO Biológico	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Dombeya cacuminum</i> Hochr..	Sterculiaceae	Dombeia; Aurora	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-4	Micro.	Árvore	Z10	C11(1), C22(1), C24(3), C25(2)
<i>Dombeya rotundifolia</i> (Hochst.) Planch.	Sterculiaceae	Dombeia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	4-5	Micro.	Árvore	Z9	C7(1)
<i>Dombeya wallichii</i> (Lindl.) B. D. Jackson	Sterculiaceae	Dombeia; Aurora	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	12-2	Micro.	Árvore	Z10	C25(3)
<i>Doranthus palmeri</i> W. Hill.	Agavaceae	Dorantes	Australiano	Perenifólio	1-12	3-6	Hemi.	Herbácea	Z10	C12(3)
<i>Dracaena deremensis</i> Engl.	Agavaceae	Dracena	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	11-12	Micro.	Arbusto	Z11	C24(5), C29(2)
<i>Dracaena draco</i> (L.) L. ssp. <i>draco</i>	Agavaceae	Dragoeiro	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-6	Micro.	Árvore	Z11	C2(2), C16(7), C28(2), C29(4)
<i>Duranta erecta</i> L.	Verbenaceae	Duranta	Neotropical	Perenifólio	1-12	7-1	Micro.	Arbusto	Z10	C9, C10(sebe), C28(1), C29(1)
<i>Echeveria elegans</i> Rose	Crassulaceae	Echeveria	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-9	Caméfito	Herbácea suculenta	Z8	C16A, C19(grupo)
<i>Echium nervosum</i> Dryand.	Boraginaceae	Massaroco	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-6	Nano.	Arbusto	Z11	C13(2), C18(5), C28 (grupo)
<i>Eichhornia crassipes</i> (Mart.) Solms-Laub.	Pontederiaceae	Jacinto-de-água	Neotropical	Perenifólio	1-12	8-10	Hidrófita	Herbácea	Z10	C17, C23 (grupo)
<i>Epidendrum ibaguense</i> HBK	Orchidaceae	Orquídea-de-cruz	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C7(2), C24(1)
<i>Epiphyllum laui</i> M. Kimmach	Cactaceae	Cacto-orquídea	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-7	Epífita	Herbácea suculenta	Z10	C24 (grupo)
<i>Eranthemum pulchellum</i> André	Acanthaceae	Salva-azul	Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C7(4)
<i>Erigeron karvinskianus</i> DC.	Compositae (Asteraceae)	Floricos; Intrometidas; Margaridas	Neotropical	Perenifólio	1-12	3-11	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z7	C2(grupo)
<i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl.	Rosaceae	Nespereira	Paleártico	Perenifólio	1-12	10-12	Micro.	Árvore	Z8	C1(1), C2(2), C15(1), C29(1)
<i>Erythrina abyssinica</i> Lam. ex DC.	Leguminosae (Papilionoideae)	Coralina-da- abissínia	Áfricotropical	Caducifólio	5-1	1-6; 9-10	Micro.	Árvore	Z10	C29(1)
<i>Erythrina caffra</i> Thunb.	Leguminosae (Papilionoideae)	Coralina	Africotropical	Caducifólio	4-11	1-5	Micro.	Árvore	Z9	C7(1), C28(1)
<i>Erythrina crista-galli</i> L.	Leguminosae (Papilionoideae)	Coraleira; Coralina-crista-de- galo	Neotropical	Marcescente	4-3 (12-3)	4-1	Micro.	Árvore	Z8	C1(4), C12(2)
<i>Erythrina lysistemon</i> Hutch.	Leguminosae (Papilionoideae)	Coralina	Áfricotropical	Marcescente	5-4 (12-4)	12-5; 7	Micro.	Árvore	Z10	C28(1)
<i>Escallonia bifida</i> Link & Otto	Grossulariaceae	Escalónia	Neotropical	Perenifólio	1-12	3-1	Micro.	Arbusto	Z9	C12(1)
<i>Eucalyptus citriodora</i> Hook.	Myrtaceae	Eucalipto-limão	Australiano	Perenifólio	1-12	12-1	Meso.	Árvore	Z10	C25(1)
<i>Eucalyptus ficifolia</i> F. Muell.	Myrtaceae	Eucalipto-de-flor- vermelha	Australiano	Perenifólio	1-12	1-12	Meso.	Árvore	Z9	C1(2), C10(1)
<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.	Myrtaceae	Eucalipto	Australiano	Perenifólio	1-12	11-4	Meso.	Árvore	Z8	C29(2)
<i>Eucalyptus robusta</i> Sm.	Myrtaceae	Eucalipto	Australiano	Perenifólio	1-12	11-4	Meso.	Árvore	Z8	C1(2), C9(1)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Eucomis bicolor</i> Bak.	Liliaceae (Hyacinthaceae)	Flor-ananás	Áfricotropical	Sazonal	6-10	7-8	Geófita	Herbácea	Z8	C15(3)
<i>Eugenia uniflora</i> L.	Myrtaceae	Pitangueira	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Árvore	Z10	C2(2), C4(2), C5(1), C6(2), C7(3), C15(1), C21(1), C23(1)
<i>Euphorbia canariensis</i> L.	Euphorbiaceae	Eufórbia-das- canárias	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-8	Micro.	Arbusto suculento	Z11	C25(grupo)
<i>Euphorbia leucocephala</i> Lotsy.	Euphorbiaceae	Eufórbia-branca	Neotropical	Caducifólio	7-4	11-12	Nano.	Arbusto	Z9	C19(3), C22(1)
<i>Euphorbia pulcherrima</i> Willd. ex Klotzsch.	Euphorbiaceae	Manhã de Páscoa	Neotropical	Caducifólio	5-2	10-3	Micro.	Arbusto	Z10	C3(1), C5(1), C6(1), C24 (grupo)
<i>Euphorbia tirucalli</i> L.	Euphorbiaceae	Eufórbia	Áfricotropical; Indomalaio	Perenifólio	1-12	4-6	Micro.	Arbusto suculento	Z10	C14(1)
<i>Ficus carica</i> L.	Moraceae	Figueira	Paleártico	Caducifólio	4-12	6-7	Micro.	Árvore	Z8	C1(5), C2(9), C3(1), C29(1)
<i>Ficus pumila</i> L.	Moraceae	Pastinha	Indomalaio; Paleártico	Perenifólio	1-12	10-12	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z8	C2, C3, C21 (grupo)
<i>Fraxinus americana</i> L.	Oleaceae	Freixo-americano	Neártico	Caducifólio	5-11	3-4	Meso.	Árvore	Z4	C9(1)
<i>Fraxinus angustifolia</i> Vahl. ssp. <i>syriaca</i> (Boiss.) Yaltirik.	Oleaceae	Freixo	Paleártico	Caducifólio	3-11	2-3	Meso.	Árvore	Z6	C7(2)
<i>Freesia alba</i> (G. L. Mey.) Gumbl.	Iridaceae	Frisia	Áfricotropical	Sazonal	12-4	12-4	Geófita	Herbácea	Z9	C14, C17A, C21, C23A (grupo)
<i>Fuchsia arborescens</i> Sims.	Onagraceae	Fúcsia -arbórea	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z9	C17(1), C22(1)
<i>Fuchsia boliviana</i> Carr.	Onagraceae	Mimos; Brincos-de- princesa	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C5(2), C6(2), C7(1)
<i>Fuchsia triphylla</i> L.	Onagraceae	Mimos; Brincos-de- princesa	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z11	C7(grupo)
<i>Furcraea foetida</i> (L.) Haw.	Agavaceae	Furcreia; Piteira	Neotropical	Perenifólio	1-12	9-12	Hemi.	Herbácea suculenta	Z10	C16(grupo)
<i>Gasteria pillansii</i> Kensit.	Liliaceae (Aloecaceae)	Gasteria	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	5-7	Hemi.	Herbácea suculenta	Z9	C17, C24(grupo)
<i>Geranium maderense</i> P. F. Yeo	Geraniaceae	Gerânio-da- madeira; Pássaras	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-6	Nano.	Herbácea	Z10	C16, C18(grupo)
<i>Geranium robertianum</i> L.	Geraniaceae	Erva-de-são- roberto	Paleártico; Neártico	Perenifólio	1-12	3-9	Hemi.	Herbácea	Z6	C2, C3 (grupo)
<i>Gerbera jamesonii</i> Bol. ex Adlam.	Compositae	Gerbera	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z8	C2(grupo)
<i>Gladiolus italicus</i> Mill	Iridaceae	Gladiolo-das- searas	Hortícola	Sazonal	3-12	4-11	Geófita	Herbácea	Z9	C7, C22(grupo)
<i>Globularia salicina</i> Lam.	Globulariaceae	Globulária; Malfurada	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-8	Nano.	Arbusto	Z11	C2, C3, C14 (grupo)
<i>Gloriosa superba</i> L.	Liliaceae (Colchicaceae)	Gloriosa	Áfricotropical; Indomalaio	Sazonal	5-7; 11-1	6-7; 12-1	Geófita	Herbácea trepadora	Z10	C7(1)
<i>Gnidia polystachya</i> Bergius	Thymelaeaceae	Gnidia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C12A, C14 (grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitoogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Goniophlebium subauriculatum</i> (Bl.) Presl.	Polypodiaceae	Feto-de-metro; Feto-chorão	Indomalaio; Australiano; Oceânia	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z10	C2, C13(grupo)
<i>Grevillea robusta</i> A. M. Cunn. ex. R. Br.	Proteaceae	Grevilea	Australiano	Perenifólio	1-12	4-7	Meso.	Árvore	Z8	C15(1)
<i>Greyia radlkoferi</i> Szyszyl.	Greyiaceae	Limpa-garrafas-do-transval	Áfricotropical	Marcescente	5-4 (1-4)	2-5	Micro.	Árvore	Z9	C18(1)
<i>Guzmania lingulata</i> (L.) Mez var. <i>minor</i> (Mez) L. B. Sm.	Bromeliaceae	Guzmania	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-11	Hemi.	Herbácea	Z11	C7(grupo)
<i>Guzmania lingulata</i> (L.) Mez.	Bromeliaceae	Bromélia	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-11	Hemi.	Herbácea	Z11	C7(grupo)
<i>Hedera canariensis</i> Willd.	Araliaceae	Hera	Paleártico	Perenifólio	1-12	7-10	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	C1(grupo)
<i>Hedera maderensis</i> K. Koch ex A. Ruthf. ssp. <i>maderensis</i>	Araliaceae	Hera	Paleártico	Perenifólio	1-12	7-10	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	C2(grupo)
<i>Hedychium gardnerianum</i> Ker-Gawl.	Zingiberaceae	Bananilha; Roca-de-vénus; Conteira	Paleártico; Indomalaio	Perenifólio	1-12	7-10	Hemi	Herbácea	Z9	C4(grupo)
<i>Heliotropium arborescens</i> L.	Boraginaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z9	C22(grupo)
<i>Hemerocallis dumortieri</i> E. Morr.	Liliaceae (Hemerocallida-ceae)	Hemerocalis; Lírio-dum-dia	Paleártico	Perenifólio	1-12	6-10	Geófito	Herbácea	Z5	C22 (grupo)
<i>Hemerocallis fulva</i> L.	Liliaceae (Hemerocallida-ceae)	Hemerocalis; Lírio-dum-dia	Paleártico	Perenifólio	1-12	6-10	Geófito	Herbácea	Z5	C22 (grupo)
<i>Hetrocentron macrostachium</i> Naud.	Melastomataceae	Heterocentro	Neotropical	Perenifólio	1-12	10-4	Nano.	Arbusto	Z10	C6(grupo)
<i>Hibbertia scandens</i> (Willd.) Dryand.	Dilleniaceae	Hibertia	Australiano	Perenifólio	1-12	3-8	Fane.trep.	Arbusto trepador	Z9	C7(1)
<i>Hibiscus mutabilis</i> L.	Malvaceae	Rosa-de-algodão	Paleártico	Perenifólio	1-12	6-11	Micro.	Arbusto	Z8	C6(1), C18(1)
<i>Hibiscus rosa-sinensis</i> L.	Malvaceae	Cardeais	Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C6(1), C9(2), C9(11), C17(3)
<i>Hibiscus syriacus</i> L.	Malvaceae	Cardeal-roxo; Hibisco-da-siria	Paleártico; Indomalaio	Caducifólio	5-11	7-9	Micro.	Arbusto	Z5	C26(1)
<i>Hippesatrum vittatum</i> (L' Hérit) Herb.	Amaryllidaceae	Raqueis	Neotropical	Sazonal	4-10	4-10	Geófito	Herbácea	Z10	C6, C11, C17A, C23 (grupo)
<i>Holmskioldia sanguinea</i> Retz.	Verbenaceae	Chapéus-de-mandarim; Chapéus-chineses	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C3(1),C6(1), C17(1), C18(1) C22 (4)
<i>Hydrangea macrophylla</i> (Thunb.) Ser.	Hydrangeaceae	Hortênsias; Novelos	Paleártico	Caducifólio	3-12	5-10	Nano.	Arbusto	Z6	C5(grupo)
<i>Hylocereus triangularis</i> (L.) Britt. & Rose	Cactaceae	Rainha-da-noite; Cacto-trepador	Neotropical	Perenifólio	1-12	7-10	Fane. trep.	Arbusto trepador e suculento	Z10	C2, C3, C16, C28 (grupo)
<i>Hymenosporum flavum</i> (Hook.) F. Muell.	Pittosporaceae	Himenospóro	Australiano	Perenifólio	1-12	3-8	Micro.	Árvore	Z9	C16(1)
<i>Illicium anisatum</i> L.	Illiciaceae	Anis-chinês	Paleártico; Indomalaio	Perenifólio	1-12	3-4	Micro.	Arbusto	Z8	C17(1)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Impatiens walleriana</i> Hook. f.	Balsaminaceae	Maravilhas	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Herbácea	Z9	C3(grupo)
<i>Ichroma cyanea</i> (Lindl.) Green.	Solanaceae	Iocroma	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z9	C17A (2)
<i>Ipomoea alba</i> L.	Convolvulaceae	Campainhas-brancas	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-10	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z10	C26(grupo)
<i>Ipomoea arborescens</i> (Humb. & Bonpl.) Don	Convolvulaceae	Árvore-glória-da-manhã	Neotropical	Caducifólio	6-11	12-2	Micro.	Arbusto	Z10	C18(1)
<i>Ipomoea indica</i> (Burm.) Merrill.	Convolvulaceae	Campainhas	Neotropical; Áfricotropical; Indomalaio; Oceânia	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z10	C2, C25 (grupo)
<i>Ipomoea purpurea</i> (L.) Roth.	Convolvulaceae	Campainhas	Neotropical	Sazonal	1-12	1-12	Terófito	Herbácea trepadora	Z10	C2, C25 (grupo)
<i>Iris germanica</i> L. var. <i>florentina</i> (L.) Dykes	Iridaceae	Lírio-branco	Paleártico	Perenifólio	1-12	2-7	Geófito	Herbácea	Z4	C6, C17, C18 (grupo)
<i>Iris japonica</i> Thunb.	Iridaceae	Lírio-do-japão	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-8	Geófito	Herbácea	Z8	C5, C6, C11 (grupo)
<i>Iris laevigata</i> Fisch	Iridaceae	Lírio	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-7	Helófito	Herbácea	Z4	C19(grupo)
<i>Iris unguicularis</i> Poir.	Iridaceae	Lírio	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Geófito	Herbácea	Z7	C3, C7(grupo)
<i>Ixia maculata</i> L.	Iridaceae	Palhinhas; Amêndoas	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	3-5	Geófito	Herbácea	Z10	C7, C22 (grupo)
<i>Jacaranda mimosifolia</i> D. Don.	Bignoniaceae	Jacarandá	Neotropical	Caducifólio	5-2	4-7; 9-10	Meso.	Árvore	Z9	C1(5), C15(1), C16(3)
<i>Jasminum azoricum</i> L.	Oleaceae	Jasmineiro-branco	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-11	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z11	C17B, C23 (grupo)
<i>Jasminum mesnyi</i> Hance.	Oleaceae	Jasmineiro-amarelo	Paleártico	Perenifólio	1-12	12-6	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z8	C16A(sebe)
<i>Jasminum odoratissimum</i> L.	Oleaceae	Jasmineiro-amarelo	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z11	C25(1)
<i>Jasminum officinale</i> L. var. <i>grandiflorum</i> (L.) Kob.	Oleaceae	Jasmineiro	Paleártico	Perenifólio	1-12	11-6	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z6	C1(2)
<i>Jasminum polyanthum</i> Franch.	Oleaceae	Jasmineiro; Jasmim-dos-poetas	Paleártico	Perenifólio	1-12	2-6	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z8	C5(2), C17(grupo)
<i>Kalanchoe blossfeldiana</i> Poelln.	Crassulaceae	Calanchoé	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto suculento	Z11	C2, C5 (grupo)
<i>Kalanchoe delagouensis</i> Ecklon & Zeyh.	Crassulaceae	Calanchoé	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	12-9	Nano.	Arbusto suculento	Z11	C17,C23(grupo)
<i>Kalanchoe fedtschenkoi</i> Hamet & Perrier.	Crassulaceae	Calanchoé	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-8	Caméfito	Arbusto suculento	Z11	C15,C19(grupo)
<i>Kalanchoe gastonis-bonnieri</i> Hamet. & Perrier	Crassulaceae	Calanchoé	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	11-2	Nano.	Arbusto suculento	Z11	C24 (grupo)
<i>Kalanchoe marmorata</i> Bak.	Crassulaceae	Calanchoé	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	11-2	Nano.	Arbusto suculento	Z11	C24 (grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Kniphofia ensifolia</i> Bak.	Liliaceae (Aloaceae)	Foguetes	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	5-7	Hemi.	Herbácea	Z9	C22 (grupo)
<i>Koelreuteria bipinnata</i> Franch.	Sapindaceae		Paleártico	Caducifólio	5-2	8-10	Micro.	Árvore	Z8	C11(1), C12(1), C15(1)
<i>Lagerstroemia indica</i> L.	Lythraceae	Laguerestrémia; Flor-de merenda; Suspiros	Paleártico; Indomalaio	Caducifólio	3-11	7-9	Micro.	Árvore	Z7	C1(2), C4(1), C26(1)
<i>Lampranthus spectabilis</i> (Haw.) N.E. Br.	Aizoaceae (Mesembryanthemaceae)	Lamprantos; Chorão	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Arbusto trepador e suculento	Z11	C19 (grupo)
<i>Lantana camara</i> L.	Verbenaceae	Lantana	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C18(3), C22(1), C24(1)
<i>Lantana montevidensis</i> (Spreng.) Briq.	Verbenaceae	Lantana	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C28(grupo)
<i>Laurus novocanariensis</i> Rivas Mart. & al.	Lauraceae	Loureiro	Paleártico	Perenifólio	1-12	11-3	Meso.	Árvore	Z10	C1(5), C2(8), C3(1), C16(9), C25(8)
<i>Lemna minor</i> L.	Lemnaceae	Pastinha; Lentilha-de-água	Indomalaio; Australiano	Perenifólio	1-12	6-10	Hidrófita	Herbácea	Z4	C6, C12C, C19 (mancha)
<i>Leonotis leonurus</i> (L.) R. Br.	Labiatae	Rabos-de-leão; Orelhas-de-leão	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	3-11	Nano.	Arbusto	Z9	C2(4), C11(2)
<i>Leptospermum scoparium</i> Forst. & Forst.	Myrtaceae	Leptospermo; Urze-de-jardim	Australiano; Antártico	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z8	C6(2), C7(1), C17(4), C18(1), C22(2)
<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) De Wit.	Leguminosae (Mimosoideae)	Aroma-branco; Leucena	Neártico	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z9	C3, C16, C25, C28 (grupo)
<i>Leucjum vernum</i> L. var. <i>vagneri</i> Stapf.	Amaryllidaceae		Paleártico	Sazonal	11-4	11-3	Geófita	Herbácea	Z5	C6(grupo)
<i>Ligustrum lucidum</i> Ait. f.	Oleaceae	Ligustro	Paleártico	Perenifólio	1-12	6-9	Micro.	Árvore	Z7	C13 (1), C16(2), C25(4), C28(3)
<i>Limonium fruticans</i> (Webb) Kuntze	Plumbaginaceae	Limónio	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z11	C18(5)
<i>Livistona australis</i> (R. Br.) Mart.	Palmae	Palmeira-de-leque	Australiano	Perenifólio	1-12	4-5	Meso.	Árvore	Z9	C29(1)
<i>Livistona chinensis</i> (Jacq.) R. Br. ex Mart.	Palmae	Palmeira-de-leque	Paleártico	Perenifólio	1-12	2-5	Meso.	Árvore	Z9	C16(1)
<i>Lobelia erinus</i> L.	Campanulaceae	Lobélia	Áfricotropical	Sazonal	4-9	4-12	Terófita	Herbácea	Z9	C5 (grupo)
<i>Lobularia maritima</i> (L.) Desv.	Cruciferae	Lobulária	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z8	C19, C21, C22 (grupo)
<i>Lonchocarpus sericeus</i> (Poir.) Kunth ex DC.	Leguminosae (Papilionoideae)	Loncocarpus	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-11	Meso.	Árvore	Z10	C29(1)
<i>Lonicera hildebrandiana</i> Collett & Hemsl.	Caprifoliaceae	Madressilva-gigante	Paleártico; Indomalaio	Perenifólio	1-12	4-8	Fane.trep.	Arbusto trepador	Z9	C4A (1)
<i>Loropetalum chinense</i> (R. Br.) Oliv.	Hamamelidaceae		Paleártico; Indomalaio	Perenifólio	1-12	12-2	Micro.	Arbusto	Z9	C4(1)
<i>Luehea grandiflora</i> Mart.	Tiliaceae	Açoita-cavalo	Neotropical	Caducifólio	6-2	12-2	Micro.	Árvore	Z11	C18(1)
<i>Lychnis coronaria</i> (L.) Desr.	Caryophyllaceae	Licnis	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-8	Nano.	Herbácea	Z4	C18 (grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Lycianthes rantonnetii</i> Carr.	Solanaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z9	C18 (grupo)
<i>Macfadyena unguis-cati</i> (L.) A. Gentry	Bignoniaceae	Bignónia-unha-de-gato	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-5	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z9	C18(1), C25(1)
<i>Magnolia grandiflora</i> L.	Magnoliaceae	Magnólia	Neártico	Perenifólio	1-12	5-8	Micro.	Árvore	Z6	C3(1)
<i>Magnolia x soulangiana</i> Soul. -Bod.	Magnoliaceae	Magnólia	Hortícola	Caducifólio	3-12	12-4	Micro.	Árvore	Z5	C5(1)
<i>Malus pumila</i> Mill.	Rosaceae	Macieira	Paleártico	Caducifólio	4-11	4-5	Micro.	Árvore	Z3	C25(1)
<i>Malvaviscus arboreus</i> Cav.	Malvaceae	Malvavisco	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z9	C22(1)
<i>Malvaviscus penduliflorus</i> DC.	Malvaceae	Malvavisco	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C18(1)
<i>Mandevilla laxa</i> (Ruiz & Pav.) Woodson	Apocynaceae	Jasmim-chileno	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-9	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	C17(1), C20(2)
<i>Maranta arundinacea</i> L.	Marantaceae	Araruta	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-6	Hemi.	Herbácea	Z11	C18(grupo)
<i>Markamia lutea</i> (Benth.) Schum.	Bignoniaceae	Marcâmia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Meso.	Árvore	Z11	C22(1)
<i>Maytenus umbellata</i> (R. Br.) Mabb.	Celastraceae	Buxo-da-rocha	Paleártico	Perenifólio	1-12	8-9	Micro.	Arbusto	Z11	C2(1), C13(1), C14(grupo), C16(1)
<i>Melaleuca argentea</i> W. Fitzg.	Myrtaceae	Melaleuca	Australiano; Oceânia	Perenifólio	1-12	Não floriu**	Micro.	Árvore	Z9	C7(1)
<i>Melaleuca hypericifolia</i> Sm.	Myrtaceae	Melaleuca-folha-de-hipericão	Australiano	Perenifólio	1-12	4-9	Micro.	Arbusto	Z9	C17(2)
<i>Melaleuca quinquenervia</i> (Cav.) S.T. Blake	Myrtaceae	Melaleuca	Australiano; Oceânia	Perenifólio	1-12	11-4	Micro.	Árvore	Z9	C20(1)
<i>Melianthus major</i> L.	Meliantaceae		Áfricotropical	Perenifólio	1-12	3-5	Micro.	Arbusto	Z9	C6(grupo)
<i>Michelia figo</i> (Lour.) Spreng	Magnoliaceae	Carocha	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-8	Micro.	Árvore	Z9	C5(1)
<i>Monstera deliciosa</i> Liebm.	Araceae	Fruto-delicioso; Costela-de-adão	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z10	C25(grupo)
<i>Montanoa bipinnatifida</i> (Kunth) K. Kock	Compositae	Malmequer-arbóreo	Neotropical	Perenifólio	1-12	11-5	Micro.	Arbusto	Z10	C17(2)
<i>Moraea polystachya</i> (Thunb.) Ker-Gawl.	Iridaceae		Áfricotropical	Perenifólio	1-12	11-3	Geófita	Herbácea	Z9	C15, C18 (grupo)
<i>Morus nigra</i> L.	Moraceae	Amoreira	Paleártico	Caducifólio	3-12	4-5	Micro.	Árvore	Z6	C25(1)
<i>Muehlenbeckia complexa</i> (Cunn.) Meissn.	Polygonaceae	Trepadeira-de-arame	Antártico	Perenifólio	1-12	7-9	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z8	C5(2), C13(grupo), C21(2)
<i>Myrtus communis</i> L.	Myrtaceae	Murta	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-7; 10-11	Micro.	Arbusto	Z8	C4(1), C13(1)
<i>Narcissus pseudonarcissus</i> L.	Amaryllidaceae	Narciso-trombeta	Paleártico	Sazonal	11-5	12-3	Geófita	Herbácea	Z6	C6, C7, C22(grupo)
<i>Narcissus tazetta</i> L.	Amaryllidaceae	Junquinhos	Paleártico	Sazonal	11-5	12-3	Geófita	Herbácea	Z8	C6, C7, C22(grupo)
<i>Neomarica caerulea</i> (Ker-Gawl.) Sprague	Iridaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	5-10	Geófita	Herbácea	Z10	C18 (grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Nephrolepis cordifolia</i> (L.) Presl.	Oleandraceae	Feto	Neotropical; Áfricotropical; Indomalaio; Oceânia; Australiano	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z10	C2(grupo)
<i>Nerine bowdenii</i> Will. Wats.	Amaryllidaceae	Nerine	Áfricotropical	Sazonal	1-7	7-12	Geófita	Herbácea	Z8	C11(grupo)
<i>Nerine samiensis</i> Herb.	Amaryllidaceae	Nerine	Áfricotropical	Sazonal	1-10	11-12	Geófita	Herbácea	Z11	C2, C21(grupo)
<i>Nerium oleander</i> L.	Apocynaceae	Sevadilha; Loendro	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-11	Micro.	Arbusto	Z9	C1(2), C24(6), C22(1)
<i>Nolina longifolia</i> (Schult.) Hemsl.	Agavaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	6-7	Nano.	Árvore	Z10	C1(1)
<i>Nolina recurvata</i> (Lem.) Hemsl.	Agavaceae	Nolina; Pata-de-elefante	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-8	Micro.	Árvore	Z9	C4(1)
<i>Nymphaea capensis</i> Thunb.	Nymphaeaceae	Nenúfar-azul-do-cabo	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	7-9	Helófita	Herbácea	Z9	C19 (grupo)
<i>Nymphoides peltata</i> (S. G. Gmel.) Kuntze	Menyanthaceae		Paleártico	Perenifólio	1-12	7-9	Hidrófita	Herbácea	Z6	C6(grupo)
<i>Ochna serrulata</i> (Hochst.) Walp.	Ochnaceae	Planta-do-rato-mikey	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	2-4	Nano.	Arbusto	Z9	C5, C18, C19, C21, C22 (grupo)
<i>Ocimum basilicum</i> L.	Labiatae	Manjerição-grande	Indomalaio	Sazonal	4-9	5-9	Terófita	Herbácea	Z10	C5, C17A, C20 (grupo)
<i>Ocotea foetens</i> (Aiton) Baill.	Lauraceae	Til	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Meso.	Árvore	Z10	C9(1), C29(1)
<i>Odontonema strictum</i> (Nees) Kuntze	Acanthaceae	Odontonema	Neotropical	Perenifólio	1-12	8-12	Nano.	Arbusto	Z10	C7(1), C8(1), C9(1), C17, C18 (grupo)
<i>Opuntia compressa</i> (Salisb.) Macbr.	Cactaceae	Cacto	Neártico	Perenifólio	1-12	5-8	Nano.	Arbusto suculento	Z8	C2 (grupo)
<i>Opuntia ficus-indica</i> (L.) Mill.	Cactaceae	Tabaibeira	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-7	Micro.	Arbusto suculento	Z9	C1(1), C2 (grupo)
<i>Osteospermum barberiae</i> (Harv.) Norl.	Compositae	Estrelas-do- cabo	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Caméfita	Arbusto	Z10	C22 (grupo)
<i>Osteospermum ecklonis</i> (DC.) Norl.	Compositae	Estrelas-do- cabo	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Caméfita	Arbusto	Z10	C22 (grupo)
<i>Oxalis pes-caprae</i> L.	Oxalidaceae	Azedas; Trevo	Áfricotropical	Sazonal	10-5	12-4	Geófita	Herbácea	Z9	C3, C7, C17, C18, C22, C25, C26, C27, C28, C29 (grupo)
<i>Pachira insignis</i> (Sw.) Savigny	Bombacaceae	Paquira	Neotropical	Perenifólio	1-12	7-8	Micro.	Árvore	Z10	C7(1)
<i>Papaver nudicaule</i> L.	Papaveraceae	Papoila-da-islândia	Paleártico; Neártico	Sazonal	2-7	3-7	Terófita	Herbácea	Z2	C6, C19, C22(grupo)
<i>Papaver somniferum</i> L.	Papaveraceae	Papoila-do-ópio	Paleártico	Sazonal	4-7	5-7	Terófita	Herbácea	Z7	C22(9)
<i>Passiflora edulis</i> Sims.	Passifloraceae	Maracujá-roxo	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-11	Fane.trep.	Arbusto trepador	Z10	C2(1), C8(1), C16(1)
<i>Pelargonium peltatum</i> (L.) L'Hérit	Geraniaceae	Malva	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z10	C19(grupo)
<i>Pelargonium tomentosum</i> Jacq.	Geraniaceae	Malva	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	5-6	Caméfita	Arbusto	Z10	C11(grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Pelargonium zonale</i> (L.) L'Hérit	Geraniaceae	Malvas	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C3 (grupo)
<i>Pennisetum villosum</i> R. Br. ex Fresen.	Gramineae		Áfricotropical	Sazonal	10-12	10-12	Hemi.	Herbácea	Z8	C19 (grupo)
<i>Peperomia argyreia</i> Morr.	Piperaceae	Conchinhas	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Caméfito	Herbácea	Z11	C6(grupo)
<i>Persea americana</i> Mill.	Lauraceae	Abacateiro	Neotropical	Perenifólio	1-12	11-5	Micro.	Árvore	Z10	C1(1), C4(1), C26(2), C27(2)
<i>Petrea volubilis</i> L.	Verbenaceae	Estrela-azul; Viuvinha	Neotropical	Perenifólio	1-12	3-12	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	C17(grupo)
<i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) A. W. Hill.	Umbelliferae	Salsa	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Herbácea	Z5	C2, C11 (grupo)
<i>Petunia x hybrida</i> hort. Vilm.- Andr.	Solanaceae	Petúnia	Hortícola	Sazonal	2-11	2-11	Terófito	Herbácea	Z9	C19(grupo)
<i>Philodendron bipinnatifidum</i> Endl.	Araceae	Filodendro	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-7	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	C9(1)
<i>Philodendron erubescens</i> K. Koch & Augustin	Araceae	Filodendro	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-6	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z11	C5(1)
<i>Phlebodium aureum</i> (L.) J. Sm.	Polypodiaceae	Polipódio-dourado	Neártico; Neotropical	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z10	C2, C20, C21 (grupo)
<i>Phoenix canariensis</i> Chabaud.	Palmae	Palmeira-das- canárias	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-3	Meso.	Árvore	Z11	C24(1), C25(8), C27(4), C29(7)
<i>Phoenix dactylifera</i> L.	Palmae	Tamareira	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-3	Meso.	Árvore	Z11	C15(1), C12(1), C21(1)
<i>Phoenix reclinata</i> Jacq.	Palmae	Tamareira-do- senegal	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	5-7	Micro.	Árvore	Z11	C16(2), C25(4)
<i>Phormium tenax</i> Forst. & Forst. f.	Agavaceae	Espadana	Antártico	Perenifólio	1-12	6-8	Hemi.	Herbácea	Z8	C26(1)
<i>Photinia serratifolia</i> (Desf.) Kalkman	Rosaceae	Fotinia	Paleártico; Indomalaio	Perenifólio	1-12	4-6	Micro.	Árvore	Z7	C22(1)
<i>Phyllostachys bambusoides</i> Sieb. & Zucc.	Gramineae	Bambu	Paleártico	Perenifólio	1-12	Não floriu**	Hemi.	Herbácea	Z8	C1(grupo)
<i>Phyllostachys nigra</i> (Lodd. Ex Lindl.) Munro	Gramineae	Bambu Negro	Paleártico	Perenifólio	1-12	Não floriu**	Hemi.	Herbácea	Z5	C7, C12A (grupo)
<i>Pinus canariensis</i> C. Sm.	Pinaceae	Pinheiro-das- canárias	Paleártico	Perenifólio	1-12	2-4	Meso.	Árvore	Z10	C16(1)
<i>Pinus halepensis</i> Mill.	Pinaceae	Pinheiro-de-alepo	Paleártico	Perenifólio	1-12	2-4	Micro.	Árvore	Z7	C14 (12), C16(23), C28 (8)
<i>Pittosporum dallii</i> Cheesem.	Pittosporaceae		Antártico	Perenifólio	1-12	1-6	Micro.	Arbusto	Z9	C4A(6)
<i>Pittosporum tobira</i> Ait.	Pittosporaceae	Tobira; Incenseiro-do-japão	Paleártico	Perenifólio	1-12	2-5; 7-8	Micro.	Árvore	Z9	C7(1)
<i>Pittosporum undulatum</i> Vent.	Pittosporaceae	Incenseiro	Australiano	Perenifólio	1-12	2-4; 6-7	Micro.	Árvore	Z9	C1(10), C2(12), C9(1), C10(1), C16(26), C24(1), C25 (5), C28(3)
<i>Platanus x acerifolia</i> (Ait.) Willd.	Platanaceae	Plátano	Hortícola	Caducifólio	4-11	4-5	Meso.	Árvore	Z7	C9(2), C12A(2)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitoogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Platycerium bifurcatum</i> (Cav.) C. Chr.	Polypodiaceae	Feto-de-corno-de-veado	Indomalaio; Oceânia; Australiano	Perenifólio	1-12	-----	Epífita	Herbácea	Z9	C6, C7, C15, C18(1), C23A(1)
<i>Plectranthus barbatus</i> Andrews	Labiatae	Falso-boldo; Boldo-da-terra	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C17(grupo)
<i>Plectranthus ecklonii</i> Benth.	Labiatae	Plectranto	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	8-11	Nano.	Arbusto	Z10	C17(3)
<i>Plectranthus oertendahlii</i> T. C. E. Fries.	Labiatae	Plectranto	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	6-12	Caméfito	Herbácea	Z10	C4A(grupo)
<i>Plectranthus thyrsoideus</i> (Bak.) B. Mathew	Labiatae	Plectranto	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	10-1	Nano.	Arbusto	Z10	C3(4), C8 (5), C16 (12), C17A(3)
<i>Plumbago auriculata</i> Lam.	Plumbaginaceae	Plumbago	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z9	C1(1), C2(grupo), C4(sebe), C28(grupo)
<i>Plumeria rubra</i> L. var. <i>acutifolia</i> (Poir.) Woodson.	Apocynaceae	Planta-dos-dentes	Neotropical	Caducifólio	5-1	6-12	Micro.	Árvore	Z10	C16(1), C18(1), C19(1), C22(2)
<i>Podocarpus totara</i> G. Benn. ex D. Don	Podocarpaceae	Podocarpos	Antártico	Perenifólio	1-12	Não floriu**	Micro.	Árvore	Z9	C25(2)
<i>Polypodium macaronesicum</i> A. E. Bobrov.	Polypodiaceae	Polipódio	Paleártico	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z10	C2, C5 (grupo)
<i>Pontederia cordata</i> L.	Pontederiaceae	Pontederia	Neártico; Neotropical	Perenifólio	1-12	5-10	Helófito	Herbácea	Z10	C19 (grupo)
<i>Portulacaria afra</i> Jacq.	Portulacaceae	Portulacária	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu**	Nano.	Arbusto suculento	Z9	C22(grupo), C24(1)
<i>Prunus persica</i> (L.) Batsch.	Rosaceae	Pessegueiro	Paleártico	Caducifólio	3-11	2-6	Micro.	Árvore	Z5	C12(1), C16(1)
<i>Psidium guajava</i> L.	Myrtaceae	Goiabeira	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-7	Micro.	Árvore	Z10	C26(4)
<i>Psidium littorale</i> Raddi.	Myrtaceae	Araçazeiro; Araçaleiro	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-7	Micro.	Árvore	Z10	C2(3)
<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn.	Dennstaedtiaceae	Feiteira	Paleártico; Neártico	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z4	C2(grupo)
<i>Pteris tremula</i> R. Br.	Pteridaceae	Feto	Australiano; Antártico; Oceânia; Áfricotropical	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z10	C17(grupo)
<i>Pteris vittata</i> L.	Pteridaceae	Feto	Paleártico; Indomalaio; Australiano, Oceânia	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z9	C2, C3, C25 (grupo)
<i>Punica granatum</i> L.	Punicaceae	Romãzeira	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-7	Micro.	Árvore	Z9	C6(1)
<i>Pyracantha angustifolia</i> (Franch.) Schneid.	Rosaceae	Perinhos; Sarça-ardente	Paleártico	Perenifólio	1-12	2-7	Micro.	Arbusto	Z7	C17(2), C17A(1), C18(2), C22(1)
<i>Pyracantha coccinea</i> Roem.	Rosaceae	Perinhos; Sarça-ardente	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-5	Micro.	Arbusto	Z6	C18 (1)
<i>Pyrostegia venusta</i> (Ker-Gawl.) Miers	Bignoniaceae	Gaitinhas	Neotropical	Perenifólio	1-12	11-5	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	C1(grupo), C2 (grupo), C24(1)
<i>Quercus ilex</i> L.	Fagaceae	Azinhiera	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-5	Meso.	Árvore	Z7	C1(6), C2(8), C3(3), C6(1), C7(1), C16(26), C25(12)
<i>Quercus robur</i> L.	Fagaceae	Carvalho	Paleártico	Caducifólio	2-11	3-5	Meso.	Árvore	Z6	C15(2)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Quisqualis indica</i> L.	Combretaceae	Quisqualis; Jasmineiro-da- índia	Áfricotropical; Indomalaio	Caducifólio	4-12	6-11	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	C21(1)
<i>Rhaphiolepis indica</i> (L.) Lindl.	Rosaceae		Paleártico	Perenifólio	1-12	4-6	Nano.	Arbusto	Z8	C17A(1)
<i>Rhaphiolepis umbellata</i> (Thunb.) Mak.	Rosaceae		Paleártico	Perenifólio	1-12	10-6	Nano.	Arbusto	Z8	C5(1), C7(1), C17(2), C17A(1)
<i>Rhododendron mucronatum</i> G. Don.	Ericaceae	Azálea-japonesa	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z5	C4(1), C12(grupo), C22(1)
<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Leguminosae (Papilionoideae)	Robínia	Neártico	Caducifólio	3-12	3-6	Meso.	Árvore	Z3	C2 (26)
<i>Roldana petasites</i> (Sims) H. Robinson & Bretell.	Compositae	Senécio	Neotropical	Perenifólio	1-12	12-4; 6-8	Micro.	Arbusto	Z9	C1, C2, C9 (grupo)
<i>Rosa banksiae</i> Ait.	Rosaceae	Roseira	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z7	C2(1), C13(1), C17(1)
<i>Rosa laevigata</i> Michx.	Rosaceae	Roseira	Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z7	C2, C3, C29 (grupo)
<i>Rosmarinus officinalis</i> L.	Labiatae	Alecrim	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z6	C13 (3)
<i>Salix canariensis</i> C. Sm. ex Link	Salicaceae	Seixo; Seixeiro	Paleártico	Caducifólio	2-12	1-2	Micro.	Árvore	Z11	C13(1)
<i>Salvia canariensis</i> L.	Labiatae	Sálvia-das- canárias	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-8	Nano.	Arbusto	Z11	C7(1)
<i>Salvia coccinea</i> Juss. ex Murray	Labiatae	Sálvia	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Herbácea	Z8	C15(grupo)
<i>Salvia guaranitica</i> St.-Hil. ex Benth.	Labiatae	Sálvia	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z9	C6, C12, C16A, C19, C20, C22 (grupo)
<i>Salvia leucantha</i> Cav.	Labiatae	Sálvia-branca	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z9	C23(grupo)
<i>Sansevieria trifasciata</i> Prain var. <i>laurentii</i> (De Wild.) N. E. Br.	Agavaceae	Língua-de-sogra	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	8-11	Hemi.	Herbácea	Z10	C2, C3, C25 (grupo)
<i>Sapium sebiferum</i> (L.) Roxb.	Euphorbiaceae	Árvore-do-sebo- da-china	Paleártico	Caducifólio	3-12	7-8	Micro.	Árvore	Z8	C22(1)
<i>Saponaria officinalis</i> L.	Caryophyllaceae		Paleártico	Perenifólio	1-12	6-9	Hemi.	Herbácea	Z5	C17, C22 (grupo)
<i>Schinus molle</i> L. non hort. ex Engl.	Anacardiaceae	Pimenteira- bastarda; Pimenteira-da-índia	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Meso.	Árvore	Z9	C23(1)
<i>Schotia latifolia</i> Jacq.	Leguminosae (Caesalpinoideae)	Scótia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	6-7	Micro.	Árvore	Z9	C13(1)
<i>Scilla maderensis</i> Mnzs.	Liliaceae	Cila-da-madeira	Paleártico	Sazonal	9-6	10-11	Geófita	Herbácea	Z11	C18, C22 (grupo)
<i>Sedum adolphii</i> Hamet.	Crassulaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	3-5	Caméfito	Arbusto suculento	Z8	C16A, C19(grupo)
<i>Selenicereus anthonyanus</i> (Alexander) D. Hunt.	Cactaceae	Cacto-da-lua	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-7	Fane. trep.	Herbácea suculenta	Z9	C23(grupo)
<i>Selenicereus grandiflorus</i> (L.) Britt. & Rose	Cactaceae	Rainha-da-noite	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-7	Fane. trep.	Herbácea suculenta	Z9	C17A (grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Semele androgyna</i> (L.) Kunth	Liliaceae	Alegre-Campo	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-5	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	C2, C3, C9, C16 (grupo)
<i>Senecio serpens</i> G. Rowley	Compositae	Bálsamo-camudo; Bálsamo-de- canudo	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Caméfito	Arbusto suculento	Z9	C24(grupo)
<i>Senna pendula</i> (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Irwin & Barnes var. <i>glabrata</i> (Vogel) Irwin & Barnes	Leguminosae (Caesalpinioideae)	Cássia; Chuva-de-ouro	Neotropical; Neártico	Perenifólio	1-12	10-1	Micro.	Arbusto	Z9	C24(2)
<i>Sideroxylon mirmulans</i> R. Brown in Buch	Sapotaceae	Marmulano	Paleártico	Perenifólio	1-12	8-1	Micro.	Árvore	Z10	C2(2)
<i>Sisyrinchium striatum</i> Sm.	Iridaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	5-8	Geófita	Herbácea	Z8	C22 (grupo)
<i>Sobralia macrantha</i> Lindl.	Orchidaceae	Orquídea-de-cana; Sobralia	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-8	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	C6, C8(grupo), C9(1), C13(1)
<i>Solandra grandiflora</i> Sw.	Solanaceae	Solandra	Neotropical	Perenifólio	1-12	3-5	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	C2(1)
<i>Solanum aviculare</i> Forst. f.	Solanaceae		Australiano	Perenifólio	1-12	5-6	Nano.	Arbusto	Z9	C12B(1)
<i>Solanum mauritanum</i> Scop.	Solanaceae	Tabaqueira	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C1, C3, C16 (grupo)
<i>Solanum pseudocapsicum</i> L.	Solanaceae	Pimenta-brava	Neotropical	Perenifólio	1-12	7-8; 12-1	Nano.	Arbusto	Z9	C5(6), C6(5), C17A(1)
<i>Solenostemon scutellarioides</i> (L.) Codd. cvs.	Labiatae	Cóleos; Basólias	Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C5 (grupo)
<i>Sonchus pinnatus</i> Ait.	Compositae	Leituga	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-7	Nano.	Arbusto	Z10	C5 (1)
<i>Sophora japonica</i> L.	Leguminosae (Papilionoideae)	Acácia-do- japão; Sófora-do-japão	Paleártico	Caducifólio	4-12	7-9	Micro.	Árvore	Z5	C2(1)
<i>Sophora secundiflora</i> (Ortega) Lagasca ex DC	Leguminosae (Papilionoideae)		Neártico	Caducifólio	1-3; 7-12	6-8	Micro.	Árvore	Z8	C15(1)
<i>Spathiphyllum wallisii</i> Reg.	Araceae	Antúrio-branco	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z11	C2(1)
<i>Spathodea campanulata</i> Beauv.	Bignoniaceae	Chama-da- floresta; Tulipeiro- africano	Áfricotropical	Caducifólio	1-12 (Variação individual)	1-12	Micro.	Árvore	Z11	C7(1), C29(1)
<i>Spiraea cantoniensis</i> Lour.	Rosaceae	Grinalda-de-noiva	Paleártico	Marcescente	3-2 (11-2)	2-9	Nano.	Arbusto	Z6	C2(grupo), C21(4)
<i>Stenotaphrum secundatum</i> (Walter) Kuntze	Gramineae	Relva; Relva-de-correr	Neotropical; Áfricotropical; Oceânia	Perenifólio	1-12	3-11	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z9	C9,C10, C19, C21, C22, C24 (mancha)
<i>Strelitzia nicotai</i> Reg. & Körn.	Strelitziaceae	Estrelícia-gigante	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C8,C9, C28(grupo)
<i>Strelitzia reginae</i> BanKs ex Dryand	Strelitziaceae	Estrelícia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C2, C10(grupo)
<i>Streptosolen jamesonii</i> (Benth.) Miers.	Solanaceae	Rapaziada	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z9	C23A(1)
<i>Strobilanthes kunthianus</i> T. Anders ex Benth.	Acanthaceae		Indomalaio	Perenifólio	1-12	3-5	Nano.	Arbusto	Z11	C17A(grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassm.	Palmae	Coqueiro-de-jardim; Palmeira-rainha	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-7	Micro.	Árvore	Z10	C29(1)
<i>Synadenium grantii</i> Hook. f.	Euphorbiaceae	Sinadénio	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	8-11	Micro.	Arbusto suculento	Z10	C17A(1), C18(1)
<i>Syzigium paniculatum</i> Gaertn.	Myrtaceae		Australiano	Perenifólio	1-12	5-10	Micro.	Árvore	Z10	C17A(1)
<i>Tagetes patula</i> L.	Compositae	Cravos-de-burro	Neotropical	Sazonal	1-9	3-8	Terófito	Herbácea	Z9	C2, C17 (grupo)
<i>Tanacetum parthenium</i> (L.) Schultz-Bip.	Compositae	Artemija; Alfinetes-de-senhora	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-10	Caméfito	Herbácea	Z6	C11(grupo)
<i>Taxodium distichum</i> (L.) Rich.	Taxodiaceae	Taxódio	Neártico	Caducifólio	4-12	4	Meso.	Árvore	Z6	C9(1)
<i>Tecoma stans</i> (L.) Juss. ex HBK.	Bignoniaceae	Estenolóbio	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C20(1)
<i>Tecomaria capensis</i> (Thunb.) Spach.	Bignoniaceae	Camarões	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C3(1), C8(1)
<i>Terminalia bellirica</i> (Gaertn.) Roxb.	Combretaceae	Amendoeira-da-índia	Indomalaio	Caducifólio	6-1	Não floriu*	Micro.	Árvore	Z10	C21(1)
<i>Tetradenia riparia</i> (Hochst.) Codd.	Labiatae	Iboza	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	12-6	Nano.	Arbusto	Z10	C18(grupo)
<i>Teucrium abutiloides</i> L'Hérit.	Labiatae	Abrotona -amarela	Paleártico	Perenifólio	1-12	6-8	Nano.	Arbusto	Z10	C27(grupo)
<i>Teucrium fruticans</i> L.	Labiatae		Paleártico	Perenifólio	1-12	12-5	Nano.	Arbusto	Z8	C6 (2), C8(3), C17A(2)
<i>Thuja occidentalis</i> L.	Cupressaceae	Tuia-do-canadá	Neártico	Perenifólio	1-12	5-8	Micro.	Árvore	Z4	C14(2)
<i>Thunbergia coccinea</i> Wallich.	Acanthaceae	Tumbérgia	Indomalaio	Perenifólio	1-12	11-4	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	C11(1)
<i>Thunbergia erecta</i> (Benth.) Anderson	Acanthaceae	Tumbérgia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C5(3), C6(5)
<i>Thunbergia grandiflora</i> (Roxb. ex Rottl.) Roxb.	Acanthaceae	Tumbérgia	Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	C17(1)
<i>Thunbergia mysorensis</i> Anderson ex Bedd.	Acanthaceae	Tumbérgia	Indomalaio	Perenifólio	1-12	2-11	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	C20(1)
<i>Tillandsia tenuifolia</i> L.	Bromeliaceae	Erva-da-fortuna; Planta-do-ar	Neotropical	Perenifólio	1-12	3-6	Epífita	Herbácea	Z9	C5(10)
<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	Leguminosae (Papilionoideae)	Tipuana; Orgulho da Bolívia	Neotropical	Marcescente	5-4 (3-4)	4-7	Meso.	Árvore	Z9	C7(1)
<i>Trachelium caeruleum</i> L.	Campanulaceae	Traquélio	Paleártico	Perenifólio	1-12	6-8	Nano.	Herbácea	Z9	C2, C21(grupo)
<i>Trachelospermum jasminoides</i> (Lindl.) Lem.	Apocynaceae	Jasmim-de-estrela	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-11	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z8	C1(1), C2 (1)
<i>Tradescantia cerinthoides</i> Kunth.	Commelinaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	2-10	Hemi.	Herbácea trepadora	Z7	C4, C5 (grupo)
<i>Tradescantia zebrina</i> hort. ex. Bosse	Commelinaceae	Zebrina	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z9	C2, C4, C27 (grupo)
<i>Tropaeolum majus</i> L.	Tropaeolaceae	Chagas	Neotropical	Sazonal	1-10	2-9	Terófito	Herbácea	Z8	C16, C27, C28, C29 (grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Umbilicus rupestris</i> (Salisb.) Dandy	Crassulaceae	Inhame-de-lagartixa	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-6	Hemi.	Herbácea	Z7	C15, C17 (grupo)
<i>Viola odorata</i> L.	Violaceae	Violeta-de-cheiro	Paleártico	Perenifólio	1-12	10-7	Hemi.	Herbácea	Z6	C19(grupo)
<i>Viola riviniana</i> Rchb.	Violaceae	Violeta	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z5	C6, C22 (grupo)
<i>Viola x witrockiana</i> Gams.	Violaceae	Amores-perfeitos	Hortícola	Perenifólio	1-12	3-8	Hemi.	Herbácea	Z5	C19, C21(grupo)
<i>Vitex agnus-castus</i> L.	Verbenaceae	Árvore-da-castidade	Paleártico	Caducifólio	5-12	7-11	Micro.	Arbusto	Z7	C22(2)
<i>Washingtonia filifera</i> (Lind. ex André) H. A. Wendl	Palmae	Palmeira-de-leque-da-califórnia; Palmeira-dos-fiapos	Neártico	Perenifólio	1-12	5-8	Micro.	Árvore	Z9	C19(1), C22(1)
<i>Watsonia borbonica</i> (Pourr.) Goldbl ssp. <i>ardernei</i> (Sander) Goldbl.	Iridaceae	Hastes-de-são-josé	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	3-7	Geófita	Herbácea	Z10	C2(grupo)
<i>Wigandia caracasana</i> H.B.K.	Hydrophyllaceae	Vigândia	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-5	Micro.	Arbusto	Z10	C2, C16 (grupo) C28(3)
<i>Wisteria sinensis</i> (Sims) Sweet.	Leguminosae (Papilionoideae)	Lilases; Glicínia	Paleártico	Caducifólio	2-12	2-5; 7-8	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z5	C2(1), C4(1), C15(grupo), C16 (1) C22 (2), C23(1)
<i>Yucca elephantipes</i> Reg.	Agavaceae	luca-gigante	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-10	Micro.	Arbusto	Z10	C16 (grupo)
<i>Yucca gloriosa</i> L.	Agavaceae	luca	Neártico	Perenifólio	1-12	6-11	Micro.	Arbusto	Z7	C9 (grupo)
<i>Yushania anceps</i> (Mitford) Yi.	Gramineae	Bambu	Paleártico	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Hemi.	Herbácea	Z9	C1 (grupo)
<i>Zantedeschia aethiopica</i> (L.) Spreng.	Araceae	Jarros; Bocas-de-jarro	Áfricotropical	Sazonal	10-7	11-5	Geófita	Herbácea	Z8	C19, C23(grupo)

Legenda:

- Plantas que não floriram no período em estudo (Janeiro 2002 – Janeiro 2005): * plantas novas; ** plantas que nunca floriram por falta de aclimação;
- Plantas marcescentes (plantas semiperenifólias e semcaducifólias): 3-2 (**3-4**) – folhas todo o ano mas com renovação significativa em Março e Abril.

Anexo 21
CARACTERIZAÇÃO FITOGEOGRÁFICA DA QUINTA JARDINS DO IMPERADOR

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Abelia x grandiflora</i> (André) Rehd.	Caprifoliaceae	Abélia	Hortícola	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z5	C9(3)
<i>Abies alba</i> Mill.	Pinaceae	Abeto-prateado	Paleártico	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Micro.	Árvore	Z6	C15(1)
<i>Abies nordmanniana</i> (Steven) Spach.	Pinaceae	Abeto-do-cáucaso	Paleártico	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Micro.	Árvore	Z4	C13(1), C15(2)
<i>Acacia dealbata</i> Link.	Leguminosae (Mimosoideae)	Mimosa	Australiano	Perenifólio	1-12	12-3	Meso.	Árvore	Z8	C19(3), C20(7)
<i>Acacia longifolia</i> (Andr.) Willd.	Leguminosae (Mimosoideae)	Acácia-das-espigas	Australiano	Perenifólio	1-12	1-6	Micro.	Árvore	Z8	C1(1), C20(2)
<i>Acacia meamsii</i> De Wildeman.	Leguminosae (Mimosoideae)	Mimosa	Australiano	Perenifólio	1-12	1-8	Micro.	Árvore	Z8	C6(1), C20(>50)
<i>Acacia melanoxylon</i> R. Br.	Leguminosae (Mimosoideae)	Acácia-austrália	Australiano	Perenifólio	1-12	1-4	Meso.	Árvore	Z8	C6(12), C20(>50)
<i>Acacia verticillata</i> (L'Hérit.) Willd.	Leguminosae (Mimosoideae)	Acácia	Australiano	Perenifólio	1-12	1-3	Micro.	Árvore	Z8	C6(1)
<i>Acalypha wilkesiana</i> Muell. Arg.	Euphorbiaceae	Acálifa;	Oceânia	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C9(3)
<i>Acanthus mollis</i> L.	Acanthaceae	Erva-gigante	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-8	Hemi.	Herbácea	Z6	C6(grupo)
<i>Acer negundo</i> L.	Aceraceae	Ácer	Neártico	Caducifólio	4-11	5-6	Micro.	Árvore	Z4	C1(3)
<i>Acer palmatum</i> Thunb.	Aceraceae	Ácer-do-japão	Paleártico	Caducifólio	4-11	4	Micro.	Árvore	Z5	C1(7), C11(1), C13(1)
<i>Acer platanoides</i> L.	Aceraceae	Ácer-da-noruega	Paleártico	Caducifólio	4-11	4	Meso.	Árvore	Z4	C18(2)
<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	Aceraceae	Ácer; Sicômoro; Bordo	Paleártico	Caducifólio	4-11	4	Meso.	Árvore	Z5	C12(1), C17(1), C18(1)
<i>Achyranthes sicula</i> (L.) All.	Amaranthaceae		Paleártico	Perenifólio	1-12	2-10	Nano.	Arbusto	Z9	E6(grupo)
<i>Aesculus hippocastanum</i> L.	Hippocastanaceae	Castanheiro-de-cavalo; Castanheiro-da-índia	Paleártico	Caducifólio	3-12	4-5	Meso.	Árvore	Z6	C3(1), C4(1), C13(1), C17(1)
<i>Aesculus x carnea</i> Hayne	Hippocastanaceae	Castanheiro-da-índia; Castanheiro-dos-cavalos	Hortícola	Caducifólio	3-11	4-5	Micro.	Árvore	Z4	C4(1)
<i>Agapanthus praecox</i> Willd. ssp. <i>orientalis</i> (Leighton) Leighton	Liliaceae	Agapantos; Coroas-de-henrique	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	4-9	Hemi.	Herbácea	Z9	C1, C3, C6, C9, C10, C11, C17, C18 (mancha)
<i>Agave attenuata</i> Salm-Dyck	Agavaceae	Piteira; Agave-pescoço-de-cisne	Neotropical	Perenifólio	1-12	12-3	Nano.	Árvore suculenta	Z9	C6(5)
<i>Ageratina adenophora</i> (Spreng.) R. King. & H. Robinson	Compositae	Abundância	Neotropical	Perenifólio	1-12	3-7	Nano.	Herbácea	Z10	C6(grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Ageratina riparia</i> (Reg.) R. King. & H. Robinson	Compositae	Falsa-abundância	Neotropical	Perenifólio	1-12	2-6	Nano.	Herbácea	Z10	C5, C6(grupo)
<i>Albizia lophantha</i> Benth.	Leguminosae (Mimodoideae)	Albizia	Australiano	Perenifólio	1-12	10-1	Micro.	Árvore	Z9	C3(7), C13(2)
<i>Allium triquetrum</i> L.	Liliaceae (Alliaceae)	Alho-bravo; Alinhos	Paleártico	Sazonal	12-4	12-4	Geófita	Herbácea	Z8	C10, C12 (grupo)
<i>Aloe capitata</i> Bak.	Liliaceae (Aloeaceae)	Aloés	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	4-5	Hemi.	Herbácea suculenta	Z9	C6(grupo)
<i>Aloe plicatilis</i> (L.) Mill.	Liliaceae (Aloeaceae)	Aloés	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	2-4	Nano.	Árvore suculenta	Z9	C6(2)
<i>Aloe pratenensis</i> Bak.	Liliaceae (Aloeaceae)	Aloés	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	12-2	Caméfito	Árvore suculento	Z9	C6(grupo)
<i>Aloe saponaria</i> (Ait. f.) Haw.	Liliaceae (Aloeaceae)	Aloés-sabão	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-7	Hemi.	Herbácea suculenta	Z9	C6(grupo)
<i>Alternanthera ficoidea</i> (L.) R. Br.	Amaranthaceae	Pirriquitos	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Caméfito	Herbácea	Z10	C5, C11 (grupo)
<i>Amaryllis belladonna</i> L.	Amaryllidaceae	Açucenas-da-serra; Belas-donas	Áfricotropical	Sazonal	5-7	8-11	Geófita	Herbácea	Z8	C9(grupo)
<i>Antirrhinum majus</i> L.	Scrophulariaceae	Bocas-de-peixe	Paleártico	Sazonal	3-10	3-10	Terófita	Herbácea	Z7	C5(grupo)
<i>Apollonias barbujana</i> (Cav.) Bomm.	Lauraceae	Barbusano	Paleártico	Perenifólio	1-12	9-3	Meso.	Árvore	Z10	C6(2)
<i>Araucaria bidwillii</i> Hook. f.	Araucariaceae	Araucária-de- bidwill	Australiano	Perenifólio	1-12	2-3	Meso.	Árvore	Z9	C6(2)
<i>Araucaria heterophylla</i> (Salisb.) Franco	Araucariaceae	Araucária; Pinheira	Oceânia	Perenifólio	1-12	2-3	Macro.	Árvore	Z9	C9(1), C10(1), C12(1), C13(1)
<i>Arbutus menziesii</i> Pursh.	Ericaceae	Medronheiro	Neártico	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Micro.	Árvore	Z7	C9(2)
<i>Arbutus unedo</i> L.	Ericaceae	Medronheiro	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Árvore	Z7	C3(1), C9(2)
<i>Arbutus x andrachnoides</i> Link.	Ericaceae	Medronheiro	Paleártico	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Micro.	Árvore	Z6	C9(2)
<i>Arctium minus</i> Bernh.	Compositae	Bardana	Paleártico	Perenifólio	1-12	7-9	Terófita	Herbácea	Z3	C4, C10 (grupo)
<i>Arctotis x hybrida</i> hort.	Compositae	Arctótis; Margarida- africana	Hortícola	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z9	C4, C5(grupo)
<i>Argyranthemum dissectum</i> (Lowe) Lowe	Compositae	Pampilhos; Estreleira; Malmequeres	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-7	Nano.	Arbusto	Z10	C9A(1), C10(grupo)
<i>Argyranthemum haematoma</i> (Lowe) Lowe	Compositae	Estreleira; Malmequeres	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-7	Nano.	Arbusto	Z10	C9A(1)
<i>Argyranthemum pinnatifidum</i> (L. f.) Lowe ssp. <i>pinnatifidum</i>	Compositae	Estrelas; Pampilhos; Malmequeres	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C9A(1), C10(1)
<i>Argyranthemum pinnatifidum</i> (L. f.) Lowe ssp. <i>succulentum</i> (Lowe) Humphr.	Compositae	Estrelas; Pampilhos; Malmequeres	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-7	Nano.	Arbusto	Z11	C6(1)
<i>Artemisia argentea</i> L'Hérit.	Compositae	Losna	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-7	Nano.	Arbusto	Z11	C6(2)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Asclepias physocarpa</i> (E. Mey.) Schltr.	Asclepiadaceae	Planta-da-seda; Balões-de-são-joão	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	5-7	Nano.	Arbusto	Z9	C6(1)
<i>Asparagus officinalis</i> L.	Liliaceae (Asparagaceae)	Espargo	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Herbácea	Z4	C4 (grupo)
<i>Asplenium onopteris</i> L.	Aspleniaceae	Avenca-negra	Paleártico	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z6	C4(grupo)
<i>Baeckea virgata</i> (Forst. & Forst. f.) Andrews.	Myrtaceae	Urze-miúda	Australiano	Perenifólio	1-12	6-8	Nano.	Arbusto	Z9	C3(1), C6(12), C9(5), C10(2)
<i>Berberis maderensis</i> Lowe	Berberidaceae	Ameixieira-de- espinho; Fustete	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-5	Micro.	Arbusto	Z10	C10(3)
<i>Bergenia crassifolia</i> (L.) Fritsch.	Saxifragaceae	Bergénia; Couve-de- jardim	Paleártico	Perenifólio	1-12	11-4	Caméfito	Herbácea	Z3	C8, C13 (grupo)
<i>Betula pendula</i> Roth.	Betulaceae	Bétula; Vidoeiro- branco	Paleártico	Caducifólio	4-11	3-4	Micro.	Árvore	Z2	C1(2)
<i>Brugmansia aurea</i> Lagerh.	Solanaceae	Trombeteira	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C11(1)
<i>Brugmansia versicolor</i> Lagerh.	Solanaceae	Trombeteira	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C11(5)
<i>Brunfelsia pauciflora</i> (Cham. & Scltd.) Benth.	Solanaceae	Brunfêlsia; Manacá	Neotropical	Perenifólio	1-12	2-10	Micro.	Arbusto	Z10	C9(3)
<i>Buddleja davidii</i> Franch. cvs.	Loganiaceae	Budléia	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-10	Micro.	Arbusto	Z5	C3(2)
<i>Bulbine frutescens</i> (L.) Willd.	Liliaceae (Asphodelaceae)	Bulbine	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Geófita	Herbácea suculenta	Z9	C8, C13 (grupo)
<i>Buxus microphylla</i> Sieb. & Zucc.	Buxaceae	Buxo	Paleártico; Indomalaio	Perenifólio	1-12	3-4	Nano.	Arbusto	Z6	C5, C11, C13, C15 (sebe)
<i>Buxus sempervirens</i> L.	Buxaceae	Buxo	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-4; 10-11	Nano.	Arbusto	Z5	C1, C2, C3, C4, C7,C8, C9 (sebe)
<i>Buxus sempervirens</i> L. var. <i>arborescens</i>	Buxaceae	Buxo	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-4	Micro.	Arbusto	Z5	C1(4), C6(>20), C11(3), C12(4), C13(4)
<i>Calceolaria tomentosa</i> Ruiz & Pav.	Scrophulariaceae	Calceolária	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-8	Nano.	Herbácea	Z9	C5(grupo)
<i>Calliandra portoricensis</i> (Jacq.) Benth.	Leguminosae (Mimosoideae)	Caliandra	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-9	Micro.	Arbusto	Z10	C9(3)
<i>Calliandra surinamensis</i> Benth.	Leguminosae (Mimosoideae)	Caliandra	Neotropical	Perenifólio	1-12	9-11	Micro.	Arbusto	Z11	C9(3)
<i>Calliandra tweedii</i> Benth.	Leguminosae (Mimosoideae)	Caliandra	Neotropical	Perenifólio	1-12	11-3	Micro.	Arbusto	Z10	C9(3)
<i>Callistemon citrinus</i> (Curtis) Skeels.	Myrtaceae	Martinete	Australiano	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z8	C3(3), C4(1), C8(2)
<i>Callistemon formosus</i> S. T. Blake	Myrtaceae	Martinete	Australiano	Perenifólio	1-12	4-6	Micro.	Arbusto	Z10	C3(1)
<i>Callistemon linearis</i> DC.	Myrtaceae	Martinete	Australiano	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z9	C4(2), C8(1)
<i>Callistemon paludosus</i> F. Muell.	Myrtaceae	Martinete	Australiano	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Micro.	Arbusto	Z9	C3(1)
<i>Callistemon rigidus</i> R. Br.	Myrtaceae	Martinete	Australiano	Perenifólio	1-12	4-8	Micro.	Arbusto	Z9	C4(2), C8(2)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Callistemon salignus</i> (Sm.) DC	Myrtaceae	Martinete	Australiano	Perenifólio	1-12	3-11	Micro.	Arbusto	Z9	C3(2)
<i>Callitris rhomboidea</i> R. Br. ex Rich.	Cupressaceae	Falso-cedro	Australiano	Perenifólio	1-12	3-4	Micro.	Árvore	Z8	C9(2)
<i>Calocedrus decurrens</i> (Torr.) Florin.	Cupressaceae	Cedro-do-incenso	Neártico	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Micro.	Árvore	Z5	C15(2), C17(1)
<i>Calodendrum capense</i> (L. f.) Thunb.	Rutaceae	Castanheiro-do-cabo	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	Nunca floriu	Micro.	Árvore	Z9	C15(1)
<i>Camellia japonica</i> L.	Theaceae	Camélia; Japoneira	Paleártico	Perenifólio	1-12	11-6	Micro.	Árvore	Z8	C1(1), C3(3), C4(1), C6(7), C8(23), C9(6), C10(1), C12(1)
<i>Canna x generalis</i> L. H. Bail.	Cannaceae	Canas-da-índia; Bananeiras-de-flor	Hortícola	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z9	C10(grupo)
<i>Castanea sativa</i> Mill.	Fagaceae	Castanheiro	Paleártico	Caducifólio	3-12	3-8	Meso.	Árvore	Z5	C1(1), C4(1), C6(1), C11(1), C12(3), C13(2), C18(1), C19(2), C20(3)
<i>Cedrus deodara</i> (D. Don) G. Don.	Pinaceae	Cedro- deodara; Cedro-dos-himalaia	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-5	Meso.	Árvore	Z7	C1(2)
<i>Cedrus libani</i> A. Rich. ssp. <i>atlantica</i> (Endl.) Battand. & Trabut	Pinaceae	Cedro-do-atlas	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-5	Meso.	Árvore	Z9	C1(1), C6(2), C15(1)
<i>Celtis australis</i> L.	Ulmaceae	Lodão-bastardo; Conteira	Paleártico	Caducifólio	4-1	5-6	Meso.	Árvore	Z8	C4(1), C15(1), C18(1)
<i>Centranthus ruber</i> (L.) DC.	Valerianaceae	Rosa-da-rocha; Alfinetes	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Caméfito	Herbácea	Z5	C3(grupo)
<i>Cephalotaxus harringtoniana</i> (Forbes) Koch.	Cephalotaxaceae		Paleártico	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Micro.	Arbusto	Z6	C20(2)
<i>Cercis siliquastrum</i> L.	Leguminosae (Papilionoideae)	Olaia; Árvore-de- judas	Paleártico	Caducifólio	4-11	10-5	Micro.	Árvore	Z7	C6(3)
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> (Murray) Parl.	Cupressaceae	Cedro-de-oregão	Neártico	Perenifólio	1-12	1-2	Micro.	Árvore	Z6	C9(2), C12(15), C14(1), C18(24), C16(grupo)
<i>Chamaecyparis thyoides</i> (L.) BSP.	Cupressaceae		Neártico	Perenifólio	1-12	Nunca floriu	Micro.	Árvore	Z5	C9(1), C10(1), C15(1), C17(1)
<i>Chamaelaucium uncinatum</i> Schauer.	Myrtaceae	Flor-de-cera	Australiano	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C11(3)
<i>Chasmanthe aethiopica</i> (L.) N. E. Br.	Iridaceae	Antoliza	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	11-3	Geófita	Herbácea	Z9	C10 (grupo)
<i>Chelidonium majus</i> L.	Papaveraceae	Celidónia; Cedronha	Paleártico	Perenifólio	1-12	2-8	Hemi.	Herbácea	Z6	C1, C4, C10, C13 (grupo)
<i>Chlorophytum comosum</i> (Thumb.) Jacques	Liliaceae (Anthericaceae)	Fitinhas	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z9	C8(grupo)
<i>Cinnamomum camphora</i> (L.) Sieb.	Lauraceae	Canforeira	Paleártico; Indomalaio	Perenifólio	1-12	2-4	Meso.	Árvore	Z10	C6(1)
<i>Citrus limon</i> (L.) Burm.	Rutaceae	Limoeiro	Paleártico	Perenifólio	1-12	11-4	Micro.	Árvore	Z9	C4(1)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Clethra arborea</i> Ait.	Clethraceae	Folhado; Folhadeiro	Paleártico	Perenifólio	1-12	7-10	Micro.	Árvore	Z10	C10(3)
<i>Clinopodium ascendens</i> (Jord.) Samp.	Labiatae	Neveda	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-10	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z7	C8(grupo)
<i>Clivia miniata</i> Regel	Amaryllidaceae	Clívia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	2-11	Hemi.	Herbácea	Z10	C1, C5(grupo)
<i>Clivia nobilis</i> Lindl.	Amaryllidaceae	Clívia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	2-11	Hemi.	Herbácea	Z10	C5(grupo)
<i>Coelogyne cristata</i> Lindl.	Orchidaceae	Orquídea	Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-4	Epífita	Herbácea	Z10	C10(grupo)
<i>Commelina benghalensis</i> L.	Commelinaceae	Erva-menina; Flor-dum-dia	Indomalaio Áfricotropical;	Perenifólio	1-12	3-9	Hemi.	Herbácea trepadora	Z9	C4, C10, C13 (grupo)
<i>Coprosma repens</i> A. Rich.	Rubiaceae	Coprosma	Antártico; Australiano	Perenifólio	1-12	4-5	Micro.	Arbusto	Z9	C11(3)
<i>Cordyline australis</i> (Forst.) Endl.	Agavaceae	Cordilina	Antártico	Perenifólio	1-12	4-7	Micro.	Árvore	Z9	C1(1), C3(2), C9(2), C13(1), C15(2), C17(2), C18(1)
<i>Coreopsis auriculata</i> L.	Compositae	Margarida-amarela	Neártico	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z4	C5(grupo)
<i>Cortaderia selloana</i> (Schult. & Schult. f.) Asch. & Gräbn.	Gramineae	Plumas; Erva-das-pampas; Penacho-branco	Neotropical	Perenifólio	1-12	7-10	Hemi.	Herbácea	Z6	C1(4), C3(6), C13(grupo)
<i>Cosmos bipinnatus</i> Cav.	Compositae	Cosmos	Neártico; Neotropical	Sazonal	3-7	3-6	Terófito	Herbácea	Z8	C5 (grupo)
<i>Crataegus laevigata</i> (Poir.) DC	Rosaceae	Pilriteiro	Paleártico	Caducifólio	5-12	5-6	Micro.	Árvore	Z5	C15A(1)
<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	Rosaceae	Pilriteiro	Paleártico	Caducifólio	3-11	4-5	Micro.	Árvore	Z5	C10(1)
<i>Cryptomeria japonica</i> (L.f.) Don	Taxodiaceae	Criptoméria- elegante	Paleártico	Perenifólio	1-12	12-3	Meso.	Árvore	Z7	C6(2), C9(3), C10(3), C18(1)
<i>Culcita macrocarpa</i> C. Presl.	Dicksoniaceae	Feto-abrum; Feto-cabelinho	Paleártico	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z9	C9A(1)
<i>Cupressus lusitanica</i> Mill.	Cupressaceae	Cedro-de-goá; Cedro-das- barracas	Neártico; Neotropical	Perenifólio	1-12	1-3	Meso.	Árvore	Z9	C3(2), C9(2)
<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartw. ex Gordon	Cupressaceae	Cipreste-de- monterrey; Cedro-de- monterrey	Neártico	Perenifólio	1-12	1-2	Meso.	Árvore	Z8	C15(1)
<i>Cyathea cooperi</i> (F. Mueller) Domin.	Cyatheaceae	Feto-arbóreo	Australiano	Perenifólio	1-12	-----	Micro.	Árvore	Z10	C9(1), C15(3)
<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.	Gramineae	Relva-bermuda	Cosmopolita	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z7	C10(tapete)
<i>Cyrtomium falcatum</i> (L.f.) Presl.	Dryopteridaceae	Feto-azevinho	Paleártico; Indomalaio; Áfricotropical; Oceânia	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z9	C4 (grupo)
<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link.	Leguminosae (Papilionoideae)	Giesta	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-7	Micro.	Arbusto	Z5	C6(grupo)
<i>Dasyllirion longissimum</i> Lem.	Agavaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Nano.	Árvore	Z9	C9(2), C10(1)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitoceográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Dasyllirion serratifolium</i> Karw. ex Schult. f.	Agavaceae		Neártico; Neotropical	Perenifólio	1-12	6-9	Nano.	Árvore	Z9	C6(2), C7(1)
<i>Davallia canariensis</i> (L.) Sm.	Davalliaceae	Cabrinhas	Paleártico	Perenifólio	1-12	-----	Epífita	Herbácea	Z9	C3, C6 (grupo)
<i>Delairea odorata</i> Lem.	Compositae	Tasneirinha	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	12-3	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z9	C2, C3(grupo), C9(1), C14(grupo)
<i>Delphinium x belladonna</i> hort. ex Bergmans	Ranunculaceae	Esporas	Hortícola	Sazonal	4-9	5-8	Terófito	Herbácea	Z3	C11(grupo)
<i>Dietes iridioides</i> (L.) Klatt.	Iridaceae	Dietes	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-5	Geófito	Herbácea	Z9	C5(grupo)
<i>Dracaena draco</i> (L.) L. ssp. <i>draco</i>	Agavaceae	Dragoeiro	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-6	Micro.	Árvore	Z11	C3(2)
<i>Duchesnea indica</i> (Andrews) Focke.	Rosaceae	Morangueiro-selvagem	Paleártico; Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi..	Herbácea trepadora	Z6	C10(mancha)
<i>Echium candicans</i> L. f.	Boraginaceae	Massaroco	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-6	Micro.	Arbusto	Z10	C6(4), C9A(2)
<i>Erica arborea</i> L.	Ericaceae	Urze-arbórea; Urze-molar; Betouro	Paleártico	Perenifólio	1-12	12-4	Micro.	Arbusto	Z8	C6(1), C8(1)
<i>Erica platycodon</i> (Webb & Berthel.) Rivas Mart. & al. ssp. <i>madericola</i> (D. C. McClint.) Rivas Mart. & al.	Ericaceae	Urze-das-vassouras; Urze-durázia	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-6	Micro.	Arbusto	Z10	C6(2), C10(2)
<i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl.	Rosaceae	Nespereira	Paleártico	Perenifólio	1-12	10-12	Micro.	Árvore	Z8	C6(1)
<i>Erysimum bicolor</i> (Hornem.) DC.	Cruciferae	Goivo-da-serra	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-5	Nano.	Arbusto	Z10	C10(3)
<i>Eschscholzia californica</i> Cham.	Papaveraceae	Papoila-da-califórnia	Neártico	Sazonal	3-6	3-6	Terófito	Herbácea	Z6	C5(grupo)
<i>Eucalyptus robusta</i> Sm.	Myrtaceae	Eucalipto	Australiano	Perenifólio	1-12	1-2	Meso.	Árvore	Z9	C6(1)
<i>Euonymus japonicus</i> Thunb.	Celastraceae	Verdegaio	Paleártico	Perenifólio	1-12	7-8; 11-12	Micro.	Arbusto	Z7	C9(3)
<i>Euphorbia mellifera</i> Ait.	Euphorbiaceae	Alindres; Figueira-do-inferno	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-5	Micro.	Arbusto	Z10	C10(1)
<i>Euphorbia pulcherrima</i> Willd. ex Klotzsch.	Euphorbiaceae	Manhã-de-páscoa	Neotropical	Caducifólio	5-2	10-3	Micro.	Arbusto	Z10	C4(3), C9(3)
<i>Euryops pectinatus</i> (L.) Cass.	Compositae	Estrelira-amarela	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z9	C3, C4, C6(grupo)
<i>Fagus sylvatica</i> L.	Fagaceae	Faia-europeia	Paleártico	Caducifólio	4-12	4-5	Meso.	Árvore	Z5	C9(1), C10(3)
<i>Fagus sylvatica</i> L. var. <i>purpurea</i> (Ait.) Schneid.	Fagaceae	Faia-europeia; Faia-de-cobre	Paleártico	Caducifólio	4-12	4-5	Meso.	Árvore	Z5	C9(1), C10(3), C17(1)
<i>Farfugium japonicum</i> (L.) Kitam.	Compositae	Patás-de-cavalo; Boínas	Paleártico	Perenifólio	1-12	6-3	Hemi.	Herbácea	Z7	C8(grupo)
<i>Felicia amelloides</i> (L.) Voss.	Compositae	Felícia; Margarida-azul	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z9	C5 (grupo)
<i>Festuca elatior</i> L.	Gramineae	Relva; Grama	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z5	C10(tapete)
<i>Frangula azorica</i> V. Grubow	Rhamnaceae	Ginjeira-brava; Tintureira	Paleártico	Caducifólio	2-10	5-7	Micro.	Árvore	Z9	C6(2)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Fraxinus ornus</i> L.	Oleaceae	Freixo	Paleártico	Caducifólio	4-1	4-5	Micro.	Árvore	Z6	C18(1)
<i>Freesia alba</i> (G. L. Mey.) Gumbl.	Iridaceae	Frisia	Áfricotropical	Sazonal	12-4	12-4	Geófita	Herbácea	Z9	C8(grupo)
<i>Fuchsia magellanica</i> Lam.	Onagraceae	Fúcsia; Brincos-de- princesa; Mimos	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z7	C3, C17(grupo)
<i>Galactites tomentosa</i> Moench.	Compositae	Cardo; Galactite	Paleártico	Sazonal	2-5	2-6	Terófito	Herbácea	Z9	C6, C20(grupo)
<i>Geranium maderense</i> P. F. Yeo	Geraniaceae	Gerânio-da- madeira; Pássaras	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-6	Nano.	Herbácea	Z10	C9A,C10(grupo)
<i>Geranium palmatum</i> Cav.	Geraniaceae	Gerânio-de- folha- de-anêmona	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-12	Nano.	Herbácea	Z10	C9A, C10(grupo)
<i>Geranium robertianum</i> L.	Geraniaceae	Erva-de-são- roberto	Paleártico; Neártico	Perenifólio	1-12	3-9	Hemi.	Herbácea	Z6	C5, C6, C10 (grupo)
<i>Gerbera jamesonii</i> Bol. ex Adlam.	Compositae	Gerbera	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z8	C5, C8 (grupo)
<i>Grevillea banksii</i> R. Br.	Proteaceae	Grevilea	Australiano	Perenifólio	1-12	3-5	Micro.	Arbusto	Z9	C3(2)
<i>Grevillea curviloba</i> McGillivray	Proteaceae	Grevilea	Australiano	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Hemi.	Arbusto	Z9	C13(1)
<i>Grevillea juniperina</i> R. Br.	Proteaceae	Grevilea	Australiano	Perenifólio	1-12	11-4	Nano.	Arbusto	Z9	C13(3)
<i>Grevillea lanigera</i> A. M. Cunn. ex R. Br.	Proteaceae	Grevilea	Australiano	Perenifólio	1-12	8-10	Hemi.	Arbusto	Z9	C13(2)
<i>Grevillea rosmarinifolia</i> A. Cunn.	Proteaceae	Grevilea	Australiano	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z8	C13(2)
<i>Gunnera manicata</i> Lindl. ex André.	Gunneraceae (Haloragidaceae)	Gunera-gigante	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-8	Hemi.	Herbácea	Z7	C6(1)
<i>Heberdenia excelsa</i> (Ait.) Banks ex DC	Myrsinaceae	Aderno	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-6	Micro.	Árvore	Z10	C6(1)
<i>Hedera helix</i> L.	Araliaceae	Hera	Paleártico	Perenifólio	1-12	9-10	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z5	C13 (grupo)
<i>Hedera maderensis</i> K. Koch ex A. Rutherf. ssp. <i>maderensis</i>	Araliaceae	Hera	Paleártico	Perenifólio	1-12	7-10	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	C5, C17(grupo)
<i>Hedychium gardnerianum</i> Ker-Gawl.	Zingiberaceae	Bananiha; Roca-de-vénus; Conteira	Paleártico; Indomalaio	Perenifólio	1-12	7-10	Hemi	Herbácea	Z9	C15, C16 (grupo)
<i>Helichrysum melaleucum</i> Rchb. ex Holl	Compositae	Perpétua- branca	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-8	Nano.	Arbusto	Z10	C10(2)
<i>Helichrysum obconicum</i> DC.	Compositae	Murrião	Paleártico	Perenifólio	1-12	6-10	Nano.	Arbusto	Z11	C6(1), C10(1)
<i>Hibiscus mutabilis</i> L.	Malvaceae	Rosa-de-algodão	Paleártico	Perenifólio	1-12	6-11	Micro.	Arbusto	Z8	C4(1)
<i>Hibiscus rosa-sinensis</i> L.	Malvaceae	Cardeais	Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C6(grupo), C10(4)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Hibiscus syriacus</i> L.	Malvaceae	Cardeal-roxo; Hibisco-da- síria	Paleártico; Indomalaio	Caducifólio	5-11	7-9	Micro.	Arbusto	Z5	C6(grupo), C10(4)
<i>Hibiscus tiliaceus</i> L.	Malvaceae	Hibisco	Neotropical; Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Árvore	Z10	C4(1)
<i>Holmskioldia sanguinea</i> Retz.	Verbenaceae	Chapéus-de- mandarim; Chapéus-chineses	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C4(1)
<i>Hyacinthoides non-scripta</i> (L.) Rothm.	Liliaceae (Hyacinthaceae)	Campainha-azul	Paleártico	Sazonal	2-5	2-4	Geófito	Herbácea	Z5	C5(grupo)
<i>Hydrangea arborescens</i> L.	Hydrangeaceae	Hortênsia	Neártico	Caducifólio	3-12	6-9	Nano.	Arbusto	Z6	C11(1), C12(2), C15A(1)
<i>Hydrangea aspera</i> D. Don.	Hydrangeaceae	Hortênsia	Indomalaio	Caducifólio	3-12	6-9	Nano.	Arbusto	Z7	C11(1), C12(3)
<i>Hydrangea macrophylla</i> (Thunb.) Ser.	Hydrangeaceae	Hortênsias; Novelos	Paleártico	Caducifólio	3-12	5-10	Nano.	Arbusto	Z6	C11(2), C12(grupo), C15A(3)
<i>Hydrangea paniculata</i> Sieb.	Hydrangeaceae	Hortênsia	Paleártico	Caducifólio	3-12	6-9	Nano.	Arbusto	Z5	C13(1)
<i>Hydrangea quercifolia</i> Bartr.	Hydrangeaceae	Hortênsias	Neártico	Caducifólio	3-12	6-8	Nano.	Arbusto	Z5	C12(3)
<i>Hydrangea serrata</i> (Thunb.)	Hydrangeaceae	Hortênsia	Paleártico	Caducifólio	3-12	5-10	Nano.	Arbusto	Z6	C12(2), C15A(1)
<i>Ilex aquifolium</i> L.	Aquifoliaceae	Azevinho-comum; Azevinho- inglês	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-6	Micro.	Árvore	Z6	C6(1), C11(7)
<i>Ilex canariensis</i> Poir.	Aquifoliaceae	Azevinho-da- rocha	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-6	Micro.	Árvore	Z10	C6(1)
<i>Ilex perado</i> Ait.	Aquifoliaceae	Perado	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-6	Micro.	Árvore	Z10	C9A(1), C10(1)
<i>Ilex x altaclarensis</i> (hort. ex Loud.) Dallim.	Aquifoliaceae	Azevinho	Hortícola	Perenifólio	1-12	12-8	Micro.	Árvore	Z6	C7(6), C11(2)
<i>Impatiens hawkeri</i> Bull.	Balsaminaceae	Maravilhas	Hortícola	Sazonal	4-9	5-8	Terófito	Herbácea	Z10	C5(grupo)
<i>Impatiens sodenii</i> Engl. & Warb. ex Engl.	Balsaminaceae	Maravilhas	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Herbácea	Z10	C1, C8(grupo)
<i>Impatiens walleriana</i> Hook. f.	Balsaminaceae	Maravilhas	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Herbácea	Z9	C5(grupo)
<i>Iresine herbstii</i> Hook.	Amaranthaceae	Iresine	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Caméfito	Herbácea	Z10	C8(grupo)
<i>Iris germanica</i> L. var. <i>florentina</i> (L.) Dykes	Iridaceae	Lírio-branco	Paleártico	Perenifólio	1-12	2-7	Geófito	Herbácea	Z4	C11, C13(grupo)
<i>Iris pseudacorus</i> L.	Iridaceae	Bandeira-amarela	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-5	Helófito	Herbácea	Z5	C13 (grupo)
<i>Isoplexis sceptrum</i> (L. f.) Loud.	Scrophulariaceae	Isoplexis; Dedaleira-da- madeira	Paleártico	Perenifólio	1-12	Não floriu**	Nano.	Arbusto	Z10	C9A(2)
<i>Ixia maculata</i> L.	Iridaceae	Palhinhas; Amêndoas	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	3-5	Geófito	Herbácea	Z10	C6, C10 (grupo)
<i>Jasminum azoricum</i> L.	Oleaceae	Jasmineiro-branco	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-11	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z11	C6(1), C10(1)
<i>Juniperus cedrus</i> Webb. & Berthel. ssp. <i>maderensis</i> (Menezes) Rivas Mart. & al.	Cupressaceae	Cedro-da- madeira	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-3	Micro.	Árvore	Z10	C6(1), C8(1), C9A(1)
<i>Juniperus squamata</i> Buch.-Ham. ex D. Don.	Cupressaceae		Paleártico	Perenifólio	1-12	1-3	Nano.	Arbusto	Z4	C13(3)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLOGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Juniperus virginiana</i> L.	Cupressaceae	Zimbro-da-virgini	Neártico	Perenifólio	1-12	3-4	Micro.	Árvore	Z2	C3(2), C4(4), C6(5), C7(1), C9(4), C10(1), C12(3), C15(1)
<i>Kalmia angustifolia</i> L.	Ericaceae		Neártico	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Nano.	Arbusto	Z2	C11(2)
<i>Koeleria paniculata</i> Laxm.	Sapindaceae		Paleártico	Caducifólio	5-2	7-9	Micro.	Árvore	Z4	C16(1), C17(1)
<i>Kohleria eriantha</i> (Benth.) Hanst.	Gesneriaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z11	C8(grupo)
<i>Lamium galeobdolon</i> (L.) L.	Labiatae	Aranjo-amarelo	Paleártico	Perenifólio	1-12	10-12	Hemi.	Herbácea	Z4	C8(grupo)
<i>Laurus novocanariensis</i> Rivas Mart. & al.	Lauraceae	Loureiro	Paleártico	Perenifólio	1-12	11-3	Meso.	Árvore	Z10	C1(1), C4(12), C6(8), C12(3), C13(3), C14(1), C15(1), C18(10), C19 (>20), C20(14)
<i>Lavandula pinnata</i> L. f.	Labiatae	Alfazema	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z11	C3(grupo)
<i>Leptospermum petersonii</i> Bail.	Myrtaceae	Leptospermo	Australiano	Perenifólio	1-12	4-10	Micro.	Arbusto	Z9	C3(1)
<i>Leptospermum scoparium</i> Forst. & Forst.	Myrtaceae	Leptospermo; Urze-de-jardim	Australiano; Antártico	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z8	C11(3), C33(1)
<i>Leucanthemum x superbum</i> (J. Ingram) Bergmans ex Kent	Compositae	Estrelas	Hortícola	Perenifólio	1-12	5-8	Nano.	Herbácea	Z5	C8, C11(grupo)
<i>Liquidambar styraciflua</i> L.	Hamamelidaceae	Liquidambar	Neártico	Caducifólio	4-11	4-6	Meso.	Árvore	Z5	C1(3)
<i>Liriodendron tulipifera</i> L.	Magnoliaceae	Tulipeiro- arbóreo	Neártico	Caducifólio	4-11	4-6	Meso.	Árvore	Z4	C9(1), C10(1), C17(1)
<i>Lobelia erinus</i> L.	Campanulaceae	Lobélia	Áfrotropical	Sazonal	4-9	4-12	Terófito	Herbácea	Z9	C9 (grupo)
<i>Lonicera japonica</i> Thunb.	Caprifoliaceae	Madressilva	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z4	C9(grupo)
<i>Lunaria annua</i> L.	Cruciferae	Hóstias; Moedas	Paleártico	Sazonal	2-7	3-6	Terófito	Herbácea	Z8	C10(grupo)
<i>Luzula seubertii</i> Lowe	Juncaceae	Luzula	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-6	Hemi.	Herbácea	Z10	C9A(1)
<i>Lysimachia nummularia</i> L.	Primulaceae	Lisimáquia	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-11	Hemi.	Herbácea	Z4	C8(grupo)
<i>Magnolia grandiflora</i> L.	Magnoliaceae	Magnólia	Neártico	Perenifólio	1-12	5-8	Micro.	Árvore	Z6	C9(1), C10(1)
<i>Magnolia x soulangiana</i> Soul.-Bod.	Magnoliaceae	Magnólia	Hortícola	Caducifólio	3-12	12-4	Micro.	Árvore	Z5	C5(2)
<i>Malus floribunda</i> Van Houtte	Rosaceae		Paleártico	Caducifólio	2-11	2-4	Micro.	Árvore	Z4	C11(1)
<i>Malvaviscus arboreus</i> Cav.	Malvaceae	Malvavisco	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z9	C4(1)
<i>Marctella maderensis</i> (Bornm.) Svent.	Rosaceae	Marcetela	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-6	Nano.	Arbusto	Z10	C9A(1)
<i>Matthiola maderensis</i> Lowe	Cruciferae	Goivo-da-rocha	Paleártico	Sazonal	2-8	4-7	Terófito	Herbácea	Z10	C6(grupo)
<i>Maytenus umbellata</i> (R. Br.) Mabb.	Celastraceae	Buxo-da- rocha	Paleártico	Perenifólio	1-12	8-9	Micro.	Arbusto	Z11	C10(1)
<i>Melanoselinum decipiens</i> (Schr. & Wendl.) Hoffm.	Umbelliferae	Aipo-de-gado	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-6	Nano.	Herbácea	Z10	C10(grupo), C13(1)
<i>Michelia figo</i> (Lour.) Spreng	Magnoliaceae	Carocha	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-8	Micro.	Árvore	Z9	C6(1)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Monizia edulis</i> Lowe	Umbelliferae	Cenoura-da-rocha; Nozelha	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-5	Nano.	Herbácea	Z10	C9A(2)
<i>Montanoa bipinnatifida</i> (Kunth) K. Kock	Compositae	Malmequer- arbóreo	Neotropical	Perenifólio	1-12	11-5	Micro.	Arbusto	Z10	C9(3)
<i>Musschia wollastonii</i> Lowe	Campanulaceae	Múchia-de- wollaston	Paleártico	Perenifólio	1-12	Não floriu**	Nano.	Arbusto	Z10	C9A(2)
<i>Myrica faya</i> Ait.	Myricaceae	Faia-das-ilhas; Samouco	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-5	Micro.	Árvore	Z9	C9(1)
<i>Narcissus tazetta</i> L.	Amaryllidaceae	Junquinhos	Paleártico	Sazonal	11-5	12-3	Geófita	Herbácea	Z8	C9, C10 (grupo)
<i>Nemesia strumosa</i> Benth. in Hook	Scrophulariaceae	Nemésia	Áfricotropical	Sazonal	3-8	3-7	Terófita	Herbácea	Z9	C5, C9 (grupo)
<i>Nephrolepis cordifolia</i> (L.) Presl.	Oleandracea	Feto	Neotropical; Áfricotropical; Indomalaio; Oceânia; Australiano	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z10	C4(grupo)
<i>Nerium oleander</i> L.	Apocynaceae	Sevadilha; Loendro	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-11	Micro.	Arbusto	Z9	C13(1)
<i>Ocotea foetens</i> (Aiton) Baill.	Lauraceae	Til	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Meso.	Árvore	Z10	C6(2)
<i>Oenanthe divaricata</i> (R. Br.) Mabb.	Umbelliferae	Aipo-preto; Salsa-brava	Paleártico	Perenifólio	1-12	6-8	Hemi.	Herbácea	Z10	C9A(2)
<i>Ophiopogon japonicus</i> (L. f.) Ker-Gawl.	Liliaceae (Convallariaceae)	Relva-do-japão	Paleártico	Perenifólio	1-12	7-9	Hemi.	Herbácea	Z8	C4(mancha)
<i>Osteospermum barberiae</i> (Harv.) Norl.	Compositae	Estrelas-do- cabo	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Caméfitas	Arbusto	Z10	C15A(grupo)
<i>Osteospermum ecklonis</i> (DC.) Norl.	Compositae	Estrelas-do- cabo	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Caméfitas	Arbusto	Z10	C15A (grupo)
<i>Oxalis pes-caprae</i> L.	Oxalidaceae	Azedas; Trevo	Áfricotropical	Sazonal	10-5	12-4	Geófita	Herbácea	Z9	C8, C10(grupo)
<i>Oxalis purpurea</i> L.	Oxalidaceae	Azedas; Trevo-vermelho	Áfricotropical	Sazonal	10-5	12-4	Geófita	Herbácea	Z9	C9, C10 (grupo)
<i>Passiflora mollissima</i> (HBK.) L. H. Bail.	Passifloraceae	Maracujá-banana	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z8	C15, C16, C17, C19 (grupo)
<i>Pelargonium vitifolium</i> (L.) L'Hérit.	Geraniaceae	Malvas	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C6, C16, C18 (grupo)
<i>Pelargonium zonale</i> (L.) L'Hérit.	Geraniaceae	Malva	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C8 (grupo)
<i>Pericallis aurita</i> (L' Hérit.) B. Nord.	Compositae	Erva-de- coelho	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-7	Nano.	Arbusto	Z10	C9A(1), C10(1)
<i>Phoenix reclinata</i> Jacq.	Palmae	Tamareira-do- senegal	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	5-7	Micro.	Árvore	Z11	C3(1)
<i>Phytolacca dioica</i> (L.) Moq.	Phytolaccaceae	Bela-sombra	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-9	Meso.	Árvore	Z11	C13(1)
<i>Picconia excelsa</i> (Ait.) DC.	Oleaceae	Pau-branco	Paleártico	Perenifólio	1-12	2-5	Micro.	Árvore	Z10	C6(2)
<i>Picea pungens</i> Engelm.	Pinaceae	Abeto-azul; Abeto-do-colorado	Neártico	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Micro.	Árvore	Z2	C6(1), C15(1)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Pilea cadierei</i> Gagnep. & Guillaum.	Urticaceae	Planta-do-alumínio	Indomalaio	Perenifólio	1-12	10-12	Hemi.	Herbácea	Z11	C8(grupo)
<i>Pilea microphylla</i> (L.) Liebm.	Urticaceae	Arrozinho	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C8(grupo)
<i>Pinus canariensis</i> C. Sm.	Pinaceae	Pinheiro-das-canárias	Paleártico	Perenifólio	1-12	2-4	Meso.	Árvore	Z10	C10(1)
<i>Pinus pinaster</i> Ait.	Pinaceae	Pinheiro-marítimo	Paleártico	Perenifólio	1-12	2-4	Meso.	Árvore	Z8	C9(1), C16(1), C19(6)
<i>Pinus pinea</i> L.	Pinaceae	Pinheiro-manso	Paleártico	Perenifólio	1-12	2-4	Meso.	Árvore	Z8	C6(1)
<i>Pittosporum coriaceum</i> Dryand. ex Ainton	Pittosporaceae	Mocano	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-7	Micro.	Árvore	Z10	C10(6), C17(2)
<i>Pittosporum undulatum</i> Vent.	Pittosporaceae	Incenseiro	Australiano	Perenifólio	1-12	2-4; 6-7	Micro.	Árvore	Z9	C1(6), C4(>20), C9(3), C12(4), C13(1), C14(3), C18(>50), C19(>100)
<i>Platycladus orientalis</i> (L. f.) Franco	Cupressaceae	Tuia-oriental	Neártico	Perenifólio	1-12	1-3	Micro.	Árvore	Z6	C7(1), C15(1)
<i>Plectranthus thyrsoides</i> (Bak.) B. Mathew	Labiatae	Plectranto	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	10-1	Nano.	Arbusto	Z10	C10(1)
<i>Polygala myrtifolia</i> L.	Polygalaceae	Polígala	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z9	C9(3), C11(2)
<i>Prunus cerasifera</i> Ehrh.	Rosaceae	Ameixeira-de-jardim	Paleártico	Caducifólio	3-11	2-3	Micro.	Árvore	Z4	C3(1), C4(1), C13(1)
<i>Prunus hixa</i> Willd.	Rosaceae	Gingeira-brava; Azereiro	Paleártico	Perenifólio	1-12	6-8	Meso.	Árvore	Z10	C6(3)
<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn.	Dennstaedtiaceae	Feiteira	Paleártico; Neártico	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z4	C6(grupo)
<i>Punica granatum</i> L.	Punicaceae	Romãzeira	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-7	Micro.	Árvore	Z9	C6(1)
<i>Pyracantha angustifolia</i> (Franch.) Schneid.	Rosaceae	Perinhos; Sarça-ardente	Paleártico	Perenifólio	1-12	2-7	Micro.	Arbusto	Z7	C9(6)
<i>Pyracantha coccinea</i> Roem.	Rosaceae	Perinhos; Sarça-ardente	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-5	Micro.	Arbusto	Z6	C3(grupo)
<i>Quercus ilex</i> L.	Fagaceae	Azinheira	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-5	Meso.	Árvore	Z7	C12(1)
<i>Quercus robur</i> L.	Fagaceae	Carvalho	Paleártico	Caducifólio	2-11	3-5	Meso.	Árvore	Z6	C1(1), C3(1), C4(3), C6(5), C9(1), C10(1), C12(5), C14(1), C19(1)
<i>Quercus rubra</i> L.	Fagaceae	Carvalho-vermelho-americano	Neártico	Caducifólio	4-11	4-5	Meso.	Árvore	Z3	C3(1), C4(3), C9(3), C10(2)
<i>Ranunculus cortusifolius</i> Willd. var. <i>major</i> Lowe	Ranunculaceae	Ranúnculo; Doiradinha	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-6	Hemi.	Herbácea	Z10	C10 (grupo)
<i>Rhododendron arboreum</i> Sm.	Ericaceae	Rododendro	Indomalaio; Paleártico	Perenifólio	1-12	2-5	Micro.	Árvore	Z7	C9(4)
<i>Rhododendron augustini</i> Hemsl.	Ericaceae	Rododendro	Paleártico	Perenifólio	1-12	2-3	Nano.	Arbusto	Z6	C9(1)
<i>Rhododendron mucronatum</i> G. Don.	Ericaceae	Azálea-japonesa	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z5	C9(4), C9(1), C11(grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Leguminosae (Papilionoideae)	Robinia	Neártico	Caducifólio	3-12	3-6	Meso.	Árvore	Z3	C3(1), C13(1)
<i>Roldana petasites</i> (Sims) H. Robinson & Bretell.	Compositae	Senécio	Neotropical	Perenifólio	1-12	12-4; 6-8	Micro.	Arbusto	Z9	C4, C6, C13, C19 (grupo)
<i>Rumohra adiantiformis</i> (Forst. f.) Ching.	Dryopteridaceae	Feto-real	Áfricotropical; Australiano; Oceânia; Antártico; Neotropical	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z10	C4(grupo)
<i>Ruscus hypophyllum</i> L.	Liliaceae (Asparagaceae)	Ruscus	Paleártico	Perenifólio	1-12	11-12	Nano.	Herbácea	Z8	C4(grupo)
<i>Salix babylonica</i> L.	Salicaceae	Salgueiro- chorão	Paleártico	Marcescente	1-12 (12-3)	3-5	Micro.	Árvore	Z4	C6(1)
<i>Salix canariensis</i> C. Sm. ex Link	Salicaceae	Seixo; Seixeiro	Paleártico	Caducifólio	2-12	1-2	Micro.	Árvore	Z11	C6(1)
<i>Salvia splendens</i> Sell ex Roem. & Scult.	Labiatae	Camarões; Sálvias	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Herbácea	Z10	C5(grupo)
<i>Sambucus lanceolata</i> R. Br. In Buch.	Caprifoliaceae	Sabugueiro-da- madeira	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-5	Micro.	Árvore	Z10	C10(3)
<i>Sansevieria trifasciata</i> hort. ex Prain.	Agavaceae	Língua-de-sogra	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	8-11	Hemi.	Herbácea	Z10	C4(grupo)
<i>Schinus molle</i> L. non hort. ex Engl.	Anacardiaceae	Pimenteira- bastarda; Pimenteira-da- índia	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Meso.	Árvore	Z9	C1(2), C6(1)
<i>Scilla maderensis</i> Mnzs.	Liliaceae	Cila-da-madeira	Paleártico	Sazonal	9-5	11-12	Geófita	Herbácea	Z11	C9A(12)
<i>Semele androgyna</i> (L.) Kunth.	Liliaceae	Alegre-campo	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-5	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	C3(10), C8(1), C9(2), C13(1), C17(1), C18(8)
<i>Senecio glastifolius</i> L. f.	Compositae	Senécio-cor-rosa	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	3-6	Nano.	Arbusto	Z9	C8(grupo)
<i>Senecio macroglossus</i> DC.	Compositae		Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z10	C10(1), C12 (1)
<i>Sequoia sempervirens</i> (D. Don) Endl.	Cupressaceae	Sequóia	Neártico	Perenifólio	1-12	2-3	Macro.	Árvore	Z8	C6(1), C9(2), C10(3), C20(3)
<i>Sibthorbia peregrina</i> L.	Scrophulariaceae	Hera-terrestre; Erva-redonda	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-8	Fane. Trep.	Herbácea trepadora	Z10	C4, C9A(grupo)
<i>Sideritis candicans</i> Ait. var. <i>candicans</i>	Labiatae	Selvageira; Erva-branca	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-7	Nano.	Arbusto	Z10	C9A(1)
<i>Sideroxylon mirmulans</i> R. Brown in Buch	Sapotaceae	Marmulano	Paleártico	Perenifólio	1-12	8-1	Micro.	Árvore	Z10	C3(1), C6(1)
<i>Solanum mauritanum</i> Scop.	Solanaceae	Tabaqueira	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C1, C6, C12, C13 (grupo)
<i>Sonchus fruticosus</i> L.fil.	Compositae	Leituga; Língua-de vaca; Serralha-da- rocha	Paleártico	Perenifólio	1-12	6-8	Nano.	Arbusto	Z10	C9A(2)
<i>Sonchus pinnatus</i> Ait.	Compositae	Leituga	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-7	Nano.	Arbusto	Z10	C9A(3)
<i>Spathodea campanulata</i> Beauv.	Bignoniaceae	Chama-da- floresta; Tulipeiro- africano	Áfricotropical	Caducifólio	1-12 (Variação individual)	1-12	Micro.	Árvore	Z11	C4(3), C7(3)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Spiraea cantoniensis</i> Lour.	Rosaceae	Grinalda-de-noiva	Paleártico	Marcescente	3-2 (11-2)	2-9	Nano.	Arbusto	Z6	C2(1), C3(2)
<i>Stenotaphrum secundatum</i> (Walter) Kuntze	Gramineae	Relva; Relva-de-correr	Neotropical; Áfricotropical; Oceânia	Perenifólio	1-12	3-11	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z9	C10 (tapete)
<i>Strelitzia nicolai</i> Reg. & Körn.	Strelitziaceae	Estrelícia-gigante	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C10(1)
<i>Strelitzia reginae</i> Banks ex Dryand	Strelitziaceae	Estrelícia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C2(1), C8(grupo)
<i>Streptosolen jamesonii</i> (Benth.) Miers.	Solanaceae	Rapaziada	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z9	C11(3)
<i>Syringa josikaea</i> Jacq. f. ex Rchb.	Oleaceae	Lilás	Paleártico	Caducifólio	4-12	Não floriu*	Micro.	Arbusto	Z5	C4(1)
<i>Syringa vulgaris</i> L.	Oleaceae	Lilás	Paleártico	Caducifólio	4-12	Não floriu*	Micro.	Arbusto	Z5	C4(3)
<i>Syringa x hyacinthiflora</i> (Lemoine) Rehh.	Oleaceae	Lilás	Hortícola	Caducifólio	4-12	Não floriu*	Micro	Arbusto	Z4	C4(1)
<i>Tagetes patula</i> L.	Compositae	Cravos-de-burro	Neotropical	Sazonal	1-9	3-8	Terófito	Herbácea	Z9	C5(grupo)
<i>Taxus baccata</i> L.	Taxaceae	Teixo	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-4	Micro.	Árvore	Z5	C6(1), C9(1), C11(2), C13(1)
<i>Tecomaria capensis</i> (Thunb.) Spach.	Bignoniaceae	Camarões	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C3, C6(grupo)
<i>Teline maderensis</i> Webb et Berth. var. <i>maderensis</i>	Leguminosae	Piorno	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-8	Micro.	Arbusto	Z10	C10(2)
<i>Teucrium abutiloides</i> L'Hérit.	Labiatae	Abrotona -amarela	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-8	Nano.	Arbusto	Z10	C10(3)
<i>Teucrium betonicum</i> L'Hérit	Labiatae	Erva-branca; Abrotona	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-8	Nano.	Arbusto	Z10	C9A(3), C10(1)
<i>Thryptomene saxicola</i> (Hook) Schauer	Myrtaceae		Australiano	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z9	C13(2)
<i>Thuja occidentalis</i> L.	Cupressaceae	Tuia-ocidental	Neártico	Perenifólio	1-12	5-8	Micro.	Árvore	Z4	C15(1)
<i>Tibouchina grandifolia</i> Cogn.	Melastomataceae	Aranhas; Tibouchina	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C9(3)
<i>Tibouchina urvilleana</i> (DC.) Cogn.	Melastomataceae	Aranhas; Tibouchina	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C9(3), C14(1)
<i>Tilia x vulgaris</i> Hayne.	Tiliaceae	Tília-comum	Hortícola	Caducifólio	4-12	6-7	Micro.	Árvore	Z3	C18(1)
<i>Tithonia diversifolia</i> (Hemsl.) A. Gray.	Compositae	Girassol-mexicano	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z9	C5(2), C6(1), C9(3)
<i>Trachelium caeruleum</i> L.	Campanulaceae	Traquélio	Paleártico	Perenifólio	1-12	6-8	Nano.	Herbácea	Z9	C5, C8, C11(grupo)
<i>Tradescantia fluminensis</i> Vell. Conc.	Commelinaceae	Tradescantia	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-6	Hemi.	Herbácea trepadora	Z9	C4(grupo)
<i>Tradescantia pallida</i> (Rose) D. Hunt.	Commelinaceae	Tradescantia	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea trepadora	Z8	C8(grupo)
<i>Tradescantia zebrina</i> hort. ex. Bosse	Commelinaceae	Zebrina	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z9	C4(grupo)
<i>Tropaeolum majus</i> L.	Tropaeolaceae	Chagas	Neotropical	Sazonal	1-10	2-10	Terófito	Herbácea	Z8	C12 (grupo)
<i>Ulmus procera</i> Salisb.	Ulmaceae	Ulmeiro	Paleártico	Caducifólio	3-12	4	Meso.	Árvore	Z4	C3(1), C12(1), C16(2)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Vaccinium padifolium</i> J. E. Sm. ex Ress	Ericaceae	Uveira-da- serra	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-6	Micro.	Arbusto	Z9	C10(1)
<i>Vicia sativa</i> L.	Leguminosae (Papilionoideae)	Ervilhaca	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-6	Terófito	Herbácea trepadora	Z6	C5, C10 (grupo)
<i>Vinca major</i> L.	Apocynaceae	Pervinca	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea trepadora	Z7	C3, C6, C13, C14 (mancha)
<i>Viola riviniana</i> Rchb.	Violaceae	Violeta	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z5	C8(grupo)
<i>Visnea mocanera</i> L.	Theaceae	Mocano	Paleártico	Perenifólio	1-12	11-2	Micro.	Árvore	Z10	C10(1)
<i>Yucca gloriosa</i> L.	Agavaceae	Ílúca	Neártico	Perenifólio	1-12	6-11	Micro.	Arbusto	Z7	C3, C6, C10, C11 (grupo)
<i>Yushania anceps</i> (Mitford) Yi.	Gramineae	Bambu	Paleártico	Perenifólio	1-12	Não floriu**	Hemi.	Herbácea	Z9	C18(grupo)
<i>Zantedeschia aethiopica</i> (L.) Spreng.	Araceae	Jarros	Áfricotropical	Sazonal	10-7	11-5	Geófito	Herbácea	Z8	C1, C3, C4, C6, C9, C11, C13 (grupo)

Legenda:

- Plantas que não floriram no período em estudo (Janeiro 2002 – Janeiro 2005): * plantas novas; ** plantas que nunca floriram por falta de aclimação;
- Plantas marcescentes (plantas semiperenifólias e semicaducifólias): 3-2 (**3-4**) – folhas todo o ano mas com renovação significativa em Março e Abril.

Anexo 22
CARACTERIZAÇÃO FITOGEOGRÁFICA DO JARDIM DO HOSPÍCIO PRINCESA D. MARIA AMÉLIA

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Acalypha wilkesiana</i> Muell. Arg.	Euphorbiaceae	Acálifa; Folha-de-cobre	Oceânia	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C8(7), C11(1), C15(1), C19(1), C20(3)
<i>Agapanthus praecox</i> Willd. ssp. <i>orientalis</i> (Leighton) Leighton	Liliaceae	Agapantos; Coroas-de-Henrique	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	4-9	Hemi.	Herbácea	Z9	C8, C15, C18 (mancha)
<i>Agathis robusta</i> (C. Moore ex. F. Muell.) Bail.	Araucariaceae	Pinheiro-de-damara; Pinheiro-folha-de-alegra-campo	Australiano	Perenifólio	1-12	3-4	Meso.	Árvore	Z9	C1(2), C19(1)
<i>Agave americana</i> L.	Agavaceae	Agave; Piteira	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-8	Hemi.	Herbácea suculenta	Z9	C2(1), C11(1), C12(1)
<i>Agave attenuata</i> Salm-Dyck	Agavaceae	Piteira; Agave-pescoço-de-cisne	Neotropical	Perenifólio	1-12	12-3	Nano.	Árvore suculenta	Z9	C1(10), C2(22), C18(2)
<i>Aloe plicatilis</i> (L.) Mill.	Liliaceae (Aloeaceae)	Aloés	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	2-4	Nano.	Árvore suculenta	Z9	C21(1)
<i>Apollonias barbujana</i> (Cav.) Bomm.	Lauraceae	Barbusano	Paleártico	Perenifólio	1-12	9-3	Meso.	Árvore	Z10	C2(1), C10(1), C16(3), C17(1)
<i>Araucaria bidwillii</i> Hook. f.	Araucariaceae	Araucária-de-bidwill	Australiano	Perenifólio	1-12	2-3	Meso.	Árvore	Z9	C11(1)
<i>Araucaria heterophylla</i> (Salisb.) Franco	Araucariaceae	Araucária	Oceânia	Perenifólio	1-12	2-3	Macro.	Árvore	Z9	C1(1), C2(2), C13(1), C18(1)
<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> H. A. Wendl. & Drude.	Palmae	Palmeira-elegante	Australiano	Perenifólio	1-12	2-10	Meso.	Árvore	Z10	C2(1), C12(2), C20(1)
<i>Asparagus setaceus</i> (Kunth) Jassop	Liliaceae (Asparagaceae)	Esparto-de-folha-miúda; Esparto	Africotropical	Perenifólio	1-12	9-12	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z9	C1(4), C15(1), C18(1), C21(4)
<i>Bauhinia malabarica</i> Roxb.	Leguminosae (Caesalpinoideae)	Bauínia	Indomalaio	Perenifólio	1-12	7-8	Micro.	Árvore	Z9	C20(1)
<i>Begonia aconitifolia</i> A. DC.	Begoniaceae	Begónia	Neotropical	Perenifólio	1-12	2-11	Nano.	Herbácea	Z10	C13(1)
<i>Begonia manicata</i> Brongn. ex. Cels.	Begoniaceae	Begónia	Neotropical	Perenifólio	1-12	2-11	Hemi.	Herbácea	Z10	C13(3)
<i>Begonia x ricinifolia</i> A. Dietr.	Begoniaceae	Corações; Begónias	Hortícola	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C13, C18(grupo)
<i>Bergenia crassifolia</i> (L.) Fritsch.	Saxifragaceae	Bergénia; Couve-de-jardim	Paleártico	Perenifólio	1-12	11-4	Caméfito	Herbácea	Z3	C18(grupo)
<i>Bilbergia vittata</i> Brong. ex. Morel	Bromeliaceae	Bromélia	Neotropical	Perenifólio	1-12	11-2	Hemi.	Herbácea	Z10	C15(grupo)
<i>Bougainvillea glabra</i> Choisy	Nyctaginaceae	Buganvília	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	C2(1), C4(1)
<i>Brachychiton acerifolius</i> Cunn. ex. F. Muell.	Sterculiaceae	Árvore-do-fogo	Australiano	Caducifólio	1-5; 8-12	5-8	Micro.	Árvore	Z10	C1(1), C10(1)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Brachychiton populneus</i> (Lindl.) K. Schum.	Sterculiaceae	Estercúlia	Australiano	Perenifólio	1-12	5-6	Meso.	Árvore	Z10	C15(1)
<i>Breynia nivosa</i> (W.G. Sm.) Small.	Euphorbiaceae		Oceânia	Perenifólio	1-12	7-8	Nano.	Arbusto	Z11	C2(1)
<i>Brunfelsia pauciflora</i> (Cham. & Scltd.) Benth.	Solanaceae	Brunfêlsia; Manacá	Neotropical	Perenifólio	1-12	2-10	Micro.	Arbusto	Z10	C11(1)
<i>Bulbine frutescens</i> (L.) Willd.	Liliaceae (Asphodelaceae)	Bulbine	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Geófita	Herbácea suculenta	Z9	C1(grupo)
<i>Calliandra tweedii</i> Benth.	Leguminosae (Mimosoideae)	Caliandra	Neotropical	Perenifólio	1-12	11-3	Micro.	Arbusto	Z10	C10(1), C11(1), C12(1)
<i>Camellia japonica</i> L.	Theaceae	Camélia; Japoneira	Paleártico	Perenifólio	1-12	11-6	Micro.	Árvore	Z8	C7(1), C8(1)
<i>Canna x generalis</i> L. H. Bail.	Cannaceae	Canas-da-índia; Bananeiras-de-flor	Hortícola	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z9	C18(grupo)
<i>Cardiospermum grandiflorum</i> Sw.	Sapindaceae	Corriola-dos- balões	Africotropical; Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z10	C4 (grupo)
<i>Casuarina equisetifolia</i> Forst. & Forst. f.	Casuarinaceae	Casuarina	Indomalaio; Australiano; Oceânia	Perenifólio	1-12	6-11	Meso.	Árvore	Z10	C11(1)
<i>Chlorophytum comosum</i> (Thumb.) Jacques	Liliaceae (Anthericaceae)	Fitinhas	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z9	C11, C12, C20 (grupo)
<i>Chorisia speciosa</i> A. St. Hil.	Bombacaceae	Sumaúma	Neotropical	Caducifólio	3-11	8-11	Meso.	Árvore	Z10	C1(1), C7(1)
<i>Cinnamomum camphora</i> (L.) Sieb.	Lauraceae	Canforeira	Paleártico; Indomalaio	Perenifólio	1-12	2-4	Meso.	Árvore	Z10	C3(1), C8(1), C12(1)
<i>Cinnamomum zeylanicum</i> Bl.	Lauraceae	Caneleira; Árvore-da-canela	Indomalaio	Perenifólio	1-12	2-4	Micro.	Árvore	Z11	C17A(1)
<i>Codiaeum variegatum</i> (L.) Bl. var. <i>pictum</i> (Lodd.) Muell. Arg.	Euphorbiaceae	Crótone	Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z11	C2(1), C3(5), C6(1), C6A(1), C9(10), C15(3), C16(7), C18(6), C19(6), C20(1)
<i>Coffea arabica</i> L.	Rubiaceae	Cafézeiro	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	4-5; 8-9	Micro.	Arbusto	Z11	C10(1)
<i>Cordyline stricta</i> (Sims) Endl.	Agavaceae	Cordilene	Australiano	Perenifólio	1-12	1-6	Nano.	Arbusto	Z10	C16(7)
<i>Cordyline terminalis</i> (L.) Kunth.	Agavaceae	Árvore-dos-reis	Indomalaio; Australiano; Oceânia; Antártico	Perenifólio	1-12	11-5	Micro.	Arbusto	Z10	C1(3), C18(2)
<i>Crassula ovata</i> (Mill.) Druce.	Crassulaceae	Ensaio-branco ; Planta-de-jade	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	11-3	Nano.	Arbusto suculento	Z10	C1, C7, C9, C9A, C10, C16, C17 (grupo)
<i>Crinum x powellii</i> L. H. Bail.	Amaryllidaceae	Crino-rosado; Açucena-gigante	Hortícola	Sazonal	11-9	3-8	Geófita	Herbácea	Z6	C1 (1)
<i>Ctenanthe oppenheimiana</i> (E. Morr.) Schum.	Marantaceae	Maranta-variegada	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-8	Hemi.	Herbácea	Z10	C1, C2, C3, C8, C16, C18, C19, C21 (grupo)
<i>Delonix regia</i> (Bojer) Raf.	Leguminosae (Caesalpinioideae)	Acácia-rubra	Áfricotropical	Caducifólio	6-3	7-9	Micro.	Árvore	Z11	C9(1)
<i>Diplazium assimile</i> (Endl.) Bedd	Woodsiaceae	Feto	Australiano	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z10	C10(5)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Dombeya wallichii</i> (Lindl.) B. D. Jackson	Sterculiaceae	Dombeia; Aurora	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	12-2	Micro.	Árvore	Z10	C11(1)
<i>Dracaena draco</i> L. ssp. <i>draco</i>	Agavaceae	Dragoeiro	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-6	Micro.	Árvore	Z11	C1(1), C2(1), C10(1), C13(1), C16(2), C21(1)
<i>Enterolobium cyclocarpa</i> (Jacq.) Griseb.	Leguminosae (Mimosoideae)	Enterolóbio; Orelha-de-elefante	Neotropical	Caducifólio	5-1	7-8	Meso.	Árvore	Z11	C15(1)
<i>Erythrina abyssinica</i> Lam. ex DC.	Leguminosae (Papilionoideae)	Coralina-da- abissínia	Áfricotropical	Caducifólio	5-1	1-6; 9-10	Micro.	Árvore	Z10	C10(1)
<i>Erythrina lysistemon</i> Hutch.	Leguminosae (Papilionoideae)	Coralina	Áfricotropical	Marcescente	5-4 (12-4)	12-5	Micro.	Árvore	Z10	C6(1), C16(1)
<i>Erythrina speciosa</i> Andrews	Leguminosae (Papilionoideae)	Coralina- elegante	Neotropical	Caducifólio	4-11	12-4	Micro.	Árvore	Z10	C1(1), C18(1)
<i>Eucalyptus ficifolia</i> F. Muell.	Myrtaceae	Eucalipto-de-flor- vermelha	Australiano	Perenifólio	1-12	1-12	Meso.	Árvore	Z9	C11(1), C18(1), C19(1)
<i>Eugenia uniflora</i> L.	Myrtaceae	Pitangueira	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Árvore	Z10	C11(1), C12(3), C15(1)
<i>Euphorbia ingens</i> E. Mey.	Euphorbiaceae	Eufórbia-gigante	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	10-12	Micro.	Arbusto suculento	Z9	C10(2)
<i>Euphorbia pulcherrima</i> Willd. ex Klotzsch.	Euphorbiaceae	Manhã-de-páscoa	Neotropical	Caducifólio	5-2	10-3	Micro.	Arbusto	Z10	C19(2)
<i>Ficus benjamina</i> L. var. <i>nuda</i> (Miq.) Barrett	Moraceae	Figueira-da-índia	Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-4	Meso.	Árvore	Z11	C4(1), C21(1)
<i>Ficus elastica</i> Vahl.	Moraceae	Borracheira	Indomalaio	Perenifólio	1-12	5-8	Micro.	Árvore	Z11	C2(1)
<i>Grevillea robusta</i> A. M. Cunn. Ex. R. Br.	Proteaceae	Grevilea	Australiano	Perenifólio	1-12	4-6	Meso.	Árvore	Z8	C5(1), C9A(1), C11(1)
<i>Hedera helix</i> L.	Araliaceae	Hera	Paleártico	Perenifólio	1-12	9-10	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z5	C12(1)
<i>Hibiscus rosa-sinensis</i> L.	Malvaceae	Cardeais; Hibiscos; Rosa-da-china	Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C1(7), C2(3), C6(3), C6A(1), C7(3), C10(1), C13(2), C16(3), C15(3)
<i>Homalocladium platycladum</i> (F. Muell.) L.H. Bail.	Polygonaceae	Homaloclá-dio	Oceânia	Perenifólio	1-12	7-10	Nano.	Arbusto	Z11	C16(1)
<i>Hylocereus triangularis</i> (L.) Britt. & Rose	Cactaceae	Rainha-da-noite; Cacto-trepador	Neotropical	Perenifólio	1-12	7-10	Fane. trep.	Arbusto trepador e suculento	Z10	C15(1)
<i>Impatiens walleriana</i> Hook. f.	Balsaminaceae	Maravilhas	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Herbácea	Z9	C1, C6, C7, C9, C13, C15, C17A, C18, C19, C20 (grupo)
<i>Iresine herbstii</i> Hook.	Amaranthaceae	Iresine	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Caméfito	Herbácea	Z10	C10, C15, C18, C19 (grupo)
<i>Lagerstroemia indica</i> L.	Lythraceae	Laguerestré-mia; Flor-de- merenda; Suspiros	Paleártico; Indomalaio	Caducifólio	3-11	7-9	Micro.	Árvore	Z7	C13(1), C15(3), C19(1)
<i>Laurus novocanariensis</i> Rivas Mart. & al.	Lauraceae	Loureiro	Paleártico	Perenifólio	1-12	11-3	Meso.	Árvore	Z10	C1(1)
<i>Ligustrum ovalifolium</i> Hassk.	Oleaceae	Ligustro	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-7	Nano.	Arbusto	Z5	C10(1)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Livistona chinensis</i> (Jacq.) R. Br. ex Mart.	Palmae	Palmeira-de-leque	Paleártico	Perenifólio	1-12	2-5	Meso.	Árvore	Z9	C14(1), C16(1), C18(1)
<i>Magnolia grandiflora</i> L.	Magnoliaceae	Magnólia	Neártico	Perenifólio	1-12	5-8	Micro.	Árvore	Z6	C8(1)
<i>Maytenus umbellata</i> (R. Br.) Mabb.	Celastraceae	Buxo-da-rocha	Paleártico	Perenifólio	1-12	8-9	Micro.	Arbusto	Z11	C15(1)
<i>Monstera deliciosa</i> Liebm.	Araceae	Fruto-delicioso; Costela-de-adão	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z10	C1(3), C9A(1), C10(3), C11(9), C12(7), C16(7), C17(4), C21(1),
<i>Myrtus communis</i> L.	Myrtaceae	Murta	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-7; 10-11	Micro.	Arbusto	Z8	C8(2)
<i>Nerium oleander</i> L.	Apocynaceae	Sevadilha; Loendro	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-11	Micro.	Arbusto	Z9	C1(4), C2(2), C3(3), C7(1), C10(1), C19(1)
<i>Nolina recurvata</i> (Lem.) Hemsl.	Agavaceae	Nolina; Pata-de-elefante	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-8	Micro.	Árvore	Z9	C2(1)
<i>Ochna serrulata</i> (Hochst.) Walp.	Ochnaceae	Planta-do-rato- mikey	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	2-4	Nano.	Arbusto	Z9	C5(1)
<i>Ocotea foetens</i> (Aiton) Baill.	Lauraceae	Til	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Meso.	Árvore	Z10	C1(1), C4(2), C8(1), C10(1)
<i>Olea europaea</i> L.	Oleaceae	Oliveira	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-6	Micro.	Árvore	Z8	C8(1), C11(1)
<i>Opuntia brasiliensis</i> (Willd.) Haw.	Cactaceae	Tabaibeira-do- brasil	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-8	Micro.	Árvore suculenta	Z9	C19(1)
<i>Pelargonium x hortorum</i> L. H. Bail.	Geraniaceae	Malvas	Hortícola	Perenifólio	1-12	4-7	Nano.	Herbácea	Z10	C8(grupo)
<i>Pericallis x hybrida</i> R. Nordenstam	Compositae	Cinerária	Hortícola	Sazonal	1-7	3-6	Terófito	Herbácea	Z10	C10, C13, C14, C15, C18 (grupo)
<i>Philodendron erubescens</i> K. Koch & Augustin	Araceae	Filodendro	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-6	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z11	C14(1), C17A(1), C18(1), C21(1)
<i>Philodendron lacerum</i> (Jacq.) Schott.	Araceae	Filodendro	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-6	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z11	C1(1), C12(1)
<i>Phlebodium aureum</i> (L.) J. Sm.	Polypodiaceae	Polipódio-dourado	Neártico; Neotropical	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z10	C8(1)
<i>Phoenix canariensis</i> Chabaud.	Palmae	Palmeira-das- Canárias	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-3	Meso.	Árvore	Z11	C1(1), C6(2), C8(2), C9A(2), C16(2), C18(2)
<i>Phoenix dactylifera</i> L.	Palmae	Tamareira	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-7	Meso.	Árvore	Z11	C8(1)
<i>Phoenix reclinata</i> Jacq.	Palmae	Tamareira-do- Senegal	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-3	Micro.	Árvore	Z11	C4 (1), C8(1)
<i>Phyllanthus arbuscula</i> (Sw.) J. F. Gmel.	Euphorbiaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	7-9	Micro.	Arbusto	Z12	C2(1)
<i>Phytolacca dioica</i> (L.) Moq.	Phytolaccaceae	Bela-sombra	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-9	Meso.	Árvore	Z11	C2(1)
<i>Pilea cadierei</i> Gagnep. & Guillaum.	Urticaceae	Planta-do- alumínio	Indomalaio	Perenifólio	1-12	10-12	Hemi.	Herbácea	Z11	C16, C19 (grupo)
<i>Pilea microphylla</i> (L.) Liebm.	Urticaceae	Arrozinho	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C19(grupo)
<i>Platycladus orientalis</i> (L. f.) Franco	Cupressaceae	Tuia-oriental	Neártico	Perenifólio	1-12	1-3	Micro.	Árvore	Z6	C7(1)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Plumbago auriculata</i> Lam.	Plumbaginaceae	Plúmbago	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z9	C4(grupo)
<i>Plumeria rubra</i> L. var. <i>acutifolia</i> (Poir.) Woodson.	Apocynaceae	Planta-dos- dentes	Neotropical	Caducifólio	5-1	6-12	Micro.	Árvore	Z10	C18(2)
<i>Pyracantha angustifolia</i> (Franch.) Schneid.	Rosaceae	Perinhos; Sarça-ardente	Paleártico	Perenifólio	1-12	2-6	Micro.	Arbusto	Z7	C2(1)
<i>Pyrostegia venusta</i> (Ker- Gawl.) Miers	Bignoniaceae	Gaitinhas	Neotropical	Perenifólio	1-12	11-4	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	C1(1)
<i>Rhododendron mucronatum</i> G. Don.	Ericaceae	Azálea-japonesa	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z5	C10(3)
<i>Rudbeckia fulgida</i> Ait.	Compositae	Margarida- amarela; Susana-de- olhos- negros	Neártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Herbácea	Z3	C14, C18, C19 (grupo)
<i>Rudbeckia hirta</i> L.	Compositae	Margarida- amarela; Susana-de- olhos- negros	Neártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Herbácea	Z3	C14, C18, C19 (grupo)
<i>Ruscus hypophyllum</i> L.	Liliaceae (Asparagaceae)	Ruscos	Paleártico	Perenifólio	1-12	11-12	Nano.	Herbácea	Z8	C1(grupo)
<i>Salvia splendens</i> Sell ex Roem. & Scult.	Labiatae	Camarões; Sálvias	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Herbácea	Z10	C1, C3, C15, C16, C17, C18, C19, C20 (grupo)
<i>Sansevieria trifasciata</i> Prain var. <i>laurentii</i> (De Wild.) N. E. Br.	Agavaceae	Língua-de-sogra	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	8-11	Hemi.	Herbácea	Z10	C1, C2, C3, C16, C17 (grupo)
<i>Schefflera actinophylla</i> (Endl.) Harms	Araliaceae	Brassaia	Australiano; Oceânia	Perenifólio	1-12	8-10	Meso.	Árvore	Z10	C1(1), C20(1)
<i>Schefflera arboricola</i> (Hayata) Hayata	Araliaceae	Cheflera	Indomalaio	Perenifólio	1-12	2-4; 7-8	Micro.	Arbusto	Z10	C9(1), C11(1)
<i>Semele androgyna</i> (L.) Kunth.	Liliaceae	Alegria-Campo	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-5	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	C12(1)
<i>Senecio cineraria</i> DC.	Compositae	Senécio	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-8	Nano.	Arbusto	Z8	C14, C15, C18, C19 (grupo)
<i>Sobralia macrantha</i> Lindl.	Orchidaceae	Orquídea-de-cana; Sobralia	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-8	Hemi.	Herbácea	Z11	C20(1)
<i>Spathodea campanulata</i> Beauv.	Bignoniaceae	Chama-da- floresta; Tulipeiro- africano	Áfricotropical	Caducifólio	1-12 (Variação individual)	1-12	Micro.	Árvore	Z11	C5(1)
<i>Spiraea cantoniensis</i> Lour.	Rosaceae	Grinalda-de-noiva	Paleártico	Marcescente	3-2 (11-2)	2-9	Nano.	Arbusto	Z6	C8(1), C16(3)
<i>Stenotaphrum secundatum</i> (Walter) Kuntze	Gramineae	Relva; Relva-de-correr	Neotropical; Áfricotropical; Oceânia	Perenifólio	1-12	3-11	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z9	C1, C2, C3, C5, C6, C7, C15, C19 (tapete)
<i>Strelitzia nicolai</i> Reg. & Körn.	Strelitziaceae	Estrelícia- gigante	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C7(1), C16(2)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Strelitzia reginae</i> Banks ex Dryand	Strelitziaceae	Estrelícia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C1(2), C2(6), C6(1), C10(9), C11(3), C13(1), C16(1), C15(11), C18 (11), C19(15), C20(7)
<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassm.	Palmae	Coqueiro-de-jardim; Palmeira-rainha	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-7	Micro.	Árvore	Z10	C1(1), C11(1), C12(1), C19(1)
<i>Tibouchina grandifolia</i> Cogn.	Melastomataceae	Aranhas; Tibouchina	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C6(1)
<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	Leguminosae (Papilionoideae)	Tipuana	Neotropical	Marcescente	5-4 (3-4)	4-7	Meso.	Árvore	Z9	C2(1), C3(1)
<i>Trachycarpus fortunei</i> (Hook.) H. A. Wendl.	Palmae	Palmeira-de-moinho-de-vento	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-6	Micro.	Árvore	Z8	C18(1)
<i>Tradescantia pallida</i> (Rose) D. Hunt.	Commelinaceae	Tradescantia	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea trepadora	Z8	C2, C16 (grupo)
<i>Tradescantia zebrina</i> hort. ex. Bosse	Commelinaceae	Zebrina	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z9	C16(grupo)
<i>Viburnum tinus</i> L.	Caprifoliaceae	Viburno	Paleártico	Perenifólio	1-12	10-4; 7-8	Micro.	Arbusto	Z7	C18(1)
<i>Washingtonia filifera</i> (Lind. ex André) H. A. Wendl	Palmae	Palmeira-de-leque-da-califórnia	Neártico	Perenifólio	1-12	5-8	Micro.	Árvore	Z9	C1(1), C19 (1)
<i>Wedelia trilobata</i> (L.) Hitchc.	Composita		Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Herbácea	Z11	C19(grupo)
<i>Wisteria sinensis</i> (Sims) Sweet.	Leguminosae (Papilionoideae)	Lilases; Glicínia	Paleártico	Caducifólio	2-12	2-5; 7-8	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z5	C1(1), C12(1)

Legenda:

- Plantas que não floriram no período em estudo (Janeiro 2002 – Janeiro 2005): * plantas novas; ** plantas que nunca floriram por falta de aclimação;
- Plantas marcescentes (plantas semiperenifólias e semicaducifólias): 3-2 (3-4) – folhas todo o ano mas com renovação significativa em Março e Abril.

Anexo 23
CARACTERIZAÇÃO FITOGEOGRÁFICA DA ESTALAGEM JARDINS DO LAGO

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Abelia x grandiflora</i> (André Rehd.	Caprifoliaceae	Abélia	Hortícola	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z5	C22(2), C23(2)
<i>Abutilon pictum</i> (Gillies ex Hook. & Arn.) Walp.	Malvaceae	Abutilão; Lanterna-chinesa	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z9	C6(grupo)
<i>Abutilon x hybridum</i> hort.	Malvaceae	Abutilão; Lanterna-chinesa	Hortícola	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z9	C1(1)
<i>Acalypha wilkesiana</i> Muell. Arg.	Euphorbiaceae	Acalífa; Folha-de-cobre	Oceânia	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C22(1), C27(4)
<i>Acanthus mollis</i> L.	Acanthaceae	Erva-gigante	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-8	Hemi.	Herbácea	Z6	C1, C2, C13 (grupo)
<i>Acca sellowiana</i> (O. Berg.) Burret	Myrtaceae	Goiabeira-ananás	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-7	Micro.	Árvore	Z8	C2(2)
<i>Adiantum capillus-veneris</i> L.	Adiantaceae	Avenca	Paleártico, Neotropical, Áfricotropical, Indomalaio	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z8	C1(grupo)
<i>Aechmea fasciata</i> (Lindl.) Bak.	Bromeliaceae	Bromélia	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C7, C9, C11, C15A (grupo)
<i>Aechmea fulgens</i> Brongn. var. <i>discolor</i> (Morr.) Brongn. ex Bak	Bromeliaceae	Bromélia	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-8	Hemi.	Herbácea	Z11	C7, C9 (grupo)
<i>Aechmea gamosepala</i> Witm.	Bromeliaceae	Bromélia	Neotropical	Perenifólio	1-12	10-2	Hemi.	Herbácea	Z10	C7, C9, C11, C15A (grupo)
<i>Aechmea luddemanniana</i> (K. Koch) Mez.	Bromeliaceae	Bromélia	Neotropical	Perenifólio	1-12	11-1	Hemi.	Herbácea	Z10	C8, C9 (grupo)
<i>Aechmea weilbachii</i> Didr.	Bromeliaceae	Bromélia	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-3	Epífita	Herbácea	Z10	C7(2)
<i>Aeonium arboreum</i> (L.) Webb. & Berth.	Crassulaceae	Ensaio; Saião	Paleártico	Perenifólio	1-12	11-1	Nano.	Herbácea suculenta	Z9	C9(grupo)
<i>Aeonium glutinosum</i> (Ait.)	Crassulaceae	Ensaio; Farrobo; Saião	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-7	Nano.	Herbácea suculenta	Z10	C17(grupo), C21(1), C27(grupo)
<i>Agapanthus praecox</i> Willd. ssp. <i>orientalis</i> (Leighton) Leighton	Liliaceae	Agapantos; Coroas-de-henrique	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	4-7	Hemi.	Herbácea	Z9	C1, C7, C8, C10, C12, C20, C22, C23, C26 (grupo)
<i>Agathis robusta</i> (C. Moore ex. F. Muell.) Bail.	Araucariaceae	Pinheiro-de-damara; Pinheiro-com-folha-de-alegra-campo	Australiano	Perenifólio	1-12	3-4	Meso.	Árvore	Z9	C1(3)
<i>Agave americana</i> L.	Agavaceae	Piteira	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-8	Hemi.	Herbácea suculenta	Z9	C1(1), C12, C13 (grupo), C25(1)
<i>Agave angustifolia</i> Haw.	Agavaceae	Agave	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-8	Nano.	Árvore suculenta	Z9	C9(2)
<i>Agave attenuata</i> Salm-Dyck	Agavaceae	Piteira; Agave-pescoço-de-cisne	Neotropical	Perenifólio	1-12	12-3	Nano.	Árvore suculenta	Z9	C5, C9, C12, C13, C25 (grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Agave macroacantha</i> Zucc.	Agavaceae	Agave-roseta	Neotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Caméfito	Arbusto suculento	Z9	C8(1)
<i>Ageratina adenophora</i> (Spreng.) R. King & H. Robinson	Compositae	Abundância	Neotropical	Perenifólio	1-12	3-7	Nano.	Herbácea	Z10	C1, C13, C23, C27 (grupo)
<i>Ageratina riparia</i> (Reg.) R. King & H. Robinson	Compositae	Falsa-abundância	Neotropical	Perenifólio	1-12	2-6	Nano.	Herbácea	Z10	C15(grupo)
<i>Ageratum houstonianum</i> Mill.	Compositae		Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Terófito	Herbácea	Z8	C17A(grupo)
<i>Allamanda cathartica</i> L.	Apocynaceae	Alamanda; Flor-de-manteiga	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-12	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z11	C3(1), C19A(1)
<i>Alocasia sanderiana</i> Bull.	Araceae	Alocásia	Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-6	Geófito	Herbácea	Z11	C3(grupo)
<i>Aloe arborescens</i> Mill.	Liliaceae (Aloeaceae)	Babosas	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	11-2	Nano.	Arbusto suculento	Z9	C1, C11, C12, C13 (grupo)
<i>Aloe capitata</i> Bak.	Liliaceae (Aloeaceae)	Aloés	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	4-5	Hemi.	Herbácea suculenta	Z9	C1, C15(grupo)
<i>Aloe ciliaris</i> Haw.	Liliaceae (Aloeaceae)	Aloés	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	10-6	Fane. trep.	Arbusto trepador e suculento	Z9	C13(grupo)
<i>Aloe excelsa</i> A. Berger.	Liliaceae (Aloeaceae)	Aloés	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-3	Micro.	Árvore suculenta	Z9	C15(2)
<i>Aloe plicatilis</i> (L.) Mill.	Liliaceae (Aloeaceae)	Aloés	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	3-4	Nano.	Árvore suculenta	Z9	C15(6)
<i>Aloe saponaria</i> (Ait. f.) Haw.	Liliaceae (Aloeaceae)	Aloés-sabão	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-7	Hemi.	Herbácea suculenta	Z9	C15(grupo)
<i>Aloe vera</i> (L.) Burm.	Liliaceae	Aloé-vera; Babosas	Paleártico, Neotropical	Perenifólio	1-12	11-6	Hemi.	Herbácea suculenta	Z8	C10 (grupo)
<i>Alpinia zerumbet</i> (Pers.) B. L. Burt & Rosemary M. Sm.	Zingiberaceae	Alpínia; Lírio-de-porcelana	Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C9 (grupo)
<i>Alstroemeria psittacina</i> Lehm.	Liliaceae (Alstroemeriaceae)	Alstroemeria	Neotropical	Sazonal	4-10	5-9	Geófito	Herbácea	Z8	C2 (grupo)
<i>Amaryllis belladonna</i> L.	Amaryllidaceae	Açucenas-da- serra; Belas-donas	Áfricotropical	Sazonal	5-7	8-10	Geófito	Herbácea	Z8	C6, C13(grupo)
<i>Ananas comosus</i> (L.) Merr.	Bromeliaceae	Ananás	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-7	Hemi.	Herbácea	Z11	C7(2), C9(2)
<i>Angiopteris evecta</i> (Forst.) Hoffm.	Marattiaceae	Feto-craca	Indomalaio; Australiano	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z10	C3(1), C13(1)
<i>Annona cherimola</i> Mill.	Annonaceae	Anoneira	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-7	Micro.	Árvore	Z10	C1(1), C2(2)
<i>Anthurium andraeanum</i> André.	Araceae	Antúrio	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z11	C3, C7, C18, C19 (grupo)
<i>Anthurium coriaceum</i> G. Don	Araceae	Antúrio-de-pedra	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-7	Hemi.	Herbácea	Z11	C7(1), C18(1)
<i>Anthurium scherzerianum</i> Schott.	Araceae	Antúrio-rabinho- de-porco	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C7(1), C18(1)
<i>Antirrhinum majus</i> L.	Scrophulariaceae	Bocas-de-peixe	Paleártico	Sazonal	3-10	3-10	Terófito	Herbácea	Z7	C3, C12 (grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Apollonia barujana</i> (Cav.) Bomm.	Lauraceae	Barbusano	Paleártico	Perenifólio	1-12	9-3	Meso.	Árvore	Z10	C12(1), C18(1)
<i>Aquilegia alpina</i> L.	Ranunculaceae	Aquilégia	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-8	Hemi.	Herbácea	Z5	C1(grupo)
<i>Araucaria bidwillii</i> Hook. f.	Araucariaceae	Araucária-de-bidwill	Australiano	Perenifólio	1-12	2-3	Meso.	Árvore	Z9	C1(1)
<i>Araujia sericifera</i> Brot.	Asclepiadaceae	Planta-da-seda	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-9	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z9	C1(1), C2(1), C23(1)
<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> H. A. Wendl. & Drude.	Palmae	Palmeira-elegante	Australiano	Perenifólio	1-12	5-10	Meso.	Árvore	Z10	C1(1), C4(2), C14(5)
<i>Ardisia crenata</i> Sims.	Myrsinaceae	Ardisia	Paleártico	Perenifólio	1-12	7-8	Nano.	Arbusto	Z8	C13, C15A (grupo)
<i>Argyranthemum pinnatifidum</i> (L. f.) Lowe ssp. <i>pinnatifidum</i>	Compositae	Estrelas; Pampilhos; Malmequeres	Paleártico	Perenifólio	1-12	2-6	Nano.	Arbusto	Z10	C1(1), C22 (grupo)
<i>Aristea woodii</i> N. E. Br.	Iridaceae	Aristeia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	4-8	Geófita	Herbácea	Z10	C6, C15A, C17A (grupo)
<i>Artocarpus heterophyllus</i> Lam.	Moraceae	Jaca; Jaqueira	Indomalaio	Perenifólio	1-12	5-6	Micro.	Árvore	Z11	C2(1)
<i>Asclepias fruticosa</i> L.	Asclepiadaceae	Planta-da-seda	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	5-11	Nano.	Arbusto	Z8	C12(1), C15(4)
<i>Asparagus asparagoides</i> (L.) Druce	Liliaceae (Asparagaceae)	Alegre-campo-miúdo	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	3-4	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z10	C2, C12, C17A, C22 (grupo)
<i>Asparagus densiflorus</i> (Kunth) Jassop	Liliaceae (Asparagaceae)	Esparto	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	7-8	Nano.	Herbácea	Z9	C1, C6, C13, C17, C17A, C19(grupo)
<i>Asparagus officinalis</i> L.	Liliaceae (Asparagaceae)	Espargo	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Herbácea	Z4	C6, C7(grupo)
<i>Asparagus setaceus</i> (Kunth) Jassop	Liliaceae (Asparagaceae)	Esparto-de-folha-miúda; Esparto	Africotropical	Perenifólio	1-12	9-12	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z9	C1, C13, C17A, C19, C20, C21 (grupo)
<i>Asparagus umbellatus</i> Link ssp. <i>lowei</i> Kunth	Liliaceae (Asparagaceae)	Esparto-da-madeira	Paleártico	Perenifólio	1-12	11-6	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z11	C13(1)
<i>Aspidistra elatior</i> Bl.	Liliaceae (Convallariaceae)		Paleártico	Perenifólio	1-12	6-7	Hemi.	Herbácea	Z8	C6, C18(grupo)
<i>Asplenium bulbiferum</i> Forst. f.	Aspleniaceae	Asplénio	Australiano; Antártico	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z10	C1(grupo), C7(1)
<i>Asplenium nidus</i> L.	Aspleniaceae	Feto-ninho	Neotropical	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z11	C3(4), C7(3)
<i>Aster squamatus</i> (Spreng.) Hieron.	Compositae	Áster	Neotropical	Sazonal	4-8	6-7	Terófita	Herbácea	Z9	C14(grupo)
<i>Baeckea virgata</i> (Forst. & Forst. f.) Andrews.	Myrtaceae	Urze-miúda	Australiano	Perenifólio	1-12	6-8	Nano.	Arbusto	Z9	C1(1)
<i>Bambusa vulgaris</i> Schräd. ex Wendl.	Gramineae	Bambu	Paleártico; Indomalaio	Perenifólio	1-12	Nunca floriu**	Hemi.	Herbácea	Z10	C1, C7, C12 (grupo)
<i>Bauhinia galpinii</i> N. E. Br.	Leguminosae (Caesalpinoideae)	Bauínia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	5-11	Micro.	Arbusto	Z9	C9(1)
<i>Bauhinia variegata</i> L.	Leguminosae (Caesalpinoideae)	Bauínia	Indomalaio	Marcescente	5-4 (12-4)	10-6	Micro.	Árvore	Z9	C1(1), C15(1), C23(1), C27(2)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Bauhinia x blakeana</i> Dunn.	Leguminosae (Caesalpinoideae)	Bauínia	Hortícola	Perenifólio	1-12	12-4	Micro.	Árvore	Z10	C22(1)
<i>Beaufortia sparsa</i> R. Br.	Myrtaceae	Limpa-garrafas	Australiano	Perenifólio	1-12	5-7	Nano.	Arbusto	Z9	C7(1)
<i>Begonia aconitifolia</i> A. DC.	Begoniaceae	Begónia	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-11	Nano.	Herbácea	Z10	C13(grupo)
<i>Begonia coccinea</i> Hook.	Begoniaceae	Begónia; Corações	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Herbácea	Z10	C14(2)
<i>Begonia minor</i> Jacq.	Begoniaceae	Corações; Begónia	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C14, C19A(grupo)
<i>Begonia olsoniae</i> L. B. Sm. & Schubert.	Begoniaceae	Begónias	Neotropical	Perenifólio	1-12	3-8	Hemi.	Herbácea	Z10	C7(1)
<i>Bergeria crassifolia</i> (L.) Fritsch.	Saxifragaceae	Bergénia; Couve-de- jardim	Paleártico	Perenifólio	1-12	11-4	Caméfito	Herbácea	Z3	C1, C8 (grupo)
<i>Billbergia pyramidalis</i> (Sims.) Lindl.	Bromeliaceae	Bromélia	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-8	Hemi.	Herbácea	Z10	C7(2)
<i>Billbergia vittata</i> Brongn. ex Morel.	Bromeliaceae	Bromélia	Neotropical	Perenifólio	1-12	11-2	Hemi.	Herbácea	Z10	C9 (grupo)
<i>Bituminaria bituminosa</i> (L.) C. H. Stirt.	Leguminosae	Fedegosos	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z8	C1, C12, C27 (grupo)
<i>Blechnum gibbum</i> (Labill.) Mett.	Blechnaceae		Oceânia	Perenifólio	1-12	-----	Nano.	Arbusto	Z10	C18(1)
<i>Bougainvillea glabra</i> Choisy	Nyctaginaceae	Buganvília	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	C1, C21, C22 (grupo), C4(8), C14(2)
<i>Brachychiton x hybridus</i> hort.	Sterculiaceae	Árvore-do-fogo	Hortícola	Caducifólio	1-5; 8-12	6-10	Micro.	Árvore	Z10	C10(1)
<i>Breynia nivosa</i> (W.G. Sm.) Small.	Euphorbiaceae		Oceânia	Perenifólio	1-12	7-8	Nano.	Arbusto	Z11	C12(1), C13(1)
<i>Brosimum alicastrum</i> Swartz	Moraceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	10-4	Micro.	Árvore	Z11	C1(3), C17(1)
<i>Brugmansia versicolor</i> Lagerh.	Solanaceae	Trombeteira	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C1(4)
<i>Brunfelsia pauciflora</i> (Cham. & Scltd.) Benth.	Solanaceae	Brunfêlsia; Manacá	Neotropical	Perenifólio	1-12	2-6	Micro.	Arbusto	Z10	C1(5), C15A(6)
<i>Bulbine frutescens</i> (L.) Willd.	Liliaceae (Asphodelaceae)	Bulbine	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Geófito	Herbácea suculenta	Z9	C9(grupo)
<i>Butia capitata</i> (Mart.) Becc.	Palmae	Palmeira-da- geleia	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-8	Micro.	Árvore	Z10	C14(1)
<i>Buxus microphylla</i> Sieb. & Zucc.	Buxaceae	Buxo	Paleártico; Indomalaio	Perenifólio	1-12	3-4	Nano.	Arbusto	Z6	C9(grupo)
<i>Buxus sempervirens</i> L.	Buxaceae	Buxo	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-4; 10-11	Nano.	Arbusto	Z5	C1, C22, C23 (sebe)
<i>Calathea louiseae</i> Gagnep.	Marantaceae	Calateia	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-7	Hemi.	Herbácea	Z11	C7, C22(grupo)
<i>Calathea picturata</i> (Linden) Koch. & Linden	Marantaceae	Calateia	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-7	Hemi.	Herbácea	Z11	C3, C7(grupo)
<i>Calathea tigrina</i> Hort.	Marantaceae	Calateia	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-7	Hemi.	Herbácea	Z11	C3, C7(grupo)
<i>Calendula officinalis</i> L.	Compositae	Calendula	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Terófito	Herbácea	Z6	C2(grupo)
<i>Callisia fragrans</i> (Lindl.) Wood.	Commelinaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	3-4	Hemi.	Herbácea trepadora	Z10	C15(grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Callistemon citrinus</i> (Curtis) Skeels.	Myrtaceae	Martinete	Australiano	Perenifólio	1-12	9-6	Micro.	Arbusto	Z8	C15(1), C17(1)
<i>Callistemon rigidus</i> R. Br.	Myrtaceae	Martinete	Australiano	Perenifólio	1-12	4-8	Micro.	Arbusto	Z9	C1(1), C4(1)
<i>Callistemon viminalis</i> (Sol. ex Gaertn.) G. Don ex Loud.	Myrtaceae	Martinete-chorão	Australiano	Perenifólio	1-12	4-7	Micro.	Arbusto	Z9	C27(1)
<i>Camellia japonica</i> L.	Theaceae	Camélia; Japoneira	Paleártico	Perenifólio	1-12	11-5	Micro.	Árvore	Z8	C1(4), C22(4), C23(2)
<i>Camellia sinensis</i> (L.) Kuntze	Theaceae	Planta-do-chá	Paleártico	Perenifólio	1-12	9-11	Nano.	Arbusto	Z9	C1(2)
<i>Campsis radicans</i> (L.) Seem.	Bignoniaceae	Campsis	Neártico	Caducifólio	5-12	5-9	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z4	C4(1), C19A(2)
<i>Canna indica</i> L.	Cannaceae	Canas-da-índia; Bananeira-de-flor	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Geófita	Herbácea	Z9	C16(grupo)
<i>Canna x generalis</i> L.H. Bail.	Cannaceae	Canas-da-índia; Bananeiras-de-flor	Hortícola	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z9	C1, C2, C4, C6, C12, C18 (grupo)
<i>Capsicum frutescens</i> L.	Solanaceae	Pimenteira	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-10	Nano.	Arbusto	Z9	C2(grupo)
<i>Casimiroa edulis</i> Llave & Lex.	Rutaceae	Pêra-mexicana; Sapota	Neotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Micro.	Árvore	Z11	C2(1)
<i>Casimiroa sapota</i> Oerst.	Rutaceae	Sapota-branca	Neotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Micro.	Árvore	Z11	C2(1)
<i>Cattleya trianae</i> Linden & Reichb. f.	Orchidaceae	Cateleia	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-2	Epífita	Herbácea	Z11	C7(grupo)
<i>Cedrus deodara</i> (D. Don) G. Don.	Pinaceae	Cedro-deodara; Cedro-dos-himalaias	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-5	Meso.	Árvore	Z7	C1(1)
<i>Celastrus scandens</i> L.	Celastraceae		Neártico	Caducifólio	2-11	Não floriu**	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z3	C19A(1)
<i>Celtis australis</i> L.	Ulmaceae	Lódão-bastardo; Conteira; Sementeira	Paleártico	Caducifólio	4-1	5-6	Meso.	Árvore	Z8	C1(2), C23(1)
<i>Centranthus ruber</i> (L.) DC.	Valerianaceae	Rosa-da-rocha; Alfinetes	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Caméfito	Herbácea	Z5	C1, C17A(grupo)
<i>Cereus jamacaru</i> DC.	Cactaceae	Cacto	Neotropical	Perenifólio	1-12	7-8	Nano.	Árvore suculenta	Z11	C1(6)
<i>Cereus validus</i> Haw.	Cactaceae	Cacto-candelabro	Neotropical	Perenifólio	1-12	7-8	Nano.	Árvore suculenta	Z9	C1(2)
<i>Cestrum aurantiacum</i> Lindl.	Solanaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z11	C6(grupo)
<i>Chamaedorea costaricana</i> Oerst	Palmae	Palmeira-de-salão; Palmeira-bambu	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-6	Micro.	Arbusto	Z10	C1(2), C2(1), C14(3), C16(2), C18(3), C23(2)
<i>Chamaedorea elegans</i> Mart.	Palmae	Palmeira-de-salão; Palmeira-bambu	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-6	Micro.	Arbusto	Z10	C4(3), C6(1), C7(2)
<i>Chamaerops humilis</i> L.	Palmae	Palmeira-das-vassouras	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-5	Micro.	Arbusto	Z9	C6(9)
<i>Chambeyronia macrocarpa</i> (Brongn.) Vieill. ex Becc.	Palmae	Palmeira-rubra	Oceânia	Perenifólio	1-12	1-2	Micro.	Árvore	Z10	C14(2)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Chlorophytum comosum</i> (Thumb.) Jacques	Liliaceae (Anthericaceae)	Fitinhas	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z9	C12(grupo)
<i>Chorisia speciosa</i> A. St. Hil.	Bombacaceae	Sumaúma	Neotropical	Caducifólio	3-11	8-11	Meso.	Árvore	Z10	C1(1)
<i>Chrysalidocarpus lutescens</i> (Bory) Wendl.	Palmae	Palmeira- amarela; Palmeira- borboleta	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	6-7	Micro.	Arbusto	Z10	C4(1), C28(1)
<i>Cinnamomum camphora</i> (L.) Sieb.	Lauraceae	Canforeira	Paleártico; Indomalaio	Perenifólio	1-12	2-4	Meso.	Árvore	Z10	C1(2), C2(1), C13(1)
<i>Cinnamomum zeylanicum</i> Bl.	Lauraceae	Caneleira; Árvore-da-canel	Indomalaio	Perenifólio	1-12	2-4	Micro.	Árvore	Z11	C2(1)
<i>Citrus sinensis</i> (L.) Osbeck	Rutaceae	Laranjeira	Paleártico	Perenifólio	1-12	2-4	Micro.	Árvore	Z9	C2(1)
<i>Clerodendrum splendens</i> G. Don ex James	Verbenaceae	Clerodendro	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	C15(1), C19A(3)
<i>Clerodendrum thomsoniae</i> Balf. f.	Verbenaceae	Clerodendro; Lágrima-de-cristo; Coração-de-jesus	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	5-11	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	C19A(1)
<i>Clivia miniata</i> Regel	Amaryllidaceae	Clívia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	2-11	Hemi.	Herbácea	Z10	C6, C23(grupo)
<i>Clivia nobilis</i> Lindl.	Amaryllidaceae	Clívia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	2-11	Hemi.	Herbácea	Z10	C18(grupo)
<i>Codiaeum variegatum</i> (L.) Bl. var. <i>pictum</i> (Lodd) Muell. Arg.	Euphorbiaceae	Crótone	Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z11	C1(8), C4(11), C6(19), C9(grupo), C14(7), C15(1), C16(3), C18(5)
<i>Coffea arabica</i> L.	Rubiaceae	Cafezeiro; Café	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	4-5; 8-9	Micro.	Arbusto	Z11	C2(3), C6(1)
<i>Cordyline stricta</i> (Sims) Endl.	Agavaceae	Cordilene	Australiano	Perenifólio	1-12	1-6	Nano.	Arbusto	Z10	C1(1)
<i>Cordyline terminalis</i> (L.) Kunth.	Agavaceae	Árvore-dos-reis	Indomalaio; Australiano; Oceânia; Antártico	Perenifólio	1-12	11-3	Micro.	Arbusto	Z10	C1(12), C4(2), C6(5), C8(5), C9(4), C10(4), C15(2), C17(1), C17A(1), C22(4), C23(10), C28(3)
<i>Coronilla valentina</i> L. ssp. <i>glauca</i> (L.) Battand.	Leguminosae (Papilionoideae)	Pascoinhas	Paleártico	Perenifólio	1-12	12-6	Nano.	Arbusto	Z9	C1(2), C7(1), C9(1), C10(1), C12(grupo), C15(1), C13(grupo), C17A(1)
<i>Corynocarpus laevigatus</i> Forst. & Forst. f.	Corynocarpaceae	Loureiro-da-nova- zelândia	Antártico	Perenifólio	1-12	2-5	Micro.	Árvore	Z10	C22(1)
<i>Cotoneaster pannosus</i> Franch.	Rosaceae	Perinhos	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-5	Micro.	Arbusto	Z7	C1(1), C15(1), C23(1)
<i>Cotyledon orbiculata</i> L.	Crassulaceae		Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-3	Nano.	Arbusto suculento	Z10	C9(4)
<i>Crassula ovata</i> (Mill.) Druce.	Crassulaceae	Ensaio-branco ; Planta-de-jade	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	11-3	Nano.	Arbusto suculento	Z10	C17A(4)
<i>Crinum x powellii</i> L. H. Bail.	Amaryllidaceae	Crino; Acucena-gigante	Hortícola	Sazonal	11-8	3-6	Geófita	Herbácea	Z6	C1, C8, C12, C22 (grupo)
<i>Crocasmia x crocosmiiflora</i> (Burb. & Dean) N.E. Br.	Iridaceae	Monbrécias; Hastes-de-são- josé	Hortícola	Perenifólio	1-12	5-9	Geófita	Herbácea	Z7	C1, C6(grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Ctenanthe oppenheimiana</i> (C. J. Morren) K. Schum.	Marantaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	4-8	Hemi.	Herbácea	Z10	C7, C22, C23 (grupo)
<i>Ctenanthe setosa</i> (Roscoe) Eickl.	Marantaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	3-7	Hemi.	Herbácea	Z10	C22, C23 (grupo)
<i>Cuphea hyssopifolia</i> HBK.	Lythraceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C1, C2, C6, C13, C15A, C16, C17A, C19, C20 (grupo)
<i>Cupressus lusitanica</i> Mill.	Cupressaceae	Cedro-de-goia; Cedro-das- barracas	Neártico; Neotropical	Perenifólio	1-12	1-3	Meso.	Árvore	Z9	C1(4), C2(10) C4(8)
<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartw. ex Gordon	Cupressaceae	Cipreste-de- monterrey; Cedro-de- monterrey	Neártico	Perenifólio	1-12	1-2	Meso.	Árvore	Z8	C10(2)
<i>Cupressus sempervirens</i> L.	Cupressaceae	Cipreste	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-2	Micro.	Árvore	Z8	C1(1), C9(1), C12(1), C15(6), C16(1), C17(2), C27(1)
<i>Curculigo latifolia</i> Dryand.	Hypoxidaceae	Curculigo	Indomalaio	Perenifólio	1-12	6-8	Hemi.	Herbácea	Z10	C6, C7(grupo)
<i>Cyathea cooperi</i> (F. Mueller) Domin.	Cyatheaceae	Feto-arbóreo	Australiano	Perenifólio	1-12	-----	Micro.	Árvore	Z10	C1(1), C8(1), C12(8), C13(8), C14(1), C15A(3), C18(16), C22(3), C23(3), C27(grupo)
<i>Cycas circinalis</i> L.	Cycadaceae	Cicas	Indomalaio	Perenifólio	1-12	2-6	Micro.	Árvore	Z10	C4(1), C5(2), C14(2), C17(1)
<i>Cycas revoluta</i> Thunb.	Cycadaceae	Cicas-revoluta; Cicas-de-sagú	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-8	Micro.	Árvore	Z9	C4(4), C5(3), C7(1), C12(1), C13(1), C14(8), C28(1)
<i>Cyclamen persicum</i> Mill.	Primulaceae	Ciclame	Paleártico	Perenifólio	1-12	11-2	Geófita	Herbácea	Z9	C7(grupo)
<i>Cydonia oblonga</i> Mill.	Rosaceae	Marmeleiro	Paleártico	Caducifólio	4-12	6-7	Micro.	Árvore	Z6	C23(1)
<i>Cymbidium insigne</i> Rolfe	Orchidaceae	Orquídea-de- haste; Cimbídio	Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-6	Hemi.	Herbácea	Z9	C7, C15, C15A, C19 (grupo)
<i>Cymbopogon citratus</i> (DC. ex Nees) Stapf.	Gramineae	Caninha; Cana-com-cheiro- a-limão	Indomalaio	Perenifólio	1-12	9-10	Hemi.	Herbácea	Z9	C2(grupo)
<i>Cyperus involucratus</i> Rottb.	Cyperaceae		Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C13(grupo)
<i>Cyperus papyrus</i> L.	Cyperaceae	Papiros	Áfricotropical; Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C13(grupo)
<i>Cyphomandra crassicaulis</i> (Ortega) Kuntze	Solanaceae	Tomateiro- arbóreo; Tomateiro-inglês	Neotropical	Perenifólio	1-12	3-10	Micro.	Arbusto	Z9	C2(1)
<i>Cyrtomium falcatum</i> (L. f.) Presl.	Dryopteridaceae	Feto-azevinho	Paleártico; Indomalaio; Áfricotropical; Oceânia	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z9	C11, C22, C23 (grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link	Leguminosae (Papilionoideae)	Giesta	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-7	Micro.	Arbusto	Z5	C2(1)
<i>Dais cotinifolia</i> L.	Thymelaeaceae		Áfrotropical	Perenifólio	1-12	11-2; 7-8	Micro.	Arbusto	Z10	C6(1)
<i>Davallia canariensis</i> (L.) Sm.	Davalliaceae	Cabrinhas	Paleártico	Perenifólio	1-12	-----	Epífita	Herbácea	Z9	C22(grupo)
<i>Delonix regia</i> (Bojer) Raf.	Leguminosae (Caesalpinioideae)	Acácia-rubra	Áfrotropical	Caducifólio	6-3	7-9	Micro.	Árvore	Z11	C17(1)
<i>Delphinium grandiflorum</i> L.	Ranunculaceae	Esporas	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Herbácea	Z3	C13(grupo)
<i>Dendranthema pacificum</i> (Nak.) Kitam	Compositae		Paleártico	Perenifólio	1-12	10-12	Caméfito	Herbácea	Z7	C20 (grupo)
<i>Dendranthema x grandiflorum</i> Kitam.	Compositae	Crisântemo-das-floristas	Hortícola	Perenifólio	1-12	10-12	Nano.	Herbácea	Z4	C9(grupo)
<i>Dendrobium nobile</i> Lindley	Orchidaceae	Dendróbio	Indomalaio	Perenifólio	1-12	2-4	Epífita	Herbácea	Z10	C7 (grupo)
<i>Deparia petersenii</i> (Kunze) M. Kato.	Woodsiaceae	Feto	Indomalaio; Paleártico; Australiano; Oceânia; Antártico	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z9	C13, C26(grupo)
<i>Dichorisandra thyrsiflora</i> Mikan.	Commelinaceae	Dicorisandra	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C6(1)
<i>Dicksonia antarctica</i> Labill.	Dicksoniaceae	Feto-arbóreo	Australiano	Perenifólio	1-12	-----	Micro.	Árvore	Z8	C18(1)
<i>Dombeya cacuminum</i> Hochr.	Sterculiaceae	Dombeia; Aurora	Áfrotropical	Perenifólio	1-12	1-4	Micro.	Árvore	Z10	C4(2)
<i>Dombeya wallichii</i> (Lindl.) B. D. Jackson	Sterculiaceae	Dombeia; Aurora	Áfrotropical	Perenifólio	1-12	12-2	Micro.	Árvore	Z10	C12(1), C16(1), C18(1), C27(1)
<i>Doryanthes palmeri</i> W. Hill.	Agavaceae	Doriantes	Australiano	Perenifólio	1-12	3-6	Hemi.	Herbácea	Z10	C12(1), C18(1)
<i>Dracaena draco</i> (L.) L. ssp. <i>draco</i>	Agavaceae	Dragoeiro	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-6	Micro.	Árvore	Z11	C1(4), C5(1), C4(7), C6(1), C9(1), C14(3)
<i>Dracaena marginata</i> Lam.	Agavaceae	Dracena	Áfrotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu**	Micro.	Arbusto	Z11	C6(6)
<i>Duchesnea indica</i> (Andrews) Focke.	Rosaceae	Morangueiro-selvagem	Paleártico; Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea trepadora	Z6	C2, C12, C15, C22 (mancha)
<i>Duranta erecta</i> L.	Verbenaceae	Duranta; Violeteira-da-brasil	Neotropical	Perenifólio	1-12	7-1	Micro.	Arbusto	Z10	C1(3), C13(1), C15(1), C22(1), C23(1)
<i>Echeveria albicans</i> Walth.	Crassulaceae	Echevéria	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-9	Caméfito	Herbácea suculenta	Z8	C8(1)
<i>Echinocactus grusonii</i> Hildm.	Cactaceae	Almofada-de-sogra	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-8	Caméfito	Herbácea suculenta	Z9	C8(2)
<i>Echium simplex</i> DC.	Boraginaceae	Massaroco	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-5	Caméfito	Arbusto	Z11	C9(10), C15(8)
<i>Eichhornia crassipes</i> (Mart.) Solms-Laub.	Pontederiaceae	Jacinto-de-água	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-10	Hidrófito	Herbácea	Z10	C13(grupo)
<i>Elaeagnus umbellata</i> Thunb.	Elaeagnaceae	Groselha	Paleártico	Caducifólio	3-12	4-8	Micro.	Arbusto	Z7	C15(1)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Encephalartos horridus</i> (Jacq.) Lehm. x <i>E. lehmannii</i> Lehm.	Zamiaceae		Áfricotropical	Perenifólio	1-12	5-10	Nano.	Árvore	Z9	C18(2)
<i>Encephalartos transvenosus</i> Stapf & Burt Davy.	Zamiaceae		Áfricotropical	Perenifólio	1-12	5-11	Micro.	Árvore	Z9	C4(2), C17(1), C18(1)
<i>Encephalartos villosus</i> Lem.	Zamiaceae		Áfricotropical	Perenifólio	1-12	5-11	Hemi.	Arbusto	Z9	C14(2)
<i>Ensete ventricosum</i> (Welw.) E.E. Cheesm.	Musaceae	Bananeira-da-abissínia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Terófito	Herbácea	Z10	C2(2), C6(1)
<i>Epidendrum falcatum</i> Lindley	Orchidaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C3(1)
<i>Epidendrum ibaguense</i> HBK	Orchidaceae	Orquídea-de-cruz	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C4, C5, C7(grupo)
<i>Epipremnum aureum</i> (Lind. & André)	Araceae		Oceânia	Perenifólio	1-12	6-8	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z10	C1(3), C5(1), C7(3), C11(3), C22(1)
<i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl.	Rosaceae	Nespereira	Paleártico	Perenifólio	1-12	11-12	Micro.	Árvore	Z8	C1(2), C2(1), C11(2), C23(1)
<i>Erythrina caffra</i> Thunb.	Leguminosae (Papilionoideae)	Coralina	Africotropical	Caducifólio	4-11	1-5	Micro.	Árvore	Z9	C22(1)
<i>Erythrina lysistemon</i> Hutch.	Leguminosae (Papilionoideae)	Coralina	Áfricotropical	Marcescente	5-4 (12-4)	12-5	Micro.	Árvore	Z10	C1(2), C13(1)
<i>Etlingera elatior</i> (Jack) Rosemary M. Sm.	Zingiberaceae	Bastão-do-imperador; Rosa-de-porcelana; Gingibre-tocha	Indomalaio	Perenifólio	1-12	2-10	Hemi.	Herbácea	Z12	C18(grupo)
<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.	Myrtaceae	Eucalipto	Australiano	Perenifólio	1-12	11-2	Meso.	Árvore	Z8	C12(6)
<i>Eucalyptus pyriformis</i> Turcz.	Myrtaceae	Eucalipto	Australiano	Perenifólio	1-12	11-2	Micro.	Árvore	Z9	C17(1)
<i>Eugenia uniflora</i> L.	Myrtaceae	Pitangueira	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Árvore	Z10	C1(6), C2(3), C6(2), C21(1)
<i>Euphorbia canariensis</i> L.	Euophorbiaceae	Eufórbia-das-canárias	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-8	Micro.	Arbusto suculento	Z11	C1(3)
<i>Euphorbia grandicornis</i> Goebel.	Euphorbiaceae	Eufórbia-grande-cornuda	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	12-2	Nano.	Arbusto suculento	Z9	C1(1)
<i>Euphorbia milli</i> Desmoul.	Euphorbiaceae	Mira-mira-não-me-toques	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C1(1)
<i>Euphorbia piscatoria</i> Ait.	Euphorbiaceae	Figueira-do-inferno	Paleártico	Caducifólio	9-6	4-6	Micro.	Arbusto suculento	Z10	C15(1)
<i>Euphorbia pulcherrima</i> Willd. ex Klotzsch.	Euphorbiaceae	Manhã-de-páscoa	Neotropical	Caducifólio	5-2	10-3	Micro.	Arbusto	Z10	C4(3), C6(1), C10(4), C14(1), C15(grupo), C16(2), C17A(grupo), C19(5),
<i>Euphorbia tirucalli</i> L.	Euphorbiaceae	Eufórbia	Áfricotropical; Indomalaio	Perenifólio	1-12	4-9	Micro.	Arbusto suculento	Z10	C1(3), C13(1), C23(1)
<i>Euphorbia trigona</i> Mill.	Euphorbiaceae	Eufórbia	Africotropical	Perenifólio	1-12	6-8	Micro.	Arbusto suculento	Z10	C1(2), C8(4)
<i>Euryops pectinatus</i> Cass.	Compositae	Estrelira-amarela	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z9	C1(2), C20(grupo), C22(1), C23(1)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Farfugium japonicum</i> (L.) Kitam.	Compositae	Patas-de- cavalo; Boinas	Paleártico	Perenifólio	1-12	7-3	Hemi.	Herbácea	Z7	C1, C13(grupo)
<i>Felicia amelloides</i> (L.) Voss.	Compositae	Felícia; Margarida-azul	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z9	C13 (grupo)
<i>Ferocactus chrysacanthus</i> (Orcutt) Britt. & Rose	Cactaceae	Ferocacto	Neotropical	Perenifólio	1-12	3-4	Caméfito	Herbácea suculenta	Z10	C8(grupo)
<i>Ferocactus latispinus</i> (Haw.) Britt. & Rose	Cactaceae	Ferocacto	Neotropical	Perenifólio	1-12	3-4	Caméfito	Herbácea suculenta	Z10	C8(1)
<i>Ficus benjamina</i> L. var. <i>nuda</i> (Miq.) Barrett	Moraceae	Figueira-da-índia	Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-4	Meso.	Árvore	Z11	C13(1)
<i>Ficus binnendykii</i> (Miq.) Miq.	Moraceae	Figueira-de-folha- estreita	Indomalaio	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Micro.	Árvore	Z11	C12(1)
<i>Ficus carica</i> L.	Moraceae	Figueira	Paleártico	Caducifólio	4-12	6-7	Micro.	Árvore	Z8	C2(1)
<i>Ficus elastica</i> Roxb. ex Homem	Moraceae	Borracheira	Indomalaio	Perenifólio	1-12	5-8	Micro.	Árvore	Z11	C20(1)
<i>Ficus lyrata</i> Warb.	Moraceae		Áfricotropical	Perenifólio	1-12	4-6	Micro.	Árvore	Z11	C1(1)
<i>Ficus pumila</i> L.	Moraceae	Pastinha	Indomalaio; Paleártico	Perenifólio	1-12	10-12	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z8	C7, C10, C11, C14, C15A, C17A, C20 (grupo)
<i>Ficus rubiginosa</i> Desf. ex Vent.	Moraceae		Australiano	Perenifólio	1-12	1-4	Micro.	Árvore	Z10	C7(1)
<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	Umbelliferae	Funcho	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-8	Hemi.	Herbácea	Z5	C2(grupo)
<i>Furcraea foetida</i> (L.) Haw.	Agavaceae	Furcreia	Neotropical	Perenifólio	1-12	9-12	Hemi.	Herbácea suculenta	Z10	C9(2)
<i>Gazania rigens</i> (L.) Gaertn..	Compositae	Gazania	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z9	C6(grupo)
<i>Geranium maderense</i> P. F. Yeo	Geraniaceae	Gerânio-da- madeira; Pássaras	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-6	Nano.	Herbácea	Z10	C7(grupo)
<i>Gerbera jamesonii</i> Bol. ex Adlam.	Compositae	Gerbera	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z8	C15 (grupo)
<i>Ginkgo biloba</i> L.	Ginkgoaceae	Ginco; Árvore - avenca	Paleártico	Caducifólio	4-1	5	Micro.	Árvore	Z4	C1(1)
<i>Gladiolus italicus</i> Mill.	Iridaceae	Gladiolo-silvestre	Paleártico	Sazonal	3-6	3-6	Geófita	Herbácea	Z6	C6, C11(grupo)
<i>Goniophlebium subauriculatum</i> (Bl.) Presl.	Polypodiaceae	Feto-de- metro; Feto-chorão	Indomalaio; Australiano; Oceânia	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z10	C1, C3, C22 (grupo)
<i>Grevillea robusta</i> A. M. Cunn. Ex. R. Br.	Proteaceae	Grevília	Australiano	Perenifólio	1-12	4-6	Meso.	Árvore	Z8	C22(1)
<i>Guzmania lingulata</i> Mez	Bromeliaceae	Gusmânia	Neotropical	Perenifólio	1-12	11-5	Hemi.	Herbácea	Z11	C8, C9, C11, C19 (grupo)
<i>Guzmania musaica</i> (Lind. & André) Mez.	Bromeliaceae	Gusmânia	Neotropical	Perenifólio	1-12	10-2	Hemi.	Herbácea	Z11	C8, C9 (grupo)
<i>Guzmania scherzeriana</i> Mez	Bromeliaceae	Gusmânia	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-11	Hemi.	Herbácea	Z11	C8, C9 (grupo)
<i>Gymnocalycium mihanovichii</i> (Fric & Gürke) Britt. & Rose	Cactaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Hemi.	Herbácea suculenta	Z9	C8(grupo)
<i>Hebe salicifolia</i> (Forst. f.) Pennell	Scrophulariaceae	Verónica	Neotropical; Antártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z7	C22, C23 (grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Hedera helix</i> L.	Araliaceae	Hera	Paleártico	Perenifólio	1-12	9-10	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z5	C11, C27 (grupo)
<i>Hedychium chrysroleucum</i> Hook.	Zingiberaceae	Bananiha Roca-de-vénus	Índomalaio	Perenifólio	1-12	7-11	Hemi.	Herbácea	Z11	C16(grupo)
<i>Heliconia bihai</i> (L.) L.	Heliconiaceae	Helicónia	Neotropical	Perenifólio	1-12	7-10	Hemi.	Herbácea	Z11	C4, C6, C11, C18 (grupo)
<i>Heliconia champneiana</i> Griggs	Heliconiaceae	Helicónia	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-3	Hemi.	Herbácea	Z11	C2(1)
<i>Heliconia foreroi</i> Abelo & Morales	Heliconiaceae	Helicónia	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-4	Hemi.	Herbácea	Z11	C2(3)
<i>Heliconia rostrata</i> Ruiz & Pav.	Heliconiaceae	Helicónia	Neotropical	Perenifólio	1-12	7-10	Hemi.	Herbácea	Z11	C4, C6 (grupo)
<i>Heliconia stricta</i> Huber.	Heliconiaceae	Helicónia	Neotropical	Perenifólio	1-12	7-10	Hemi.	Herbácea	Z11	C4, C11 (grupo)
<i>Hemerocallis dumortieri</i> E. Morr.	Liliaceae (Hemerocallidaceae)	Hemerocalis; Lírio-dum-dia	Paleártico	Perenifólio	1-12	6-10	Geófito	Herbácea	Z5	C15 (grupo)
<i>Hibiscus rosa-sinensis</i> L.	Malvaceae	Cardeais	Índomalaio	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C9(2), C14(7), C23(sebe), C27(8)
<i>Hibiscus schizopetalus</i> (Mast.) Hook.	Malvaceae	Lanterna-japonesa	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	3-11	Micro.	Arbusto	Z10	C23(1)
<i>Hibiscus syriacus</i> L.	Malvaceae	Cardeal-roxo; Hibisco-da- síria	Paleártico; Índomalaio	Caducifólio	5-11	7-9	Micro.	Arbusto	Z5	C14(1)
<i>Hippesatrum vittatum</i> (L' Hérit) Herb.	Amaryllidaceae	Raqueis	Neotropical	Sazonal	4-10	4-10	Geófito	Herbácea	Z10	C6(grupo)
<i>Hohenbergia stellata</i> Schultes f.	Bromeliaceae	Bromélia	Neotropical	Perenifólio	1-12	3-8	Hemi.	Herbácea	Z11	C7(grupo)
<i>Holmskioldia sanguinea</i> Retz.	Verbenaceae	Chapéus-de-mandarim; Chapéus-chineses	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C1(1), C11(1), C27(1)
<i>Howea forsteriana</i> (C. Moore & F. Muell.) Becc.	Palmae	Quência	Australiano	Perenifólio	1-12	1-9	Micro.	Árvore	Z10	C4(3), C12(1), C15A(1), C17(1), C17A(1), C27(3)
<i>Huernia confusa</i> E. Phillips	Asclepiadaceae	Huernia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea suculenta	Z10	E8(1)
<i>Hydrangea macrophylla</i> (Thunb.) Ser.	Hydrangeaceae	Hortênsia; Novelos	Paleártico	Caducifólio	3-12	5-10	Nano.	Arbusto	Z6	C2, C6, C14, C18, C22 (grupo)
<i>Hylocereus triangularis</i> (L.) Britt. & Rose	Cactaceae	Rainha-da-noite; Cacto-trepador	Neotropical	Perenifólio	1-12	7-10	Fane. trep.	Arbusto trepador e suculento	Z10	C1(1), C8(1), C9(1), C13(1)
<i>Hypericum monogynum</i> L.	Guttiferae	Hipericão	Paleártico; Índomalaio	Perenifólio	1-12	3-6	Micro.	Arbusto	Z11	C15(1)
<i>Ilex aquifolium</i> L.	Aquifoliaceae	Azevinho-comum; Azevinho-inglês	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-6	Micro.	Árvore	Z6	C22(2)
<i>Impatiens hawkeri</i> Bull.	Balsaminaceae	Maravilhas	Hortícola	Sazonal	4-9	5-8	Terófito	Herbácea	Z10	C9, C14, C19A(grupo)
<i>Impatiens walleriana</i> Hook. f.	Balsaminaceae	Maravilhas	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Herbácea	Z9	C13(grupo)
<i>Ipochroma cyanea</i> (Lindl.) Green.	Solanaceae	Iocroma	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z9	C8(1)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Iris japonica</i> Thunb.	Iridaceae	Lírio-do-japão	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-8	Geófita	Herbácea	Z8	C13, C19, C21, C22, C23 (grupo)
<i>Jacaranda mimosifolia</i> D. Don.	Bignoniaceae	Jacarandá	Neotropical	Caducifólio	5-2	4-6; 9-10	Meso.	Árvore	Z9	C1(2), C12(1), C23(2)
<i>Jatropha curcas</i> L.	Euphorbiaceae	Jatrofa	Neotropical;	Caducifólio	5-1	7-8	Micro.	Árvore	Z10	C2(1)
<i>Juniperus communis</i> L.	Cupressaceae	Cedro	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-3	Micro.	Árvore	Z2	C15(2)
<i>Justicia rizzinii</i> Wassh.	Acanthaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	1-3	Nano.	Arbusto	Z11	C7(1)
<i>Kalanchoe delagonensis</i> Ecklon & Zeyh.	Crassulaceae	Calanchoé	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	12-9	Nano.	Arbusto suculento	Z11	C17A (grupo)
<i>Kniphofia x praecox</i> Bak.	Liliaceae (Aloecaceae)	Foguetes	Hortícola	Perenifólio	1-12	11-2	Hemi.	Herbácea	Z9	C16(grupo)
<i>Kohleria eriantha</i> (Benth.) Hanst.	Gesneriaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z11	C15A(grupo)
<i>Lagerstroemia indica</i> L.	Lythraceae	Laguerestrémia; Flor-de-merenda; Suspiros	Paleártico; Indomalaio	Caducifólio	3-11	7-9	Micro.	Árvore	Z7	C1(1), C10(3)
<i>Lampranthus multiradiatus</i> (Jacq.) N. E. Br.	Aizoaceae (Mesembryanthemaceae)	Lamprantos; Chorão	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Arbusto trepador e suculento	Z11	C25(grupo)
<i>Lantana camara</i> L.	Verbenaceae	Lantana	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C14(grupo)
<i>Laurus novocanariensis</i> Rivas Mart. & al.	Lauraceae	Loureiro	Paleártico	Perenifólio	1-12	11-3	Meso.	Árvore	Z10	C2(1), C7(1), C9(1), C11(1), C13(2), C21(1)
<i>Lavandula dentata</i> L.	Labiatae	Alfazema; Lavanda	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z8	C2(grupo)
<i>Lavandula lanata</i> Boiss.	Labiatae	Alfazema	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z8	C2(grupo)
<i>Leptospermum scoparium</i> Forst. & Forst.	Myrtaceae	Leptospermo; Urze-de-jardim	Australiano; Antártico	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z8	C1(1), C22(1), C23(1)
<i>Leucadendron salignum</i> Bergius x <i>L. laureolum</i> (Lam.) Fourc.	Proteaceae	Safari-sunset	Hortícola	Perenifólio	1-12	11-2	Micro.	Arbusto	Z9	C18(1)
<i>Leucanthemum x superbum</i> (J. Ingram) Bergmans ex Kent	Compositae	Estrelas; Margarida-grande	Hortícola	Perenifólio	1-12	5-8	Nano.	Herbácea	Z5	C6(grupo)
<i>Ligustrum ovalifolium</i> Hassk.	Oleaceae	Ligustro	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-7	Nano.	Arbusto	Z5	C1(2), C2(1)
<i>Limonium sinuatum</i> (L.) Mill.	Plumbaginaceae	Limónio; Cuidados-eternos	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-11	Nano.	Herbácea	Z9	C2(grupo)
<i>Liriodendron tulipifera</i> L.	Magnoliaceae	Tulipeiro-arbóreo	Neártico	Caducifólio	4-11	4-6	Meso.	Árvore	Z4	C6(1), C8(1), C23(1)
<i>Livistona chinensis</i> (Jacq.) R. Br. ex Mart.	Palmae	Palmeira-de- leque	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-5	Meso.	Árvore	Z9	C1(3), C9(4), C10(1), C15(1), C16(1), C17(1), C23(1), C24(1),
<i>Lobularia maritima</i> (L.) Desv.	Cruciferae	Lobulária	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z8	C14(grupo)
<i>Lonicera hildebrandiana</i> Collett & Hemsl	Caprifoliaceae	Madressilva- gigante	Paleártico; Indomalaio	Perenifólio	1-12	4-8	Fane.trep.	Arbusto trepador	Z9	C18(1)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Lonicera japonica</i> Thunb.	Caprifoliaceae	Madressilva	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-11	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z4	C15(grupo)
<i>Macadamia integrifolia</i> Maid. & Betche.	Proteaceae	Macadâmia	Australiano	Perenifólio	1-12	2-5	Micro.	Árvore	Z9	C1(3), C2(1)
<i>Macfadyena unguis-cati</i> (L.) A. Gentry	Bignoniaceae	Bignónia-unha-de- gato	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-5	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z9	C9(1)
<i>Magnolia grandiflora</i> L.	Magnoliaceae	Magnólia	Neártico	Perenifólio	1-12	5-8	Micro.	Árvore	Z6	C18(1)
<i>Malus sylvestris</i> (L.) Mill.	Rosaceae	Pereiro	Paleártico	Caducifólio	4-11	4-11	Micro.	Árvore	Z3	C2(1)
<i>Mammillaria sempervivi</i> DC.	Cactaceae	Mamilária	Neotropical	Perenifólio	1-12	7-11	Hemi.	Herbácea suculenta	Z9	C8(grupo)
<i>Mandevilla boliviensis</i> (Hook. f.) Woodson	Apocynaceae	Dipladénia-branca	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	C27(1)
<i>Mandevilla splendens</i> (Hook. f.) Woodson	Apocynaceae	Dipladénia	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	C19A(1)
<i>Mangifera indica</i> L.	Anacardiaceae	Mangueiro	Indomalaio	Perenifólio	1-12	9-6	Micro.	Árvore	Z11	C1(2), C2(2), C14(13), C6(18), C23(1)
<i>Maytenus umbellata</i> (R. Br.) Mabb.	Celastraceae	Buxo-da- rocha	Paleártico	Perenifólio	1-12	8-9	Micro.	Arbusto	Z11	C2(1), C15(1)
<i>Melaleuca armilaris</i> (Sol. ex Gaertn.) Sm.	Myrtaceae	Melaleuca	Australiano	Perenifólio	1-12	3-5	Micro.	Árvore	Z9	C10(4)
<i>Melaleuca hypericifolia</i> Sm.	Myrtaceae	Melaleuca	Australiano	Perenifólio	1-12	4-9	Micro.	Arbusto	Z9	C7(1)
<i>Melissa officinalis</i> L.	Labiatae	Erva-cidreira	Paleártico	Perenifólio	1-12	6-8	Nano.	Herbácea	Z4	C2(grupo)
<i>Melocactus matanzanus</i> Léon	Cactaceae	Cacto	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-11	Caméfito	Herbácea suculenta	Z12	C8(grupo)
<i>Mentha spicata</i> L.	Labiatae	Hortelã-dos- jardins; Hortelã-de-leite	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Herbácea	Z3	C2(grupo)
<i>Metrosideros excelsa</i> Sol. ex Gaertn.	Myrtaceae	Metrosídero	Antártico	Perenifólio	1-12	6-7	Meso.	Árvore	Z10	C1(1)
<i>Miscanthus sinensis</i> Anders. var. <i>condensatus</i>	Gramineae		Paleártico	Perenifólio	1-12	6-8	Hemi.	Herbácea	Z4	C9(grupo)
<i>Monstera deliciosa</i> Liebm.	Araceae	Costela-de-adão	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z10	C1, C9, C11, C23 (grupo)
<i>Montanoa bipinnatifida</i> (Kunth) K. Kock	Compositae	Malmequer- arbóreo	Neotropical	Perenifólio	1-12	12-4	Micro.	Arbusto	Z10	C8(1)
<i>Morus nigra</i> L.	Moraceae	Amoreira	Paleártico	Caducifólio	3-11	4-5	Micro.	Árvore	Z6	C23(1)
<i>Musa velutina</i> Wendl. & Drude.	Musaceae	Bananeira-de- jardim	Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z9	C4(grupo)
<i>Musa x paradisiaca</i> L.	Musaceae	Bananeira-de- prata	Hortícola	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C4, C6(grupo)
<i>Myoporum tenuifolium</i> Forst. f.	Myoporaceae	Miopóro	Australiano	Perenifólio	1-12	2-5	Micro.	Árvore	Z9	C15(2)
<i>Myrtus communis</i> L.	Myrtaceae	Murta	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-7; 10-11	Micro.	Arbusto	Z8	C1(2), C9(1), C15A(1)
<i>Narcissus tazetta</i> L.	Amaryllidaceae	Junquilhos	Paleártico	Sazonal	11-5	12-3	Geófito	Herbácea	Z8	C1, C6, C10, C22, C23 (grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Neoregelia carolinae</i> (Beer) L. B.	Bromeliaceae	Bromélia	Neotropical	Perenifólio	1-12	11-1	Hemi.	Herbácea	Z10	C9, C11, C19 (grupo)
<i>Neoregelia concentrica</i> (Vell.) L. B. Sm.	Bromeliaceae	Bromélia	Neotropical	Perenifólio	1-12	11-1	Hemi.	Herbácea	Z10	C9(grupo)
<i>Nepenthes maxima</i> Reinw. ex Nees	Nepenthaceae	Nepentes	Oceânia	Perenifólio	1-12	8-9	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z11	C3(1), C7(1)
<i>Nephrolepis cordifolia</i> (L.) Presl.	Oleandraceae	Feto	Neotropical; Áfricotropical; Indomalaio; Oceânia; Australiano	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z10	C11, C14, C22 (grupo)
<i>Nephrolepis exaltata</i> (L.) Schott.	Oleandraceae	Feto	Neotropical; Áfricotropical; Indomalaio; Oceânia; Australiano	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z10	C11, C14(grupo)
<i>Nerium oleander</i> L.	Apocynaceae	Sevadiha; Loendro	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-11	Micro.	Arbusto	Z9	C2(4), C4(13), C14(4), C15(1), C21(2)
<i>Nipidium crassifolium</i> (L.) Lellinger	Polypodiaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z10	C13(2)
<i>Nolina recurvata</i> (Lem.) Hemsl.	Agavaceae	Nolina; Pata-de-elefante	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-8	Micro.	Árvore	Z9	C15(1), C26(4)
<i>Nymphaea alba</i> L.	Nymphaeaceae	Nenúfar-branco	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-8	Helófito	Herbácea	Z6	C9(grupo)
<i>Odontonema strictum</i> (Nees) Kuntze	Acanthaceae	Odontonema; Ramo-de-fogo	Neotropical	Perenifólio	1-12	8-12	Nano.	Arbusto	Z10	C4(2), C23(grupo)
<i>Oncidium phalaenopsis</i> Linden & Reichb. f.	Orchidaceae	Oncídio	Neotropical	Perenifólio	1-12	10-12	Epífita	Herbácea	Z11	C12(grupo)
<i>Oncidium sphacelatum</i> Lindley	Orchidaceae	Oncídio	Neotropical	Perenifólio	1-12	10-12	Epífita	Herbácea	Z11	C17(1)
<i>Ophiopogon japonicus</i> (L. f.) Ker-Gawl	Liliaceae (Convallariaceae)	Relva-do-japão	Paleártico	Perenifólio	1-12	7-9	Hemi.	Herbácea	Z8	C6, C27, C28 (mancha)
<i>Opuntia cylindrica</i> (Lam.) DC.	Cactaceae	Cacto-redondo	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-7	Micro.	Arbusto suculento	Z9	C1(10)
<i>Opuntia leucotricha</i> DC.	Cactaceae	Cacto; Tabaibeira	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-7	Nano.	Arbusto suculento	Z9	C1(3)
<i>Opuntia monacantha</i> (Willd.) Haw. f. <i>variegata</i>	Cactaceae	Cacto	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-7	Nano.	Arbusto suculento	Z9	C1(4)
<i>Opuntia robusta</i> Wendl. & Pfeiff.	Cactaceae	Cacto; Tabaibeira	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-7	Nano.	Arbusto suculento	Z9	C1(2)
<i>Opuntia subulata</i> (Muehlenph.) Engelm.	Cactaceae	Cacto	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-7	Micro.	Arbusto suculento	Z9	C1(1)
<i>Ornithogalum thyrsoides</i> Jacq.	Liliaceae (Hyacinthaceae)	Torrões-de-açúcar	Áfricotropical	Sazonal	10-6	5-6	Geófito	Herbácea	Z9	C6(grupo)
<i>Oxalis latifolia</i> HBK.	Oxalidaceae	Trevo	Neotropical	Sazonal	10-5	12-4	Geófito	Herbácea	Z9	C10(grupo)
<i>Oxalis pes-caprae</i> L.	Oxalidaceae	Azedas; Trevo	Áfricotropical	Sazonal	10-5	12-4	Geófito	Herbácea	Z9	C6(grupo)
<i>Pachira insignis</i> (Sw.) Savigny	Bombacaceae	Paquira	Neotropical	Perenifólio	1-12	7-8	Micro.	Árvore	Z10	C2(2)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Pachycereus pringlei</i> (S. Wats.)	Cactaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Nano.	Arbusto suculento	Z9	C8(1)
<i>Pachypodium lamerei</i> Drake	Apocynaceae	Paquípódio	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	8-9	Micro.	Árvore suculenta	Z9	C8(1)
<i>Pandanus utilis</i> Bory	Pandanaceae	Pândano	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	9-3	Micro.	Árvore	Z10	C23(1)
<i>Paphiopedilum insigne</i> (Wallich ex Lindl.) Pfitz.	Orchidaceae	Sapatinhos	Indomalaio	Perenifólio	1-12	11-4	Hemi.	Herbácea	Z10	C7(grupo)
<i>Parthenocissus quinquefolia</i> (L.) Planch.	Vitaceae	Vinha-virgem	Neártico	Caducifólio	4-12	5-7	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z3	C14(grupo)
<i>Paspalum dilatatum</i> Poir.	Gramineae	Erva-rija; Erva-do-governo	Neotropical	Perenifólio	1-12	3-9	Hemi.	Herbácea	Z8	C1, C23 (tapete)
<i>Passiflora edulis</i> Sims	Passifloraceae	Maracujá-roxo; Flor-da-paixão	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-11	Fane.trep.	Arbusto trepador	Z10	C20(1)
<i>Pelargonium inquinans</i> (L.) L'Hérit	Geraniaceae	Malva-vermelha	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C12(grupo)
<i>Pelargonium peltatum</i> (L.) L'Hérit.	Geraniaceae	Malva	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z10	C6(grupo)
<i>Pelargonium quercifolium</i> (L.) L'Hérit.	Geraniaceae	Malva	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	2-8	Nano.	Arbusto	Z10	C2, C21 (grupo)
<i>Pelargonium zonale</i> (L.) L'Hérit	Geraniaceae	Malva	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C4, C14 (grupo)
<i>Pentas lanceolata</i> (Forssk.) Deflers.	Rubiaceae	Pentas	Áfricotropical; Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C23(2)
<i>Petrea volubilis</i> L.	Verbenaceae	Estrela-azul; Viuvinha	Neotropical	Perenifólio	1-12	3-12	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	C6(2), C17A(2), C19A(2)
<i>Petunia x hybrida</i> hort. Vilm.-Andr.	Solanaceae	Petúnia	Hortícola	Sazonal	2-11	2-11	Terófito	Herbácea	Z9	C18(grupo)
<i>Phalaenopsis amabilis</i> (L.) Blume	Orchidaceae	Falanópsia	Indomalaio; Oceânia; Australiano	Perenifólio	1-12	12-6	Epífita	Herbácea	Z11	C3, C17 (grupo)
<i>Phalaenopsis schilleriana</i> Reichb. f.	Orchidaceae	Falanópsia	Indomalaio	Perenifólio	1-12	12-6	Epífita	Herbácea	Z11	C3(grupo)
<i>Philodendron erubescens</i> K. Koch & Augustin	Araceae	Filodendro	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-6	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z11	C1(2), C7(1), C11(5), C12(2), C18(2)
<i>Philodendron imbe</i> Schott	Araceae	Filodendro	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-6	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z12	C11(1)
<i>Phlebodium aureum</i> (L.) J. Sm.	Polypodiaceae	Polipódio-dourado	Neártico; Neotropical	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z10	C13, C22, C23 (grupo)
<i>Phoenix canariensis</i> Chabaud.	Palmae	Palmeira-das- canárias	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-3	Meso.	Árvore	Z11	C2(2), C6(1), C7(3), C22(1)
<i>Phoenix dactylifera</i> L.	Palmae	Tamareira	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-3	Meso.	Árvore	Z11	C1(2), C1(3 peq.), C22(1)
<i>Phoenix reclinata</i> Jacq.	Palmae	Tamareira-do- senegal	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	5-7	Micro.	Árvore	Z11	C1(2), C4(4), C7(1), C10(1), C11(1), C12(1), C13(1) C19(1), C21(1), C22(1), C24(4), C25(1), C28(1)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Phoenix roebelinii</i> O'Brien.	Palmae	Palmeira-anã	Indomalaio	Perenifólio	1-12	5-7	Micro.	Árvore	Z11	C4(4), C6(2)
<i>Phormium tenax</i> Forst. & Forst. f.	Agavaceae	Espadana	Antártico	Perenifólio	1-12	6-8	Hemi.	Herbácea	Z8	C4, C9 (grupo)
<i>Phyllostachis aurea</i> (Carr.) A. & C. Riv.	Gramineae	Bambu	Paleártico	Perenifólio	1-12	Não floriu**	Hemi.	Herbácea	Z6	C7(grupo)
<i>Phyllostachys nigra</i> (Lodd. Ex Lindl.) Munro	Gramineae	Bambu-negro	Paleártico	Perenifólio	1-12	Não floriu**	Hemi.	Herbácea	Z5	C1(grupo)
<i>Phytolacca dioica</i> (L.) Moq.	Phytolaccaceae	Bela-sombra	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-9	Meso.	Árvore	Z11	C1(1)
<i>Pilea cadierei</i> Gagnep. & Guillaum.	Urticaceae	Planta-do-alumínio	Indomalaio	Perenifólio	1-12	10-12	Hemi.	Herbácea	Z11	C1(grupo)
<i>Pinus canariensis</i> C. Sm.	Pinaceae	Pinheiro-das-canárias	Paleártico	Perenifólio	1-12	2-4	Meso.	Árvore	Z10	C1(4), C12(2), C23(3), C24(1), C25(1)
<i>Pinus pinaster</i> Ait.	Pinaceae	Pinheiro-marítimo	Paleártico	Perenifólio	1-12	2-4	Meso.	Árvore	Z8	C1(1)
<i>Pistia stratiotes</i> L.	Araceae	Alface-de-água	Neotropical; Áfricotropical; Indomalaio; Oceânia; Australiano	Perenifólio	1-12	1-12	Hidrófita	Herbácea	Z10	C13, C14 (grupo)
<i>Pittosporum tobira</i> Ait.	Pittosporaceae	Tobira; Faia-da-holanda	Paleártico	Perenifólio	1-12	2-5	Micro.	Árvore	Z9	C7(1), C15(1)
<i>Pittosporum undulatum</i> Vent.	Pittosporaceae	Incenseiro	Australiano	Perenifólio	1-12	2-4	Micro.	Árvore	Z9	C7(1), C23(1)
<i>Platycerium bifurcatum</i> (Cav.) C. Chr.	Polypodiaceae	Feto-de-corno-de-veado	Indomalaio; Oceânia; Australiano	Perenifólio	1-12	-----	Epífita	Herbácea	Z9	C1(1), C7(2), C11(1), C17(3)
<i>Platycladus orientalis</i> (L. f.) Franco	Cupressaceae	Tuia	Neártico	Perenifólio	1-12	1-3	Micro.	Árvore	Z6	C27(1)
<i>Plectranthus forsteri</i> Benth.	Labiatae	Plectrantos	Australiano; Oceânia	Perenifólio	1-12	6-10	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z10	C22, C23(grupo)
<i>Plumbago auriculata</i> Lam.	Plumbaginaceae	Plumbago	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Árbusto trepador	Z9	C1, C22(grupo)
<i>Plumeria rubra</i> L. var. <i>acutifolia</i> (Poir.) Woodson.	Apocynaceae	Planta-dos-dentes	Neotropical	Caducifólio	5-1	6-12	Micro.	Árvore	Z10	C2(5), C16(1)
<i>Polygonum capitatum</i> Buch.-Ham. ex D. Don	Polygonaceae	Polígono-de-jardim	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z8	C18(grupo)
<i>Polypodium macaronesicum</i> A. E. Bobrov.	Polypodiaceae	Polipódio	Paleártico	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z10	C13(grupo)
<i>Populus alba</i> L.	Salicaceae	Choupo-branco	Paleártico	Caducifólio	4-12	3-4	Micro.	Árvore	Z3	C12(4)
<i>Portulacaria afra</i> Jacq.	Portulacaceae	Portulacaria	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu**	Nano.	Árbusto suculento	Z9	C1(1)
<i>Protea neriifolia</i> R. Br.	Proteaceae	Protea-de-folha – estreita; Protea-folha-de-loendro	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	11-2	Nano.	Árbusto	Z5	C1(16)
<i>Prunus persica</i> (L.) Batsch.	Rosaceae	Pessegueiro	Paleártico	Caducifólio	3-11	3-4	Micro.	Árvore	Z5	C13(1), C23(1)
<i>Prunus x domestica</i> L.	Rosaceae	Ameixeira	Hortícola	Caducifólio	4-11	3-4	Micro.	Árvore	Z5	C2(1)
<i>Psidium guajava</i> L.	Myrtaceae	Goiabeira	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-7	Micro.	Árvore	Z10	C2(2)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Psidium littorale</i> Raddi	Myrtaceae	Araçazeiro; Araçaleiro	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-7	Micro.	Árvore	Z10	C2(1), C4(1), C6(1)
<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn.	Dennstaedtiaceae	Feiteira	Paleártico; Neártico	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z4	C5(grupo)
<i>Pteris tremula</i> R. Br.	Pteridaceae	Feto	Australiano; Antártico; Oceânia; Áfricotropical	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z10	C1, C6, C7, C17, C18, C22, C23 (grupo)
<i>Pteris vittata</i> L.	Pteridaceae	Feto	Paleártico; Indomalaio; Australiano Oceânia	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z9	C6, C7, C14, C18, C20, C26, C27 (grupo)
<i>Punica granatum</i> L.	Punicaceae	Romãzeira	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-6	Micro.	Árvore	Z9	C2(1)
<i>Pyracantha angustifolia</i> (Franch.) Schneid.	Rosaceae	Perinhos; Sarça-ardente	Paleártico	Perenifólio	1-12	2-5	Micro.	Arbusto	Z7	C1(4), C12(1), C15(1), C15(1), C23(1), C27(5)
<i>Pyracantha coccinea</i> Roem.	Rosaceae	Perinhos; Sarça-ardente	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-5	Micro.	Arbusto	Z6	C1(2), C2(1), C6(3), C9(1), C10(1)
<i>Pyrostegia venusta</i> (Ker- Gawl.) Miers	Bignoniaceae	Gaitinhas	Neotropical	Perenifólio	1-12	11-3	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	C19A(1)
<i>Quercus robur</i> L.	Fagaceae	Carvalho	Paleártico	Caducifólio	2-11	3-5	Meso.	Árvore	Z6	C11(1)
<i>Quercus rubra</i> L.	Fagaceae	Carvalho- vermelho- americano	Neártico	Caducifólio	4-11	4-5	Meso.	Árvore	Z3	C12(1)
<i>Quercus suber</i> L.	Fagaceae	Sobreiro	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-4	Micro.	Árvore	Z8	C1(1), C7(2), C12(1)
<i>Quercus x crenata</i> Lam.	Fagaceae	Carvalho	Paleártico	Marcescente	5-4 (3-4)	3-4	Meso.	Árvore	Z6	C7(1)
<i>Ravenala madagascariensis</i> Sonn.	Strelitziaceae	Ravenala; Árvore-do-viajante	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	2-10	Micro.	Árvore	Z11	C6(1), C15(1)
<i>Reinwardtia indica</i> Dumort.	Linaceae		Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z9	C6(grupo)
<i>Rhaphiolepis umbellata</i> (Thunb.) Mak.	Rosaceae		Paleártico	Perenifólio	1-12	10-4	Nano.	Arbusto	Z8	C12(1), C13(1), C15(1), C17A(1)
<i>Rhapis excelsa</i> (Thunb.) Henry.	Palmae	Palmeira-de-hong- kong; Pameira-de- senhora	Paleártico	Perenifólio	1-12	6-9	Micro.	Arbusto	Z10	C8(2), C13(1)
<i>Rhododendron mucronatum</i> G. Don.	Ericaceae	Azálea-japonesa	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z5	C1, C8, C17A(grupo)
<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Leguminosae (Papilionoideae)	Robinia	Neártico	Caducifólio	3-12	3-6	Meso.	Árvore	Z3	C13(6)
<i>Roldana petasites</i> (Sims) H. Robinson & Bretell.	Compositae	Senécio	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-4	Micro.	Arbusto	Z9	C12, C13 (grupo)
<i>Rosa laevigata</i> Michx.	Rosaceae	Roseira	Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z7	C15(1)
<i>Rosmarinus officinalis</i> L.	Labiatae	Alecrim	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z6	C2(2), C15A(1), C17A(1), C20(1)
<i>Ruellia graecizans</i> Backer	Acanthaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	8-12	Nano.	Arbusto	Z10	C15, C17A(grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Rumohra adiantiformis</i> (Forst. f.) Ching.	Dryopteridaceae	Feto-real	Áfricotropical; Australiano; Oceânia; Antártico; Neotropical	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z10	C6, C7(grupo)
<i>Ruscus hypophyllum</i> L.	Liliaceae (Asparagaceae)	Ruscus	Paleártico	Perenifólio	1-12	11-12	Nano.	Herbácea	Z8	C4(grupo)
<i>Russelia equisetiformis</i> Scdl. & Cham.	Scrophulariaceae	Russélia ; Lágrimas-de-amor	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z9	C9, C15A, C17A (grupo)
<i>Saintpaulia ionantha</i> Wendl.	Gesneriaceae	Violeta-do-cabo; Violeta-africana	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	10-2	Hemi.	Herbácea	Z11	C7(grupo)
<i>Salvia leucantha</i> Cav.	Labiatae	Sálvia -branca	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z9	C6(grupo)
<i>Salvia officinalis</i> L.	Labiatae	Salva	Paleártico	Perenifólio	1-12	6-8	Nano.	Herbácea	Z5	C2(grupo)
<i>Sansevieria trifasciata</i> hort. ex Prain.	Agavaceae	Língua-de-sogra	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	8-11	Hemi.	Herbácea	Z10	C9(grupo)
<i>Sansevieria trifasciata</i> Prain var. <i>laurentii</i> (De Wild.) N. E. Br.	Agavaceae	Língua-de-sogra	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	8-11	Hemi.	Herbácea	Z10	C1, C9 (grupo)
<i>Schefflera actinophylla</i> (Endl.) Harms	Araliaceae	Brassaia	Australiano; Oceânia	Perenifólio	1-12	8-10	Meso.	Árvore	Z10	C4(1)
<i>Schefflera arboricola</i> (Hayata)	Araliaceae	Schefflera	Indomalaio	Perenifólio	1-12	2-4; 7-8	Micro.	Arbusto	Z10	C1(5)
<i>Schinus molle</i> L. non hort. ex Engl.	Anacardiaceae	Pimenteira- bastarda; Pimenteira-da- Índia	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Meso.	Árvore	Z9	C23(2)
<i>Schinus terebinthifolius</i> Raddi	Anacardiaceae	Pimenteira-do- brasil	Neotropical	Perenifólio	1-12	8-10	Micro.	Árvore	Z10	C1(2), C12(1)
<i>Schlumbergera x buckleyi</i> (T. Moore)	Cactaceae	Cacto-do-natal	Hortícola	Perenifólio	1-12	11-2	Epífita	Herbácea suculenta	Z9	C7, C8 (grupo)
<i>Schotia brachypetala</i> Sonder.	Leguminosae (Caesalpinioidae)	Scótia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	2-5	Micro.	Árvore	Z9	C1(1), C23(1)
<i>Scilla amoena</i> L.	Liliaceae (Hyacinthaceae)	Cila	Paleártico	Sazonal	2-7	3-4	Geófito	Herbácea	Z7	C6(grupo)
<i>Sedum morganianum</i> Walth.	Crassulaceae	Bananinhas	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-9	Nano.	Herbácea suculenta	Z9	C3(1)
<i>Sedum pachyphyllum</i> Rose	Crassulaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	1-4	Caméfito	Arbusto suculento	Z8	C8(grupo)
<i>Selenicereus grandiflorus</i> (L.) Britton & Rose	Cactaceae	Rainha-da-noite	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-7	Fane. trep.	Herbácea suculenta	Z9	C8(2)
<i>Senna didymobotrya</i> (Fres.) Irwin & Barneby.	Leguminosae (Caesalpinioidae)	Planta-das- pipocas; Cássia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C4(2), C15(3)
<i>Senna pendula</i> (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Irwin & Barneby var. <i>glabrata</i> (Vogel) Irwin & Barneby	Leguminosae (Caesalpinioidae)	Chuva-de-ouro; Cássia	Neotropical; Neártico	Perenifólio	1-12	10-1	Micro.	Arbusto	Z9	C4(1), C23(2)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Sequoia sempervirens</i> (D. Don) Endl	Cupressaceae	Sequóia	Neártico	Perenifólio	1-12	2-3	Micro.	Árvore	Z8	C22(1)
<i>Sobralia leucoxantha</i> Reichb. f.	Orchidaceae	Orquídea-de-cana; Sobralia	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-9	Hemi.	Herbácea	Z11	C10(grupo)
<i>Solandra maxima</i> (Sessé & Moc.) P. Green	Solanaceae	Solandra	Neotropical	Perenifólio	1-12	2-5	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	C12(1), C14(1)
<i>Solanum jasminoides</i> Paxt.	Solanaceae	Jasmim-bastardo	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z9	C9(1), C18(5), C19A(1),
<i>Solanum mauritianum</i> Scop.	Solanaceae	Tabaqueira	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C2(1), C23(1)
<i>Solanum seaforthianum</i> Andrews	Solanaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	5-11	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	C19A(1)
<i>Solenostemon scutellarioides</i> (L.) Codd.	Labiatae	Cóleos	Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C6, C13, C15, C23 (grupo)
<i>Spathiphyllum walisii</i> Reg.	Araceae	Lírio-da-paz; Bandeira-branca; Espatífilo	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z11	C15A, C18(grupo)
<i>Spathodea campanulata</i> Beauv.	Bignoniaceae	Chama-da- floresta; Tulipeiro- africano	Áfricotropical	Caducifólio	1-12 (Variação individual)	1-12	Micro.	Árvore	Z11	C9(1), C22(1)
<i>Stenotaphrum secundatum</i> (Walter) Kuntze	Gramineae	Relva; Relva-de-correr	Neotropical; Áfricotropical; Oceânia	Perenifólio	1-12	3-11	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z9	C4, C5, C6, C9, C10, C12, C13, C14, C16, C17 (tapete)
<i>Stephanotis floribunda</i> (R. Br.) Brongn.	Asclepiadaceae	Jasmim-de- madagáscar; Flor-de-noiva	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	4-8	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	C17A(1), C18(1)
<i>Strelitzia nicolai</i> Reg. & Körn.	Strelitziaceae	Estrelícia-gigante	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C1, C13, C19A, C24 (grupo)
<i>Strelitzia reginae</i> BanKs ex Dryand	Strelitziaceae	Estrelícia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C1, C6, C23, C26 (grupo)
<i>Strelitzia reginae</i> Banks ex Dryand var. <i>parvifolia</i> (Aiton) Anon.	Strelitziaceae	Estrelícia; Ave-do-paraíso	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C4(grupo)
<i>Strelitzia reginae</i> Banks ex Dryand var. <i>junceae</i> (Ker- Gawl.) H. E. Moore	Strelitziaceae	Estrelícia; Ave-do-paraíso	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C12(grupo)
<i>Streptosolen jamesonii</i> (Benth.) Miers.	Solanaceae	Rapaziada	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z9	C17A(2)
<i>Strobilanthes kunthianus</i> T. Anders ex Benth.	Acanthaceae		Indomalaio	Perenifólio	1-12	3-5	Nano.	Arbusto	Z11	C15(4)
<i>Stromanthe sanguinea</i> Sond.	Marantaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	6-7	Hemi.	Herbácea	Z10	C7(grupo)
<i>Strongylodon macrobotrys</i> A. Gray.	Leguminosae (Papilionoideae)	Vinha-de-jade	Indomalaio	Perenifólio	1-12	3-6	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z11	C3(1)
<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassm.	Palmae	Coqueiro-de- jardim; Palmeira-rainha	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-7	Micro.	Árvore	Z10	C1(2), C4(2), C14(6), C28(3)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Syncarpia glomulifera</i> (Sm.) Nied.	Myrtaceae	Turpentine	Australiano	Perenifólio	1-12	3-5	Meso.	Árvore	Z9	C13(1)
<i>Syngonium hoffmannii</i> Schott.	Araceae	Singónio	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-7	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z11	C1, C22 (grupo)
<i>Syngonium podophyllum</i> Shott.	Araceae	Singónio	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-7	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z11	C1, C12, C22 (grupo)
<i>Syngonium wendlandii</i> Schott.	Araceae	Singónio	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-7	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z11	C12(grupo)
<i>Syzygium jambos</i> (L.) Alston.	Myrtaceae	Jambeiro	Indomalaio	Perenifólio	1-12	3-7	Micro.	Árvore	Z10	C1(2), C2(1), C12(2)
<i>Tabebuia heterophylla</i> (D. C.) Britton	Bignoniaceae	Tabebuia	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-8	Micro.	Árvore	Z10	C2(1)
<i>Tamarindus indica</i> L.	Leguminosae	Tamarindo	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	7-8	Micro.	Árvore	Z11	C2(1)
<i>Tetradenia riparia</i> (Hochst.) Codd.	Labiatae	Iboza (Moschosma)	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	12-4	Nano.	Arbusto	Z10	C23(5)
<i>Tetrapanax papyrifer</i> (Hook.) K. Kock.	Araliaceae	Arália-do-papel	Indomalaio	Perenifólio	1-12	8-12	Micro.	Arbusto	Z8	C15(5)
<i>Thunbergia grandiflora</i> (Roxb. ex Rottl.) Roxb.	Acanthaceae	Tumbérgia	Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	C1(2)
<i>Thunbergia mysorensis</i> Anderson ex Bedd.	Acanthaceae	Tumbérgia	Indomalaio	Perenifólio	1-12	2-11	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	C10(1)
<i>Thymus vulgaris</i> L.	Labiatae	Segurelha; Cheiros	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-6	Nano.	Arbusto	Z7	C2(grupo)
<i>Tibouchina grandifolia</i> Cogn.	Melastomataceae	Aranhas; Tibouchina	Neotropical	Perenifólio	1-12	3-10	Micro.	Arbusto	Z10	C22(1), C23(1), C27(2)
<i>Tibouchina urvilleana</i> (DC) Cogn.	Melastomataceae	Aranhas	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C1(1), C22(2), C23(3), C27(2)
<i>Tillandsia cyanea</i> Lindl. ex K. Koch.	Bromeliaceae	Tilândsia-azul	Neotropical	Perenifólio	1-12	8-2	Hemi.	Herbácea	Z10	C8, C9 (grupo)
<i>Tillandsia tenuifolia</i> L.	Bromeliaceae	Erva-da-fortuna; Planta-do-ar	Neotropical	Perenifólio	1-12	3-6	Epífita	Herbácea	Z9	C3, C8, C9, C17 (grupo)
<i>Tillandsia usneoides</i> (L.) L.	Bromeliaceae	Tilandsia	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-10	Epífita	Herbácea	Z8	C3(7)
<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	Leguminosae (Papilionoideae)	Tipuana	Neotropical	Marcescente	5-4 (3-4)	4-7	Meso.	Árvore	Z9	C17(1)
<i>Tithonia diversifolia</i> (Hemsl.) A. Gray.	Compositae	Girassol-mexicano	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z9	C27(1)
<i>Trachelospermum jasminoides</i> (Lindl.) Lem.	Apocynaceae	Jasmim-de-estrela	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-9	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z8	C5(2), C17A(1), C19A(1), C26(2)
<i>Trachycarpus fortunei</i> (Hook.) H. A. Wendl.	Palmae	Palmeira-de- moinho-de-vento	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-6	Micro.	Árvore	Z8	C4(2), C5(2)
<i>Tradescantia zebrina</i> hort. ex. Bosse	Commelinaceae	Zebrina	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z9	C6, C13 (grupo)
<i>Tropaeolum majus</i> L.	Tropaeolaceae	Chagas	Neotropical	Sazonal	1-10	2-9	Terófito	Herbácea	Z8	C2, C18(grupo)
<i>Vanda tricolor</i> Lindley	Orchidaceae	Vanda-tricolor	Indomalaio	Perenifólio	1-12	3-5	Epífita	Herbácea	Z12	C7(grupo)
<i>Verbena bonariensis</i> L.	Verbenaceae	Jarvão; Urgebão	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-12	Nano.	Herbácea	Z7	C12(grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Vinca major</i> L.	Apocynaceae	Pervinca	Paleártico	Perenifólio	1-12	2-8	Hemi.	Herbácea trepadora	Z7	C1(grupo)
<i>Vitis vinifera</i> L.	Vitaceae	Vinha	Paleártico	Caducifólio	3-12	4-6	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z6	C2(grupo), C6(1), C10(2)
<i>Vriesea ensiformis</i> (Vell.) Beer.	Bromeliaceae	Bromélia	Neotropical	Perenifólio	1-12	11-2	Hemi.	Herbácea	Z11	C8, C9(grupo)
<i>Vriesea splendens</i> (Brongn.) Lem.	Bromeliaceae	Espada-de-fogo	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-2	Hemi.	Herbácea	Z11	C9(1), C11(grupo), C15A(1)
<i>Washingtonia filifera</i> (Lind. ex André) H. A. Wendl	Palmae	Palmeira-de-leque- da-califórnia	Neártico	Perenifólio	1-12	5-8	Micro.	Árvore	Z9	C1(1), C4(3), C6(1)
<i>Wigandia caracasana</i> HBK.	Hydrophyllaceae	Vigândia	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-5	Micro.	Arbusto	Z10	C1(grupo)
<i>Wisteria floribunda</i> (Willd.) DC	Leguminosae (Papilionoideae)	Glicínia-do-japão	Paleártico	Caducifólio	2-11	3-6	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z5	C19(1), C19A(1)
<i>Wisteria sinensis</i> (Sims) Sweet.	Leguminosae (Papilionoideae)	Lilases; Glicínia	Paleártico	Caducifólio	2-11	2-5; 7-8	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z5	C18(1), C19(2)
<i>Woodwardia radicans</i> (L.) Sm	Blechnaceae	Feto-de-botão	Paleártico	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z8	C7, C13(grupo)
<i>Yucca elata</i> Engelm.	Agavaceae		Neártico	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Nano.	Arbusto	Z9	C8(1)
<i>Yucca gloriosa</i> L.	Agavaceae	luca	Neártico	Perenifólio	1-12	6-11	Micro.	Arbusto	Z7	C1(grupo), C7(1), C9(grupo), C10(5), C12(grupo), C13(1)
<i>Yushania anceps</i> (Mitford) Yi.	Gramineae	Bambu	Paleártico	Perenifólio	1-12	Não floriu**	Hemi.	Herbácea	Z9	C4, C11 (grupo)
<i>Zantedeschia aethiopica</i> (L.) Spreng.	Araceae	Jarros	Áfricotropical	Sazonal	10-7	11-5	Geófita	Herbácea	Z8	C19(grupo)

Legenda:

- Plantas que não floriram no período em estudo (Janeiro 2002 – Janeiro 2005): * plantas novas; ** plantas que nunca floriram por falta de aclimação;
- Plantas marcescentes (plantas semiperenifólias e semcaducifólias): 3-2 **(3-4)** – folhas todo o ano mas com renovação significativa em Março e Abril.

Anexo 24
CARACTERIZAÇÃO FITOGEOGRÁFICA DOS JARDINS DA ESTALAGEM QUINTA DA BELA VISTA

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Abelia x grandiflora</i> (André) Rehd.	Caprifoliaceae	Abélia	Hortícola	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z5	C1(1), C5A(3), C14(1), C18(1)
<i>Acalypha hispida</i> Burm.	Euphorbiaceae	Rabo-de-gato-vermelho	Indomalaio; Oceânia	Perenifólio	1-12	7-11	Nano.	Arbusto	Z11	C2(1)
<i>Acalypha wilkesiana</i> Muell. Arg.	Euphorbiaceae	Acálifa;	Oceânia	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C5(1), C10(5)
<i>Acanthus mollis</i> L.	Acanthaceae	Erva-gigante	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-8	Hemi.	Herbácea	Z6	C14(grupo)
<i>Acer platanoides</i> L.	Aceraceae	Ácer	Paleártico	Caducifólio	4-11	4	Meso.	Árvore	Z4	C18(1)
<i>Adiantum capillus-veneris</i> L.	Adiantaceae	Avenca	Paleártico, Neotropical, Áfricotropical, Indomalaio	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z8	C1(grupo)
<i>Agapanthus praecox</i> Willd. ssp. <i>orientalis</i> (Leighton) Leighton	Liliaceae	Agapantos; Coroas-de-henrique	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	4-9	Hemi.	Herbácea	Z9	C1, C5, C5A, C9, C10, C11, C18, C24 (mancha)
<i>Agathis robusta</i> (C. Moore ex. F. Muell.) Bail.	Araucariaceae	Pinheiro-de-damara; Pinheiro-com-folha-de-alegra-campo	Australiano	Perenifólio	1-12	3-4	Meso.	Árvore	Z9	C12A(1), C22(3)
<i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle	Simaroubaceae	Ailanto; Árvore-do-céu	Paleártico	Caducifólio	5-1	6-9	Micro.	Árvore	Z6	C5(6)
<i>Albizia julibrissin</i> Durazz.	Leguminosae (Mimosoideae)	Árvore-da-seda; Albizia-de-constantinopla	Paleártico	Caducifólio	4-12	5-8	Micro.	Árvore	Z8	C9(1), C10A(1), C11(1), C13(1), C14(1)
<i>Aloe arborescens</i> Mill.	Liliaceae (Aloeaceae)	Aloés, Babosas, Foguetes-de-natal	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	11-2	Nano.	Arbusto suculento	Z9	C14(1)
<i>Aloe ciliaris</i> Haw.	Liliaceae (Aloeaceae)	Aloés	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	10-6	Fane. trep.	Arbusto trepador e suculento	Z9	C11(grupo)
<i>Alpinia zerumbet</i> (Pers.) B. L. Burt & Rosemary M. Sm.	Zingiberaceae	Alpínia; Lírio-de-porcelana	Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C14(1)
<i>Annona cherimola</i> Mill.	Annonaceae	Anoneira	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-7	Micro.	Árvore	Z10	C22(1), C23(2)
<i>Anredera cordifolia</i> (Ten.) Steenis	Basellaceae	Boussingau-Itia	Neotropical	Caducifólio	6-2	7-9	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z9	C11(1)
<i>Apollonias barbuja</i> (Cav.) Bomm.	Lauraceae	Barbusano	Paleártico	Perenifólio	1-12	9-3	Meso.	Árvore	Z10	C23(1)
<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> H. A. Wendl. & Drude.	Palmae	Palmeira-elegante	Australiano	Perenifólio	1-12	2-10	Meso.	Árvore	Z10	C23(2)
<i>Asparagus asparagoides</i> L. Druce	Liliaceae (Asparagaceae)	Alegre-campo-miúdo	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	3-4	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z10	C6, C14(grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Asparagus setaceus</i> (Kunth) Jassop	Liliaceae (Asparagaceae)	Esparto-de-folha-miúda; Esparto	Afrotropical	Perenifólio	1-12	9-12	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z9	C14(1)
<i>Bambusa vulgaris</i> J.C. Wendl.	Gramineae	Bambu	Paleártico; Indomalaio	Perenifólio	1-12	Não floriu**	Hemi.	Herbácea	Z10	C4A, C14, C18 (grupo)
<i>Begonia minor</i> Jacq.	Begoniaceae	Corações; Begónia- sempre-em-flor	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C5(grupo)
<i>Begonia x ricinifolia</i> A. Dietr.	Begoniaceae	Corações; Begónias	Hortícola	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C4, C12, C18 (grupo)
<i>Bergenia crassifolia</i> (L.) Fritsch.	Saxifragaceae	Bergénia; Couve-de- jardim	Paleártico	Perenifólio	1-12	11-4	Caméfito	Herbácea	Z3	C14(grupo)
<i>Billbergia vittata</i> Brongn. ex Morel.	Bromeliaceae	Bromélia	Neotropical	Perenifólio	1-12	11-2	Hemi.	Herbácea	Z10	C14(grupo)
<i>Bougainvillea glabra</i> Choisy	Nyctaginaceae	Buganvília	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	C1(18), C4A(1), C5A(2), C7(1), C21B(11)
<i>Brachychiton acerifolius</i> Cunn. ex. F. Muell.	Sterculiaceae	Árvore-do-fogo	Australiano	Caducifólio	1-5; 8-12	5-8	Micro.	Árvore	Z10	C1(3), C10(1)
<i>Brugmansia versicolor</i> Lagerh.	Solanaceae	Trombeteira	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C6(2), C12(1), C13(2), C14(2), C18(1)
<i>Bulbine frutescens</i> (L.) Willd.	Liliaceae (Asphodelaceae)	Bulbine	Áfrotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Geófita	Herbácea suculenta	Z9	C4, C5, C18 (grupo)
<i>Buxus microphylla</i> Sieb. & Zucc.	Buxaceae	Buxo	Paleártico; Indomalaio	Perenifólio	1-12	3-4	Nano.	Arbusto	Z6	C18, C19, C20 (sebe)
<i>Buxus sempervirens</i> L.	Buxaceae	Buxo	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-4; 10-11	Nano.	Arbusto	Z5	C1, C2, C3, C4, C4A, C5, C6, C10, C12, C12A, C13, C14, C18A, C23, C24 (sebe)
<i>Callistemon viminalis</i> (Sol. ex Gaertn.) G. Don ex Loud.	Myrtaceae	Martinete-chorão	Australiano	Perenifólio	1-12	4-7	Micro.	Arbusto	Z9	C12(1)
<i>Callistephus chinensis</i> (L.) Nees.	Compositae	Não-me-deixes	Paleártico	Sazonal	3-12	4-12	Terófito	Herbácea	Z6	C4, C6, C7, C7A, C8, C9 (grupo)
<i>Calycanthus floridus</i> L.	Calycanthaceae	Carocha (Carolina- allspice)	Neártico	Caducifólio	3-11	3-7	Micro.	Arbusto	Z6	C10(1)
<i>Camellia japonica</i> L.	Theaceae	Camélia; Japoneira	Paleártico	Perenifólio	1-12	11-6	Micro.	Árvore	Z8	C10(2), C14(4), C18(6)
<i>Caryota urens</i> L.	Palmae	Palmeiro-rabo-de-peixe	Indomalaio	Perenifólio	1-12	6-8	Micro.	Árvore	Z10	C5(2)
<i>Castanea sativa</i> Mill.	Fagaceae	Castanheiro	Paleártico	Caducifólio	3-12	3-7	Meso.	Árvore	Z5	C6(2)
<i>Casuarina equisetifolia</i> Forst. & Forst. f.	Casuarinaceae	Casuarina	Indomalaio; Australiano; Oceânia	Perenifólio	1-12	6-11	Meso.	Árvore	Z10	C1(15), C12A(1), C19(1), C24(1)
<i>Celtis australis</i> L.	Ulmaceae	Lódão-bastardo; Conteira	Paleártico	Caducifólio	4-1	5-6	Meso.	Árvore	Z8	C11(2), C14(1), C18A(1), C23(1), C24(1)
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> (Murray) Parl.	Cupressaceae	Cedro-de- orégão	Neártico	Perenifólio	1-12	1-2	Micro.	Árvore	Z6	C6(2), C12(3)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Chamaedorea elegans</i> Mart.	Palmae	Palmeira-de-salão; Palmeira-bambu	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-6	Micro.	Arbusto	Z10	C11, C14 (grupo)
<i>Chamaerops humilis</i> L.	Palmae	Palmeira-das-vassouras	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-5	Micro.	Arbusto	Z9	C4(1), C18(1)
<i>Chlorophytum comosum</i> (Thumb.) Jacques	Liliaceae (Anthericaceae)	Fitinhas	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z9	C5, C6, C12, C14 (grupo)
<i>Chorisia speciosa</i> A. St. Hil.	Bombacaceae	Sumaúma	Neotropical	Caducifólio	3-11	8-11	Meso.	Árvore	Z10	C9(2), C10(2), C12A(2), C14(1), C21A(1), C24(2), C25(2)
<i>Chrysalidocarpus lutescens</i> (Bory) Wendl.	Palmae	Palmeira-amarela; Palmeira-borboleta	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	6-7	Micro.	Arbusto	Z10	C2(1)
<i>Cinnamomum camphora</i> (L.) Sieb.	Lauraceae	Canforeira	Paleártico; Indomalaio	Perenifólio	1-12	2-4	Meso.	Árvore	Z10	C2(1), C9(1), C10(1), C14(2), C16(1), C17(4), C18(20), C21A(1), C23(1), C24(2)
<i>Citrus limon</i> (L.) Burm.	Rutaceae	Limoeiro	Paleártico	Perenifólio	1-12	2-4	Micro.	Árvore	Z9	C12(1)
<i>Citrus sinensis</i> (L.) Osbeck	Rutaceae	Laranjeira	Paleártico	Perenifólio	1-12	2-4	Micro.	Árvore	Z9	C14(2)
<i>Cleome hassleriana</i> Chodat.	Capparidaceae	Cleome	Neotropical	Sazonal	5-10	5-10	Terófito	Herbácea	Z9	C2(1), C4(1)
<i>Clethra arborea</i> Ait.	Clethraceae	Folhado; Folhadeiro	Paleártico	Perenifólio	1-12	7-8	Micro.	Árvore	Z10	C4(1)
<i>Clivia miniata</i> Regel	Amaryllidaceae	Clívia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	2-11	Hemi.	Herbácea	Z10	C10B, C12, C14, C18 (grupo)
<i>Codiaeum variegatum</i> (L.) Bl. var. <i>pictum</i> (Lodd.) Muell. Arg.	Euphorbiaceae	Crótone	Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z11	C10(1), C11(1), C12(4), C13(7)
<i>Coffea arabica</i> L.	Rubiaceae	Cafézeiro; Café	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	4-5; 8-9	Micro.	Arbusto	Z11	C18(1)
<i>Coprosma repens</i> A. Rich.	Rubiaceae	Coprosma	Antártico; Australiano	Perenifólio	1-12	4-5	Micro.	Arbusto	Z9	C4(1), C11(1), C18(1)
<i>Cordyline australis</i> (Forst.) Endl.	Agavaceae	Cordilina	Antártico	Perenifólio	1-12	4-6	Micro.	Árvore	Z9	C18(1)
<i>Cordyline stricta</i> (Sims) Endl.	Agavaceae	Cordiline	Australiano	Perenifólio	1-12	1-6	Nano.	Arbusto	Z10	C6(3), C12A(4)
<i>Cordyline terminalis</i> (L.) Kunth.	Agavaceae	Árvore-dos-reis	Indomalaio; Australiano; Oceânia; Antártico	Perenifólio	1-12	11-5	Micro.	Arbusto	Z10	C18(1)
<i>Corynocarpus laevigata</i> Forst. & Forst. f.	Corynocarpaceae	Loureiro-da-nova- zelândia	Antártico	Perenifólio	1-12	2-5	Micro.	Árvore	Z10	C16(1), C17(1)
<i>Crassula ovata</i> (Mill.) Druce.	Crassulaceae	Ensaio-branco; Planta-de-jade	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	11-3	Nano.	Arbusto suculento	Z10	C7A(grupo)
<i>Crocasmia x crocosmiflora</i> (Burb. & Dean) N.E. Br.	Iridaceae	Monbrécias; Hastes-de-são-josé	Hortícola	Perenifólio	1-12	5-9	Geófito	Herbácea	Z7	C5 (grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Cryptomeria japonica</i> (L.f.) Don	Taxodiaceae	Criptoméria	Paleártico	Perenifólio	1-12	12-3	Meso.	Árvore	Z7	C22(4), C23(10), C24(4)
<i>Cuphea micropetala</i> HBK.	Lythraceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	4-8	Nano.	Arbusto	Z9	C2(1)
<i>Cupressus arizonica</i> Green.	Cupressaceae	Cedro-do-arizona	Neártico	Perenifólio	1-12	11-1	Micro.	Árvore	Z7	C6(1)
<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartw. ex Gordon	Cupressaceae	Cipreste-de-monterrey; Cedro-de-monterrey	Neártico	Perenifólio	1-12	1-2	Meso.	Árvore	Z8	C24(3)
<i>Cupressus sempervirens</i> L.	Cupressaceae	Cipreste	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-2	Micro.	Árvore	Z8	C1(37), C8(1), C9(1)
<i>Cyathea australis</i> (R. Br.) Domin	Cyatheaceae	Feto-arbóreo	Australiano	Perenifólio	1-12	-----	Micro.	Árvore	Z9	C11(1)
<i>Cyathea cooperi</i> (F. Mueller) Domin.	Cyatheaceae	Feto-arbóreo	Australiano	Perenifólio	1-12	-----	Micro.	Árvore	Z10	C4(1), C10(4), C18(2)
<i>Cycas revoluta</i> Thunb.	Cycadaceae	Cicas-revoluta; Cicas-de-sagú	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-8	Micro.	Árvore	Z9	C18 (2)
<i>Cyrtomium falcatum</i> (L. f.) Presl.	Dryopteridaceae	Feto-azevinho	Paleártico; Indomalaio; Áfricotropical; Oceânia	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z9	C10, C11 (grupo)
<i>Delonix regia</i> (Bojer) Raf.	Leguminosae (Papilionoideae)	Acácia-rubra	Áfricotropical	Caducifólio	6-3	7-9	Micro.	Árvore	Z11	C1(1)
<i>Dendranthema x grandiflorum</i> Kitam.	Compositae	Crisântemo-das- floristas	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Herbácea	Z3	C5 (grupo)
<i>Distictis buccinatoria</i> (DC.) A. Gentry	Bignoniaceae	Dedos-de-senhora	Neotropical	Perenifólio	1-12	3-11	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z11	C8, C9 (grupo)
<i>Dracaena deremensis</i> Engl.	Agavaceae	Dracena	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	11-12	Micro.	Arbusto	Z11	C14(1), C17(8), C18(2)
<i>Dracaena draco</i> L. ssp. <i>draco</i>	Agavaceae	Dragoeiro	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-6	Micro.	Árvore	Z11	C1(2), C5(1), C8(1)
<i>Dracaena marginata</i> Lam.	Agavaceae	Dracena	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu**	Micro.	Arbusto	Z11	C12(1), C18(1)
<i>Duranta erecta</i> L.	Verbenaceae	Duranta; Violeteira-da-brasil	Neotropical	Perenifólio	1-12	7-1	Micro.	Arbusto	Z10	C5(2)
<i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl.	Rosaceae	Nespereira	Paleártico	Perenifólio	1-12	10-12	Micro.	Árvore	Z8	C11(1), C14(1), C18(2), C23(1)
<i>Escallonia bifida</i> Link & Otto	Grossulariaceae	Escalónia	Neotropical	Perenifólio	1-12	3-10	Micro.	Arbusto	Z9	C5(1)
<i>Eucalyptus ficifolia</i> F. Muell.	Myrtaceae	Eucalipto-de-flor- vermelha	Australiano	Perenifólio	1-12	1-12	Meso.	Árvore	Z9	C1(2), C24(3)
<i>Eucalyptus sideroxylon</i> A. Cunn. ex Wools	Myrtaceae	Eucalipto	Australiano	Perenifólio	1-12	8-9	Meso.	Árvore	Z9	C1(3)
<i>Eugenia uniflora</i> L.	Myrtaceae	Pitangueira	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Árvore	Z10	C11(3)
<i>Euphorbia cotinifolia</i> L.	Euphorbiaceae	Eufórbia	Neotropical	Caducifólio	3-12	7-11	Micro.	Árvore	Z11	C4(1), C5(2), C18(6)
<i>Euphorbia pulcherrima</i> Willd. ex Klotzsch.	Euphorbiaceae	Manhã-de-páscoa	Neotropical	Caducifólio	5-2	10-3	Micro.	Arbusto	Z10	C1(8), C5(1), C5A(5), C11(3)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Euphorbia tirucalli</i> L.	Euphorbiaceae	Eufórbia	Áfricotropical; Indomalaio	Perenifólio	1-12	4-9	Micro.	Arbusto suculento	Z10	C5(1)
<i>Euryops chrysanthemoides</i> (DC.) R. Nordenstam	Compositae	Estreleira-amarela	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z9	C18(4)
<i>Fagus sylvatica</i> L.	Fagaceae	Faia-europeia	Paleártico	Caducifólio	4-12	4-5	Meso.	Árvore	Z5	C1(3), C14(2)
<i>Felicia amelloides</i> (L.) Voss.	Compositae	Felícia ; Margarida-azul	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z9	C18(grupo)
<i>Ficus benjamina</i> L.	Moraceae	Figueira-da-índia	Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-4	Micro.	Árvore	Z11	C7(1), C21(1), C23(1)
<i>Ficus microcarpa</i> L. f.	Moraceae	Figueira-da-índia	Indomalaio	Perenifólio	1-12	3-12	Meso.	Árvore	Z11	C1(1)
<i>Freesia alba</i> (G. L. Mey.) Gumbel.	Iridaceae	Frisia	Áfricotropical	Sazonal	12-4	12-4	Geófita	Herbácea	Z9	C8, C9(grupo)
<i>Gardenia augusta</i> (L.) Merrill	Rubiaceae	Gardénia	Paleártico; Indomalaio	Perenifólio	1-12	6-8	Nano.	Arbusto	Z10	C15(1)
<i>Gazania rigens</i> (L.) Gaertn.	Compositae	Gazania	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z9	C3(grupo)
<i>Gerbera jamesonii</i> Bol. ex Adlam.	Compositae	Gerbera	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z8	C13(1)
<i>Ginkgo biloba</i> L.	Ginkgoaceae	Ginco; Árvore - avenca	Paleártico	Caducifólio	4-1	5	Micro.	Árvore	Z4	C23(2)
<i>Grevillea robusta</i> A. M. Cunn. Ex. R. Br.	Proteaceae	Grevília	Australiano	Perenifólio	1-12	4-6	Meso.	Árvore	Z8	C1(11), C21A(1), C22(2), C23(1)
<i>Hedera helix</i> L.	Araliaceae	Hera	Paleártico	Perenifólio	1-12	9-10	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z5	C6, C9, C10A (grupo)
<i>Hedychium gardnerianum</i> Ker-Gawl.	Zingiberaceae	Bananilha; Roca-de-vénus; Conteira	Paleártico; Indomalaio	Perenifólio	1-12	7-10	Hemi	Herbácea	Z9	C12, C14 (grupo)
<i>Hibiscus rosa-sinensis</i> L.	Malvaceae	Cardeais; Hibiscos; Rosa-da-china	Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C1(sebe), C4A(1), C5(sebe), C6(1), C7A(2), C8(grupo), C9(2), C18(5)
<i>Hibiscus schizopetalus</i> (Mast.) Hook.	Malvaceae	Lanterna-japonesa	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	3-11	Micro.	Arbusto	Z10	C22(1)
<i>Hibiscus syriacus</i> L.	Malvaceae	Cardeal-roxo; Hibisco-da- síria	Paleártico; Indomalaio	Caducifólio	5-11	7-9	Micro.	Arbusto	Z5	C9(1), C13(3), C18(2)
<i>Hippesatrum vittatum</i> (L' Hérit) Herb.	Amaryllidaceae	Raqueis	Neotropical	Sazonal	4-10	4-10	Geófita	Herbácea	Z10	C9(grupo)
<i>Howea forsteriana</i> (C. Moore & F. Muell.) Becc.	Palmae	Quência	Australiano	Perenifólio	1-12	1-9	Micro.	Árvore	Z10	C1(3)
<i>Hydrangea macrophylla</i> (Thunb.) Ser.	Hydrangeaceae	Hortênsias; Novelos	Paleártico	Caducifólio	3-12	5-10	Nano.	Arbusto	Z6	C2, C4, C6, C21A, C23, C24 (grupo)
<i>Ilex aquifolium</i> L.	Aquifoliaceae	Azevinho- comum; Azevinho- inglês	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-6	Micro.	Árvore	Z6	C9(1), C10(1), C11(1)
<i>Impatiens walleriana</i> Hook. f.	Balsaminaceae	Maravilhas	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Herbácea	Z9	C11, C12, C14 (grupo)
<i>Jacaranda mimosifolia</i> D. Don.	Bignoniaceae	Jacarandá	Neotropical	Caducifólio	5-2	4-6; 9-10	Meso.	Árvore	Z9	C1(2), C5(1), C23(1)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Jasminum polyanthum</i> Franch.	Oleaceae	Jasmim-dos-poetas	Paleártico	Perenifólio	1-12	2-6	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z8	C1(grupo)
<i>Juniperus communis</i> L. cv.	Cupressaceae		Paleártico	Perenifólio	1-12	1-3	Micro.	Árvore	Z2	C18(2)
<i>Kalanchoe blossfeldiana</i> Poelln.	Crassulaceae		Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto suculento	Z11	C2, C13 (grupo)
<i>Lagerstroemia indica</i> L.	Lythraceae	Laguerestrémia; Flor-de-merenda; Suspiros	Paleártico; Indomalaio	Caducifólio	3-11	7-9	Micro.	Árvore	Z7	C8(1), C9(1)
<i>Laurus novocanariensis</i> Rivas Mart. & al.	Lauraceae	Loureiro	Paleártico	Perenifólio	1-12	11-3	Meso.	Árvore	Z10	C8(2), C11(1), C14(2), C16(1), C22(1), C23(2), C24(1)
<i>Leucanthemum x superbum</i> (J. Ingram) Bergmans ex Kent	Compositae	Estrelas	Hortícola	Perenifólio	1-12	5-8	Nano.	Herbácea	Z5	C6, C18 (grupo)
<i>Lilium candidum</i> L.	Liliaceae	Açucena-branca; Açucena-de-nossa-senhora	Paleártico	Sazonal	2-7	4-6	Geófita	Herbácea	Z6	C6, C8, C9 (grupo)
<i>Liriodendron tulipifera</i> L.	Magnoliaceae	Tulipeiro-arbóreo	Neártico	Caducifólio	4-11	4-6	Meso.	Árvore	Z4	C14(1)
<i>Livistona chinensis</i> (Jacq.) R. Br. ex Mart.	Palmae	Palmeira-de-leque-da-china	Paleártico	Perenifólio	1-12	2-5	Meso.	Árvore	Z9	C8(1), C13(1)
<i>Lycianthes rantonnettii</i> Carr.	Solanaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z9	C2(2)
<i>Magnolia grandiflora</i> L.	Magnoliaceae	Magnólia	Neártico	Perenifólio	1-12	5-8	Micro.	Árvore	Z6	C1(1), C4(1), C12(1), C13(1), C18(1)
<i>Magnolia x soulangiana</i> Soul.-Bod.	Magnoliaceae	Magnólia	Hortícola	Caducifólio	3-12	12-4	Micro.	Árvore	Z5	C5(1)
<i>Mangifera indica</i> L.	Anacardiaceae	Mangueiro	Indomalaio	Perenifólio	1-12	11-6	Micro.	Árvore	Z11	C13(1)
<i>Markhamia lutea</i> (Benth.) Schum.	Bignoniaceae	Marcâmia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Meso.	Árvore	Z11	C1(1), C23(1), C24(2)
<i>Melia azederach</i> L.	Meliaceae	Amargoseira; Mélia; Conteira; Lilás-da-índia	Paleártico; Indomalaio	Caducifólio	4-1	4-6	Micro.	Árvore	Z10	C1(1), C23(1)
<i>Mentha aquatica</i> L.	Labiatae	Hortelã	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Herbácea	Z6	C5(grupo)
<i>Metrosideros excelsa</i> Sol. ex Gaertn.	Myrtaceae	Metrosidero	Antártico	Perenifólio	1-12	6-7	Meso.	Árvore	Z10	C1(2), C22(1), C25(1)
<i>Monstera deliciosa</i> Liebm.	Araceae	Costela-de-adão	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z10	C4(2), C10A(grupo), C12A(2)
<i>Musa x paradisiaca</i> L.	Musaceae	Bananeira-de-prata	Hortícola	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C1, C6, C14, C15, C20 (grupo)
<i>Myrica faya</i> Ait.	Myricaceae	Faia-das-ilhas; Samouco	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-5	Micro.	Árvore	Z9	C25(1)
<i>Myrtus communis</i> L.	Myrtaceae	Murta	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-7; 10-11	Micro.	Arbusto	Z8	C8(1)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Nephrolepis cordifolia</i> (L.) Presl.	Oleandraceae	Feto	Neotropical; Áfricotropical; Indomalaio; Oceânia; Australiano	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z10	C1, C6, C9, C17, C18A (grupo)
<i>Nephrolepis exaltata</i> (L.) Schott.	Oleandraceae	Feto	Neotropical; Áfricotropical; Indomalaio; Oceânia; Australiano	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z10	C1, C6, C9 (grupo)
<i>Nerium oleander</i> L.	Apocynaceae	Sevadilha; Loendro	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-11	Micro.	Arbusto	Z9	C1(6), C5(14), C9(3), C16(1)
<i>Nymphaea capensis</i> Thunb.	Nymphaeaceae	Nenúfar-azul-do-cabo	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	7-8	Helófito	Herbácea	Z9	C3 (grupo)
<i>Ocotea foetens</i> (Aiton) Baill.	Lauraceae	Til	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Meso.	Árvore	Z10	C1(8), C4A(1), C9(4), C10(1), C14(4), C17(1), C18(4), C22(1), C23(1), C24(1)
<i>Odontonema strictum</i> (Nees) Kuntze	Acanthaceae	Ramo-de-fogo	Neotropical	Perenifólio	1-12	8-12	Nano.	Arbusto	Z10	C4(3), C12(1)
<i>Osteospermum barberiae</i> (Harv.) Norl.	Compositae	Estrelas-do-cabo	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Caméfito	Arbusto	Z10	C18 (grupo)
<i>Parthenocissus tricuspidata</i> (Sieb. & Zucc.) Planch. in DC.	Vitaceae	Vinha-virgem	Paleártico	Caducifólio	4-12	5-6	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z4	C10B, C17 (grupo)
<i>Pelargonium peltatum</i> (L.) L'Hérit.	Geraniaceae	Malva	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z10	C5(grupo)
<i>Pelargonium zonal</i> (L.) L'Hérit.	Geraniaceae	Malva	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C2, C5, C16(grupo)
<i>Pericallis x hybrida</i> R. Nordenstam	Compositae	Cinerária	Hortícola	Sazonal	1-7	3-6	Terófito	Herbácea	Z10	C12(grupo)
<i>Persea americana</i> Mill.	Lauraceae	Abacateiro	Neotropical	Perenifólio	1-12	11-5	Micro.	Árvore	Z10	C14(2)
<i>Persea indica</i> (L.) Spreng.	Lauraceae	Vinhático	Paleártico	Perenifólio	1-12	7-9	Meso.	Árvore	Z10	C23(2)
<i>Philodendron erubescens</i> K. Koch & Augustin	Araceae	Filodendro	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-6	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z11	C17(2), C18(2)
<i>Phlebodium aureum</i> (L.) Sm.	Polypodiaceae	Polipódio-dourado	Neártico; Neotropical	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z10	C1(1)
<i>Phlox drummondii</i> Hook	Polemoniaceae	Floxe	Neártico	Sazonal	2-7	3-6	Terófito	Herbácea	Z6	C6, C9 (grupo)
<i>Phoenix canariensis</i> Chabaud.	Palmae	Palmeira-das-canárias	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-3	Meso.	Árvore	Z11	C1(2), C5(2), C5A(1), C6(1), C7(1), C10(2), C11(2), C14(2), C18(1), C24(3)
<i>Phoenix dactylifera</i> L.	Palmae	Tamareira	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-3	Meso.	Árvore	Z11	C19(1), C20(1)
<i>Phoenix roebelinii</i> O'Brien.	Palmae	Palmeira-anã	Indomalaio	Perenifólio	1-12	5-7	Micro.	Árvore	Z11	C8(1), C18(1)
<i>Photinia x fraseri</i> Dress	Rosaceae	Fotínia	Hortícola	Perenifólio	1-12	4-6	Micro.	Arbusto	Z8	C18(1)
<i>Phyllanthus tenellus</i> Roxb.	Euphorbiaceae	Quebra-pedra	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Herbácea	Z11	C14(grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Phyllostachis aurea</i> (Carr.) A. & C. Riv.	Gramineae	Bambu	Paleártico	Perenifólio	1-12	Não floriu**	Hemi.	Herbácea	Z6	C4A, C14 (grupo)
<i>Picconia excelsa</i> (Ait.) DC.	Oleaceae	Pau-branco	Paleártico	Perenifólio	1-12	2-5	Micro.	Árvore	Z10	C23(1)
<i>Pinus pinaster</i> Ait.	Pinaceae	Pinheiro-marítimo	Paleártico	Perenifólio	1-12	2-4	Meso.	Árvore	Z8	C18(1)
<i>Pittosporum undulatum</i> Vent.	Pittosporaceae	Incenseiro	Australiano	Perenifólio	1-12	2-4	Micro.	Árvore	Z9	C4A(2), C6(2), C10(1), C10A(2), C14(1), C16(1), C17(1), C24(6), C25(1)
<i>Platanus x acerifolia</i> (Ait.) Willd.	Platanaceae	Plátano	Hortícola	Caducifólio	4-11	4-5	Meso.	Árvore	Z7	C1(1), C18(1), C21A(1), C23(1), C24(1)
<i>Platycerium bifurcatum</i> (Cav.) C. Chr.	Polypodiaceae	Feto-de-corno- de-veado	Indomalaio; Oceânia; Australiano	Perenifólio	1-12	-----	Epífita	Herbácea	Z9	C6(grupo)
<i>Plumbago auriculata</i> Lam.	Plumbaginaceae	Plumbago	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z9	C4, C7A, C12A(grupo)
<i>Plumeria rubra</i> L. var. <i>acutifolia</i> (Poir.) Woodson.	Apocynaceae	Planta-dos- dentes	Neotropical	Caducifólio	5-1	6-12	Micro.	Árvore	Z10	C9(1), C13(1)
<i>Polygonum capitatum</i> Buch.-Ham. ex D. Don	Polygonaceae	Polígono-de-jardim	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z8	C14(grupo)
<i>Pouteria sapota</i> (Jacq.) Moore & Stearn	Sapotaceae	Sapota	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-7	Micro.	Árvore	Z10	C9(1)
<i>Psidium guajava</i> L.	Myrtaceae	Goiabeira	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-7	Micro.	Árvore	Z10	C5(1)
<i>Psidium littorale</i> Raddi	Myrtaceae	Araçazeiro; Araçaleiro	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-7	Micro.	Árvore	Z10	C9(1), C14(4)
<i>Pteris tremula</i> R. Br.	Pteridaceae	Feto	Paleártico; Neártico	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z4	C1, C14, C24 (grupo)
<i>Pteris vittata</i> L.	Pteridaceae	Feto	Australiano; Antártico; Oceânia; Áfricotropical	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z10	C1(grupo)
<i>Punica granatum</i> L.	Punicaceae	Romãzeira	Paleártico; Indomalaio; Australiano; Oceânia	Perenifólio	1-12	5-7	Micro.	Árvore	Z9	C6(1), C14(4)
<i>Pyracantha angustifolia</i> (Franch.) Schneid.	Rosaceae	Perinhos; Sarça-ardente	Paleártico	Perenifólio	1-12	2-6	Micro.	Arbusto	Z7	C14(1)
<i>Pyrostegia venusta</i> (Ker-Gawl.) Miers	Bignoniaceae	Gaitinhas	Neotropical	Perenifólio	1-12	11-4	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	C5(grupo)
<i>Quercus robur</i> L.	Fagaceae	Carvalho-roble	Paleártico	Caducifólio	2-11	3-5	Meso.	Árvore	Z6	C9(1), C14(1), C16(1), C18(1), C19(1), C21A(2), C24(1)
<i>Quercus rubra</i> L.	Fagaceae	Carvalho-americano	Neártico	Caducifólio	4-11	4-5	Meso.	Árvore	Z3	C1(2), C19(1), C22(1), C23(2), C24(1), C25(1)
<i>Rhododendron mucronatum</i> G. Don.	Ericaceae	Azálea-japonesa	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z5	C1, C13, C18, C19 (grupo)
<i>Rivina humilis</i> L.	Phytolaccaceae	Planta-vermelha	Neártico; Neotropical	Perenifólio	1-12	5-10	Nano.	Herbácea	Z9	C1(1)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Leguminosae (Papilionoideae)	Robinia	Neártico	Caducifólio	3-12	3-6	Meso.	Árvore	Z3	C24(1)
<i>Rosa banksiae</i> Ait.	Rosaceae	Roseira	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z7	C11, C12 (grupo)
<i>Rosa laevigata</i> Micchx.	Rosaceae	Roseira	Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z7	C11, C12 (grupo)
<i>Rosmarinus officinalis</i> L.	Labiatae	Alecrim	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z6	C18(1)
<i>Rudbeckia fulgida</i> Ait.	Compositae	Margarida-amarela; Susana-de-olhos-negros	Neártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Herbácea	Z3	C14(grupo)
<i>Salvia splendens</i> Sell ex Roem. & Scult.	Labiatae	Camarões; Sálvias	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Herbácea	Z10	C4 (grupo)
<i>Schefflera actinophylla</i> (Endl.) Harms	Araliaceae	Brassaia	Australiano; Oceânia	Perenifólio	1-12	8-10	Meso.	Árvore	Z10	C1(1)
<i>Schinus molle</i> L. non hort. ex Engl.	Anacardiaceae	Pimenteira-bastarda; Pimenteira-da-india	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Meso.	Árvore	Z9	C1(2), C5(5), C24(1)
<i>Senna pendula</i> (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Irwin & Bameby var. <i>glabrata</i> (Vogel) Irwin & Bameby	Leguminosae (Caesalpiniodeae)	Chuva-de-ouro; Cássia	Neotropical; Neártico	Perenifólio	1-12	10-1	Micro.	Arbusto	Z9	C4(1), C5(1)
<i>Sideroxylon mirmulans</i> R. Brown in Buch	Sapotaceae	Marmulano	Paleártico	Perenifólio	1-12	8-1	Micro.	Árvore	Z10	C12(1)
<i>Solandra longiflora</i> Tussac.	Solanaceae	Solandra	Neotropical	Perenifólio	1-12	2-5	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	C12(2)
<i>Solanum jasminoides</i> Paxt. 'Album'	Solanaceae	Jasmim-bastardo	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z9	C2(2)
<i>Spathodea campanulata</i> Beauv.	Bignoniaceae	Chama-da-floresta; Tulipeiro-africano	Áfricotropical	Caducifólio	1-12 (Variação individual)	1-12	Micro.	Árvore	Z11	C5(1), C22(1)
<i>Spiraea cantoniensis</i> Lour.	Rosaceae	Grinalda-de-noiva	Paleártico	Marcescente	3-2 (11-2)	2-9	Nano.	Arbusto	Z6	C9(5), C10(5), C18(2)
<i>Stenotaphrum secundatum</i> (Walter) Kuntze	Gramineae	Relva; Relva-de-correr	Neotropical; Áfricotropical; Oceânia	Perenifólio	1-12	3-11	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z9	C1, C2, C4, C5, C6, C7, C8, C14, C15, C18, C19, C20, C21A (tapete)
<i>Strelitzia nicolai</i> Reg. & Körn.	Strelitziaceae	Estrelícia-gigante	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C14(1)
<i>Strelitzia reginae</i> Banks ex Dryand	Strelitziaceae	Estrelícia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C1, C2, C5, C14, C18A (grupo)
<i>Streptosolen jamesonii</i> (Benth.) Miers.	Solanaceae	Rapaziada	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z9	C7(1)
<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassm.	Palmae	Coqueiro-de-jardim; Palmeira-rainha	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-7	Micro.	Árvore	Z10	C5(1)
<i>Tetradenia riparia</i> (Hochst.) Codd.	Labiatae	Iboza (Moschosma)	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	12-5	Nano.	Arbusto	Z10	C1(1), C6(1)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Tibouchina grandifolia</i> Cogn.	Melastomataceae	Aranhas; Tibouchina	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C18(3)
<i>Tilia x vulgaris</i> Hayne.	Tiliaceae	Tília-comum	Hortícola	Caducifólio	4-12	6-7	Micro.	Árvore	Z3	C23(1)
<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	Leguminosae (Papilionoideae)	Tipuana	Neotropical	Marcescente	5-4 (3-4)	4-7	Meso.	Árvore	Z9	C1(11), C2(3), C5(3), C5A(12), C7A(1), C14(1), C16(1), C21A(1), C24(3)
<i>Trachycarpus fortunei</i> (Hook.) H. A. Wendl.	Palmae	Palmeira-de- moinho-de-vento	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-6	Micro.	Árvore	Z8	C5(2)
<i>Tradescantia pallida</i> (Rose) D. Hunt.	Commelinaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea trepadora	Z8	C11(grupo)
<i>Viburnum tinus</i> L.	Caprifoliaceae	Viburno	Paleártico	Perenifólio	1-12	10-4	Micro.	Arbusto	Z7	C18(10)
<i>Viola x witrockiana</i> Gams.	Violaceae	Amores-perfeitos	Hortícola	Perenifólio	1-12	3-8	Hemi.	Herbácea	Z5	C8 (grupo)
<i>Vitis vinifera</i> L.	Vitaceae	Vinha	Paleártico	Caducifólio	3-12	4-6	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z6	C21A(grupo), C23(1), C24(2)
<i>Washingtonia filifera</i> (Lind. ex André) H. A. Wendl	Palmae	Palmeira-de-leque- da- califórnia	Neártico	Perenifólio	1-12	5-8	Micro.	Árvore	Z9	C14(1)
<i>Wisteria sinensis</i> (Sims) Sweet.	Leguminosae (Papilionoideae)	Lilases; Glicínia	Paleártico	Caducifólio	2-12	2-5; 7-8	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z5	C2(1), C4(1), C9(3), C10B(grupo), C14(1), C17(1), C18(5)
<i>Yucca gloriosa</i> L..	Agavaceae	luca	Neártico	Perenifólio	1-12	6-11	Micro.	Arbusto	Z7	C1(2), C14(1)
<i>Yushania anceps</i> (Mitford) Yi.	Gramineae	Bambu	Paleártico	Perenifólio	1-12	Não floriu**	Hemi.	Herbácea	Z9	C4(grupo)
<i>Zantedeschia aethiopica</i> (L.) Spreng.	Araceae	Jarros	Áfricotropical	Sazonal	10-7	11-5	Geófito	Herbácea	Z8	C18(grupo)

Legenda:

- Plantas que não floriram no período em estudo (Janeiro 2002 – Janeiro 2005): * plantas novas; ** plantas que nunca floriram por falta de aclimação;
- Plantas marcescentes (plantas semiperenifólias e semcaducifólias): 3-2 (3-4) – folhas todo o ano mas com renovação significativa em Março e Abril.

Anexo 25
CARACTERIZAÇÃO FITOGEGRÁFICA DO JARDIM DO HOTEL CLIFF BAY

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Abelia x grandiflora</i> (André) Rehd.	Caprifoliaceae	Abélia	Hortícola	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z5	C12(sebe), C25(1), C30(1)
<i>Acalypha wilkesiana</i> Muell. Arg.	Euphorbiaceae	Acálifa;	Oceânia	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C2(1), C3(1)
<i>Adiantum capillus-veneris</i> L.	Adiantaceae	Avenca; Avenca-das-fontes	Paleártico, Neotropical, Áfricotropical, Indomalaio	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z8	C26(grupo)
<i>Aechmea fasciata</i> (Lindl.) Bak.	Bromeliaceae	Bromélia	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C18(3)
<i>Aeonium glutinosum</i> (Aiton.) Webb. & Berthel.	Crassulaceae	Farrobo; Ensaíão	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-8	Nano.	Herbácea suculenta	Z10	C18(1)
<i>Agapanthus praecox</i> Willd. ssp. <i>orientalis</i> (Leighton) Leighton	Liliaceae	Agapantos; Coroas-de- henrique	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	4-9	Hemi.	Herbácea	Z9	C3, C6, C9, C15(mancha)
<i>Agave americana</i> L.	Agavaceae	Agave; Piteira	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-8	Hemi.	Herbácea suculenta	Z9	C32(1)
<i>Agave angustifolia</i> Haw.	Agavaceae	Agave	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-8	Nano.	Árvore suculenta	Z9	C32(8)
<i>Agave attenuata</i> Salm-Dyck	Agavaceae	Piteira; Agave-pescoço- de-cisne	Neotropical	Perenifólio	1-12	12-3	Nano.	Árvore suculenta	Z9	C3, C11, C18, C30, C31, C34, C35 (grupo)
<i>Ageratum houstonianum</i> Mill.	Compositae		Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Terófito	Herbácea	Z8	C9, C12, C13, C35 (grupo)
<i>Allamanda cathartica</i> L.	Apocynaceae	Alamanda; Flor-de-manteiga	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-12	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z11	C5(1), C13(8)
<i>Aloe arborescens</i> Mill.	Liliaceae (Aloeaceae)	Aloés, Babosas, Foguetes-de-natal	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	11-2	Nano.	Arbusto suculento	Z9	C1, C11(grupo)
<i>Aloe capitata</i> Bak.	Liliaceae (Aloeaceae)	Aloés	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	4-5	Hemi.	Herbácea suculenta	Z9	C18(grupo)
<i>Aloe doei</i> Lavranos	Liliaceae (Aloeaceae)	Aloés	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	6-8	Caméfito	Arbusto suculento	Z9	C32(grupo)
<i>Aloe mitriformis</i> Mill.	Liliaceae (Aloeaceae)	Aloés	Africotropical	Perenifólio	1-12	6-8	Caméfito	Arbusto suculento	Z9	C30(grupo)
<i>Aloe pretoriensis</i> Pole Evans	Liliaceae (Aloeaceae)	Aloés	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea suculenta	Z9	C29, C30(grupo)
<i>Aloe squarrosa</i> Bak.	Liliaceae (Aloeaceae)	Alóes	Indomalaio	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Hemi.	Herbácea suculenta	Z10	C18(4)
<i>Aptenia cordifolia</i> (L. f.) Schwant.	Aizoaceae	Apténia; Rosinha-de-sol	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Herbácea trepadora e suculenta	Z9	C35(mancha)
<i>Argyranthemum frutescens</i> (L.) Schultz-Bip	Compositae	Estreleira; Margaridas	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C8, C9, C11, C13, C31, C35 (grupo), C35A(1)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Argyranthemum pinnatifidum</i> (L. f.) Lowe ssp. <i>pinnatifidum</i>	Compositae	Estrelas; Pampilhos; Malmequeres	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C6(grupo), C30(2), C32(1)
<i>Arundo donax</i> L.	Gramineae	Cana-vieira; Cana-de-roca; Cana	Paleártico	Perenifólio	1-12	7-10	Hemi.	Herbácea	Z9	C16(grupo)
<i>Asparagus asparagoides</i> (L.) Druce	Liliaceae (Asparagaceae)	Alegre-campo- miúdo	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	3-4	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z10	C2(1)
<i>Asparagus densiflorus</i> (Kunth) Jassop	Liliaceae (Asparagaceae)	Esparto	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	7-8	Nano.	Herbácea	Z9	C2(1)
<i>Asparagus falcatus</i> L.	Liliaceae (Asparagaceae)	Esparto	Áfricotropical; Indomalaio	Perenifólio	1-12	6-8	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	C36(1)
<i>Asparagus setaceus</i> (Kunth) Jassop	Liliaceae (Asparagaceae)	Espargo-de-folha- miúda; Esparto	Africotropical	Perenifólio	1-12	9-12	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z9	C2(1)
<i>Asplenium nidus</i> L.	Aspleniaceae	Feto-de-ninho	Neotropical	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z11	C1(1)
<i>Bauhinia galpinii</i> N. E. Br.	Leguminosae (Caesalpinioide-ae)	Bauínia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	5-11	Micro.	Arbusto	Z9	C23(1)
<i>Bauhinia variegata</i> L.	Leguminosae (Caesalpinioideae)	Bauínia; Árvore-das- orquídeas	Indomalaio	Marcescente	5-4 (12-4)	10-6	Micro.	Árvore	Z9	C13(1)
<i>Bergenia crassifolia</i> (L.) Fritsch.	Saxifragaceae	Bergénia; Couve-de-jardim	Paleártico	Perenifólio	1-12	11-4	Caméfito	Herbácea	Z3	C6(mancha)
<i>Bidens ferulifolia</i> (Jacq.) DC.	Compositae	Bidenes	Neártico; Neotropical	Perenifólio	1-12	5-8	Hemi.	Herbácea	Z8	C6, C7, C8, C35 (grupo)
<i>Bougainvillea glabra</i> Choisy	Nyctaginaceae	Buganvília	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	C1, C3, C5, C22, C24, C25, C30, C35A, C36 (grupo) C37(1)
<i>Brachychiton x hybridus</i> hort.	Sterculiaceae	Árvore-do-fogo	Hortícola	Caducifólio	1-5; 8-12	6-10	Micro.	Árvore	Z10	C3(1)
<i>Brugmansia versicolor</i> Lagerh.	Solanaceae	Trombeteira	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C22(1), C32(2)
<i>Brunfelsia pauciflora</i> (Cham. & Scltdl.) Benth.	Solanaceae	Brunfêlsia; Manacá	Neotropical	Perenifólio	1-12	2-8	Micro.	Arbusto	Z10	C11(1)
<i>Buxus sempervirens</i> L.	Buxaceae	Buxo-comum	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-4; 10-11	Nano.	Arbusto	Z5	C1, C2(sebe)
<i>Calendula officinalis</i> L.	Compositae	Calendula	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Terófito	Herbácea	Z6	C11(grupo)
<i>Callistemon rigidus</i> R. Br.	Myrtaceae	Martinete	Australiano	Perenifólio	1-12	4-8	Micro.	Arbusto	Z9	C16(3), C19(1), C21(1)
<i>Callistephus chinensis</i> (L.) Nees.	Compositae	Não-me-deixes	Paleártico	Sazonal	3-12	4-12	Terófito	Herbácea	Z6	C30, C32, C33, C35 (grupo)
<i>Canna x generalis</i> L. H. Bail.	Cannaceae	Canas-da-índia; Bananeiras-de-flor	Hortícola	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z9	C8, C12(grupo)
<i>Capsicum frutescens</i> L.	Solanaceae	Pimenteira	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-10	Nano.	Arbusto	Z9	C33(grupo)
<i>Carpobrotus edulis</i> (L.) L. Bol.	Aizoaceae	Bálsamo; Chorão	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	3-8	Fane. trep.	Herbácea suculenta e trepadora	Z9	C29, C32 (mancha)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Catharanthus roseus</i> (L.) G. Don.	Apocynaceae	Maravilhas	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Herbácea	Z10	C32, C35(grupo)
<i>Celosia argentea</i> L.	Amaranthaceae	Crista-de-galo	Indomalaio; Áfricotropical Neotropical	Sazonal	5-12	7-12	Terófito	Herbácea	Z10	C7, C9 (grupo)
<i>Cereus uruguayanus</i> Kiesling	Cactaceae	Cacto-vela-de-cera	Neotropical	Perenifólio	1-12	7-8	Nano.	Árvore suculenta	Z9	C18(1)
<i>Cereus validus</i> Haw.	Cactaceae	Cacto-candelabro	Neotropical	Perenifólio	1-12	7-8	Nano.	Árvore suculenta	Z9	C18(1)
<i>Cestrum roseum</i> HBK.	Solanaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	3-11	Nano.	Arbusto	Z10	C6(1)
<i>Chamaedorea elegans</i> Mart.	Palmae	Palmeira-de-salão; Palmeira-bambu	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-6	Micro.	Arbusto	Z10	C3(1)
<i>Chamaerops humilis</i> L.	Palmae	Palmeira-das-vassouras	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-5	Micro.	Arbusto	Z9	C13(1-vaso), C14(1-vaso)
<i>Chambeyronia macrocarpa</i> (Brongn.) Vieill. ex Becc.	Palmae	Palmeira-rubra	Oceânia	Perenifólio	1-12	1-2	Micro.	Árvore	Z10	C21(1)
<i>Chasmanthe aethiopica</i> (L.) N. E. Br.	Iridaceae	Antoliza	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	11-3	Geófito	Herbácea	Z9	C16(grupo)
<i>Chlorophytum comosum</i> (Thumb.) Jacques	Liliaceae (Anthericaceae)	Fitinhas	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z9	C12(grupo)
<i>Chorisia speciosa</i> A. St. Hil.	Bombacaceae	Sumaúma	Neotropical	Caducifólio	3-11	8-11	Meso.	Árvore	Z10	C10(1)
<i>Christella dentata</i> (Forssk.) Brownsey & Jermy	Thelypteridaceae	Feto	Áfricotropical; Indomalaio	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z10	C26 (grupo)
<i>Chrysalidocarpus lutescens</i> (Bory) Wendl.	Palmae	Palmeira-borboleta; Palmeira-amarela	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	6-7	Micro.	Arbusto	Z10	C12(1), C13(4 – vasos), C35(1)
<i>Cinnamomum camphora</i> (L.) Sieb.	Lauraceae	Canforeira	Paleártico; Indomalaio	Perenifólio	1-12	2-4	Meso.	Árvore	Z10	C1(1)
<i>Clerodendrum splendens</i> G. Don ex James	Verbenaceae	Clerodendro	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fan. trep.	Arbusto trepador	Z10	C16(2)
<i>Clerodendrum thomsoniae</i> Balf. f.	Verbenaceae	Clerodendro; Lágrima-de-cristo; Coração-de-jesus	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	5-11	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	C13(2)
<i>Clytostoma callistigioides</i> Bur. & Schum.	Bignoniaceae	Clitostoma	Neotropical	Perenifólio	1-12	3-7	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z9	C13(1)
<i>Coccoloba uvifera</i> (L.) L.	Polygonaceae	Uva-do-mar	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-8	Micro.	Árvore	Z11	C29(2), C32(1), C35(2)
<i>Coprosma repens</i> A. Rich.	Rubiaceae	Coprosma	Antártico; Australiano	Perenifólio	1-12	4-5	Micro.	Arbusto	Z9	C16(1), C35(2)
<i>Cortaderia selloana</i> (Schult. & Schult. f.) Asch. & Gräbn.	Gramineae	Plumas; Capim-das-pampas	Neotropical	Perenifólio	1-12	7-10	Hemi.	Herbácea	Z6	C30(1), C31(2), C32(3), C35(2)
<i>Corynocarpus laevigata</i> Forst. & Forst. f.	Corynocarpaceae	Loureiro-da-nova-zelândia	Antártico	Perenifólio	1-12	2-5	Micro.	Árvore	Z10	C12(1)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Cotoneaster horizontalis</i> Decne.	Rosaceae		Paleártico	Perenifólio	1-12	3-5	Nano.	Arbusto	Z5	C35A(1)
<i>Cupressus sempervirens</i> L.	Cupressaceae	Cipreste	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-2	Micro.	Árvore	Z8	C11(4)
<i>Cyathea cooperi</i> (F. Mueller) Domin.	Cyatheaceae	Feto-arbóreo	Australiano	Perenifólio	1-12	-----	Micro.	Árvore	Z10	C1(1), C9(2)
<i>Cycas revoluta</i> Thunb.	Cycadaceae	Cicas-revoluta; Cicas-de-sagú	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-8	Micro.	Árvore	Z9	C6(1), C12(2), C13(2), C14(1)
<i>Cyrtomium falcatum</i> (L. f.) Presl.	Dryopteridaceae	Feto-azevinho	Paleártico; Indomalaio; Áfricotropical; Oceânia	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z9	C31, C32(grupo)
<i>Delonix regia</i> (Bojer) Raf.	Leguminosae (Caesalpinoideae)	Acácia-rubra	Áfricotropical	Caducifólio	6-3	7-9	Micro.	Árvore	Z11	C13(2)
<i>Dianthus barbatus</i> L.	Caryophyllaceae	Craveiro	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-7	Nano.	Herbácea	Z4	C9(grupo)
<i>Dianthus caryophyllus</i> L.	Caryophyllaceae	Craveiro	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-8	Nano.	Herbácea	Z8	C33(grupo)
<i>Dombeya wallichii</i> (Lindl.) B. D. Jackson	Sterculiaceae	Dombeia; Aurora	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	12-2	Micro.	Árvore	Z10	C6(2), C21(1)
<i>Dracaena draco</i> L. ssp. <i>draco</i>	Agavaceae	Dragoeiro	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-6	Micro.	Árvore	Z11	C32(1)
<i>Dracaena reflexa</i> (Decne.) Lam.	Agavaceae	Dracena	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	4-5	Micro.	Arbusto	Z10	C1(2), C19(1), C20(1)
<i>Duranta erecta</i> L.	Verbenaceae	Duranta	Neotropical	Perenifólio	1-12	7-1	Micro.	Arbusto	Z10	C25(1)
<i>Echinocactus grusonii</i> Hildm.	Cactaceae	Almofada-de-sogra	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-8	Caméfito	Herbácea suculenta	Z9	C18(4)
<i>Echium nervosum</i> Dryand.	Boraginaceae	Massaroco	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-3	Nano.	Arbusto	Z11	C3(1), C13(grupo), C28(grupo)
<i>Emilia coccinea</i> (Sims) D. Don.	Compositae	Emilia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Herbácea	Z11	C13(1)
<i>Epipremnum aureum</i> (Lind. & André)	Araceae		Oceânia	Perenifólio	1-12	6-8	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z10	C11(1)
<i>Erythrina crista-galli</i> L.	Leguminosae (Papilionoideae)	Coraleira; Coralina-crista-de-galo	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-12	Micro.	Árvore	Z8	C1(4)
<i>Erythrina livingstoniana</i> Bak.	Leguminosae (Papilionoideae)	Coralina	Áfricotropical	Caducifólio	4-12	3-5	Micro.	Árvore	Z10	C35(2)
<i>Erythrina lysistemon</i> Hutch.	Leguminosae (Papilionoideae)	Coralina	Áfricotropical	Marcescente	5-4 (12-4)	12-5	Micro.	Árvore	Z10	C16(1), C35(2)
<i>Euonymus japonicus</i> Thunb.	Celastraceae	Verdegaio	Paleártico	Perenifólio	1-12	7-8	Micro.	Arbusto	Z7	C35(2)
<i>Euphorbia cotinifolia</i> L.	Euphorbiaceae	Eufórbia	Neotropical	Caducifólio	3-12	6-11	Micro.	Árvore	Z11	C2(1), C22(2)
<i>Euphorbia leucocephala</i> Lotsy.	Euphorbiaceae	Eufórbia-branca	Neotropical	Caducifólio	7-4	11-12	Nano.	Arbusto	Z9	C6(1)
<i>Euphorbia milii</i> Desmoul.	Euphorbiaceae	Mira-mira-não-me-toques	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C18(4), C20(grupo), C35(1)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Euphorbia pulcherrima</i> Willd. ex Klotzsch.	Euphorbiaceae	Manhã de Páscoa	Neotropical	Caducifólio	5-2	10-3	Micro.	Arbusto	Z10	C10(7), C35A(grupo)
<i>Euphorbia tirucalli</i> L.	Euphorbiaceae	Eufórbia	Áfricotropical; Indomalaio	Perenifólio	1-12	4-9	Micro.	Arbusto suculento	Z10	C11(grupo)
<i>Euphorbia trigona</i> Mill.	Euphorbiaceae	Eufórbia	Africotropical	Perenifólio	1-12	6-8	Micro.	Arbusto suculento	Z10	C18(1)
<i>Euryops chrysanthemoides</i> (DC.) R. Nordenstam	Compositae	Estrelaira-amarela	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z9	C13, C30 (grupo)
<i>Farfugium japonicum</i> (L.) Kitam.	Compositae	Patás-de- cavalo; Boinas	Paleártico	Perenifólio	1-12	7-3	Hemi.	Herbácea	Z7	C11(1)
<i>Festuca glauca</i> Vill.	Gramineae	Festuca	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-6	Hemi.	Herbácea	Z3	C32(grupo)
<i>Ficus benjamina</i> L.	Moraceae	Figueira-da-Índia	Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-4	Micro.	Árvore	Z11	C6, C11, C13, C19, C21, C22, C35 (sebe)
<i>Ficus binnendykii</i> (Miq.) Miq.	Moraceae	Figueira-de-folha- estreita	Indomalaio	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Micro.	Árvore	Z11	C13(2)
<i>Ficus deltoidea</i> Jack	Moraceae		Indomalaio	Perenifólio	1-12	5-8	Micro.	Árvore	Z11	C12(1)
<i>Furcraea selloa</i> K. Koch. var. <i>marginata</i>	Agavaceae	Furcreia; Piteira	Neotropical	Perenifólio	1-12	8-12	Micro.	Árvore suculenta	Z10	C34(2)
<i>Gardenia augusta</i> (L.) Merrill	Rubiaceae	Gardénia	Paleártico; Indomalaio	Perenifólio	1-12	6-8	Nano.	Arbusto	Z10	C14(vaso)
<i>Gazania rigens</i> (L.) Gaertn.	Compositae	Gazania	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z9	C6, C13, C32, C37 (grupo)
<i>Gloriosa superba</i> L.	Liliaceae (Colchicaceae)	Gloriosa	Áfricotropical; Indomalaio	Sazonal	5-7; 11-1	6-7; 12-1	Geófito	Herbácea trepadora	Z10	C12(2)
<i>Goniophlebium subauriculatum</i> (Bl.) Presl.	Polypodiaceae	Feto-de- metro; Feto-chorão	Indomalaio; Australiano; Oceânia	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z10	C13(grupo-vaso)
<i>Grevillea rosmarinifolia</i> A. Cunn.	Proteaceae	Grevillea	Australiano	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z8	C16(2)
<i>Guzmania lingulata</i> (L.) Mez. var. <i>minor</i> (Mez.) L. B. Sm.	Bromeliaceae	Bromélia	Neotropical	Perenifólio	1-12	11-5	Hemi.	Herbácea	Z11	C18(grupo)
<i>Hedera helix</i> L.	Araliaceae	Hera	Paleártico	Perenifólio	1-12	9-10	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z5	C29, C34, C35 (grupo)
<i>Helichrysum obconicum</i> DC.	Compositae	Murrião	Paleártico	Perenifólio	1-12	6-10	Nano.	Arbusto	Z11	C33(grupo)
<i>Hibiscus hastatus</i> L. f.	Malvaceae	Cardeais	Oceânia	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Árvore	Z11	C1(1), C6(1)
<i>Hibiscus rosa-sinensis</i> L.	Malvaceae	Cardeais; Hibiscos; Rosa-da-china	Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C1, C5, C11, C14, C20, C22 (sebe)
<i>Hippesatrum vittatum</i> (L' Hérit) Herb.	Amaryllidaceae	Raqueis	Neotropical	Sazonal	4-10	4-10	Geófito	Herbácea	Z10	C33(grupo)
<i>Holmskioldia sanguinea</i> Retz.	Verbenaceae	Chapéus-de- mandarim; Chapéus-chineses	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C6(2)
<i>Howea forsteriana</i> (C. Moore & F. Muell.) Becc.	Palmae	Quência	Australiano	Perenifólio	1-12	1-9	Micro.	Árvore	Z10	C22(2), C23(2), C24(2), C25(2), C37(3)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Hydrangea macrophylla</i> (Thunb.) Ser.	Hydrangeaceae	Hortênsias; Novelos	Paleártico	Caducifólio	3-12	5-10	Nano.	Arbusto	Z6	C6, C11, C12, C13 (grupo)
<i>Hylocereus triangularis</i> (L.) Britt. & Rose	Cactaceae	Rainha-da-noite; Cacto-trepador	Neotropical	Perenifólio	1-12	7-10	Fane. trep.	Arbusto trepador e suculento	Z10	C18(2)
<i>Hyparrhenia hirta</i> (L.) Stapf	Gramineae	Feno	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-5	Hemi.	Herbácea	Z9	C28(grupo)
<i>Impatiens hawkeri</i> Bull.	Balsaminaceae	Maravilhas	Hortícola	Sazonal	4-9	5-8	Terófito	Herbácea	Z10	C6(grupo)
<i>Impatiens sodenii</i> Engl. & Warb. ex Engl.	Balsaminaceae	Maravilhas	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Herbácea	Z10	C31, C32 (grupo)
<i>Impatiens walleriana</i> Hook. f.	Balsaminaceae	Maravilhas	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Herbácea	Z9	C11(grupo)
<i>Ipomoea batatas</i> (L.) Poir.	Convolvulaceae	Batata-doce	Neotropical; Oceânia	Perenifólio	1-12	6-10	Geófito	Herbácea trepadora	Z9	C33(grupo)
<i>Iresine herbstii</i> Hook.	Amaranthaceae	Iresine	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Caméfito	Herbácea	Z10	C13, C14, C16, C31, C37 (bordadura)
<i>Iris germanica</i> L. var. <i>florentina</i> (L.) Dykes	Iridaceae	Lírio-branco	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-6	Geófito	Herbácea	Z4	C11(grupo)
<i>Jacaranda mimosifolia</i> D. Don.	Bignoniaceae	Jacarandá	Neotropical	Caducifólio	5-2	4-6; 9-10	Meso.	Árvore	Z9	C4(1), C22(1)
<i>Jasminum polyanthum</i> Franch.	Oleaceae	Jasmineiro; Jasmim-dos-poetas	Paleártico	Perenifólio	1-12	2-6	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z8	C13(2)
<i>Jasminum sambac</i> (L.) Ait.	Oleaceae	Jasmim-da-arábia	Indomalaio	Perenifólio	1-12	3-7	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	C26(2)
<i>Kalanchoe blossfeldiana</i> Poelln.	Crassulaceae	Calanchoé	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto suculento	Z11	C6, C37 (grupo)
<i>Lagerstroemia indica</i> L.	Lythraceae	Laguerestré-mia; Flor-de-merenda; Suspiros	Paleártico; Indomalaio	Caducifólio	3-11	7-9	Micro.	Árvore	Z7	C3(1)
<i>Lampranthus aurantiacus</i> (DC.) Swantes	Aizoaceae	Lamprantos	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	4-12	Caméfito	Herbácea suculenta	Z11	C28(mancha)
<i>Lampranthus spectabilis</i> (Haw.) N.E. Br.	Aizoaceae	Lamprantos; Chorão	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Arbusto trepador e suculento	Z11	C13, C18, C32 (mancha)
<i>Lantana camara</i> L.	Verbenaceae	Lantana	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C3(1), C6 (3), C30(1), C35 (1)
<i>Lantana montevidensis</i> (Spreng.) Briq.	Verbenaceae	Lantana	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C6(2), , C30(1)
<i>Lavandula stoechas</i> L.	Labiatae	Rosmaninho; Lavanda	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z7	C6(grupo)
<i>Leptospermum scoparium</i> Forst. & Forst.	Myrtaceae	Leptospermo; Urze-de-jardim	Australiano; Antártico	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z8	C11(2)
<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) De Wit.	Leguminosae (Mimosoideae)	Aroma-branco; Leucena	Neártico	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z9	C13(grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Leucanthemum x superbum</i> (J. Ingram) Bergmans ex Kent	Compositae	Estrelas	Hortícola	Perenifólio	1-12	5-8	Nano.	Herbácea	Z5	C35(grupo)
<i>Livistona chinensis</i> (Jacq.) R. Br. ex Mart.	Palmae	Palmeira-de- leque-da-china	Paleártico	Perenifólio	1-12	2-5	Meso.	Árvore	Z9	C4(3)
<i>Lobelia erinus</i> L.	Campanulaceae	Lobélia	Áfricotropical	Sazonal	4-9	5-9	Terófito	Herbácea	Z9	C6, C13, C14(grupo)
<i>Lobularia maritima</i> (L.) Desv.	Cruciferae	Lobulária	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z8	C6, C8, C35 (mancha)
<i>Lonicera caprifolium</i> L.	Caprifoliaceae	Madressilva- italiana	Paleártico	Perenifólio	1-12	6-8	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z5	C11(1)
<i>Lundia cordata</i> (Vell.) A. DC.	Bignoniaceae	Lundia	Neotropical	Perenifólio	1-12	12-3; 6-7	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z11	C13(1)
<i>Lysimachia nummularia</i> L.	Primulaceae	Lisimáquia	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-11	Hemi.	Herbácea	Z4	C6(grupo)
<i>Macfadyena unguis-cati</i> (L.) A. Gentry	Bignoniaceae	Bignónia-unha-de- gato	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-5	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z9	C15(1)
<i>Malva sylvestris</i> L.	Malvaceae	Malva-silvestre; Malva-do-caminho	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-8	Nano.	Herbácea	Z5	C13 (grupo)
<i>Mandevilla boliviensis</i> (Hook. f.) Woodson	Apocynaceae	Dipladénia	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	C11(1)
<i>Mandevilla sanderi</i> (Hemsl.) Woodson.	Apocynaceae	Dipladénia	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	C11(1)
<i>Matthiola maderensis</i> Lowe	Cruciferae	Goivo-da-rocha	Paleártico	Sazonal	3-8	4-7	Terófito	Herbácea	Z10	C33(grupo)
<i>Melaleuca armillaris</i> (Soland. & Gaertn.) Sm.	Myrtaceae	Melaleuca	Australiano	Perenifólio	1-12	3-5	Micro.	Árvore	Z9	C35(3)
<i>Mentha spicata</i> L.	Labiatae	Hortelã-de-leite	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Herbácea	Z3	C33(grupo)
<i>Mesembryanthemum crystalinum</i> L.	Aizoaceae	Barrilha; Erva-gelada;	Áfricotropical	Sazonal	10-7	3-6	Terófito	Herbácea trepadora e suculenta	Z9	C32(grupo)
<i>Mesembryanthemum nodiflorum</i> L.	Aizoaceae	Barrilha	Áfricotropical	Sazonal	10-7	3-6	Terófito	Herbácea trepadora e suculenta	Z9	C32(grupo)
<i>Metrosideros excelsa</i> Sol. ex Gaertn.	Myrtaceae	Metrosidero	Antártico	Perenifólio	1-12	6-7	Meso.	Árvore	Z10	C36(1)
<i>Monstera deliciosa</i> Liebm.	Araceae	Fruto-delicioso; Costela-de-adão	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z10	C6(grupo)
<i>Morus nigra</i> L.	Moraceae	Amoreira	Paleártico	Caducifólio	3-12	4-5	Micro.	Árvore	Z6	C2(1)
<i>Musa acuminata</i> Colla	Musaceae	Bananeira	Indomalaio; Australiano	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C33(grupo)
<i>Musa x paradisiaca</i> L.	Musaceae	Bananeira-de- prata	Hortícola	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C3(grupo)
<i>Nephrolepis cordifolia</i> (L.) Presl.	Oleandraceae	Feto	Neotropical; Áfricotropical; Indomalaio; Oceânia; Australiano	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z10	C13(mancha)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Nerium oleander</i> L.	Apocynaceae	Sevadilha; Loendro	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-11	Micro.	Arbusto	Z9	C4(1), C6(2), C12(grupo), C16(7), C19(2), C20(1), C22(6), C23(1), C25(1), C27(1), C34(2), C35(grupo), C36(2)
<i>Nicotiana glauca</i> Grah.	Solanaceae	Tabaqueira-azul; Charuto-do-rei	Neotropical	Perenifólio	1-12	3-9	Micro.	Arbusto	Z8	C28, C32, C33 (grupo)
<i>Nolina recurvata</i> (Lem.) Hemsl.	Agavaceae	Nolina; Pata-de-elefante	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-8	Micro.	Árvore	Z9	C2(1), C14(1)
<i>Odontonema strictum</i> (Nees) Kuntze	Acanthaceae	Ramo-de-fogo	Neotropical	Perenifólio	1-12	8-12	Nano.	Arbusto	Z10	C2(1)
<i>Opuntia compressa</i> (Salisb.) Macbr.	Cactaceae	Tabaibeira; Cacto	Neártico	Perenifólio	1-12	5-8	Nano.	Arbusto suculento	Z8	C11(1), C18(2)
<i>Opuntia microdasys</i> (Lehm.) Pfeiff. var. <i>alispina</i>	Cactaceae	Cacto	Neártico	Perenifólio	1-12	5-7	Nano.	Arbusto suculento	Z8	C32(1)
<i>Origanum majorana</i> L.	Labiatae	Manjerona	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-9	Nano.	Herbácea	Z7	C33(grupo)
<i>Ornithogalum thyrsoides</i> Jacq.	Liliaceae (Hyacinthaceae)	Torrões-de-açúcar	Áfricotropical	Sazonal	10-6	5-6	Geófita	Herbácea	Z9	C7 (grupo)
<i>Osteospermum barberiae</i> (Harv.) Norl.	Compositae	Estrelas-do- cabo	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Caméfito	Arbusto	Z10	C32, C33(grupo)
<i>Osteospermum ecklonis</i> (DC.) Norl.	Compositae	Estrelas-do- cabo	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Caméfito	Arbusto	Z10	C6(grupo)
<i>Pachycereus marginatus</i> (DC.) Britt. & Hunt.	Cactaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	7-8	Micro.	Arbusto suculento	Z9	C11(1)
<i>Pachypodium lamerei</i> Drake	Apocynaceae	Paquípodio	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	8-9	Micro.	Árvore suculenta	Z9	C11(1)
<i>Pandanus utilis</i> Bory	Pandanaceae	Pândano	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	9-3	Micro.	Árvore	Z10	C13(1), C14(1), C16(1)
<i>Parietaria judaica</i> L.	Urticaceae	Alfavaca; Alfavaca-de-cobra	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-9	Nano.	Arbusto	Z8	C31(grupo)
<i>Pelargonium graveolens</i> L' Hérit	Geraniaceae	Malva	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	3-6	Nano.	Arbusto	Z10	C29, C33(grupo)
<i>Pelargonium peltatum</i> (L.) L'Hérit.	Geraniaceae	Malva	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z10	C31(grupo)
<i>Pelargonium x hortorum</i> L. H. Bail.	Geraniaceae	Malvas	Hortícola	Perenifólio	1-12	4-7	Nano.	Herbácea	Z10	C37(grupo)
<i>Petunia x hybrida</i> hort. Vilm.- Andr.	Solanaceae	Petúnia	Hortícola	Sazonal	2-11	2-11	Terófita	Herbácea	Z9	C12, C13(grupo)
<i>Phoenix canariensis</i> Chabaud.	Palmae	Palmeira-das- canárias	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-3	Meso.	Árvore	Z11	C1(4), C2(5), C3(1), C4(1), C16(11), C26(1), C28(1), C32(2), C33(1), C35(5), C37(3)
<i>Phoenix roebelinii</i> O'Brien.	Palmae	Palmeira-anã	Indomalaio	Perenifólio	1-12	5-7	Micro.	Árvore	Z11	C29(2)
<i>Pilea microphylla</i> (L.) Liebm.	Urticaceae	Arrozinho	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C6, C31 (mancha)
<i>Plectranthus barbatus</i> Andrews	Labiatae	Falso-boldo; Boldo-da-terra	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C6(grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Plectranthus forsteri</i> Benth.	Labiatae	Plectratos	Australiano; Oceânia	Perenifólio	1-12	6-11	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z10	C31, C32, C33 (grupo)
<i>Plumbago auriculata</i> Lam.	Plumbaginaceae	Plumbago	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z9	C6(1)
<i>Plumeria rubra</i> L. (Poir.) Woodson	Apocynaceae	Planta-dos- dentes	Neotropical	Caducifólio	5-2	6-2	Micro.	Árvore	Z10	C13(1)
<i>Plumeria rubra</i> L. var. <i>acutifolia</i> (Poir.) Woodson.	Apocynaceae	Planta-dos- dentes	Neotropical	Caducifólio	5-1	6-12	Micro.	Árvore	Z10	C6(1), C13(1)
<i>Polygala myrtifolia</i> L.	Polygalaceae	Polígala	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z9	C33(1), C36(2)
<i>Portulacaria afra</i> Jacq.	Portulacaceae	Portulacária	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu**	Nano.	Arbusto suculento	Z9	C32(grupo), C33(grupo), C35(1)
<i>Psidium guajava</i> L.	Myrtaceae	Goiabeira	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-7	Micro.	Árvore	Z10	C1(1), C6(1)
<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn.	Dennstaedtiaceae	Feiteira	Paleártico; Neártico	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z4	C11(grupo)
<i>Pteris vittata</i> L.	Pteridaceae	Feto	Paleártico; Indomalaio; Australiano; Oceânia	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z9	C30(grupo)
<i>Pyracantha angustifolia</i> (Franch.) Schneid.	Rosaceae	Perinhos; Sarça-ardente	Paleártico	Perenifólio	1-12	2-6	Micro.	Arbusto	Z7	C13(2)
<i>Pyrostegia venusta</i> (Ker- Gawl.) Miers	Bignoniaceae	Gaitinhas	Neotropical	Perenifólio	1-12	11-4	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	C35A(1)
<i>Ravenala madagascariensis</i> Sonn.	Strelitziaceae	Ravenala; Árvore-do-viajante	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	2-10	Micro.	Árvore	Z11	C12(2)
<i>Rhapis excelsa</i> (Thunb.) Henry.	Palmae	Palmeira-de-hong- kong; Pameira-de- senhora	Paleártico	Perenifólio	1-12	6-9	Micro.	Arbusto	Z10	C13(2 vasos)
<i>Rhododendron mucronatum</i> G. Don.	Ericaceae	Azálea-japonesa	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z5	C9, C13, C15(grupo)
<i>Roystonea regia</i> (H.B.K.) Cook	Palmae	Palmeira-real	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-6	Micro.	Árvore	Z11	C15(1)
<i>Salvia leucantha</i> Cav.	Labiatae	Sálvia-branca	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z9	C6(1)
<i>Salvia splendens</i> Sell ex Roem. & Scult.	Labiatae	Camarões; Sálvias	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Herbácea	Z10	C6, C9(grupo)
<i>Sansevieria trifasciata</i> Prain	Agavaceae	Língua-de-sogra	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	8-11	Hemi.	Herbácea	Z10	C34(grupo)
<i>Sansevieria trifasciata</i> Prain var. <i>laurentii</i> (De Wild.) N. E. Br.	Agavaceae	Língua-de-sogra	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	8-11	Hemi.	Herbácea	Z10	C34(grupo)
<i>Santolina chamaecyparissus</i> L.	Compositae	Santolina	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-8	Caméfito	Arbusto	Z7	C22(grupo)
<i>Schefflera actinophylla</i> (Endl.) Harms	Araliaceae	Brassaia	Australiano; Oceânia	Perenifólio	1-12	8-10	Meso.	Árvore	Z10	C1(2)
<i>Schefflera arboricola</i> (Hayata) Hayata	Araliaceae	Cheflera	Indomalaio	Perenifólio	1-12	2-4; 7-8	Micro.	Arbusto	Z10	C11(grupo)
<i>Senecio tamoides</i> DC.	Compositae	Senécio	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	10-6	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z9	C5(4)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Senna didymobotrya</i> (Fres.) Irwin & Barneby.	Leguminosae (Caesalpinioideae)	Planta-das-pipocas; Cássia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C31(1)
<i>Solanum muricatum</i> Ait.	Solanaceae	Pêra-melão	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Herbácea	Z9	C33(grupo)
<i>Spathiphyllum walsii</i> Reg.	Araceae	Lírio-da-paz; Bandeira-branca; Espatifilo	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z11	C11, C15(grupo)
<i>Spathodea campanulata</i> Beauv.	Bignoniaceae	Chama-da-floresta; Tulipeiro- africano	Áfricotropical	Caducifólio	1-12 (Variação individual)	1-12	Micro.	Árvore	Z11	C1(1), C3(1), C6(2), C13(2), C22(1), C24(5)
<i>Stenotaphrum secundatum</i> (Walter) Kuntze	Gramineae	Relva; Relva-de-correr	Neotropical; Áfricotropical; Oceânia	Perenifólio	1-12	3-11	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z9	C3, C4, C6, C8 (tapete)
<i>Strelitzia reginae</i> Banks ex Dryand	Strelitziaceae	Estrelícia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C5, C12, C20, C22, C32 (grupo)
<i>Streptosolen jamesonii</i> (Benth.) Miers.	Solanaceae	Rapaziada	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z9	C6(1), C13(1)
<i>Synadenium grantii</i> Hook. f.	Euphorbiaceae	Sinadénio	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	8-11	Micro.	Arbusto suculento	Z10	C31(1)
<i>Tagetes patula</i> L.	Compositae	Cravos-de-burro	Neotropical	Sazonal	1-9	3-8	Terófito	Herbácea	Z9	C6, C32(grupo)
<i>Tanacetum parthenium</i> (L.) Schultz-Bip.	Compositae	Artemija	Paleártico	Perenifólio	1-12	2-10	Caméfito	Herbácea	Z6	C6(grupo)
<i>Teucrium fruticans</i> L.	Labiatae		Paleártico	Perenifólio	1-12	12-5	Nano.	Arbusto	Z8	C6(1)
<i>Tibouchina grandifolia</i> Cogn.	Melastomataceae	Aranhas; Tibouchina	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C6(1), C19(1)
<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	Leguminosae (Papilionoideae)	Tipuana	Neotropical	Marcescente	5-4 (3-4)	4-7	Meso.	Árvore	Z9	C1(1)
<i>Trachelospermum jasminoides</i> (Lindl.) Lem.	Apocynaceae	Jasmim-de-estrela	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-11	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z8	C13(1)
<i>Verbena x hybrida</i> Groenl. & Ruempl.	Verbenaceae	Verbena	Hortícola	Perenifólio	1-12	6-10	Caméfito	Herbácea	Z9	C6, C8 (grupo)
<i>Viburnum tinus</i> L.	Caprifoliaceae	Viburno	Paleártico	Perenifólio	1-12	10-4; 7-8	Micro.	Arbusto	Z7	C3, C5 (sebe)
<i>Washingtonia filifera</i> (Lind. ex André) H. A. Wendl	Palmae	Palmeira-de-leque-da-califórnia	Neártico	Perenifólio	1-12	5-8	Micro.	Árvore	Z9	C1(8), C2(3), C3(2), C36(3)
<i>Washingtonia robusta</i> H. A. Wendl	Palmae	Palmeira-de-leque-mexicana	Neártico	Perenifólio	1-12	4-6	Micro.	Árvore	Z10	C19(1), C20(2), C26(1), C27(2)
<i>Wisteria sinensis</i> (Sims) Sweet.	Leguminosae (Papilionoideae)	Lilases; Glicínia	Paleártico	Caducifólio	2-12	2-5; 7-8	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z5	C10(1)
<i>Yucca gloriosa</i> L.	Agavaceae	Ílca	Neártico	Perenifólio	1-12	6-11	Micro.	Arbusto	Z7	C11(1), C35(1), C37(2)

Legenda:

- Plantas que não floriram no período em estudo (Janeiro 2002 – Janeiro 2005): * plantas novas; ** plantas que nunca floriram por falta de aclimação;
- Plantas marcescentes (plantas semiperenifólias e semcaducifólias): 3-2 (3-4) – folhas todo o ano mas com renovação significativa em Março e Abril.

Anexo 26
CARACTERIZAÇÃO FITOGEOGRÁFICA DO JARDIM DO HOTEL PESTANA CASINO PARK

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Abelia x grandiflora</i> (André) Rehd.	Caprifoliaceae	Abélia	Hortícola	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z5	C15(5)
<i>Abutilon grandifolium</i> (Willd.) Sweet	Malvaceae	Abutilão	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z9	C24(2)
<i>Acalypha wilkesiana</i> Muell. Arg.	Euphorbiaceae	Acálifa; Folha-de-cobre	Oceânia	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C12(1), C19(3), C30(2), C31(4)
<i>Adiantum capillus-veneris</i> L.	Adiantaceae	Avenca; Avenca-das-fontes	Paleártico, Neotropical, Áfricotropical, Indomalaio	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z8	C13(grupo)
<i>Agapanthus praecox</i> Willd. ssp. <i>orientalis</i> (Leighton) Leighton	Liliaceae	Agapantos; Coroas-de-henrique	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	4-9	Hemi.	Herbácea	Z9	C3, C4, C12, C13, C16, C22, C26, C31 (mancha)
<i>Agathis robusta</i> (C. Moore ex. F. Muell.) Bail.	Araucariaceae	Pinheiro-de-damara;	Australiano	Perenifólio	1-12	3-4	Meso.	Árvore	Z9	C12(2), C18(1)
<i>Agave americana</i> L.	Agavaceae	Agave; Piteira	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-8	Hemi.	Herbácea suculenta	Z9	C17, C27 (grupo)
<i>Agave attenuata</i> Salm-Dyck	Agavaceae	Piteira; Agave-pescoço-de-cisne	Neotropical	Perenifólio	1-12	12-3	Nano.	Árvore suculenta	Z9	C4, C12, C17, C20, C22, C24, C27, C30, C31 (grupo)
<i>Ageratina adenophora</i> (Spreng.) R. King. & H. Robinson	Compositae	Abundância	Neotropical	Perenifólio	1-12	3-7	Nano.	Herbácea	Z10	C27(grupo)
<i>Aloe arborescens</i> Mill.	Liliaceae (Aloeaceae)	Aloés, Babosas, Foguetes-de-natal	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	11-2	Nano.	Arbusto suculento	Z9	C22, C24, C27, C31 (grupo)
<i>Annona cherimola</i> Mill.	Annonaceae	Anoneira	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-7	Micro.	Árvore	Z10	C12(1), C23(1), C24(1)
<i>Apollonias barbujana</i> (Cav.) Bomm.	Lauraceae	Barbusano	Paleártico	Perenifólio	1-12	9-3	Meso.	Árvore	Z10	C13(1)
<i>Araucaria bidwillii</i> Hook. f.	Araucariaceae	Araucária-de-bidwill	Australiano	Perenifólio	1-12	2-3	Meso.	Árvore	Z9	C1(1)
<i>Araucaria columnaris</i> (Forst. f.) Hook.	Araucariaceae	Pinheiro-da-nova-caledónia; Araucária	Oceânia	Perenifólio	1-12	5-7	Macro.	Árvore	Z10	C13(2), C17(1), C19(1), C26(3)
<i>Araucaria heterophylla</i> (Salisb.) Franco	Araucariaceae	Araucária	Oceânia	Perenifólio	1-12	2-3	Macro.	Árvore	Z9	C7(1), C16(1)
<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> H. A. Wendl. & Drude.	Palmae	Palmeira-elegante	Australiano	Perenifólio	1-12	2-10	Meso.	Árvore	Z10	C29(1)
<i>Argyranthemum frutescens</i> (L.) Schultz-Bip.	Compositae	Estrelas; Estreleiras; Pampilhos; Malmequeres	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C29(grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Asparagus setaceus</i> (Kunth) Jassop	Liliaceae (Asparagaceae)	Esparto-de-folha-miúda; Esparto	Africotropical	Perenifólio	1-12	9-12	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z9	C13, C22, C30, C31 (grupo)
<i>Aspidistra elatior</i> Bl.	Liliaceae (Convallariaceae)		Paleártico	Perenifólio	1-12	6-7	Hemi.	Herbácea	Z8	C29, C30 (grupo)
<i>Aster amellus</i> L.	Compositae	Áster	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-12	Hemi.	Herbácea	Z4	C28A, C30 (grupo)
<i>Bauhinia variegata</i> L.	Leguminosae (Caesalpinioi-deae)	Bauínia; Árvore-de-são-Tomé	Indomalaio	Marcescente	5-4 (12-4)	10-6	Micro.	Árvore	Z9	C12(1), C19(1), C31(1)
<i>Begonia x ricinifolia</i> A. Dietr.	Begoniaceae	Corações; Begónias	Hortícola	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C12(grupo)
<i>Bergenia crassifolia</i> (L.) Fritsch.	Saxifragaceae	Bergénia; Couve-de-jardim	Paleártico	Perenifólio	1-12	12-4	Caméfito	Herbácea	Z3	C7(grupo)
<i>Bougainvillea glabra</i> Choisy	Nyctaginaceae	Buganvília	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	C26, C27, C30(grupo)
<i>Brachychiton acerifolius</i> Cunn. ex. F. Muell.	Sterculiaceae	Árvore-do-fogo	Australiano	Caducifólio	1-5; 8-12	5-8	Micro.	Árvore	Z10	C12(3), C19(2), C20(1)
<i>Bulbine frutescens</i> (L.) Willd.	Liliaceae (Asphodelaceae)	Bulbine	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Geófita	Herbácea suculenta	Z9	C16A, C17, C23, C27 (grupo)
<i>Callistemon viminalis</i> (Sol. ex Gaertn.) G. Don ex Loud.	Myrtaceae	Martinete- chorão	Australiano	Perenifólio	1-12	4-7	Micro.	Arbusto	Z9	C19(1), C21(2), C23(1), C31(1)
<i>Camellia japonica</i> L.	Theaceae	Camélia; Japoneira	Paleártico	Perenifólio	1-12	11-6	Micro.	Árvore	Z8	C12(5), C13(7)
<i>Canna x generalis</i> L. H. Bail.	Cannaceae	Canas-da-índia; Bananeiras-de-flor	Hortícola	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z9	C21, C22, C31 (grupo)
<i>Cardiospermum grandiflorum</i> Sw.	Sapindaceae	Corriola-dos-balões	Africotropical; Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z10	C25(grupo)
<i>Carpobrotus edulis</i> (L.) L. Bol.	Aizoaceae	Bálsamo; Chorão	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	3-8	Fane. trep.	Herbácea suculenta e trepadora	Z9	C24(mancha)
<i>Centranthus ruber</i> (L.) DC.	Valerianaceae	Rosa-da-rocha; Alfinetes	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Caméfito	Herbácea	Z5	C24(grupo)
<i>Chamaedorea elegans</i> Mart.	Palmae	Palmeira-de-salão; Palmeira-bambu	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-6	Micro.	Arbusto	Z10	C28(1), C29(2)
<i>Chambeyronia macrocarpa</i> (Brongn.) Vieill. ex Becc.	Palmae	Palmeira-rubra	Oceânia	Perenifólio	1-12	1-2	Micro.	Árvore	Z10	C29(1)
<i>Chorisia speciosa</i> A. St. Hil.	Bombacaceae	Sumaúma	Neotropical	Caducifólio	3-11	8-11	Meso.	Árvore	Z10	C3(1), C12(1), C19(1)
<i>Cinnamomum camphora</i> (L.) Sieb.	Lauraceae	Canforeira	Paleártico; Indomalaio	Perenifólio	1-12	2-4	Meso.	Árvore	Z10	C7(1), C12(1), C14(1), C14B(1), C15(1), C16(1), C19(1),
<i>Citrus limon</i> (L.) Burm.	Rutaceae	Limoeiro	Paleártico	Perenifólio	1-12	11-12	Micro.	Árvore	Z9	C31(1)
<i>Citrus sinensis</i> (L.) Osbeck	Rutaceae	Laranjeira	Paleártico	Perenifólio	1-12	2-4	Micro.	Árvore	Z9	C31(1)
<i>Clivia miniata</i> Regel	Amaryllidaceae	Clívia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	2-11	Hemi.	Herbácea	Z10	C13(grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitoogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Codiaeum variegatum</i> (L.) Bl. var. <i>pictum</i> (Lodd) Muell. Arg.	Euphorbiaceae	Crótone	Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z11	C1(6), C7(4), C12(6), C13(8), C19(3), C23(2), C36(3),
<i>Coprosma repens</i> A. Rich.	Rubiaceae	Doiradinha	Antártico; Australiano	Perenifólio	1-12	4-5	Micro.	Arbusto	Z9	C12(1)
<i>Cordyline australis</i> (Forst.) Endl.	Agavaceae	Cordilina	Antártico	Perenifólio	1-12	4-6	Micro.	Árvore	Z9	C9(12), C11(9), C10(6)
<i>Cortaderia selloana</i> (Schult. & Schult. f.) Asch. & Gräbn.	Gramineae	Plumas; Erva-das-pampas; Penacho-branco	Neotropical	Perenifólio	1-12	7-10	Hemi.	Herbácea	Z6	C31(2)
<i>Cotoneaster pannosus</i> Franch.	Rosaceae		Paleártico	Perenifólio	1-12	4-5	Micro.	Arbusto	Z7	C12(3), C16(1), C19(2), C20(2), C22(2), C23(1), C24(grupo), C31(4)
<i>Cuphea hissoifolia</i> HBK.	Lythraceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C27(grupo)
<i>Cupressus funebris</i> Endl.	Cupressaceae	Cipreste-chorão-da-china	Paleártico	Perenifólio	1-12	2-3	Micro.	Árvore	Z7	C1(1)
<i>Cupressus lusitanica</i> Mill.	Cupressaceae	Cedro-de-goa; Cedro-das-barracas	Neártico; Neotropical	Perenifólio	1-12	1-3	Meso.	Árvore	Z9	C13(1)
<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartw. ex Gordon	Cupressaceae	Cipreste-de-monterrey; Cedro-de-monterrey	Neártico	Perenifólio	1-12	1-2	Meso.	Árvore	Z8	C12(1)
<i>Cupressus sempervirens</i> L. f. <i>horizontalis</i> (Mill.) Voss.	Cupressaceae	Cipreste	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-2	Meso.	Árvore	Z8	C1(1)
<i>Dendranthema x grandiflorum</i> Kitam.	Compositae	Crisântemo-das-floristas	Hortícola	Perenifólio	1-12	10-12	Nano.	Herbácea	Z4	C29(grupo)
<i>Deparia petersenii</i> (Kunze) Kato	Woodsiaceae	Feto-de-senhora-do-japão	Indomalaio; Paleártico; Australiano; Oceânia; Antártico	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z9	C20(grupo)
<i>Dichondra micrantha</i> Urban.	Convolvulaceae	Relva-redonda	Australiano; Antártico	Perenifólio	1-12	3-6	Hemi.	Herbácea	Z9	C12(tapete)
<i>Dracaena deremensis</i> Engl.	Agavaceae	Dracena	Áfrotropical	Perenifólio	1-12	11-12	Micro.	Arbusto	Z11	C30(1)
<i>Dracaena draco</i> L. ssp. <i>draco</i>	Agavaceae	Dragoeiro	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-6	Micro.	Árvore	Z11	C23(1), C27(1), C29(3)
<i>Erythrina abyssinica</i> Lam. ex DC.	Leguminosae (Papilionoideae)	Coralina-da-abissínia	Áfrotropical	Caducifólio	5-1	1-6; 9-10	Micro.	Árvore	Z10	C12(1), C19(1)
<i>Erythrina crista-galli</i> L.	Leguminosae (Papilionoideae)	Coraleira; Coralina-crista-de-galo	Neotropical	Marcescente	4-3 (12-3)	4-1	Micro.	Árvore	Z8	C12(14), C20(4), C23(2)
<i>Erythrina lysistemon</i> Hutch.	Leguminosae (Papilionoideae)	Coralina	Áfrotropical	Marcescente	5-4 (12-4)	12-5	Micro.	Árvore	Z10	C12(1)
<i>Erythrina speciosa</i> Andrews	Leguminosae (Papilionoideae)	Coralina-elegante	Neotropical	Caducifólio	4-11	12-4	Micro.	Árvore	Z10	C12(1), C19(1)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Escallonia bifida</i> Link & Otto	Grossulariaceae	Escalónia	Neotropical	Perenifólio	1-12	3-12	Micro.	Arbusto	Z9	C19(2)
<i>Eugenia uniflora</i> L.	Myrtaceae	Pitangueira	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Árvore	Z10	C15(1), C20(1)
<i>Euphorbia ingens</i> E. Mey.	Euphorbiaceae	Eufórbia-gigante	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	10-12	Micro.	Arbusto suculento	Z9	C17(2), C24(1), C31(1)
<i>Euphorbia pulcherrima</i> Willd. ex Klotzsch.	Euphorbiaceae	Manhã-de-páscoa	Neotropical	Caducifólio	5-2	10-3	Micro.	Arbusto	Z10	C19(2)
<i>Euphorbia trigona</i> Mill.	Euphorbiaceae	Eufórbia	Africotropical	Perenifólio	1-12	6-8	Micro.	Arbusto suculento	Z10	C10(1)
<i>Fagus sylvatica</i> L.	Fagaceae	Faia-europeia	Paleártico	Caducifólio	4-12	4-5	Meso.	Árvore	Z5	C2(1)
<i>Farugium japonicum</i> (L.) Kitam.	Compositae	Patás-de-cavalo; Boinas	Paleártico	Perenifólio	1-12	7-3	Hemi.	Herbácea	Z7	C13(grupo)
<i>Ficus benjamina</i> L.	Moraceae	Figueira-da-índia	Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-4	Micro.	Árvore	Z11	C13(1), C30(1)
<i>Ficus benjamina</i> L. var. <i>nuda</i> (Miq.) Barrett.	Moraceae	Figueira-da-índia	Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-4	Meso.	Árvore	Z11	C12(1), C13(4), C24(1 – multicaule), C25(1), C26(4), C30(1 – multicaule)
<i>Ficus elastica</i> Roxb. ex Homem	Moraceae	Borracheira	Indomalaio	Perenifólio	1-12	5-8	Micro.	Árvore	Z11	C19(1)
<i>Ficus pumila</i> L.	Moraceae	Pastinha	Indomalaio; Paleártico	Perenifólio	1-12	10-12	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z8	C22(grupo)
<i>Furcraea foetida</i> (L.)	Agavaceae	Furcreia; Piteira	Neotropical	Perenifólio	1-12	9-12	Hemi.	Herbácea suculenta	Z10	C2(2)
<i>Gazania rigens</i> (L.) Gaertn.	Compositae	Gazania	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z9	C18, C19, C20, C25, C27 (grupo)
<i>Gerbera jamesonii</i> Bol. ex Adlam.	Compositae	Gerbera	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z8	C16(grupo)
<i>Globularia salicina</i> Lam.	Globulariaceae	Globulária; Malfurada	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-8	Nano.	Arbusto	Z11	C27(grupo)
<i>Goniophlebium subauriculatum</i> (Bl.) Presl.	Polypodiaceae	Feto-de-metro; Feto-chorão	Indomalaio; Australiano; Oceânia	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z10	C15(grupo)
<i>Grevillea robusta</i> A. M. Cunn. ex R. Br.	Proteaceae	Grevílea	Australiano	Perenifólio	1-12	4-6	Meso.	Árvore	Z8	C8(1), C13(1), C15(1)
<i>Hedera helix</i> L.	Araliaceae	Hera	Paleártico	Perenifólio	1-12	9-10	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z5	C28(grupo)
<i>Hedychium gardnerianum</i> Ker-Gawl.	Zingiberaceae	Bananiha; Roca-de-vénus; Conteira	Paleártico; Indomalaio	Perenifólio	1-12	7-10	Hemi.	Herbácea	Z9	C31(grupo)
<i>Heliconia bihai</i> (L.) L.	Heliconiaceae	Helicónia	Neotropical	Perenifólio	1-12	7-11	Hemi.	Herbácea	Z11	C12(grupo)
<i>Hibiscus rosa-sinensis</i> L.	Malvaceae	Cardeais; Hibiscos; Rosa-da-china	Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C1(2), C2(1 + sebe), C7(1), C12(sebe), C13(sebe), C15(sebe), C19(grupo), C17(sebe), C18(sebe), C20(sebe), C22(sebe), C23(1), C28(sebe), C30(sebe)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Hibiscus schizopetalus</i> (Mast.) Hook.	Malvaceae	Lanterna-japonesa	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	3-11	Micro.	Arbusto	Z10	C31(1)
<i>Holmskioldia sanguinea</i> Retz.	Verbenaceae	Chapéus-de-mandarim; Chapéus-chineses	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C19(2)
<i>Howea forsteriana</i> (C. Moore & F. Muell.) Becc.	Palmae	Quênia	Australiano	Perenifólio	1-12	1-9	Micro.	Árvore	Z10	C29(2)
<i>Hydrangea macrophylla</i> (Thunb.) Ser.	Hydrangeaceae	Hortênsia; Novelos	Paleártico	Caducifólio	3-12	5-10	Nano.	Arbusto	Z6	C12(grupo)
<i>Hylocereus triangularis</i> (L.) Britt. & Rose	Cactaceae	Rainha-da-noite; Cacto-trepador	Neotropical	Perenifólio	1-12	7-10	Fane. trep.	Arbusto trepador e suculento	Z10	C27, C30 (grupo)
<i>Hymenosporum flavum</i> (Hook.) F. Muell.	Pittosporaceae	Himenosporó	Australiano	Perenifólio	1-12	3-8	Micro.	Árvore	Z9	C12(1)
<i>Hyparrhenia hirta</i> (L.) Stapf	Gramineae	Feno	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-5	Hemi.	Herbácea	Z9	C27 (grupo)
<i>Impatiens walleriana</i> Hook. f.	Balsaminaceae	Maravilhas	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Herbácea	Z9	C29(grupo)
<i>Iresine herbstii</i> Hook.	Amaranthaceae	Iresine	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Caméfito	Herbácea	Z10	C27 (grupo)
<i>Jacaranda mimosifolia</i> D. Don.	Bignoniaceae	Jacarandá	Neotropical	Caducifólio	5-2	4-6; 9-10	Meso.	Árvore	Z9	C4(2)
<i>Kalanchoe blossfeldiana</i> Poelln.	Crassulaceae	Calanchoé	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto suculento	Z11	C28A, C29, C30 (grupo)
<i>Kigelia africana</i> (Lam.) Benth.	Bignoniaceae	Árvore-das-salsichas	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	5-7	Micro.	Árvore	Z10	C12(1), C20(1)
<i>Lagerstroemia indica</i> L.	Lythraceae	Laguerestrémia; Flor de Merenda; Suspiros	Paleártico; Indomalaio	Caducifólio	3-11	7-9	Micro.	Árvore	Z7	C20(3), C31(1)
<i>Lampranthus multiradiatus</i> (Jacq.) N. E. Br.	Aizoaceae	Lamprantos; Chorão	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Arbusto trepador e suculento	Z11	C7(grupo)
<i>Lantana camara</i> L.	Verbenaceae	Lantana	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C28(grupo)
<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) De Wit.	Leguminosae (Mimosoideae)	Aroma-branco; Leucena	Neártico	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z9	C24, C27 (grupo)
<i>Ligustrum lucidum</i> Ait. f.	Oleaceae	Ligustro; Alfinheiro	Paleártico	Perenifólio	1-12	7-9	Micro.	Árvore	Z7	C21(1), C22(4), C24(3), C31(2)
<i>Livistona chinensis</i> (Jacq.) R. Br. ex Mart.	Palmae	Palmeira-de-leque	Paleártico	Perenifólio	1-12	2-5	Meso.	Árvore	Z9	C7(1), C15(1), C19(1)
<i>Magnolia grandiflora</i> L.	Magnoliaceae	Magnólia	Neártico	Perenifólio	1-12	5-8	Micro.	Árvore	Z6	C12(1), C19(2)
<i>Mangifera indica</i> L.	Anacardiaceae	Mangueiro	Indomalaio	Perenifólio	1-12	11-6	Micro.	Árvore	Z11	C12(1)
<i>Markamia lutea</i> (Benth.) Schum.	Bignoniaceae	Marcâmia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Meso.	Árvore	Z11	C8(1), C16(1)
<i>Mirabilis jalapa</i> L.	Nyctaginaceae	Boas-noites	Neotropical	Sazonal	3-10	5-9	Geófito	Herbácea	Z8	C24(grupo)
<i>Monstera deliciosa</i> Liebm.	Araceae	Fruto-delicioso; Costela-de-adão	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z10	C3, C7, C12, C13, C30 (grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Musa acuminata</i> Colla	Musaceae	Bananeira	Indomalaio; Australiano	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C12(grupo)
<i>Musa x paradisiaca</i> L.	Musaceae	Bananeira-de-prata	Hortícola	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C12, C13(grupo)
<i>Nephrolepis cordifolia</i> (L.) Presl.	Oleandraceae	Feto	Neotropical; Áfricotropical; Indomalaio; Oceânia; Australiano	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z10	C6, C12, C15 (grupo)
<i>Nerium oleander</i> L.	Apocynaceae	Sevadilha; Loendro	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-11	Micro.	Arbusto	Z9	C12(7), C18(1), C19(7), C21(1), C23(1), C31(4)
<i>Nicotiana glauca</i> Grah.	Solanaceae	Tabaqueira-azul; Charuto-do-rei	Neotropical	Perenifólio	1-12	3-9	Micro.	Arbusto	Z8	C27(grupo)
<i>Nolina recurvata</i> (Lem.) Hemsl.	Agavaceae	Nolina; Pata-de-elefante	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-8	Micro.	Árvore	Z9	C29(1)
<i>Ocotea foetens</i> (Aiton) Baill.	Lauraceae	Til	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Meso.	Árvore	Z10	C8(1)
<i>Odontonema strictum</i> (Nees) Kuntze	Acanthaceae	Odontonema; Ramo-de-fogo	Neotropical	Perenifólio	1-12	8-12	Nano.	Arbusto	Z10	C12(1)
<i>Osteospermum ecklonis</i> (DC.) Norl.	Compositae	Estrelas-do-cabo	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Caméfito	Arbusto	Z10	C27(grupo)
<i>Oxalis latifolia</i> HBK.	Oxalidaceae	Trevo	Neotropical	Sazonal	10-5	12-4	Geófito	Herbácea	Z9	C27(grupo)
<i>Parthenocissus tricuspidata</i> (Sieb. & Zucc.) Planch. in DC.	Vitaceae	Vinha-virgem	Paleártico	Caducifólio	4-12	5-6	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z4	C22, C31(grupo)
<i>Paspalum dilatatum</i> Poir.	Gramineae	Erva-rija; Erva-do-governo	Neotropical	Perenifólio	1-12	3-9	Hemi.	Herbácea	Z8	C12, C19 (tapete)
<i>Passiflora subpeltata</i> Ortega	Passifloraceae	Maracujá-branco	Neotropical	Perenifólio	1-12	7-9	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	C27(grupo)
<i>Pelargonium peltatum</i> (L.) L'Hérit. cv.	Geraniaceae	Malva	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z10	C25, C27 (grupo)
<i>Peperomia glabella</i> (Sw.) A. Dietr.	Piperaceae	Peperómia	Neotropical	Perenifólio	1-12	7-10	Caméfito	Herbácea	Z11	C29 (grupo)
<i>Persea americana</i> Mill.	Lauraceae	Abacateiro	Neotropical	Perenifólio	1-12	11-5	Micro.	Árvore	Z10	C12(2), C13(2), C19(2), C24(1)
<i>Petunia x hybrida</i> hort. Vilm.-Andr.	Solanaceae	Petúnia	Hortícola	Sazonal	2-11	2-11	Terófito	Herbácea	Z9	C28A, C29 (grupo)
<i>Philodendron bipinnatifidum</i> Endl.	Araceae	Filodendro	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-7	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	C12(grupo)
<i>Phlox paniculata</i> L.	Polemoniaceae	Floxe	Neártico	Perenifólio	1-12	7-10	Nano.	Herbácea	Z4	C28A(grupo)
<i>Phoenix canariensis</i> Chabaud.	Palmae	Palmeira-das-canárias	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-3	Meso.	Árvore	Z11	C1(1), C7(5), C8(3), C12(2), C14(4), C15(3), C17(2), C19(10), C20(1), C22(2), C23(1), C28(2), C29(3), C30(4), C31(1)
<i>Phoenix dactylifera</i> L.	Palmae	Tamareira	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-3	Meso.	Árvore	Z11	C14(1), C16A(1), C18(1), C19(1), C30(1)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Phoenix reclinata</i> Jacq.	Palmae	Tamareira-do-senegal	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	5-7	Micro.	Árvore	Z11	C15(6), C16A(2)
<i>Phoenix roebelinii</i> O'Brien.	Palmae	Palmeira-anã	Indomalaio	Perenifólio	1-12	5-7	Micro.	Árvore	Z11	C19(2)
<i>Phyllostachis aurea</i> (Carr.) A. & C. Riv.	Gramineae	Bambu	Paleártico	Perenifólio	1-12	Não floriu**	Hemi.	Herbácea	Z6	C13(grupo)
<i>Phytolacca dioica</i> (L.) Moq.	Phytolaccaceae	Bela-sombra	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-9	Meso.	Árvore	Z11	C13(1)
<i>Pilea microphylla</i> (L.) Lieb.	Urticaceae	Arrozinho	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C27(mancha)
<i>Pittosporum undulatum</i> Vent.	Pittosporaceae	Incenseiro	Australiano	Perenifólio	1-12	2-4	Micro.	Árvore	Z9	C24(4)
<i>Plumeria rubra</i> L. var. <i>acutifolia</i> (Poir.) Woodson.	Apocynaceae	Planta-dos-dentes	Neotropical	Caducifólio	5-1	6-12	Micro.	Árvore	Z10	C19(1), C23(1), C31(1)
<i>Podocarpus salignus</i> D. Don.	Podocarpaceae	Podocarpo	Neotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu**	Micro.	Árvore	Z8	C12(1)
<i>Podranea ricasoliana</i> (Tanf.) Sprague.	Bignoniaceae	Ricassoliana	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	4-10	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z9	C22 (grupo)
<i>Polygonum capitatum</i> Buch.-Ham. ex D. Don	Polygonaceae	Polígono-de-jardim	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z8	C7, C20, C27 (mancha)
<i>Psidium guajava</i> L.	Myrtaceae	Goiabeira	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-7	Micro.	Árvore	Z10	C31(1)
<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn.	Dennstaedtiaceae	Feiteira	Paleártico; Neártico	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z4	C15(grupo)
<i>Pteris vittata</i> L.	Pteridaceae	Feto	Paleártico; Indomalaio; Australiano; Oceânia	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z9	C7, C27 (grupo)
<i>Pyracantha angustifolia</i> (Franch.) Schneid.	Rosaceae	Perinhos; Sarça-ardente	Paleártico	Perenifólio	1-12	2-6	Micro.	Arbusto	Z7	C12(2), C19(1)
<i>Pyrostegia venusta</i> (Ker-Gawl.) Miers	Bignoniaceae	Gaitinhas	Neotropical	Perenifólio	1-12	11-4	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	C21, C31 (grupo)
<i>Rhaphiolepis umbellata</i> (Thunb.) Mak.	Rosaceae		Paleártico	Perenifólio	1-12	10-4	Nano.	Arbusto	Z8	C12(1)
<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Leguminosae (Papilionoideae)	Robinia	Neártico	Caducifólio	3-12	3-6	Meso.	Árvore	Z3	C13(1), C14(1)
<i>Ruscus hypophyllum</i> L.	Liliaceae (Asparagaceae)	Ruscus	Paleártico	Perenifólio	1-12	11-12	Nano.	Herbácea	Z8	C12(grupo)
<i>Salvia splendens</i> Sell ex Roem. & Scult.	Labiatae	Camarões; Sálvia	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Herbácea	Z10	C28A, C29 (grupo)
<i>Sansevieria trifasciata</i> Prain	Agavaceae	Língua-de-sogra	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	8-11	Hemi.	Herbácea	Z10	C7(grupo)
<i>Schefflera arboricola</i> (Hayata)	Araliaceae	Schefflera	Indomalaio	Perenifólio	1-12	2-4; 7-8	Micro.	Arbusto	Z10	C30(1)
<i>Schinus molle</i> L. non hort. ex Engl.	Anacardiaceae	Pimenteira-bastarda; Pimenteira-da-índia	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Meso.	Árvore	Z9	C31(1)
<i>Schinus terebinthifolius</i> Raddi	Anacardiaceae	Pimenteira-do-brasil	Neotropical	Perenifólio	1-12	8-10	Micro.	Árvore	Z10	C26(1), C27(2)
<i>Schotia brachypetala</i> Sonder.	Leguminosae (Caesalpinioidae)	Escótia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	2-5	Micro.	Árvore	Z9	C1(2), C19(2)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Sophora japonica</i> L.	Leguminosae (Papilionoideae)	Acácia-do-japão; Sófora-do-japão	Paleártico	Caducifólio	4-12	8-9	Micro.	Árvore	Z5	C26(1)
<i>Spathiphyllum walisii</i> Reg.	Araceae	Lírio-da-paz; Bandeira-branca; Espatífilo	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z11	C29 (grupo)
<i>Spathodea campanulata</i> Beauv.	Bignoniaceae	Chama-da- floresta; Tulipeiro-africano	Áfricotropical	Caducifólio	1-12 (Variação individual)	1-12	Micro.	Árvore	Z11	C10(1), C19(1), C20(1)
<i>Spiraea cantoniensis</i> Lour.	Rosaceae	Grinalda-de-noiva	Paleártico	Marcescente	3-2 (11-2)	2-9	Nano.	Arbusto	Z6	C23(1), C31(1)
<i>Stenotaphrum secundatum</i> (Walter) Kuntze	Gramineae	Relva; Relva-de-correr	Neotropical; Áfricotropical; Oceânia	Perenifólio	1-12	3-11	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z9	C1, C2, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C26, C29, C30 (tapete)
<i>Strelitzia nicolai</i> Reg. & Körn.	Strelitziaceae	Estrelícia-gigante	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C7, C12, C13, C22, C26 (grupo)
<i>Strelitzia reginae</i> Banks ex Dryand	Strelitziaceae	Estrelícia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C7, C9, C10, C11, C12, C15, C19, C21, C22 (grupo)
<i>Tagetes patula</i> L.	Compositae	Cravos-de-burro	Neotropical	Sazonal	1-9	3-8	Terófito	Herbácea	Z9	C25 (grupo)
<i>Tecoma stans</i> (L.) Juss. ex HBK.	Bignoniaceae	Estenolóbio	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C12(1)
<i>Tecomaria capensis</i> (Thunb.) Spach.	Bignoniaceae	Camarões	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C27(grupo)
<i>Tetradenia riparia</i> (Hochst.) Codd.	Labiatae	Iboza (Moschosma)	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	12-5	Nano.	Arbusto	Z10	C24(grupo)
<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	Leguminosae (Papilionoideae)	Tipuana	Neotropical	Marcescente	5-4 (3-4)	4-7	Meso.	Árvore	Z9	C12(2), C14(1), C16(1), C26(1), C31(1)
<i>Tradescantia pallida</i> (Rose) D. Hunt.	Commelinaceae	Tradescantia	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea trepadora	Z8	C18(mancha)
<i>Tradescantia spathacea</i> Sw.	Commelinaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	10-2	Hemi.	Herbácea	Z9	C7(grupo)
<i>Trifolium repens</i> L.	Leguminosae	Trevo	Paleártico	Perenifólio	1-12	2-10	Hemi.	Herbácea	Z4	C12 (grupo)
<i>Vriesea splendens</i> (Brongn.) Lem.	Bromeliaceae	Espada-de-fogo	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-2	Hemi.	Herbácea	Z11	C30(3)
<i>Washingtonia filifera</i> (Lind. ex André) H. A. Wendl	Palmae	Palmeira-de-leque- da-califórnia	Neártico	Perenifólio	1-12	5-8	Micro.	Árvore	Z9	C3(1), C5(1), C7(1), C29(3)
<i>Yucca gloriosa</i> L.	Agavaceae	luca	Neártico	Perenifólio	1-12	6-11	Micro.	Arbusto	Z7	C12(3), C29(6), C31(2)
<i>Zantedeschia aethiopica</i> (L.) Spreng.	Araceae	Jarros	Áfricotropical	Sazonal	10-7	11-5	Geófito	Herbácea	Z8	C13, C19 (grupo)

Legenda:

- Plantas que não floriram no período em estudo (Janeiro 2002 – Janeiro 2005): * plantas novas; ** plantas que nunca floriram por falta de aclimação;
- Plantas marcescentes (plantas semiperenifólias e semcaducifólias): 3-2 (3-4) – folhas todo o ano mas com renovação significativa em Março e Abril.

Anexo 27
CARACTERIZAÇÃO FITOGEOGRÁFICA DO JARDIM DO HOTEL PESTANA VILLAGE

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Abelia x grandiflora</i> (André) Rehd.	Caprifoliaceae	Abélia	Hortícola	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z5	C16(1), C18(1), C20(6), C23(1), C33(1)
<i>Abutilon pictum</i> (Gillies ex Hook. & Arn.) Walp.	Malvaceae	Abutilão	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z9	C3(1), C4(1), C9(2), C20(1), C32(5), C34(1)
<i>Abutilon x hybridum</i> hort.	Malvaceae	Lanterna-chinesa	Hortícola	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z9	C3(1), C20(1), C28(grupo)
<i>Abutilon x milleri</i> hort.	Malvaceae	Lanterna-chinesa	Hortícola	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z9	C11(1), C14(1)
<i>Acacia dealbata</i> Link.	Leguminosae (Mimosoideae)	Mimosa	Australiano	Perenifólio	1-12	12-3	Meso.	Árvore	Z8	C18(2)
<i>Acacia longifolia</i> (Andrews) Willd.	Leguminosae (Mimosoideae)	Acácia-de-espigas	Australiano	Perenifólio	1-12	2-6	Micro.	Árvore	Z8	C36(1)
<i>Acacia podalyriifolia</i> G. Don.	Leguminosae (Mimosoideae)	Acácia	Australiano	Perenifólio	1-12	12-3	Micro.	Árvore	Z8	C23(1)
<i>Acalypha godseffiana</i> hort. Sander ex Mast.	Euphorbiaceae	Acálifa	Oceânia	Perenifólio	1-12	2-8	Micro.	Arbusto	Z11	C9(3)
<i>Acalypha wilkesiana</i> Muell. Arg.	Euphorbiaceae	Acálifa;	Oceânia	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C9(5), C11(9), C17(2), C22(1), C24(1), C33(1), C35(3), C38(1)
<i>Acanthus mollis</i> L.	Acanthaceae	Erva-gigante	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-8	Hemi.	Herbácea	Z6	C30, C32(grupo)
<i>Acca sellowiana</i> (O. Berg.) Burret	Myrtaceae	Goiabeira-ananás	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-7	Micro.	Árvore	Z8	C2A(1)
<i>Adenium obesum</i> (Forssk.) Roem. & Schult.	Apocynaceae	Adénio	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	7-9	Nano.	Arbusto suculento	Z11	Terraço (1)
<i>Adiantum capillus-veneris</i> L.	Adiantaceae	Avenca; Avenca-das-fontes	Paleártico, Neotropical, Áfricotropical, Indomalaio	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z8	C30, C32 (grupo)
<i>Aechmea fasciata</i> (Lindl.) Bak.	Bromeliaceae	Bromélia	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C6(grupo)
<i>Aechmea fulgens</i> Brongn. var. <i>discolor</i> (Morr.) Brongn. ex Bak.	Bromeliaceae	Bromélia	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-8	Hemi.	Herbácea	Z11	C4, C7, C8, C9, C11, C17, C18, C28 (grupo)
<i>Aeonium arboreum</i> (L.) Webb & Berth.	Crassulaceae	Ensaio-vermelho; Saião-vermelho	Paleártico	Perenifólio	1-12	11-4	Nano.	Herbácea suculenta	Z9	Terraço (grupo)
<i>Aeonium glutinosum</i> (Aiton.) Webb. & Berthel.	Crassulaceae	Farrobo; Ensaio	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-8	Nano.	Herbácea suculenta	Z10	C26(2)
<i>Agapanthus praecox</i> Willd. ssp. <i>orientalis</i> (Leighton) Leighton	Liliaceae	Agapantos; Coroas-de-henrique	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	4-9	Hemi.	Herbácea	Z9	C1, C9, C20, C36 (grupo)
<i>Agave americana</i> L.	Agavaceae	Agave; Piteira	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-8	Hemi..	Herbácea suculenta	Z9	Terraço – (grupo)
<i>Agave angustifolia</i> Haw.	Agavaceae	Agave	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-8	Nano.	Árvore suculenta	Z9	Terraço (7)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Agave attenuata</i> Salm-Dyck	Agavaceae	Piteira; Agave-pescoço- de-cisne	Neotropical	Perenifólio	1-12	12-3	Nano.	Árvore suculenta	Z9	C2(2), C8(>50), C28(4)
<i>Agave celsii</i> Hook var. <i>albicans</i> (Jacobi) Gent.	Agavaceae	Agave	Neotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Hemi.	Herbácea suculenta	Z9	Terraço (1)
<i>Agave chiapensis</i> Jacobi	Agavaceae	Agave	Neotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Nano.	Árvore suculenta	Z9	Terraço (2)
<i>Agave filifera</i> Salm-Dyck	Agavaceae	Agave	Neotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Hemi.	Herbácea suculenta	Z9	Terraço – (grupo)
<i>Agave macroacantha</i> Zucc.	Agavaceae	Agave-roseta	Neotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Caméfito	Arbusto suculento	Z9	Terraço – (grupo)
<i>Agave victoriae-reginae</i> T. Moore	Agavaceae	Agave	Neotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Hemi.	Herbácea suculenta	Z9	Terraço (grupo)
<i>Ageratina ligustrina</i> (DC.) R. King & H. Robinson	Compositae		Neotropical	Perenifólio	1-12	7-1	Micro.	Herbácea	Z10	C3(1)
<i>Ageratina riparia</i> (Reg.) R. King. & H. Robinson	Compositae	Falsa-abundância	Neotropical	Perenifólio	1-12	2-6	Nano.	Herbácea	Z10	C2(grupo)
<i>Agonis flexuosa</i> (Willd.) Sweet.	Myrtaceae		Australiano	Perenifólio	1-12	4-7	Micro.	Árvore	Z9	C18(1)
<i>Aloe arborescens</i> Mill.	Liliaceae (Aloeaceae)	Aloés, Babosas, Foguetes-de-natal	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	11-2	Nano.	Arbusto suculento	Z9	C4, C11, C28, C30, Terraço (grupo)
<i>Aloe branddraaiensis</i> Groenewald	Liliaceae (Aloeaceae)	Aloés	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Hemi.	Herbácea suculenta	Z9	Terraço (grupo)
<i>Aloe ciliaris</i> Haw.	Liliaceae (Aloeaceae)	Aloés	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	10-6	Fane. trep.	Arbusto trepador e suculento	Z9	C27, C30, Terraço (grupo)
<i>Aloe excelsa</i> A. Berger.	Liliaceae (Aloeaceae)	Aloés	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-3	Micro.	Árvore suculenta	Z9	C17(1), C26(1), C28(1)
<i>Aloe ferox</i> Mill.	Liliaceae (Aloeaceae)	Aloés	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	12-1	Nano.	Árvore suculenta	Z9	Terraço (5)
<i>Aloe marlothi</i> A. Berger.	Liliaceae (Aloeaceae)	Aloés	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	3-4	Nano.	Árvore suculenta	Z9	C29(2), Terraço(3)
<i>Aloe mitriformis</i> Mill.	Liliaceae (Aloeaceae)	Aloés	Africotropical	Perenifólio	1-12	6-8	Caméfito	Arbusto suculento	Z9	C28, Terraço (grupo)
<i>Aloe plicatilis</i> (L.) Mill.	Liliaceae (Aloeaceae)	Aloés	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	2-4	Nano.	Árvore suculenta	Z9	C26(1)
<i>Aloe pratensis</i> Bak.	Liliaceae (Aloeaceae)	Aloés	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	12-2	Caméfito	Arbusto suculento	Z9	C29(1)
<i>Aloe saponaria</i> (Ait. f.) Haw.	Liliaceae (Aloeaceae)	Aloés-sabão	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-7	Hemi.	Herbácea suculenta	Z9	C26, Terraço (grupo)
<i>Aloe striata</i> Haw.	Liliaceae (Aloeaceae)	Aloés	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	12-5	Caméfito	Arbusto suculento	Z9	C29(1), Terraço (grupo)
<i>Aloe striatula</i> Haw.	Liliaceae (Aloeaceae)	Aloés	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Nano.	Arbusto suculento	Z9	Terraço (1)
<i>Aloe vera</i> (L.) Burm.	Liliaceae (Aloeaceae)	Aloés-vera	Paleártico; Neotropical	Perenifólio	1-12	11-6	Hemi.	Herbácea suculenta	Z8	C28, Terraço (grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Alpinia zerumbet</i> (Pers.) B. L. Burt & Rosemary M. Sm.	Zingiberaceae	Alpínia; Lírio-de-porcelana	Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C9(grupo), C8(1), C18(2), C33(1)
<i>Alternanthera ficoidea</i> (L.) R. Br.	Amaranthaceae	Pirriquitos	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Caméfito	Herbácea	Z10	C23, C28, C30 (grupo)
<i>Amaryllis belladonna</i> L.	Amaryllidaceae	Açucenas-da-serra; Belas-donas	Áfricotropical	Sazonal	5-7	8-11	Geófita	Herbácea	Z8	C2A, C30 (grupo)
<i>Ananas bracteatus</i> (Lindl.) Schult. var. <i>tricolor</i> (Bertoni) L.B.	Bromeliaceae	Ananás	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-7	Hemi.	Herbácea	Z11	C7(6)
<i>Anemone x hybrida</i> Paxt.	Ranunculaceae	Anémone	Hortícola	Perenifólio	1-12	8-12	Hemi.	Herbácea	Z6	C8(grupo)
<i>Anigozanthos flavidus</i> DC.	Haemodoraceae	Pata-de-canguru	Australiano	Perenifólio	1-12	3-7	Nano.	Herbácea	Z9	C31(2), C38(1)
<i>Anisodonteia capensis</i> (L.) Bates	Malvaceae	Malva-do-cabo	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	3-10	Nano.	Arbusto	Z9	C15(1)
<i>Anredera cordifolia</i> (Ten.) Steenis	Basellaceae	Boussingau-Itia	Neotropical	Caducifólio	6-2	7-9	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z9	C31(2)
<i>Anthurium andraeanum</i> André.	Araceae	Antúrio	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z11	C7 (grupo)
<i>Aphelandra squarrosa</i> Nees.	Acanthaceae	Planta-zebra	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-6	Nano.	Arbusto	Z11	C25(grupo)
<i>Araucaria bidwillii</i> Hook. f.	Araucariaceae	Araucária-de-bidwill	Australiano	Perenifólio	1-12	2-3	Meso.	Árvore	Z9	C9(1)
<i>Araucaria heterophylla</i> (Salisb.) Franco	Araucariaceae	Araucária	Oceânia	Perenifólio	1-12	2-3	Macro.	Árvore	Z9	C30(2)
<i>Archontophoenix alexandrae</i> (Muell.) Wendl. & Drude	Palmae	Palmeira-real-da-austrália	Australiano	Perenifólio	1-12	1-5	Micro.	Árvore	Z10	C1(12), C8(8), C17(10), C17A(10), C38(6)
<i>Argyranthemum dissectum</i> (Lowe) Lowe	Compositae	Pampilhos; Estrela; Malmequeres	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-7	Nano.	Arbusto	Z10	C12(1)
<i>Argyranthemum frutescens</i> (L.) Schultz-Bip.	Compositae	Estrelas; Estrelas; Pampilhos; Malmequeres	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C9, C24(grupo)
<i>Argyranthemum gracile</i> Schultz-Bip	Compositae	Estrela	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C3(2), C12(grupo), C18(3), C23(grupo), C27(grupo)
<i>Aristolochia gigantea</i> Mart. & Zucc.	Aristolochiaceae	Cachimbo-holandês	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-10	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z11	C2A(1), C8(1)
<i>Arthropodium cirratum</i> (Forst. f.) R. Br.	Liliaceae		Antártico	Perenifólio	1-12	5-7	Geófita	Herbácea	Z8	C11(grupo)
<i>Asclepias curassavica</i> L.	Asclepiadaceae	Planta-da-seda	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z9	C23(1), C29(1)
<i>Asclepias physocarpa</i> (E. Mey.) Schltr.	Asclepiadaceae	Planta-da-seda; Balões-de-são-joão	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	5-7	Nano.	Arbusto	Z9	C9(1)
<i>Asparagus densiflorus</i> (Kunth) Jassop	Liliaceae (Asparagaceae)	Esparto	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	7-8	Nano.	Herbácea	Z9	C9, C17A, C23, C25, C36, C38 (grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Asparagus setaceus</i> (Kunth) Jassop	Liliaceae (Asparagaceae)	Esparto-de-folha-miúda; Esparto	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	9-12	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z9	C8, C18, C36, C37 (grupo)
<i>Asparagus umbellatus</i> Link ssp. <i>lowei</i> (Kunth) Valdés	Liliaceae (Asparagaceae)	Esparto-da-madeira	Paleártico	Perenifólio	1-12	11-6	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z11	C30(1)
<i>Aspidistra elatior</i> Bl.	Liliaceae (Convallariaceae)		Paleártico	Perenifólio	1-12	6-7	Hemi.	Herbácea	Z8	C1, C33 (grupo)
<i>Atriplex halimus</i> L.	Chenopodiaceae	Salgadeira	Paleártico	Perenifólio	1-12	7-8	Nano.	Arbusto	Z6	C8(1)
<i>Banksia integrifolia</i> L.f.	Proteaceae	Banksia	Australiano	Perenifólio	1-12	12-5	Micro.	Árvore	Z9	C28(1), C32(1)
<i>Bauhinia galpinii</i> N. E. Br.	Leguminosae (Caesalpinoideae)	Bauínia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	5-11	Micro.	Arbusto	Z9	C37(1)
<i>Bauhinia variegata</i> L.	Leguminosae (Caesalpinoideae)	Bauínia; Árvore-das-orquídeas	Indomalaio	Marcescente	5-4 (12-4)	10-6	Micro.	Árvore	Z9	C17(1), C33(4), C34(1), C38(1)
<i>Beaumontia grandiflora</i> Wallich.	Apocynaceae		Indomalaio	Perenifólio	1-12	3-6	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z9	C23(1)
<i>Begonia imperialis</i> Lem.	Begoniaceae	Begónia	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-9	Caméfito	Herbácea	Z10	C7 (grupo)
<i>Begonia minor</i> Jacq.	Begoniaceae	Corações;	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C7(grupo)
<i>Begonia venosa</i> Skan ex Hook. f.	Begoniaceae	Begónia	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-8	Hemi.	Herbácea	Z10	C7(grupo)
<i>Bergenia crassifolia</i> (L.) Fritsch.	Saxifragaceae	Bergénia; Couve-de-jardim	Paleártico	Perenifólio	1-12	11-4	Caméfito	Herbácea	Z3	C2A, C33(grupo)
<i>Billbergia nutans</i> H. Wendl.	Bromeliaceae	Bromélia	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-7	Hemi.	Herbácea	Z10	C7, C19, C28(grupo)
<i>Billbergia vittata</i> Brongn. ex Morel.	Bromeliaceae	Bromélia	Neotropical	Perenifólio	1-12	11-2	Hemi.	Herbácea	Z10	C7, C9, C11, C28 (grupo)
<i>Bischofia javanica</i> Blume.	Euphorbiaceae		Indomalaio	Perenifólio	1-12	12-2	Micro.	Árvore	Z9	C8(1)
<i>Bolusanthus speciosus</i> (Bol.) Harms.	Leguminosae (Papilionoideae)	Árvore-glicínia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	5-7	Micro.	Árvore	Z9	C33(1)
<i>Bougainvillea glabra</i> Choisy	Nyctaginaceae	Buganvília	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	C10, C15, C27, C28, C31, C32, C34 (grupo)
<i>Bougainvillea spectabilis</i> Willd.	Nyctaginaceae	Buganvília	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	C27, C28, C31, C32 (grupo)
<i>Bougainvillea x buttiana</i> Holtt. & Standl.	Nyctaginaceae	Buganvília	Hortícola	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	C15, C17A(grupo)
<i>Brugmansia versicolor</i> Lagerh.	Solanaceae	Trombeteira	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C8(2), C18(15), C23(1), C28(1), C38(2), C39(6)
<i>Brugmansia x candida</i> Pers.	Solanaceae	Trombeteira; Belas-noites	Hortícola	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C17(2), C18(1)
<i>Brunfelsia pauciflora</i> (Cham. & Scltd.) Benth.	Solanaceae	Brunfêlsia; Manacá	Neotropical	Perenifólio	1-12	2-10	Micro.	Arbusto	Z10	C7(2), C9(1), C11(1), C14(1), C15(1) C18(1), C20(2)
<i>Buddleja davidii</i> Franch.	Loganiaceae	Budleia	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-8	Micro.	Arbusto	Z5	C2A(1), C13(1), C28(3), C34(1)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Buddleja madagascariensis</i> Lam.	Loganiaceae	Budléia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-7	Micro.	Arbusto	Z9	C2A(1), C33(1)
<i>Bulbine frutescens</i> (L.) Willd.	Liliaceae (Asphodelaceae)	Bulbine	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Geófito	Herbácea suculenta	Z9	C34(grupo)
<i>Butia capitata</i> (Mart.) Becc.	Palmae	Palmeira-da-geleia	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-8	Micro.	Árvore	Z10	C19(1)
<i>Buxus sempervirens</i> L.	Buxaceae	Buxo	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-4; 10-11	Nano.	Arbusto	Z5	C7(sebe), C31(grupo)
<i>Calathea louisae</i> Gagnep.	Marantaceae	Calateia	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-7	Hemi.	Herbácea	Z11	C6, C9 (mancha)
<i>Calathea zebrina</i> (Sims) Lindl.	Marantaceae	Calateia-zebra	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-7	Hemi.	Herbácea	Z10	C16(grupo)
<i>Callisia fragrans</i> (Lindl.) Wood.	Commelinaceae	Calisia	Neotropical	Perenifólio	1-12	3-4	Hemi.	Herbácea trepadora	Z10	C2, C17, C32 (grupo)
<i>Callisia repens</i> L.	Commelinaceae	Calisia	Neártico; Neotropical	Perenifólio	1-12	3-4	Hemi.	Herbácea trepadora	Z9	C3(grupo)
<i>Callistemon citrinus</i> (Curtis) Skeels	Myrtaceae	Martinete	Australiano	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z8	C17A(5), C25(2), C27(4)
<i>Callistemon viminalis</i> (Sol. ex Gaertn.) G. Don ex Loud.	Myrtaceae	Martinete-chorão	Australiano	Perenifólio	1-12	3-7	Micro.	Arbusto	Z9	C17A(2), C27(1), C28(2), C37(1)
<i>Canna indica</i> L.	Cannaceae	Canas-da-índia; Bananeiras-de- flor	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Geófito	Herbácea	Z9	C2A, C17,C36 (grupo)
<i>Canna iridiflora</i> Ruiz & Pav.	Cannaceae	Canas-da-índia; Bananeiras-de- flor	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Geófito	Herbácea	Z9	C14(2)
<i>Canna x generalis</i> L. H. Bail.	Cannaceae	Canas-da-índia; Bananeiras-de- flor	Hortícola	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z9	C4, C9, C12, C14, C15, C19, C23, C27, C36, C37, C38 (grupo)
<i>Cardiospermum grandiflorum</i> Sw.	Sapindaceae	Corriola-dos- balões	Africotropical; Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z10	C2 (grupo)
<i>Carissa macrocarpa</i> (Ecklon) A. DC.	Apocynaceae	Carissa	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-6	Micro.	Arbusto	Z9	C4(1)
<i>Caryota maxima</i> Bl.	Palmae	Palmeira-rabo-de- peixe	Indomalaio	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Micro.	Árvore	Z10	C31(1)
<i>Catharanthus roseus</i> (L.) G. Don.	Apocynaceae	Catarantos; Maravilhas;	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Herbácea	Z10	C9, C23 (grupo)
<i>Centradenia inaequalateralis</i> G. Don.	Melastomataceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C1, C11, C17A, C33 (grupo)
<i>Centranthus ruber</i> (L.) DC.	Valerianaceae	Rosa-da-rocha; Alfinetes	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Caméfito	Herbácea	Z5	C11, C12, C18 (grupo)
<i>Cestrum aurantiacum</i> Lindl.	Solanaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z11	C18(1), C34(grupo)
<i>Cestrum elegans</i> (Brongn.) Soidl.	Solanaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C22(grupo)
<i>Cestrum fasciculatum</i> (Soidl.) Miers.	Solanaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C11(1), C33(1)
<i>Cestrum nocturnum</i> L.	Solanaceae	Galã-da-noite	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-12	Micro.	Arbusto	Z11	C18(1), C33(grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Chamaerops humilis</i> L.	Palmae	Palmeira-das-vassouras	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-5	Micro.	Arbusto	Z9	C27(1)
<i>Chasmanthe aethiopica</i> (L.) N. E. Br.	Iridaceae	Antoliza	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	11-3	Geófito	Herbácea	Z9	C33(grupo)
<i>Chlorophytum comosum</i> (Thumb.) Jacques	Liliaceae (Anthericaceae)	Fitinhas	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z9	C4, C9, C18(grupo)
<i>Chrysalidocarpus lutescens</i> (Bory) Wendl.	Palmae	Palmeira- amarela; Palmeira- borboleta	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	6-7	Micro.	Arbusto	Z10	C1(1), C8(1), C26(1), C33(1), C34(2)
<i>Cinnamomum camphora</i> (L.) Sieb.	Lauraceae	Canforeira	Paleártico; Indomalaio	Perenifólio	1-12	2-4	Meso.	Árvore	Z10	C3(5), C9(1), C27(1), C33(1)
<i>Cissus antarctica</i> Vent.	Vitaceae	Vinha-virgem	Australiano	Perenifólio	1-12	4-7	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z9	C9(1), C28(1)
<i>Clerodendrum philippinum</i> Schauer	Verbenaceae	Clerodendro	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-7	Micro.	Arbusto	Z10	C18(2), C36(6)
<i>Clerodendrum thomsoniae</i> Balf. f.	Verbenaceae	Clerodendro; Lágrima-de-cristo	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	5-11	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	C7(1)
<i>Clivia miniata</i> Regel	Amaryllidaceae	Clívia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	2-11	Hemi.	Herbácea	Z10	C3, C7, C16 (mancha)
<i>Clytostoma callistigioides</i> Bur. & Schum.	Bignoniaceae	Clitostoma	Neotropical	Perenifólio	1-12	3-7	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z9	C28 (1)
<i>Cocculus laurifolius</i> DC.	Menispermaceae	Cóculo	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-6	Micro.	Árvore	Z8	C4(2)
<i>Codiaeum variegatum</i> (L.) Bl. var. <i>pictum</i> (Lodd.) Muell. Arg.	Euphorbiaceae	Crótone	Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z11	C3(4), C7(1), C18(1), C19(3)
<i>Coprosma repens</i> A. Rich.	Rubiaceae	Coprosma; Doiradinha	Antártico; Australiano	Perenifólio	1-12	4-5	Micro.	Arbusto	Z9	C16(1), C19(2), C25(1), C33(1)
<i>Coprosma x kirkii</i> Chesem.	Rubiaceae	Coprosma	Hortícola	Perenifólio	1-12	4-5	Nano.	Arbusto	Z8	C2A, C34(grupo)
<i>Cordyline australis</i> (Forst.) Endl.	Agavaceae	Cordilina	Antártico	Perenifólio	1-12	4-6	Micro.	Árvore	Z9	C1(1), C8(2), C17A(12), C26(11), C28(2), C30(1), C33(5)
<i>Cordyline stricta</i> (Sims) Endl.	Agavaceae	Cordiline	Australiano	Perenifólio	1-12	1-6	Nano.	Arbusto	Z10	C8(1), C20(1), C21(2), C26(1), C28(grupo), C30(1), C33(grupo)
<i>Cordyline terminalis</i> (L.) Kunth.	Agavaceae	Árvore-dos-reis	Indomalaio; Australiano; Oceânia; Antártico	Perenifólio	1-12	11-5	Micro.	Arbusto	Z10	C1(1), C7(>20), C11(15), C20(2), C21(3), C23(4), C33(5)
<i>Cotyledon orbiculata</i> L.	Crassulaceae		Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-3	Nano.	Arbusto suculento	Z10	C26(1), Terraço (grupo)
<i>Crassula multicava</i> Lem.	Crassulaceae	Crássula	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea suculenta	Z10	C26(grupo)
<i>Crassula ovata</i> (Mill.) Druce.	Crassulaceae	Ensaio-branco ; Planta-de-jade	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	11-3	Nano.	Arbusto suculento	Z10	C26(3), Terraço (1)
<i>Crassula perforata</i> Thunb.	Crassulaceae		Áfricotropical	Perenifólio	1-12	12-2	Hemi.	Herbácea suculenta	Z10	C26 (grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Crassula tetragona</i> L.	Crassulaceae	Pinheirinho	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	6-8	Nano.	Arbusto suculento	Z10	C26(2)
<i>Crinum moorei</i> Hook. f.	Amaryllidaceae	Crino	Áfricotropical	Sazonal	11-9	4-8	Geófito	Herbácea	Z8	C1, C3, C4, C8, C17, C28, C33(grupo)
<i>Crocasmia x crocosmiflora</i> (Burb. & Dean) N.E. Br.	Iridaceae	Monbrécias; Hastes-de-são- jósé	Hortícola	Perenifólio	1-12	5-9	Geófito	Herbácea	Z7	C33(grupo)
<i>Ctenanthe lubbersiana</i> (E. Morr.) Eichl.	Marantaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	4-8	Hemi.	Herbácea	Z10	C3(grupo)
<i>Ctenanthe oppenheimiana</i> (C. J. Morren) K. Schum.	Marantaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	4-8	Hemi.	Herbácea	Z10	C3, C9, C23, C33 (grupo)
<i>Ctenanthe setosa</i> Eichler	Marantaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	3-7	Hemi.	Herbácea	Z10	C9, C28, C33 (grupo)
<i>Cuphea hyssopifolia</i> HBK.	Lythraceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C11, C28, C30, C31(grupo)
<i>Cuphea micropetala</i> HBK.	Lythraceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	4-8	Nano.	Arbusto	Z9	C19, C28, C30, C33, C37 (grupo)
<i>Cupressus sempervirens</i> L.	Cupressaceae	Cipreste	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-2	Micro.	Árvore	Z8	C7(1), C22(1)
<i>Cyathea cooperi</i> (F. Mueller) Domin.	Cyatheaceae	Feto arbóreo	Australiano	Perenifólio	1-12	-----	Micro.	Árvore	Z10	C8(1), C18(2)
<i>Cymbidium insigne</i> Rolfe	Orchidaceae	Orquídea-de- haste; Cimbídio	Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-6	Hemi.	Herbácea	Z9	C7(grupo)
<i>Cyperus involucratus</i> Rottb.	Cyperaceae		Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C3, C14, C23, C36 (grupo)
<i>Cyrtomium falcatum</i> (L. f.) Presl.	Dryopteridaceae	Feto-azevinho	Paleártico; Indomalaio; Áfricotropical; Oceânia	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z9	C7(grupo)
<i>Datura metel</i> L.	Solanaceae	Datura	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-7	Nano.	Herbácea	Z9	C23(1)
<i>Delonix regia</i> (Bojer) Raf.	Leguminosae (Caesalpinoideae)	Acácia-rubra	Áfricotropical	Caducifólio	6-3	7-9	Micro.	Árvore	Z11	C31(1)
<i>Deparia petersenii</i> (Kunze) M. Kato.	Woodsiaceae	Feto	Indomalaio; Paleártico; Australiano; Oceânia; Antártico	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z9	C7, C18, C20, C23, C36 (grupo)
<i>Dichorisandra thyrsiflora</i> Mikan.	Commelinaceae	Dicorisandra	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C8(1), C23(3), C33(2)
<i>Dicksonia antarctica</i> Labill.	Dicksoniaceae	Feto Arbóreo	Australiano	Perenifólio	1-12	-----	Micro.	Árvore	Z8	C18(1)
<i>Dicliptera suberecta</i> (André) Bremek.	Acanthaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	5-8	Nano.	Arbusto	Z8	C33, C34 (grupo)
<i>Dietes iridioides</i> (L.) Klatt.	Iridaceae	Dietes	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-5	Geófito	Herbácea	Z9	C9, C11, C31(grupo)
<i>Dombeya cacuminum</i> Hochr..	Sterculiaceae	Dombeia; Aurora	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-4	Micro.	Árvore	Z10	C3(1), C4(1), C8(1), C18(2)
<i>Doryanthes palmeri</i> W. Hill.	Agavaceae	Doriantes	Australiano	Perenifólio	1-12	3-6	Hemi.	Herbácea	Z10	C31(1)
<i>Dracaena deremensis</i> Engl.	Agavaceae	Dracena	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	11-12	Micro.	Arbusto	Z11	C8(2), C9(1), C33(2)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Dracaena draco</i> L. ssp. <i>draco</i>	Agavaceae	Dragoeiro	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-6	Micro.	Árvore	Z11	C3(1), C19(1), C26(2), C28(13)
<i>Dracaena fragrans</i> (L.) Ker- Gawl.	Agavaceae	Dracena	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	11-12	Micro.	Arbusto	Z12	C17(1), C19, C20(1), C21(1), C33(1)
<i>Dracaena marginata</i> Lam.	Agavaceae	Dracena	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu**	Micro.	Arbusto	Z11	C1(3), C23(4)
<i>Dracaena reflexa</i> (Decne.) Lam.	Agavaceae	Dracena	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	4-5	Micro.	Arbusto	Z10	C33(2)
<i>Drimiopsis maculata</i> Lindl. & Paxt.	Liliaceae		Áfricotropical	Perenifólio	1-12	4-8	Geófita	Herbácea	Z10	C23(1)
<i>Duchesnea indica</i> (Andrews) Focke.	Rosaceae	Morangueiro- selvagem	Paleártico; Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea trepadora	Z6	C11, C28, C33 (mancha)
<i>Duranta erecta</i> L.	Verbenaceae	Duranta	Neotropical	Perenifólio	1-12	7-1	Micro.	Arbusto	Z10	C4(1), C35(grupo)
<i>Echeveria elegans</i> Rose.	Crassulaceae	Rosa-mexicana	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-9	Caméfito	Herbácea suculenta	Z8	Terraço (grupo)
<i>Echeveria pulvinata</i> Rose	Crassulaceae	Echevéria	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-6	Caméfito	Herbácea suculenta	Z9	Terraço (grupo)
<i>Echinocactus grusonii</i> Hildm.	Cactaceae	Almofada-de-sogra	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-8	Caméfito	Herbácea suculenta	Z9	Terraço (grupo)
<i>Echium nervosum</i> Dryand.	Boraginaceae	Massaroco	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-3	Nano.	Arbusto	Z11	C33(1)
<i>Emilia coccinea</i> (Sims) D. Don.	Compositae	Emilia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Herbácea	Z11	C30(grupo)
<i>Epipremnum aureum</i> (Lind. & André)	Araceae		Oceânia	Perenifólio	1-12	6-8	Fane.trep.	Herbácea trepadora	Z10	C5(1), C9(4), C17(grupo), C18(grupo), C37(grupo)
<i>Erica arborea</i> L.	Ericaceae	Urze-arbórea; Urze-molar; Betouro	Paleártico	Perenifólio	1-12	12-3	Micro.	Arbusto	Z8	C18(1)
<i>Erigeron karvinskianus</i> D.C.	Compositae	Intrometidas; Floricos; Margaridas	Neotropical	Perenifólio	1-12	3-11	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z7	C11(mancha)
<i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl.	Rosaceae	Nespereira	Paleártico	Perenifólio	1-12	10-12	Micro.	Árvore	Z8	C8(5), C18(1), C19(1), C33(1)
<i>Erythrina crista-galli</i> L.	Leguminosae (Papilionoideae)	Coraleira; Coralina-crista-de- galo	Neotropical	Marcescente	4-3 (12-3)	4-1	Micro.	Árvore	Z8	C16(2), C19(1)
<i>Erythrina lysistemon</i> Hutch.	Leguminosae (Papilionoideae)	Coralina	Áfricotropical	Marcescente	5-4 (12-4)	12-5	Micro.	Árvore	Z10	C18(1)
<i>Escallonia rosea</i> Griseb.	Grossulariaceae	Escalónia-cor-rosa	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-1	Micro.	Arbusto	Z9	C4(1), C13(1)
<i>Eucalyptus calophylla</i> R. Br. ex Lindl.	Myrtaceae	Eucalipto	Australiano	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Árvore	Z10	C22(1)
<i>Eucalyptus ficifolia</i> F. Muell.	Myrtaceae	Eucalipto-de-flor- vermelha	Australiano	Perenifólio	1-12	1-12	Meso.	Árvore	Z9	C22(1), C33(1)
<i>Eucalyptus kruseana</i> F. Mueller	Myrtaceae	Eucalipto	Australiano	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C23(1)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Eugenia uniflora</i> L.	Myrtaceae	Pitangueira	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Árvore	Z10	C2A(3), C17(1), C18(1), C33(1)
<i>Euphorbia cotinifolia</i> L.	Euphorbiaceae	Eufórbia	Neotropical	Caducifólio	3-12	7-11	Micro.	Árvore	Z11	C2A(1), C28(4)
<i>Euphorbia ingens</i> E. Mey.	Euphorbiaceae	Eufórbia-gigante	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	10-12	Micro.	Arbusto suculento	Z9	C30(1)
<i>Euphorbia milii</i> Desmoul.	Euphorbiaceae	Mira-mira-não-me-toques	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	Terraço (grupo)
<i>Euphorbia nerifolia</i> L.	Euphorbiaceae	Eufórbia	Indomalaio; Oceânia	Perenifólio	1-12	3-7	Micro.	Arbusto suculento	Z10	C26(1)
<i>Euphorbia piscatoria</i> Ait.	Euphorbiaceae	Figueira-do-inferno	Paleártico	Caducifólio	9-6	4-6	Micro.	Arbusto suculento	Z10	C28(1)
<i>Euphorbia pulcherrima</i> Willd. ex Klotzsch.	Euphorbiaceae	Manhã-de-páscoa	Neotropical	Caducifólio	5-2	10-3	Micro.	Arbusto	Z10	C23(1), C33(1)
<i>Euphorbia trigona</i> Mill.	Euphorbiaceae	Eufórbia	Africotropical	Perenifólio	1-12	6-8	Micro.	Arbusto suculento	Z10	C26(1), Terraço (3)
<i>Euryops chrysanthemoides</i> (DC.) R. Nordenstam	Compositae	Estreleira-amarela	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z9	C33(2)
<i>Euryops pectinatus</i> (L.) Cass.	Compositae	Estreleira-amarela	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z9	C18(grupo)
<i>Fabiana imbricata</i> Ruiz & Pav.	Solanaceae	Fabiana	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-9	Nano	Arbusto	Z8	C18(grupo)
<i>Farfugium japonicum</i> (L.) Kitam.	Compositae	Patás-de-cavalo; Boinas	Paleártico	Perenifólio	1-12	7-3	Hemi.	Herbácea	Z7	C3(grupo), C8(2), C9(grupo)
<i>Felicia amelloides</i> (L.) Voss.	Compositae	Felícia; Margarida-azul	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z9	C33(grupo)
<i>Ficus benjamina</i> L.	Moraceae	Figueira-da-índia	Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-4	Micro.	Árvore	Z11	C3(1), C28(1)
<i>Ficus binnendykii</i> (Miq.) Miq.	Moraceae	Figueira-de-folha-estreita	Indomalaio	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Micro.	Árvore	Z11	C8(1)
<i>Ficus elastica</i> Roxb. ex Homem	Moraceae	Borracheira	Indomalaio	Perenifólio	1-12	5-8	Micro.	Árvore	Z11	C7(1), C8(2), C11(1)
<i>Ficus lyrata</i> Warb.	Moraceae		Áfricotropical	Perenifólio	1-12	4-6	Micro.	Árvore	Z11	C3(2)
<i>Ficus natalensis</i> Hochst. ssp. <i>lepreurii</i> (Miq.) C. Berg.	Moraceae		Áfricotropical	Perenifólio	1-12	4-6	Micro.	Árvore	Z10	C37(1)
<i>Ficus pumila</i> L.	Moraceae	Pastinha	Indomalaio; Paleártico	Perenifólio	1-12	10-12	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z8	C39(grupo)
<i>Ficus rubiginosa</i> Desf. ex Vent.	Moraceae		Australiano	Perenifólio	1-12	1-4	Micro.	Árvore	Z10	C8(1), C18(1)
<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	Umbelliferae	Funcho	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-8	Hemi.	Herbácea	Z5	C28(grupo)
<i>Freylinia lanceolata</i> (L. f.) G. Don.	Scrophulariaceae	Campainhas-de-mel	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C18(1)
<i>Fuchsia arborescens</i> Sims.	Onagraceae	Fúcsia -arbórea	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z9	C15(1)
<i>Fuchsia magellanica</i> Lam.	Onagraceae	Brincos-de-princesa; Mimos	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z7	C3(5), C4(4), C9(2), C33(grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Fuchsia triphylla</i> L.	Onagraceae	Brincos-de-princesa; Mimos	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z11	C11, C13(grupo)
<i>Furcraea bedinghausii</i> K. Koch.	Agavaceae	Piteira; Furcreia	Neotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Nano.	Árvore suculenta	Z10	C29(1), Terraço (4)
<i>Furcraea foetida</i> (L.) Haw.	Agavaceae	Piteira; Furcreia	Neotropical	Perenifólio	1-12	9-12	Hemi.	Herbácea suculenta	Z10	C26(1)
<i>Furcraea selloa</i> K. Koch. var. <i>marginata</i> Trel.	Agavaceae	Furcreia; Piteira	Neotropical	Perenifólio	1-12	8-12	Micro.	Árvore suculenta	Z10	C3(1), C9(1), Terraço (2)
<i>Gasteria pillansii</i> Kensit.	Liliaceae (Aloeaceae)	Gastéria	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	4-5	Hemi.	Herbácea suculenta	Z9	C26(3)
<i>Gazania rigens</i> (L.) Gaertn.	Compositae	Gazania	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z9	C33(mancha)
<i>Grevillea asplenifolia</i> Knight	Proteaceae	Grevílea-folha-de-feto	Australianao	Perenifólio	1-12	1-7	Micro.	Arbusto	Z8	C19(1)
<i>Grevillea banksii</i> R. Br. x <i>Grevillea bipinnatifida</i> R. Br.	Proteaceae	Grevílea	Hortícola	Perenifólio	1-12	3-7	Micro.	Arbusto	Z9	C25(2)
<i>Grevillea x semperflorens</i> F. E. Briggs ex Mullig	Proteaceae	Grevílea	Hortícola	Perenifólio	1-12	1-7	Micro.	Arbusto	Z8	C18(1), C25(1)
<i>Gunnera manicata</i> Lindl. ex André	Gunneraceae (Haloragidaceae)	Gunera-gigante	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-8	Hemi.	Herbácea	Z7	C30(1)
<i>Hardenbergia comptoniana</i> Benth.	Leguminosae (Papilionoideae)		Australiano	Perenifólio	1-12	1-6	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z9	C15(1)
<i>Hebe speciosa</i> (A. Cunn.) Ckn. & Allan	Scrophulariaceae	Verónica; Hebe	Antártico	Perenifólio	1-12	4-10	Nano.	Arbusto	Z9	C28, C33 (grupo)
<i>Hechtia dichroantha</i> Donnel Smith	Bromeliaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	7-8	Hemi.	Herbácea suculenta	Z9	Terraço (1)
<i>Hedera canariensis</i> Willd.	Araliaceae	Hera	Paleártico	Perenifólio	1-12	7-10	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	C5(1), C9(4), C10(1), C20(1), Terraço (grupo)
<i>Hedera helix</i> L.	Araliaceae	Hera	Paleártico	Perenifólio	1-12	9-10	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z5	C18(grupo)
<i>Hedychium gardnerianum</i> Ker-Gawl.	Zingiberaceae	Bananiha; Roca-de-vénus; Conteira	Paleártico; Indomalaio	Perenifólio	1-12	7-10	Hemi	Herbácea	Z9	C4, C8(grupo)
<i>Heliconia bihai</i> (L.) L.	Heliconiaceae	Helicónia	Neotropical	Perenifólio	1-12	7-11	Hemi.	Herbácea	Z11	C9(grupo), C33(1)
<i>Heliconia schiedeana</i> Klotzsch.	Heliconiaceae	Helicónia	Neotropical	Perenifólio	1-12	7-9	Hemi.	Herbácea	Z11	C2A(grupo)
<i>Hemerocallis dumortieri</i> E. Morr.	Liliaceae (Hemerocallida-ceae)	Hemerocalis; Lírio-dum-dia	Paleártico	Perenifólio	1-12	6-10	Geófito	Herbácea	Z5	C9, C11(grupo)
<i>Hemerocallis fulva</i> L.	Liliaceae (Hemerocallida-ceae)	Hemerocalis; Lírio-dum-dia	Paleártico	Perenifólio	1-12	6-10	Geófito	Herbácea	Z5	C9, C11(grupo)
<i>Hibanobambusa tranquillans</i> (Koidz.) Maruyama & H. Okamura	Gramineae	Bambu	Paleártico	Perenifólio	1-12	Não floriu**	Hemi.	Herbácea	Z8	C9 (grupo)
<i>Hibbertia scandens</i> (Willd.) Dryand.	Dilleniaceae	Hibertia	Australiano	Perenifólio	1-12	4-8	Fane.trep.	Arbusto trepador	Z9	C17A(1)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Hibiscus rosa-sinensis</i> L.	Malvaceae	Cardeais; Hibiscos; Rosa-da-china	Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C1(15), C2A(1), C4(1), C7(2), C8(>50), C10(4), C12(2), C22(2), C23(3), C39(2)
<i>Homalocladium platycladum</i> (F. Muell.) L. H. Bail.	Polygonaceae	Homaloclá-dio	Oceânia	Perenifólio	1-12	7-8	Nano.	Arbusto	Z11	C1(1), C2(2), Terraço (1)
<i>Howea forsteriana</i> (C. Moore & F. Muell.) Becc.	Palmae	Quência	Australiano	Perenifólio	1-12	1-9	Micro.	Árvore	Z10	C1(2)
<i>Hydrangea macrophylla</i> (Thunb.) Ser.	Hydrangeaceae	Hortênsias; Novelos	Paleártico	Caducifólio	3-12	5-10	Nano.	Arbusto	Z6	C4, C23 (grupo)
<i>Hylocereus triangularis</i> (L.) Britt. & Rose	Cactaceae	Rainha-da-noite; Cacto-trepador	Neotropical	Perenifólio	1-12	7-10	Fane. trep.	Arbusto trepador e suculento	Z10	C4, C26, Terraço (grupo)
<i>Hymenosporum flavum</i> (Hook.) F. Muell.	Pittosporaceae	Himenospóro	Australiano	Perenifólio	1-12	3-8	Micro.	Árvore	Z9	C4(1), C18(2)
<i>Hypoestes phyllostachya</i> Bak.	Acanthaceae	Hipoestes	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	9-12	Nano.	Arbusto	Z10	C28(1), C33(2)
<i>Impatiens hawkeri</i> Bull.	Balsaminaceae	Maravilhas	Hortícola	Sazonal	4-9	5-8	Terófito	Herbácea	Z10	C7(grupo)
<i>Impatiens walleriana</i> Hook. f.	Balsaminaceae	Maravilhas	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Herbácea	Z9	C9, C15, C23, C33, C39 (grupo)
<i>Ipomoea coccinea</i> Scheidw.	Solanaceae	Iocroma-vermelha	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-7	Micro.	Arbusto	Z10	C8(1)
<i>Ipomoea purpurea</i> (L.) Roth.	Convolvulaceae	Campainhas	Neotropical	Sazonal	1-12	1-12	Terófito	Herbácea trepadora	Z10	C30(grupo)
<i>Iresine herbstii</i> Hook.	Amaranthaceae	Iresine	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Caméfito	Herbácea	Z10	C2A, C23, C28, C33 (grupo)
<i>Iresine lindenii</i> Van Houtte	Amaranthaceae	Iresine	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Caméfito	Herbácea	Z10	C33(grupo)
<i>Iris unguicularis</i> Poir.	Iridaceae	Lírio	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Geófito	Herbácea	Z7	C8(grupo)
<i>Jacaranda mimosifolia</i> D. Don.	Bignoniaceae	Jacarandá	Neotropical	Caducifólio	5-2	4-6; 9-10	Meso.	Árvore	Z9	C4(1), C7(1), C18(6)
<i>Jasminum azoricum</i> L.	Oleaceae	Jasmineiro-branco	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-11	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z11	C28(grupo)
<i>Jasminum mesnyi</i> Hance.	Oleaceae	Jasmineiro- amarelo	Paleártico	Perenifólio	1-12	12-6	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z8	C18(1), Terraço (1)
<i>Jasminum polyanthum</i> Franch.	Oleaceae	Jasmim-dos- poetas	Paleártico	Perenifólio	1-12	2-6	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z8	C4(1), C8(1), C9(grupo), C20(1), C30(1), Terraço(1)
<i>Jatropha podagrica</i> Hook.	Euphorbiaceae	Jatrofa	Neotropical	Perenifólio	1-12	12-2	Nano.	Arbusto suculento	Z10	Terraço (1)
<i>Justicia brandegeana</i> Wassh.	Acanthaceae	Beloperone	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C7(2), C18(2)
<i>Justicia carnea</i> Lindl.	Acanthaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	5-10	Nano.	Arbusto	Z12	C4(2), C18(5), C23(1), C33(9)
<i>Kalanchoe beharensis</i> Drake.	Crassulaceae	Arbusto-de-feltro	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	12-3	Micro.	Arbusto suculento	Z11	Terraço (6)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Kalanchoe blossfeldiana</i> Poelln.	Crassulaceae	Calanchoé	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto suculento	Z11	C9(grupo)
<i>Kalanchoe delagouensis</i> Ecklon & Zeyh.	Crassulaceae	Calanchoé	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	12-9	Nano.	Arbusto suculento	Z11	Terraço (grupo)
<i>Kalanchoe fedtschenkoi</i> Hamet & Perrier.	Crassulaceae	Calanchoé	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-8	Caméfito	Arbusto suculento	Z11	C17A, C28(grupo)
<i>Kalanchoe pinnata</i> (Lam.) Pers.	Crassulaceae	Calanchoé	Neotropical; Áfricotropical; Indomalaio; Oceânia	Perenifólio	1-12	2-5	Nano.	Arbusto suculento	Z11	C13, C28, C33, Terraço (grupo)
<i>Kalanchoe thyrsiflora</i> Harv.	Crassulaceae	Calanchoé	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	12-2	Nano.	Arbusto suculento	Z11	Terraço (4)
<i>Kalanchoe tomentosa</i> Bak.	Crassulaceae	Planta-panda	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-3	Nano.	Arbusto suculento	Z11	C26(grupo)
<i>Kigelia africana</i> (Lam.) Benth.	Bignoniaceae	Árvore-das- salsichas	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	5-7	Micro.	Árvore	Z10	C18(1)
<i>Kohleria eriantha</i> (Benth.) Hanst.	Gesneriaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z11	C4(grupo)
<i>Kunzea ericoides</i> (A. Rich) J. Thomson	Myrtaceae		Australiano; Antártico	Perenifólio	1-12	6-7	Micro.	Arbusto	Z8	C27(2), C31(2), C34(2)
<i>Lampranthus blandus</i> (Haw.) Schwantes	Aizoaceae	Lamprantos; Chorão	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	3-9	Fane. trep.	Arbusto trepador e suculento	Z11	C29(grupo)
<i>Lampranthus comptonii</i> (L. Bol.) N. E. Br.	Aizoaceae	Lamprantos- branco; Chorão	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	3-8	Fane. trep.	Arbusto trepador e suculento	Z11	C29(grupo)
<i>Lantana camara</i> L.	Verbenaceae	Lantana	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C16(1), C23(1), C28(2), C34(2)
<i>Lantana montevidensis</i> (Spreng.) Briq.	Verbenaceae	Lantana	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C11(1), C20(1)
<i>Lavandula dentata</i> L. var. <i>candicans</i> Battand.	Labiatae	Alfazema; Lavanda	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z8	C11, C31(grupo)
<i>Leonotis leonurus</i> (L.) R. Br.	Labiatae	Rabos-de-leão; Orelhas-de-leão	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	3-11	Nano.	Arbusto	Z9	C2(2), C28(3), C33(4)
<i>Leptospermum scoparium</i> Forst. & Forst. cvs.	Myrtaceae	Leptospermo; Urze-de-jardim	Australiano; Antártico	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z8	C17(1), C31(6), C33(3), C34(3)
<i>Leucanthemum x superbum</i> (J. Ingram) Bergmans ex Kent	Compositae	Estrelas	Hortícola	Perenifólio	1-12	5-8	Nano.	Herbácea	Z5	C2A(grupo)
<i>Liriodendron tulipifera</i> L.	Magnoliaceae	Tulipeiro-arbóreo	Neártico	Caducifólio	4-11	4-6	Meso.	Árvore	Z4	C18(1)
<i>Livistona chinensis</i> (Jacq.) R. Br. ex Mart.	Palmae	Palmeira-de- leque-da-china	Paleártico	Perenifólio	1-12	2-5	Meso.	Árvore	Z9	C1(6), C6(1), C8(7), C36(3 – novas)
<i>Lonicera japonica</i> Thunb.	Caprifoliaceae	Madressilva	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-11	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z4	C28(grupo)
<i>Lycianthes rantonnetii</i> Carr.	Solanaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z9	C23(2), C31(1), C33(1)
<i>Mackaya bella</i> Harv.	Acanthaceae	Macaia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-7	Micro.	Arbusto	Z10	C13(1)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Magnolia grandiflora</i> L.	Magnoliaceae	Magnólia	Neártico	Perenifólio	1-12	5-8	Micro.	Árvore	Z6	C28(4), C30(1)
<i>Malvaviscus arboreus</i> Cav. var. <i>mexicanus</i> Schdl.	Malvaceae	Malvavisco	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z9	C18(1), C19(1), C30(7), C31(5), C33(1)
<i>Mandevilla x amoena</i> hort.	Apocynaceae	Dipladénia	Hortícola	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	C17A(2), C36(1)
<i>Mangifera indica</i> L.	Anacardiaceae	Mangueiro	Indomalaio	Perenifólio	1-12	11-6	Micro.	Árvore	Z11	C2A(2), C39(1)
<i>Maranta leuconeura</i> E. Morr.	Marantaceae	Maranta	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-6	Hemi.	Herbácea	Z11	C6(1)
<i>Markamia lutea</i> (Benth.) Schum.	Bignoniaceae	Marcâmia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Meso.	Árvore	Z11	C18(1)
<i>Matthiola incana</i> (L.) R. Br.	Cruciferae	Goivos	Paleártico	Sazonal	1-7	3-7	Terófito	Herbácea	Z6	C33(grupo)
<i>Melaleuca linarifolia</i> Sm.	Myrtaceae	Melaleuca	Australiano	Perenifólio	1-12	4-7	Micro.	Árvore	Z9	C33(1), C34(1)
<i>Melia azederach</i> L.	Meliaceae	Amargoseira; Mélia; Conteira; Lilás-da-índia	Paleártico; Indomalaio	Caducifólio	4-1	4-6	Micro.	Árvore	Z10	C20(1), C23(1), C33(1)
<i>Melissa officinalis</i> L.	Labiatae	Erva-cidreira	Paleártico	Perenifólio	1-12	6-8	Nano.	Herbácea	Z4	C28(grupo)
<i>Mentha spicata</i> L.	Labiatae	Hortelã-de-leite	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Herbácea	Z3	C11(grupo)
<i>Miscanthus sinensis</i> Anderss.	Gramineae		Paleártico	Perenifólio	1-12	6-8	Hemi.	Herbácea	Z4	C18, C33, C35(grupo)
<i>Monstera deliciosa</i> Liebm.	Araceae	Fruto-delicioso; Costela-de-adão	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z10	C1(1), C3(1), C8(1), C17(grupo), C27(grupo)
<i>Montanoa bipinnatifida</i> (Kunth) K. Kock	Compositae	Malmequer-arbóreo	Neotropical	Perenifólio	1-12	11-5	Micro.	Arbusto	Z10	C18(1)
<i>Musa velutina</i> Wendl. & Drude.	Musaceae	Bananeira-de-jardim	Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z9	C2(grupo)
<i>Musa x paradisiaca</i> L.	Musaceae	Bananeira-de-prata	Hortícola	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C2A, C3, C9(grupo)
<i>Nandina domestica</i> Thunb.	Berberidaceae	Nandina	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-9	Nano.	Arbusto	Z5	C18(2), C20(1)
<i>Neodypsis decaryi</i> Jumelle	Palmae	Palmeira-triangular	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	6-7	Micro.	Árvore	Z11	C18(1)
<i>Nephrolepis cordifolia</i> (L.) Presl.	Oleandraceae	Feto	Neotropical; Áfricotropical; Indomalaio; Oceânia; Australiano	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z10	C1, C2A, C4, C7, C8, C15, C17, C21 (grupo)
<i>Nerium oleander</i> L.	Apocynaceae	Sevadilha; Loendro	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-11	Micro.	Arbusto	Z9	C1(6), C8(5), C14(grupo), C33(10)
<i>Nothoscordum gracile</i> (Ait.) Steam.	Liliaceae (Alliaceae)	Alinhos	Neotropical	Sazonal	1-4	1-3	Geófito	Herbácea	Z7	C11, C31 (grupo)
<i>Ocimum basilicum</i> L.	Labiatae	Manjerição-grande	Indomalaio	Sazonal	4-9	5-9	Terófito	Herbácea	Z10	C28 (grupo)
<i>Ocotea foetens</i> (Aiton) Baill.	Lauraceae	Til	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Meso.	Árvore	Z10	C2A(8), C3(4), C9(1), C18(1), C35(1 – peq.), C39(3)
<i>Odontonema strictum</i> (Nees) Kuntze	Acanthaceae	Odontonema; Ramo-de-fogo	Neotropical	Perenifólio	1-12	8-12	Nano.	Arbusto	Z10	C3(5), C8(2), C11(8), C34(2), C39(6)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Oncidium sphacelatum</i> Lindley	Orchidaceae	Oncídio	Neotropical	Perenifólio	1-12	10-12	Epífita	Herbácea	Z11	C4(1)
<i>Ophiopogon japonicus</i> (L. f.) Ker-Gawl	Liliaceae (Convallariaceae)	Relva-do-japão	Paleártico	Perenifólio	1-12	7-9	Hemi.	Herbácea	Z8	C3, C4, C7, C16, C18, C19(mancha)
<i>Opuntia brasiliensis</i> (Willd.) Haw.	Cactaceae	Tabaibeira-do-brasil	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-8	Micro.	Árvore suculenta	Z9	C26(1), Terraço (6)
<i>Opuntia cylindrica</i> (Lam.) DC.	Cactaceae	Cacto-redondo	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-7	Micro.	Arbusto suculento	Z9	Terraço (1)
<i>Opuntia microdasys</i> (Lehm.) Pfeiff. var. <i>albispina</i>	Cactaceae	Cacto	Neártico	Perenifólio	1-12	5-7	Nano.	Arbusto suculento	Z8	Terraço(grupo)
<i>Opuntia robusta</i> Wendl. & Pfeiff.	Cactaceae	Cacto; Tabaibeira	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-7	Nano.	Arbusto suculento	Z9	Terraço (grupo)
<i>Pachypodium lamerei</i> Drake	Apocynaceae	Paquipódio	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	8-9	Micro.	Árvore suculenta	Z9	Terraço (5)
<i>Pandorea jasminoides</i> (Lindl.) Schum.	Bignoniaceae	Bignónia	Australiano	Perenifólio	1-12	4-11	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z9	C30(1)
<i>Passiflora sanguinolenta</i> Mast. & Linden	Passifloraceae	Maracujá	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-7	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	C23(1)
<i>Pelargonium graveolens</i> L' Hérit	Geraniaceae	Malva	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	3-6	Nano.	Arbusto	Z10	C31(grupo)
<i>Pelargonium odoratissimum</i> (L.) L'Hérit	Geraniaceae	Malva	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	4-8	Nano.	Arbusto	Z10	C31(grupo)
<i>Pelargonium quercifolium</i> (L.) L'Hérit.	Geraniaceae	Malva	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	2-8	Nano.	Arbusto	Z10	C11, C33(grupo)
<i>Pelargonium tomentosum</i> Jacq.	Geraniaceae	Malva	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	5-6	Caméfitas	Arbusto	Z10	C31(grupo)
<i>Pennisetum clandestinum</i> Hochst. ex Chiov.	Gramineae	Relva	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z9	C32, C33 (tapete)
<i>Pennisetum purpureum</i> Schum.	Gramineae		Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C34(grupo)
<i>Pentas lanceolata</i> (Forssk.) Deflers.	Rubiaceae	Pentas	Áfricotropical; Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C8, C23, C31 (grupo)
<i>Peperomia magnoliifolia</i> (Jacq.) Dietr.	Piperaceae	Peperómia	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-10	Caméfitas	Herbácea	Z11	C9, C26 (grupo)
<i>Persea americana</i> Mill.	Lauraceae	Abacateiro	Neotropical	Perenifólio	1-12	11-5	Micro.	Árvore	Z10	C2A(1), C9(1), C28(1), C30(1), C31(1), C33(1)
<i>Petrea volubilis</i> L.	Verbenaceae	Estrela-azul; Viuvinha	Neotropical	Perenifólio	1-12	3-12	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	C17(1)
<i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) A. W. Hill.	Umbelliferae	Salsa	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Herbácea	Z5	C28(grupo)
<i>Philadelphus coronarius</i> L.	Hydrangeaceae (Philadelphaceae)		Paleártico	Caducifólio	3-12	5-7	Micro.	Arbusto	Z5	C39(1)
<i>Philodendron bipinnatifidum</i> Endl.	Araceae	Filodendro	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-6	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	C3(4), C9(1)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Philodendron erubescens</i> K. Koch & Augustin	Araceae	Filodendro	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-6	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z11	C3(1), C7(grupo), C17(1)
<i>Philodendron mayoi</i> E. G. Gonç.	Araceae	Filodendro	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-6	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z11	C23(1)
<i>Philodendron pinnatifidum</i> Schott.	Araceae	Filodendro	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-6	Hemi.	Arbusto	Z11	C17(grupo)
<i>Phlebodium aureum</i> (L.) Sm.	Polypodiaceae	Polipódio-dourado	Neártico; Neotropical	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z10	C33(grupo)
<i>Phoenix canariensis</i> Chabaud.	Palmae	Palmeira-das-Canárias	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-3	Meso.	Árvore	Z11	C26(1), C28(1), C33(1)
<i>Phoenix reclinata</i> Jacq.	Palmae	Tamareira-do-senegal	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	5-7	Micro.	Árvore	Z11	C26(1), C27(1)
<i>Phoenix roebelinii</i> O' Brien.	Palmae	Palmeira-anã	Indomalaio	Perenifólio	1-12	5-7	Micro.	Árvore	Z11	C4(2), C5(4), C6(6), C7(7), C9(3), C16(4), C17A(1), C26(5)
<i>Phormium tenax</i> Forst. & Forst. f.	Agavaceae	Espadana	Antártico	Perenifólio	1-12	6-8	Hemi.	Herbácea	Z8	C8(grupo), C17(4), C25(1), C26(3), C36(2), C39(1)
<i>Phyllanthus tenellus</i> Roxb.	Euphorbiaceae	Quebra-pedra	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Herbácea	Z11	C26(grupo)
<i>Phyllostachys aurea</i> (Carr.) A. & C. Riv.	Gramineae	Bambu	Paleártico	Perenifólio	1-12	Não floriu**	Hemi.	Herbácea	Z6	C8(grupo)
<i>Phyllostachys bambusoides</i> Sieb. & Zucc.	Gramineae	Bambu	Paleártico	Perenifólio	1-12	Não floriu**	Hemi.	Herbácea	Z8	C2(grupo)
<i>Phyllostachys edulis</i> (Carr.) Houz.	Gramineae	Bambu	Paleártico	Perenifólio	1-12	Não floriu**	Hemi.	Herbácea	Z8	C8(grupo)
<i>Phyllostachys nigra</i> (Lodd. Ex Lindl.) Munro	Gramineae	Bambu-negro	Paleártico	Perenifólio	1-12	Não floriu**	Hemi.	Herbácea	Z5	C2, C8(grupo)
<i>Phytolacca dioica</i> (L.) Moq.	Phytolaccaceae	Bela-sombra	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-9	Meso.	Árvore	Z11	C2A(1)
<i>Pilea cadierei</i> Gagnep. & Guillaum.	Urticaceae	Planta-do-alumínio	Indomalaio	Perenifólio	1-12	10-12	Hemi.	Herbácea	Z11	C12(mancha)
<i>Pilea microphylla</i> (L.) Liebm.	Urticaceae	Arrozinho	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C33(mancha)
<i>Pilea nummularifolia</i> (Sw.) Wedd.	Urticaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	6-10	Hemi.	Herbácea	Z10	C4, C7, C17, C18 (grupo)
<i>Pimpinella anisum</i> L.	Umbelliferae	Anis; Erva-doce	Paleártico	Sazonal	3-9	6-8	Terófito	Herbácea	Z6	C28(grupo)
<i>Pithecoctenium crucigerum</i> (L.) A. Gentry	Bignoniaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	3-6	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	C18(2), C19(1)
<i>Pittosporum tenuifolium</i> Banks & Sol.	Pittosporaceae	Pitóspero	Antártico	Perenifólio	1-12	4-5	Micro.	Árvore	Z9	C33(1)
<i>Pittosporum tobira</i> Ait.	Pittosporaceae	Tobira	Paleártico	Perenifólio	1-12	2-5	Micro.	Árvore	Z9	C4(sebe), C7(sebe), C20(1)
<i>Plantago major</i> L.	Plantaginaceae	Plantago-maior	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-8	Hemi.	Herbácea	Z6	C30(grupo)
<i>Plectostachys serphyllifolia</i> (A. Bergerr) Hilliard & B. L. Burt.	Compositae		Áfricotropical	Perenifólio	1-12	3-6	Nano.	Arbusto	Z9	C31(grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Plectranthus argentatus</i> S. T. Blake	Labiatae		Australiano	Perenifólio	1-12	3-8	Nano.	Arbusto	Z10	C33(3)
<i>Plectranthus forsteri</i> Benth.	Labiatae	Plectratos	Australiano; Oceânia	Perenifólio	1-12	6-11	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z10	C12, C22, C35 (grupo)
<i>Plectranthus fruticosus</i> L' Hérít.	Labiatae		Áfricotropical	Perenifólio	1-12	6-7	Nano.	Arbusto	Z9	C33(3)
<i>Plectranthus saccatus</i> Benth.	Labiatae		Áfricotropical	Perenifólio	1-12	4-7	Nano.	Arbusto	Z10	C33, C38(grupo)
<i>Pleiblastus variegatus</i> (Sieb. Ex Miq.) Mak.	Gramineae	Bambu-variegado	Hortícola	Perenifólio	1-12	Não floriu**	Hemi.	Herbácea	Z7	C1, C2, C8(grupo)
<i>Plumbago auriculata</i> Lam.	Plumbaginaceae	Plumbago	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z9	C4(1), C8(1), C18(1), C34(1), C35(1)
<i>Plumeria rubra</i> L. var. <i>acutifolia</i> (Poir.) Woodson.	Apocynaceae	Planta-dos-dentes	Neotropical	Caducifólio	5-1	6-12	Micro.	Árvore	Z10	C28(2)
<i>Podocarpus salignus</i> D. Don.	Podocarpaceae	Podocarpo	Neotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu**	Micro.	Árvore	Z8	C2A (6 – pequenos)
<i>Podranea ricasoliana</i> (Tanf.) Sprague.	Bignoniaceae	Ricassoliana	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	4-10	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z9	C23, C24(grupo)
<i>Polygala myrtifolia</i> L.	Polygalaceae	Polígala	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z9	C8(1), C11(3), C13(2), C17(1), C20(2)
<i>Polygonum capitatum</i> Buch.-Ham. ex D. Don	Polygonaceae	Polígono-de-jardim	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z8	C18, C19, C38 (mancha)
<i>Portulacaria afra</i> Jacq.	Portulacaceae	Portulacária	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu**	Nano.	Arbusto suculento	Z9	C4(2), C25(1), C26(1)
<i>Pseudogynoxys chenopodioides</i> (Kunth.) Cabr.	Compositae	Malmequer-trepador	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	C16(grupo)
<i>Pseudosasa japonica</i> (Sieb. & Steud.) Mak. ex Nak.	Gramineae	Bambu	Paleártico	Perenifólio	1-12	Não floriu**	Hemi.	Herbácea	Z6	C1, C2, C8, C39 (grupo)
<i>Psidium guajava</i> L.	Myrtaceae	Goiabeira	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-7	Micro.	Árvore	Z10	C11(1), C12(1)
<i>Pteris vittata</i> L.	Pteridaceae	Feto	Paleártico; Indomalaio; Australiano; Oceânia	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z9	C33(grupo)
<i>Punica granatum</i> L.	Punicaceae	Romãzeira	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-7	Micro.	Árvore	Z9	C9(1), C11(1), C30(2)
<i>Pyracantha angustifolia</i> (Franch.) Schneid.	Rosaceae	Perinhos; Sarça-ardente	Paleártico	Perenifólio	1-12	2-6	Micro.	Arbusto	Z7	C33(1)
<i>Pyrostegia venusta</i> (Ker-Gawl.) Miers	Bignoniaceae	Gaitinhas	Neotropical	Perenifólio	1-12	11-5	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	C2A(1), C8(1), C16(1), C19(1)
<i>Radermachera sinica</i> (Hance) Hemsl.	Bignoniaceae	Árvore-serpente; Boneca-da-china	Indomalaio	Perenifólio	1-12	6-8	Micro.	Árvore	Z10	C1(1), C2(1)
<i>Ravenea rivularis</i> Jum & Perrier	Palmae	Palma-augusta	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Micro.	Árvore	Z11	C17A(3)
<i>Reinwardtia indica</i> Dumort.	Linaceae		Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z9	C11(2), C16(3)
<i>Rhaphiolepis umbellata</i> (Thunb.) Mak.	Rosaceae		Paleártico	Perenifólio	1-12	10-4	Nano.	Arbusto	Z8	C17(2), C17A(1)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Rhipsalis goebeliana</i> Backeb.	Cactaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	6-7	Epífita	Herbácea suculenta	Z10	C28(1)
<i>Rhododendron mucronatum</i> G. Don.	Ericaceae	Azálea-japonesa	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z5	C7 (20)
<i>Rivina humilis</i> L.	Phytolaccaceae	Planta-vermelha	Neártico; Neotropical	Perenifólio	1-12	5-10	Nano.	Herbácea	Z9	C2A(2)
<i>Rohdea japonica</i> (Thunb.) Roth	Liliaceae		Paleártico	Perenifólio	1-12	5-6	Hemi.	Herbácea	Z7	C9(2)
<i>Roldana petasites</i> (Sims) H. Robinson & Bretell.	Compositae	Senécio	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-4	Micro.	Arbusto	Z9	C3(1), C28(grupo), C30(1), C32(1), C33(1)
<i>Rosa banksiae</i> Ait.	Rosaceae	Roseira	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z7	C18(grupo)
<i>Rosa chinensis</i> Jacq. f. <i>mutabilis</i> (Correv.) Rehd.	Rosaceae	Roseira	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z7	C8(2), C18(1)
<i>Rosa laevigata</i> Michx.	Rosaceae	Roseira	Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z7	C12(1), C18(grupo)
<i>Rosa x damascena</i> Mill. var. <i>semperflorens</i> (Duhamel) Rowley	Rosaceae	Rosa-de-quatro- estações	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z4	C18(grupo)
<i>Rosmarinus officinalis</i> L.	Labiatae	Alecrim	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z6	C2(grupo), C13(1)
<i>Ruellia makoyana</i> hort. Makoy ex Closon	Acanthaceae	Ruélia	Neotropical	Perenifólio	1-12	9-12	Nano.	Herbácea	Z10	C9, C33 (grupo)
<i>Ruscus hypophyllum</i> L.	Liliaceae (Asparagaceae)	Ruscus	Paleártico	Perenifólio	1-12	11-12	Nano.	Herbácea	Z8	C7(grupo)
<i>Russelia equisetiformis</i> Scdl. & Cham.	Scrophulariaceae	Russélia ; Lágrimas-de-amor	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z9	C1, C16, C27, C28, C30 (grupo)
<i>Sabal palmetto</i> (Walt.) Lodd. ex Schult. & Schult. f.	Palmae	Palmeira-da- carolina	Neártico	Perenifólio	1-12	6-8	Micro.	Árvore	Z8	C17(1), C19(1), C26(1)
<i>Saccharum officinarum</i> L.	Gramineae	Cana-sacarina; Cana-de-açúcar	Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-3	Hemi.	Herbácea	Z9	C33(grupo)
<i>Salvia africana-lutea</i> L.	Labiatae	Sálvia-amarela	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	4-7	Nano.	Arbusto	Z9	C12(1)
<i>Salvia chamaedryoides</i> Cav.	Labiatae	Sálvia-azul	Neártico	Perenifólio	1-12	5-8	Nano.	Arbusto	Z8	C23, C33 (grupo)
<i>Salvia coccinea</i> Juss. ex Murray	Labiatae	Sálvia	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Herbácea	Z8	C23(grupo)
<i>Salvia guaranitica</i> St.-Hil. ex Benth.	Labiatae	Sálvia	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z9	C4, C11, C20, C23, C28, C31 (grupo)
<i>Salvia leucantha</i> Cav.	Labiatae	Sálvia-branca	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z9	C11, C20 (grupo)
<i>Sansevieria splendens</i> Stapf	Agavaceae	Língua-de-sogra	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	8-11	Hemi.	Herbácea	Z10	C26(grupo)
<i>Sansevieria trifasciata</i> Prain var. <i>laurentii</i> (De Wild.) N. E. Br.	Agavaceae	Língua-de-sogra	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	8-11	Hemi.	Herbácea	Z10	C4, C22, C24(grupo)
<i>Sansevieria trifasciata</i> Prain.	Agavaceae	Língua-de-sogra	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	8-11	Hemi.	Herbácea	Z10	C26, C28, Terraço(grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Santolina pinnata</i> Viv. ssp. <i>neapolitana</i> (Jordan & Fourr.) Guinea.	Compositae	Santolina	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-8	Nano.	Arbusto	Z7	C34, Terraço (grupo)
<i>Schefflera actinophylla</i> (Endl.) Harms	Araliaceae	Brassaia	Australiano; Oceânia	Perenifólio	1-12	8-10	Meso.	Árvore	Z10	C3(2), C8(2), C17(3), C35(1)
<i>Schefflera arboricola</i> (Hayata) Hayata	Araliaceae	Cheflera	Indomalaio	Perenifólio	1-12	2-4; 7-8	Micro.	Arbusto	Z10	C8(2), C28(5), C30(1)
<i>Schefflera elegantissima</i> (Veitch ex Mast.) Lowry & Frodin	Araliaceae	Falsa-arália	Oceânia	Perenifólio	1-12	11-2	Micro.	Arbusto	Z10	C8(2), C17(1)
<i>Schefflera pueckleri</i> (K. Koch) Frodin.	Araliaceae	Cheflera	Indomalaio	Perenifólio	1-12	5-6	Micro.	Árvore	Z10	C33(3)
<i>Schinus molle</i> L. non hort. ex Engl.	Anacardiaceae	Pimenteira-bastarda; Pimenteira-da-índia	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Meso.	Árvore	Z9	C18(4), C35(1), C39(4)
<i>Schotia brachypetala</i> Sonder.	Leguminosae (Caesalpinioideae)	Scótia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	2-5	Micro.	Árvore	Z9	C4(1)
<i>Sedum aytacianum</i> J. Metzger	Crassulaceae	Arrozinho	Paleártico	Perenifólio	1-12	6-7	Caméfito	Herbácea suculenta	Z7	C26(grupo)
<i>Senecio cineraria</i> DC.	Compositae	Senécio	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-8	Nano.	Arbusto	Z8	C3, C11, C12, C28 (grupo)
<i>Senecio serpens</i> G. Rowley	Compositae	Bálsamo-camudo; Bálsamo-de-canudo	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Caméfito	Arbusto suculento	Z9	C2, C28(grupo)
<i>Senecio tamoides</i> DC.	Compositae	Senécio	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	10-6	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z9	C2A(grupo)
<i>Senna didymobotrya</i> (Fres.) Irwin & Barneby.	Leguminosae (Caesalpinioideae)	Planta-das-pipocas; Cássia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C8(1), C16(1), C19(1), C28(1)
<i>Senna spectabilis</i> (DC.) Irwin & Barneby	Leguminosae (Caesalpinioideae)	Cássia-espectacular	Neotropical	Caducifólio	3-12	7-11	Micro.	Árvore	Z10	C32(1)
<i>Sisyrinchium striatum</i> Sm.	Iridaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	5-7	Geófita	Herbácea	Z8	C11(grupo)
<i>Sobralia macrantha</i> Lindl.	Orchidaceae	Orquídea-de-cana; Sobralia	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-8	Hemi.	Herbácea	Z11	C20(grupo)
<i>Solandra maxima</i> (Sessé & Moc.) P. Green	Solanaceae	Solandra	Neotropical	Perenifólio	1-12	2-5	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	C1(2), C8(1), C27(1)
<i>Solenostemon scutellarioides</i> (L.) Codd.	Labiatae	Cóleos	Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C28(grupo)
<i>Sophora japonica</i> L.	Leguminosae (Papilionoideae)	Acácia-do-japão; Sófora-do-japão	Paleártico	Caducifólio	4-12	7-9	Micro.	Árvore	Z5	C1(5), C8(5)
<i>Sparmannia africana</i> L. f.	Tiliaceae	Espamânia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	12-8	Micro.	Arbusto	Z10	C18(2)
<i>Spathiphyllum orgiesii</i> Reg.	Araceae	Lírio-da-paz; Bandeira-branca; Espatifilo	Neotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu**	Hemi.	Herbácea	Z10	C23(1)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Spathiphyllum walisii</i> Reg.	Araceae	Lírio-da-paz; Bandeira-branca; Espatifilo	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z11	C23(grupo)
<i>Spathodea campanulata</i> Beauv.	Bignoniaceae	Chama-da- floresta; Tulipeiro- africano	Áfricotropical	Caducifólio	1-12 (Variação individual)	1-12	Micro.	Árvore	Z11	C14(1)
<i>Spiraea cantoniensis</i> Lour.	Rosaceae	Grinalda-de-noiva	Paleártico	Marcescente	3-2 (11-2)	2-9	Nano.	Arbusto	Z6	Terraço (1)
<i>Stenotaphrum secundatum</i> (Walter) Kuntze	Gramineae	Relva; Relva-de-correr	Neotropical; Áfricotropical; Oceânia	Perenifólio	1-12	3-11	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z9	C28, C31, C33, C34 (tapete)
<i>Stipa tenuissima</i> Trin.	Gramineae		Neártico	Perenifólio	1-12	6-9	Hemi.	Herbácea	Z8	Terraço - grupo
<i>Strelitzia nicolai</i> Reg. & Körn.	Strelitziaceae	Estrelícia-gigante	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C17(1), C19(1), C27(2), C36(1)
<i>Strelitzia reginae</i> Bank. ex Dryand	Strelitziaceae	Estrelícia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C2, C34(grupo)
<i>Streptosolen jamesonii</i> (Benth.) Miers.	Solanaceae	Rapaziada	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z9	C1(1), C9(1), C16(1), C19(4), C33(grupo)
<i>Stromanthe sanguinea</i> (Hook.) Sonder.	Marantaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	6-7	Hemi.	Herbácea	Z10	C9(grupo)
<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassm.	Palmae	Coqueiro-de- jardim; Palmeira-rainha	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-7	Micro.	Árvore	Z10	C4(1), C17(2), C27(2), C29(3)
<i>Synadenium grantii</i> Hook. f.	Euphorbiaceae	Sinadénio	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	8-11	Micro.	Arbusto suculento	Z10	C26(3)
<i>Syngonium podophyllum</i> Schott.	Araceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	6-7	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z11	C9, C11, C33(grupo)
<i>Syzygium paniculatum</i> Gaertn.	Myrtaceae		Australiano	Perenifólio	1-12	6-9	Micro.	Árvore	Z10	C8(sebe - 10)
<i>Tecoma stans</i> (L.) Juss. ex HBK.	Bignoniaceae	Estenolóbio	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C8(1), C18(1)
<i>Tecomaria capensis</i> (Thunb.) Spach.	Bignoniaceae	Camarões	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C16(2), C18(2), C19(1), C25(1), C30(1), C33(1)
<i>Tetragium voinierianum</i> (Pierre ex Nichols. & Mottet) Gagnep	Vitaceae	Vinha-virgem	Indomalaio	Perenifólio	1-12	4-5	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	C8(3), C9(1), C27(1)
<i>Teucrium fruticans</i> L.	Labiatae		Paleártico	Perenifólio	1-12	12-5	Nano.	Arbusto	Z8	C12(1)
<i>Thevetia peruviana</i> (Pers.) Schum.	Apocynaceae	Tevétia	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-7	Micro.	Arbusto	Z10	C3(15), C18(4), C23(1)
<i>Thryptomene saxicola</i> (Hook) Schauer	Myrtaceae		Australiano	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z9	C18, C34 (grupo)
<i>Thunbergia erecta</i> (Benth.) Anderson	Acanthaceae	Tumbérgia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C15(grupo)
<i>Thunbergia grandiflora</i> (Roxb. ex Rottl.) Roxb.	Acanthaceae	Tumbérgia-azul	Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	C6(2), C7(1)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Thunbergia gregorii</i> S. Moore	Acanthaceae	Tumbérgia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z10	C9 (grupo)
<i>Thymus vulgaris</i> L.	Labiatae	Segurelha	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-6	Nano.	Arbusto	Z7	C28(grupo)
<i>Tibouchina grandifolia</i> Cogn.	Melastomataceae	Aranhas; Tibouchina	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C7(1), C11(1), C33(3), C34(3)
<i>Tibouchina urvilleana</i> (DC.) Cogn.	Melastomataceae	Aranhas; Tibouchina	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C11(1), C22(1), C23(1), C27(1), C33(3)
<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	Leguminosae (Papilionoideae)	Tipuana	Neotropical	Marcescente	5-4 (3-4)	4-7	Meso.	Árvore	Z9	C3(3)
<i>Trachelospermum jasminoides</i> (Lindl.) Lem.	Apocynaceae	Jasmim-de-estrela	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-11	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z8	C9(grupo)
<i>Trachycarpus fortunei</i> (Hook.) H. A. Wendl.	Palmae	Palmeira-de- moinho-de-vento	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-6	Micro.	Árvore	Z8	C8(1), C26(2), C28(1)
<i>Tradescantia luminensis</i> Vell. Conc.	Commelinaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	4-6	Hemi.	Herbácea trepadora	Z9	C11, C23, C33 (grupo)
<i>Tradescantia pallida</i> (Rose) D. Hunt.	Commelinaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea trepadora	Z8	C33 (grupo)
<i>Tradescantia spathacea</i> Sw.	Commelinaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	10-2	Hemi.	Herbácea	Z9	C17(grupo)
<i>Tradescantia zebrina</i> hort. ex. Bosse	Commelinaceae	Zebrina	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z9	C2, C4, C27 (mancha)
<i>Trochetopsis ebenus</i> Q.C.B. Cronk	Sterculiaceae	Ébano-de-santa- helenia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	7-5	Nano.	Arbusto	Z10	C29(1)
<i>Tulbaghia violacea</i> Harv.	Liliaceae (Alliaceae)	Tulbáguia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	11-6	Geófita	Herbácea	Z8	C39 (grupo)
<i>Viburnum suspensum</i> Lindl.	Caprifoliaceae	Víbarno	Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-2	Micro.	Arbusto	Z9	C3(1), C4(4), C13(1)
<i>Vinca major</i> L.	Apocynaceae	Pervinca	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea trepadora	Z7	C18(grupo)
<i>Vitex agnus-castus</i> L.	Verbenaceae	Árvore-da- castidade	Paleártico	Caducifólio	5-12	7-11	Micro.	Arbusto	Z7	C12(1)
<i>Washingtonia filifera</i> (Lind. ex André) H. A. Wendl	Palmae	Palmeira-de-leque- da- califórnia	Neártico	Perenifólio	1-12	5-8	Micro.	Árvore	Z9	C17(1), C17A(3), C18(8), C19(1), C28(1), C38(3)
<i>Washingtonia robusta</i> H. A. Wendl	Palmae	Palmeira-de-leque- mexicana	Neártico	Perenifólio	1-12	4-6	Micro.	Árvore	Z10	C8(4)
<i>Wedelia trilobata</i> (L.) Hitchc.	Compositae		Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Herbácea	Z11	C33(mancha)
<i>Westringia fruticosa</i> (Wiild.) Druce	Labiatae		Australiano	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z9	C17A(1), C18(2), C32(1), C34(1)
<i>Westringia leighii</i> Boiv.	Labiatae		Australiano	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z9	C14(1)
<i>Wisteria sinensis</i> (Sims) Sweet.	Leguminosae (Papilionoideae)	Lilases; Glicínia	Paleártico	Caducifólio	3-12	2-5; 7-8	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z5	C2(grupo), C5(1)
<i>Yucca elephantipes</i> Reg.	Agavaceae	luca-gigante	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-10	Micro.	Arbusto	Z10	C8(2), C18(1)
<i>Yucca gloriosa</i> L..	Agavaceae	luca	Neártico	Perenifólio	1-12	6-11	Micro.	Arbusto	Z7	Terraço (4)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Zantedeschia aethiopica</i> (L.) Spreng.	Araceae	Jarros	Áfricotropical	Sazonal	10-7	11-5	Geófita	Herbácea	Z8	C23 (grupo)
<i>Zoysia japonica</i> Steud.	Gramineae		Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z7	C33, C35 (tapete)

Legenda:

- Plantas que não floriram no período em estudo (Janeiro 2002 – Janeiro 2005): * plantas novas; ** plantas que nunca floriram por falta de aclimação;
- Plantas marcescentes (plantas semiperenifólias e semicaducifólias): 3-2 (**3-4**) – folhas todo o ano mas com renovação significativa em Março e Abril.

Anexo 28
CARACTERIZAÇÃO FITOGEOGRÁFICA DO JARDIM DO HOTEL QUINTA DAS VISTAS

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Abutilon pictum</i> (Gillies ex Hook. & Arn.) Walp.	Malvaceae	Abutilão	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z9	C30(6)
<i>Acalypha wilkesiana</i> Muell. Arg.	Euphorbiaceae	Acálifa	Oceânia	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C9(grupo), C13(4), C18(5), C29(1), C30(3), C35(1)
<i>Acer palmatum</i> Thunb.	Aceraceae	Ácer-vermelho-do-japão	Paleártico	Caducifólio	4-11	4	Micro.	Árvore	Z5	C23(8), C25(1), C30(1), C34(1), C36(2)
<i>Adiantum capillus-veneris</i> L.	Adiantaceae	Avenca; Avenca-das-fontes	Paleártico, Neotropical, Áfricotropical, Indomalaio	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z8	C8, C29 (grupo)
<i>Agapanthus praecox</i> Willd. ssp. <i>orientalis</i> (Leighton) Leighton	Liliaceae	Agapantos; Coroas-de-henrique	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	4-9	Hemi.	Herbácea	Z9	C1, C2, C4 (mancha)
<i>Agathis robusta</i> (C. Moore ex F. Muell.) Bail.	Araucariaceae	Pinheiro-de-damara; Pinheiro-com-folha-de-alegra-campo	Australiano	Perenifólio	1-12	3-4	Meso.	Árvore	Z9	C35(1)
<i>Agave attenuata</i> Salm-Dyck	Agavaceae	Piteira; Agave-pescoço-de-cisne	Neotropical	Perenifólio	1-12	12-3	Nano.	Árvore suculenta	Z9	C2, C13 (grupo)
<i>Albizia julibrissin</i> Durazz.	Leguminosae (Mimosoideae)	Árvore-da-seda; Albizia-de-constantinopla	Paleártico	Caducifólio	4-12	5-8	Micro.	Árvore	Z8	C14(1)
<i>Allamanda cathartica</i> L.	Apocynaceae	Alamanda; Flor-de-manteiga	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-12	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z11	C7(1), C16(6)
<i>Aloe arborescens</i> Mill.	Liliaceae (Aloeaceae)	Aloés, Babosas, Foguetes-de-natal	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	11-2	Nano.	Arbusto suculento	Z9	C9(grupo)
<i>Anredera cordifolia</i> (Ten.) Steenis	Basellaceae	Boussingaul-tia	Neotropical	Caducifólio	6-2	7-9	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z9	C30(1)
<i>Apollonias barbijana</i> (Cav.) Bomm.	Lauraceae	Barbusano	Paleártico	Perenifólio	1-12	9-3	Meso.	Árvore	Z10	C2(2)
<i>Aptenia cordifolia</i> (L. f.) Swant.	Aizoaceae	Apténia; Rosinha-de-sol	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Herbácea trepadora e suculenta	Z9	C29, C35, C36 (mancha)
<i>Araucaria columnaris</i> (Forst. f.) Hook.	Araucariaceae	Pinheiro-da-nova-caledónia; Araucária	Oceânia	Perenifólio	1-12	5-7	Macro.	Árvore	Z10	C30(1)
<i>Araucaria heterophylla</i> (Salisb.) Franco	Araucariaceae	Araucária	Oceânia	Perenifólio	1-12	2-3	Macro.	Árvore	Z9	C8(1)
<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> H. A. Wendl. & Drude.	Palmae	Palmeira- elegante	Australiano	Perenifólio	1-12	2-10	Meso.	Árvore	Z10	C15(4), C18(1), C30(1)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Asparagus densiflorus</i> (Kunth) Jassop	Liliaceae (Asparagaceae)	Esparto	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	7-8	Nano.	Herbácea	Z9	C35 (grupo)
<i>Asparagus setaceus</i> (Kunth) Jassop	Liliaceae (Asparagaceae)	Esparto-de-folha-miúda; Esparto	Africotropical	Perenifólio	1-12	9-12	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z9	C2, C6, C24 (grupo)
<i>Aucuba japonica</i> Thunb.	Comaceae (Aucubaceae)	Aucuba	Paleártico; Indomalaio	Perenifólio	1-12	2-4	Micro.	Arbusto	Z7	C30(2)
<i>Bambusa vulgaris</i> Schräd. ex Wendl.	Gramineae	Bambu	Paleártico; Indomalaio	Perenifólio	1-12	Não floriu**	Hemi.	Herbácea	Z10	C4, C10, C30 (grupo)
<i>Begonia minor</i> Jacq.	Begoniaceae	Corações; Begónias	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C3, C7, C9, C29 (grupo)
<i>Bergenia crassifolia</i> (L.) Fritsch.	Saxifragaceae	Bergénia; Couve-de-jardim	Paleártico	Perenifólio	1-12	12-4	Caméfito	Herbácea	Z3	C3, C34A(grupo)
<i>Bougainvillea glabra</i> Choisy	Nyctaginaceae	Buganvília	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	C1, C2, C7 (grupo), C12(1), C13(1)
<i>Brachychiton acerifolius</i> Cunn. ex. F. Muell.	Sterculiaceae	Árvore-do-fogo	Australiano	Caducifólio	1-5; 8-12	5-8	Micro.	Árvore	Z10	C2(1)
<i>Brugmansia versicolor</i> Lagerh.	Solanaceae	Trombeteira	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C1(1)
<i>Brunfelsia pauciflora</i> (Cham. & Scltd.) Benth.	Solanaceae	Brunfêlsia; Manacá	Neotropical	Perenifólio	1-12	3-8	Micro.	Arbusto	Z10	C9(1)
<i>Bulbine frutescens</i> (L.) Willd.	Liliaceae (Asphodelaceae)	Bulbine	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Geófita	Herbácea suculenta	Z9	C15, C26 (grupo)
<i>Butia capitata</i> (Mart.) Becc.	Palmae	Palmeira-da-geleia	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-8	Micro.	Árvore	Z10	C13(1)
<i>Buxus microphylla</i> Sieb. & Zucc.	Buxaceae	Buxo	Paleártico; Indomalaio	Perenifólio	1-12	3-4	Nano.	Arbusto	Z6	C35(6), C39(6)
<i>Buxus sempervirens</i> L.	Buxaceae	Buxo	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-4; 10-11	Nano.	Arbusto	Z5	C14, C25 (sebe)
<i>Callistemon rigidus</i> R. Br.	Myrtaceae	Martinete	Australiano	Perenifólio	1-12	4-8	Micro.	Arbusto	Z9	C24(2)
<i>Capsicum frutescens</i> L.	Solanaceae	Pimenteira	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-10	Nano.	Arbusto	Z9	C8(3)
<i>Carica papaya</i> L.	Caricaceae	Papaieira	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Árvore	Z10	C8 (9)
<i>Casuarina equisetifolia</i> Forst. & Forst. f.	Casuarinaceae	Casuarina	Indomalaio; Australiano; Oceânia	Perenifólio	1-12	6-11	Meso.	Árvore	Z10	C1(3), C2(1), C4(2), C5(1), C6(4), C8(2), C9(1), C10(3), C21(1), C30(3), C32(1), C36(2),
<i>Celtis australis</i> L.	Ulmaceae	Lódão-bastardo; Conteira	Paleártico	Caducifólio	4-1	5-6	Meso.	Árvore	Z8	C1(1)
<i>Centranthus ruber</i> (L.) DC.	Valerianaceae	Rosa-da-rocha; Alfinetes	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Caméfito	Herbácea	Z5	C6(grupo)
<i>Ceratonia siliqua</i> L.	Leguminosae (Caesalpinoideae)	Alfarrobeira	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-9	Micro.	Árvore	Z9	C36(1)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> (Murray) Parl.	Cupressaceae	Cedro-de- oregão	Neártico	Perenifólio	1-12	1-2	Micro.	Árvore	Z6	C4, C10, C11, C13, C19, C21, C27, C30, C35, C36 (sebe), C23(6), C24(5 podados), C29(11 podados),
<i>Chamaedorea costaricana</i> Oerst	Palmae	Palmeira-de- salão; Palmeira- bambu	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-6	Micro.	Arbusto	Z10	C13(4), C14(3), C14A(1)
<i>Chamaedorea elegans</i> Mart.	Palmae	Palmeira-de- salão; Palmeira- bambu	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-6	Micro.	Arbusto	Z10	C9(1), C1(1), C31(1)
<i>Chamaerops humilis</i> L.	Palmae	Palmeira-das- vassouras	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-5	Micro.	Arbusto	Z9	C15(1), C18(3), C36(3)
<i>Chlorophytum comosum</i> (Thumb.) Jacques	Liliaceae (Anthericaceae)	Fitinhas	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z9	C28, C32, C35 (grupo)
<i>Chorisia speciosa</i> A. St. Hil.	Bombacaceae	Sumaúma	Neotropical	Caducifólio	3-11	8-11	Meso.	Árvore	Z10	C1(1), C29(1)
<i>Chrysalidocarpus lutescens</i> (Bory) Wendl.	Palmae	Palmeira- amarela; Palmeira- borboleta	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	6-7	Micro.	Arbusto	Z10	C36(1)
<i>Clerodendrum x speciosum</i> Domb.	Verbenaceae	Clerodendro	Hortícola	Perenifólio	1-12	5-11	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	C30(8)
<i>Clethra arborea</i> Ait.	Clethraceae	Folhado	Paleártico	Perenifólio	1-12	7-8	Micro.	Árvore	Z10	C10(4), C14(3), C30(3)
<i>Codiaeum variegatum</i> (L.) Bl. var. <i>pictum</i> (Lodd) Muell. Arg.	Euphorbiaceae	Crótone	Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z11	C12(2), C13(10), C14A(4), C15(2), C31(2), C35(1), C36(4),
<i>Commelina benghalensis</i> L.	Commelinaceae	Erva-menina; Flor-dum-dia	Indomalaio Áfricotropical;	Perenifólio	1-12	3-9	Hemi.	Herbácea trepadora	Z9	C30(mancha)
<i>Cordyline australis</i> (Forst.) Endl.	Agavaceae	Cordilina	Antártico	Perenifólio	1-12	4-6	Micro.	Árvore	Z9	C10(3), C36(5)
<i>Cordyline indivisa</i> (Forst.) Steud.	Agavaceae	Cordilina	Antártico	Perenifólio	1-12	3-6	Micro.	Árvore	Z9	C1(4), C9(4), C10(14), C11(2), C12(4), C16(8)
<i>Cordyline stricta</i> (Sims) Endl.	Agavaceae	Cordilina	Australiano	Perenifólio	1-12	1-6	Nano.	Arbusto	Z10	C30(1)
<i>Cordyline terminalis</i> (L.) Kunth.	Agavaceae	Árvore-dos-reis	Indomalaio; Australiano; Oceânia; Antártico	Perenifólio	1-12	11-5	Micro.	Arbusto	Z10	C30(grupo)
<i>Cortaderia selloana</i> (Schult. & Schult. f.) Asch. & Gräbn.	Gramineae	Plumas; Erva-das-pampas; Penacho-branco	Neotropical	Perenifólio	1-12	7-10	Hemi.	Herbácea	Z6	C10(1), C37(1)
<i>Cottoneaster pannosus</i> Franch.	Rosaceae	Perinhos	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-5	Micro.	Arbusto	Z7	C2(1), C3(1), C24(2), C32(1)
<i>Crassula multica</i> Lem.	Crassulaceae	Crássula	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea suculenta	Z10	C24, C30 (grupo)
<i>Crassula ovata</i> (Mill.) Druce.	Crassulaceae	Ensaio-branco ; Planta-de-jade	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	11-3	Nano.	Arbusto suculento	Z10	C10, C30, C36 (grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Cupressus arizonica</i> Green.	Cupressaceae	Cedro-do-arizona	Neártico	Perenifólio	1-12	11-1	Micro.	Árvore	Z7	C11(1), C13(1), C19(1), C21(1)
<i>Cupressus lusitanica</i> Mill.	Cupressaceae	Cedro-de-goá; Cedro-das-barracas	Neártico; Neotropical	Perenifólio	1-12	1-3	Meso.	Árvore	Z9	C4(7), C6(6), C9(3), C10(3), C21(4), C24(7), C30(7), C31(1), C34(1), C34A(1), C35(1)
<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartw. ex Gordon	Cupressaceae	Cipreste-de-monterrey; Cedro-de-monterrey	Neártico	Perenifólio	1-12	1-2	Meso.	Árvore	Z8	C1(3), C11(1), C12(2), C13(4), C21(5), C30(4), C33(1), C36(2)
<i>Cupressus sempervirens</i> L.	Cupressaceae	Cipreste	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-2	Micro.	Árvore	Z8	C15(1), C17(3), C25(4), C29(6), C39(2)
<i>Cycas revoluta</i> Thunb.	Cycadaceae	Cicas-revoluta; Cicas-de-sagú	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-8	Micro.	Árvore	Z9	C15(1), C25(1), C30(1), C36(3)
<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.	Gramineae	Relva-bermuda	Cosmopolita	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z7	C13, C24, C29 (tapete)
<i>Cyperus papyrus</i> L.	Cyperaceae	Papiros	Áfricotropical; Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C14A, C14B, C24, C26 (grupo)
<i>Cyrtomium falcatum</i> (L. f.) Presl.	Dryopteridaceae	Feto-azevinho	Paleártico; Indomalaio; Áfricotropical; Oceânia	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z9	C4, C12, C29, C35 (grupo)
<i>Dasyllirion serratifolium</i> Karw. ex Schult. F.	Agavaceae		Neártico; Neotropical	Perenifólio	1-12	6-9	Nano.	Árvore	Z9	C26(6)
<i>Deparia petersenii</i> (Kunze) Kato	Woodsiaceae	Feto-de-senhora-do-japão	Indomalaio; Paleártico; Australiano; Oceânia; Antártico	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z9	C29 (grupo)
<i>Dicksonia antarctica</i> Labill.	Dicksoniaceae	Feto Arbóreo	Australiano	Perenifólio	1-12	-----	Micro.	Árvore	Z8	C24(2)
<i>Dracaena draco</i> L. ssp. <i>draco</i>	Agavaceae	Dragoeiro	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-6	Micro.	Árvore	Z11	C19(1), C20(1), C36(1)
<i>Dracaena fragrans</i> (L.) Ker-Gawl.	Agavaceae	Dracena	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	11-12	Micro.	Arbusto	Z12	C30(grupo)
<i>Dracaena marginata</i> Lam.	Agavaceae	Dracena	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu**	Micro.	Arbusto	Z11	C10(1), C14(1), C15(1)
<i>Drosanthemum floribundum</i> (Haw.) Schwantes	Aizoaceae	Arrozinho	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	5-7	Fane. trep.	Arbusto trepador e suculento	Z9	C1, C35(mancha)
<i>Duchesnea indica</i> (Andrews) Focke.	Rosaceae	Morangueiro-selvagem	Paleártico; Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea trepadora	Z6	C2(mancha)
<i>Duranta erecta</i> L.	Verbenaceae	Duranta	Neotropical	Perenifólio	1-12	7-1	Micro.	Arbusto	Z10	C29 (grupo)
<i>Echium candicans</i> L. f.	Boraginaceae	Massaroco	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-6	Micro.	Arbusto	Z10	C6, C10, C14 (grupo)
<i>Echium nervosum</i> Dryand.	Boraginaceae	Massaroco	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-3	Nano.	Arbusto	Z11	C6, C10, C14 (grupo)
<i>Ensete ventricosum</i> (Welw.) E.E. Cheesm.	Musaceae	Bananeira-da-abissínia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Terófito	Herbácea	Z10	C15(1)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Erythrina crista-galli</i> L.	Leguminosae (Papilionoideae)	Coraleira; Coralina-crista-de- galo	Afrotropical	Marcescente	4-3 (12-3)	5-12	Micro.	Árvore	Z8	C13(3), C14A(1), C22(1), C36(1)
<i>Erythrina lysistemon</i> Hutch.	Leguminosae (Papilionoideae)	Coralina	Áfrotropical	Marcescente	5-4 (12-4)	12-5	Micro.	Árvore	Z10	C30(1), C36(1)
<i>Erythrina speciosa</i> Andrews	Leguminosae (Papilionoideae)	Coralina-elegante	Neotropical	Caducifólio	4-11	12-4	Micro.	Árvore	Z10	C9(1), C30(1)
<i>Eucalyptus creba</i> F. J. Muell.	Myrtaceae	Eucalipto	Australiano	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Meso.	Árvore	Z9	C14(1)
<i>Eucalyptus ficifolia</i> F. Muell.	Myrtaceae	Eucalipto-de-flor- vermelha	Australiano	Perenifólio	1-12	1-12	Meso.	Árvore	Z9	C14(1)
<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.	Myrtaceae	Eucalipto	Australiano	Perenifólio	1-12	11-2	Meso.	Árvore	Z8	C1(1)
<i>Euonymus japonicus</i> Thunb.	Celastraceae	Verde-gaio	Paleártico	Perenifólio	1-12	11-12	Micro.	Arbusto	Z7	C9(1), C10(2), C11(6), C13(1), C30(2)
<i>Euphorbia cotinifolia</i> L.	Euphorbiaceae	Eufórbia	Neotropical	Caducifólio	3-12	7-11	Micro.	Árvore	Z11	C18(2), C29(1), C30(1), C34(1)
<i>Euphorbia ingens</i> E. Mey.	Euphorbiaceae	Eufórbia-gigante	Áfrotropical	Perenifólio	1-12	10-12	Micro.	Arbusto suculento	Z9	C2(3)
<i>Farugium japonicum</i> (L.) Kitam.	Compositae	Patas-de- cavalo; Boinas	Paleártico	Perenifólio	1-12	7-3	Hemi.	Herbácea	Z7	C36(grupo)
<i>Fatsia japonica</i> (Thunb.) Decne. & Planch.	Araliaceae	Fátsia; Arália	Paleártico	Perenifólio	1-12	11-12	Micro.	Arbusto	Z8	C38(2)
<i>Festuca glauca</i> Vill.	Gramineae	Festuca	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-6	Hemi.	Herbácea	Z3	C15(grupo)
<i>Ficus benamina</i> L.	Moraceae	Figueira-da-india- variegada	Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-4	Micro.	Árvore	Z11	C9(1), C31(2)
<i>Ficus benamina</i> L. var. <i>nuda</i> (Miq.) Barrett	Moraceae	Figueira-da-india	Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-4	Meso.	Árvore	Z11	C9(1), C31(2), C36(3)
<i>Ficus pumila</i> L.	Moraceae	Pastinha	Indomalaio; Paleártico	Perenifólio	1-12	10-12	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z8	C14, C16, C34 (grupo)
<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	Umbelliferae	Funcho	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-8	Hemi.	Herbácea	Z5	C10(grupo)
<i>Gazania rigens</i> (L.) Gaertn.	Compositae	Gazania	Áfrotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z9	C4, C5, C24, C26, C29, C35(grupo)
<i>Goniophlebium subauriculatum</i> (Bl.) Presl.	Polypodiaceae	Feto-de- metro; Feto-chorão	Indomalaio; Australiano; Oceânia	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z10	C31(grupo)
<i>Grevillea robusta</i> A. M. Cunn. Ex. R. Br.	Proteaceae	Grevillea	Australiano	Perenifólio	1-12	4-7	Meso.	Árvore	Z8	C1(2), C2(2), C5(1), C10(1)
<i>Hebe x franciscana</i> (Eastw.) Souster.	Scrophulariaceae	Verónica	Hortícola	Perenifólio	1-12	5-12	Nano.	Arbusto	Z8	C30(7)
<i>Hibiscus rosa-sinensis</i> L.	Malvaceae	Cardeais; Hibiscos; Rosa-da-china	Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C2, C9, C12, C29 (sebe) C4, C5, C6, C14 (grupo)
<i>Hibiscus syriacus</i> L.	Malvaceae	Cardeal-roxo; Hibisco-da- síria	Paleártico; Indomalaio	Caducifólio	5-11	7-9	Micro.	Arbusto	Z5	C7(1)
<i>Hydrangea macrophylla</i> (Thunb.) Ser.	Hydrangeaceae	Hortênsia; Novelos	Paleártico	Caducifólio	3-12	5-10	Nano.	Arbusto	Z6	C33, C34, C38, C39 (grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Hylocereus triangularis</i> (L.) Britt. & Rose	Cactaceae	Rainha-da-noite; Cacto-trepador	Neotropical	Perenifólio	1-12	7-10	Fane. trep.	Arbusto trepador e suculento	Z10	C29(3)
<i>Impatiens hawkeri</i> Bull.	Balsaminaceae	Maravilhas	Hortícola	Sazonal	4-9	5-8	Terófito	Herbácea	Z10	C30(grupo)
<i>Iresine herbstii</i> Hook.	Amaranthaceae	Iresine	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Caméfito	Herbácea	Z10	C24, C26 (grupo)
<i>Jacaranda mimosifolia</i> D. Don.	Bignoniaceae	Jacarandá	Neotropical	Caducifólio	6-2	4-6; 9-10	Meso.	Árvore	Z9	C9(1), C21(2)
<i>Jasminum mesnyi</i> Hance.	Oleaceae	Jasmineiro- amarelo	Paleártico	Perenifólio	1-12	12-6	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z8	C35(grupo)
<i>Jasminum polyanthum</i> Franch.	Oleaceae	Jasmim-dos- poetas	Paleártico	Perenifólio	1-12	2-6	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z8	C4(2)
<i>Juniperus cedrus</i> Webb. & Berthel. ssp. <i>maderensis</i> (Menezes) Rivas Mart. & al.	Cupressaceae	Cedro-da- madeira	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-3	Micro.	Árvore	Z10	C14(1)
<i>Juniperus horizontalis</i> Moench.	Cupressaceae		Neártico	Perenifólio	1-12	1-3	Nano.	Arbusto	Z4	C12, C30(grupo)
<i>Juniperus squamata</i> Buch- Ham. ex D. Don	Cupressaceae		Paleártico	Perenifólio	1-12	1-3	Nano.	Arbusto	Z4	C9(2), C18(3), C36(4)
<i>Lampranthus spectabilis</i> (Haw.) N.E. Br.	Aizoaceae (Mesembryanthemaceae)	Lamprantos; Chorão	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Arbusto trepador e suculento	Z11	C15, C20, C34A, C35(grupo)
<i>Laurus novocanariensis</i> Rivas Mart. & al.	Lauraceae	Loureiro	Paleártico	Perenifólio	1-12	11-3	Meso.	Árvore	Z10	C2(2), C8(1)
<i>Lavandula angustifolia</i> Mill.	Labiatae	Alfazema; Lavanda	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z6	C13(grupo)
<i>Leonotis leonurus</i> (L.) R. Br.	Labiatae	Rabos-de-leão; Orelhas-de-leão	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	3-11	Nano.	Arbusto	Z9	C9(1), C10(2), C13(4), C14A(1), C30(1)
<i>Leptospermum scoparium</i> Forst. & Forst.	Myrtaceae	Leptospermo; Urze-de-jardim	Australiano; Antártico	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z8	C12(4), C35(grupo)
<i>Ligustrum lucidum</i> Ait. f.	Oleaceae	Ligustro; Alfinheiro	Paleártico	Perenifólio	1-12	7-9	Micro.	Árvore	Z7	C1(grupo), C2(grupo), C3(1), C4(4), C6(2), C10(grupo), C13(1), C21(sebe), C29(sebe), C34(2), C36(1)
<i>Ligustrum ovalifolium</i> Hassk.	Oleaceae	Ligustro; Alfinheiro	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-7	Nano.	Arbusto	Z5	C14(1)
<i>Macfadyena unguis-cati</i> (L.) A. Gentry	Bignoniaceae	Bignónia-unha-de- gato	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-5	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z9	C4(1)
<i>Magnolia grandiflora</i> L.	Magnoliaceae	Magnólia	Neártico	Perenifólio	1-12	5-8	Micro.	Árvore	Z6	C14(1), C37(1), C38(1)
<i>Mahonia japonica</i> (Thunb.) DC.	Berberidaceae	Maónia	Paleártico; Indomalaio	Perenifólio	1-12	12-2	Micro.	Arbusto	Z6	C36(1)
<i>Mandevilla boliviensis</i> (Hook. f.) Woodson	Apocynaceae	Dipladénia-branca	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	C16(3)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLOGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Metrosideros excelsa</i> Sol. ex Gaertn.	Myrtaceae	Metrosídero; Árvore-de-natal- da-nova-zelândia	Antártico	Perenifólio	1-12	6-7	Meso.	Árvore	Z10	C10(8), C13(2), C14A(4), C32(8)
<i>Monstera deliciosa</i> Liebm.	Araceae	Fruto-delicioso; Costela-de-adão	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z10	C21, C36, C38(grupo)
<i>Musa acuminata</i> Colla	Musaceae	Bananeira	Indomalaio; Australiano	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C8, C13(grupo)
<i>Musa x paradisiaca</i> L.	Musaceae	Bananeira-de- prata	Hortícola	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C8, C13, C19(grupo)
<i>Neodypsis decaryi</i> Jumelle	Palmae	Palmeira- triangular	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	6-7	Micro.	Árvore	Z11	C13(4)
<i>Nephrolepis cordifolia</i> (L.) Presl.	Oleandraceae	Feto	Neotropical; Áfricotropical; Indomalaio; Oceânia; Australiano	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z10	C30 (grupo)
<i>Nerium oleander</i> L.	Apocynaceae	Sevadilha; Loendro	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-11	Micro.	Arbusto	Z9	C2(1), C9(3), C14(2), C34(2)
<i>Nolina recurvata</i> (Lem.) Hemsl.	Agavaceae	Nolina; Pata-de-elefante	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-8	Micro.	Árvore	Z9	C14A(1), C25(2)
<i>Ochna serrulata</i> (Hochst.) Walp.	Ochnaceae	Planta-do-rato- mickey	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	2-4	Nano.	Arbusto	Z9	C2(1), C6(4)
<i>Ocotea foetens</i> (Aiton) Baill.	Lauraceae	Til	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Meso.	Árvore	Z10	C2(14), C6(1), C10(1), C11(1), C14(1), C30(4)
<i>Ophiopogon japonicus</i> (L. f.) Ker-Gawl	Liliaceae (Convallariaceae)	Relva-do-japão	Paleártico	Perenifólio	1-12	7-9	Hemi.	Herbácea	Z8	C7, C10, C11, C12, C14, C14A, C16, C23, C25, C29, C30, C31, C34, C37 (mancha)
<i>Parthenocissus quinquefolia</i> (L.) Planch.	Vitaceae	Vinha-virgem	Neártico	Caducifólio	4-12	5-7	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z3	C30(grupo)
<i>Parthenocissus tricuspidata</i> (Sieb. & Zucc.) Planch. in DC.	Vitaceae	Vinha-virgem	Paleártico	Caducifólio	4-12	5-6	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z4	C35 (grupo)
<i>Passiflora edulis</i> Sims.	Passifloraceae	Maracujá-roxo	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-11	Fane.trep.	Arbusto trepador	Z10	C8(grupo)
<i>Pelargonium peltatum</i> (L.) L'Hérit.	Geraniaceae	Malvas	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z10	C16(10)
<i>Pelargonium zonal</i> (L.) L'Hérit	Geraniaceae	Malva	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C13(grupo), C30(1)
<i>Persea americana</i> Mill.	Lauraceae	Abacateiro	Neotropical	Perenifólio	1-12	11-5	Micro.	Árvore	Z10	C2(1)
<i>Philodendron bipinnatifidum</i> Endl.	Araceae	Filodendro	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-6	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	C10(4), C30(1), C34A(1), C38(1)
<i>Phoenix canariensis</i> Chabaud.	Palmae	Palmeira-das- canárias	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-3	Meso.	Árvore	Z11	C2(5), C13(1), C24(1), C30(2)
<i>Phoenix dactylifera</i> L.	Palmae	Tamareira	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-3	Meso.	Árvore	Z11	C14A(2)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Phoenix roebelinii</i> O'Brien.	Palmae	Palmeira-anã	Indomalaio	Perenifólio	1-12	5-7	Micro.	Árvore	Z11	C25(1), C26(2)
<i>Phormium tenax</i> Forst. & Forst. f.	Agavaceae	Espadana	Antártico	Perenifólio	1-12	6-8	Hemi.	Herbácea	Z8	C13 (grupo), C15(2)
<i>Photinia x fraseri</i> Dress	Rosaceae	Fotinia	Hortícola	Perenifólio	1-12	4-6	Micro.	Arbusto	Z8	C30(4)
<i>Phyllostachis aurea</i> (Carr.) A. & C. Riv.	Gramineae	Bambu	Paleártico	Perenifólio	1-12	Não floriu**	Hemi.	Herbácea	Z6	C1, C6, C9, C21, C38 (grupo)
<i>Picconia excelsa</i> (Ait.) DC.	Oleaceae	Pau-branco	Paleártico	Perenifólio	1-12	2-5	Micro.	Árvore	Z10	C2(6)
<i>Pinus canariensis</i> C. Sm.	Pinaceae	Pinheiro-das-canárias	Paleártico	Perenifólio	1-12	2-4	Meso.	Árvore	Z10	C8(1)
<i>Pinus halepensis</i> Mill.	Pinaceae	Pinheiro-de-alepo	Paleártico	Perenifólio	1-12	2-4	Micro.	Árvore	Z7	C9(1)
<i>Pittosporum tobira</i> Ait.	Pittosporaceae	Tobira	Paleártico	Perenifólio	1-12	2-5	Micro.	Árvore	Z9	C11, C12, C28, C31 (sebe)
<i>Platyserium bifurcatum</i> (Cav.) C. Chr.	Polypodiaceae	Feto-de-corno- de-veado	Indomalaio; Oceânia; Australiano	Perenifólio	1-12	-----	Epífita	Herbácea	Z9	C24(1)
<i>Plectranthus forsteri</i> Benth.	Labiatae	Plectratos	Australiano; Oceânia	Perenifólio	1-12	6-11	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z10	C32(mancha)
<i>Plumbago auriculata</i> Lam.	Plumbaginaceae	Plumbago	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z9	C1, C35 (grupo)
<i>Plumeria rubra</i> L. var. <i>acutifolia</i> (Poir.) Woodson.	Apocynaceae	Planta-dos- dentes	Neotropical	Caducifólio	5-1	6-12	Micro.	Árvore	Z10	C1(1), C6(1), C10(1), C13(5), C18(1)
<i>Podranea ricasoliana</i> (Tanf.) Sprague.	Bignoniaceae	Ricassoliana	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	4-10	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z9	C11, C29 (grupo)
<i>Prunus laurocerasus</i> L.	Rosaceae	Loureiro-inglês; Loureiro-cerejo	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-4	Micro.	Árvore	Z7	C30(1)
<i>Psidium guajava</i> L.	Myrtaceae	Goiabeira	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-7	Micro.	Árvore	Z10	C8(1)
<i>Psidium littorale</i> Raddi	Myrtaceae	Araçazeiro; Araçaleiro	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-7	Micro.	Árvore	Z10	C1(1), C2(1)
<i>Pteris tremula</i> R. Br.	Pteridaceae	Feto	Australiano; Antártico; Oceânia; Áfricotropical	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z10	C1, C4, C8 (grupo)
<i>Pteris vittata</i> L.	Pteridaceae	Feto	Paleártico; Indomalaio; Australiano Oceânia	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z9	C4, C8, C29 (grupo)
<i>Punica granatum</i> L.	Punicaceae	Romãzeira-anã	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-6	Micro.	Árvore	Z9	C14(1)
<i>Pyrostegia venusta</i> (Ker-Gawl.) Miers	Bignoniaceae	Gaitinhas	Neotropical	Perenifólio	1-12	11-5	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	C4(1), C5(1), C30(grupo)
<i>Quercus robur</i> L.	Fagaceae	Carvalho-roble	Paleártico	Caducifólio	2-11	3-5	Meso.	Árvore	Z6	C24(1)
<i>Ravenala madagascariensis</i> Sonn.	Strelitziaceae	Ravenala; Árvore-do-viajante	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	2-10	Micro.	Árvore	Z11	C24(1)
<i>Rhapis excelsa</i> (Thunb.) Henry.	Palmae	Palmeira-de-hong-kong; Pameira-de-senhora	Paleártico	Perenifólio	1-12	6-9	Micro.	Arbusto	Z10	C30(2), C31(2)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Rhododendron mucronatum</i> G. Don.	Ericaceae	Azálea-japonesa	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z5	C7(1), C14(grupo), C16(grupo), C30(1)
<i>Robinia viscosa</i> Vent.	Leguminosae (Papilionoideae)	Robínia	Neártico	Caducifólio	3-12	3-6	Micro.	Árvore	Z5	C28(1)
<i>Roldana petasites</i> (Sims) H. Robinson & Bretell.	Compositae	Senécio	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-4	Micro.	Arbusto	Z9	C1(grupo)
<i>Rosmarinus officinalis</i> L.	Labiatae	Alecrim	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z6	C10(1), C12(2)
<i>Russelia equisetiformis</i> Scdl. & Cham.	Scrophulariaceae	Russélia ; Lágrimas-de-amor	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z9	C14A(grupo), C18(2)
<i>Saccharum officinarum</i> L.	Gramineae	Cana-sacarina; Cana-de-açúcar	Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-3	Hemi.	Herbácea	Z9	C21(2 grupos)
<i>Sansevieria trifasciata</i> Prain var. <i>laurentii</i> (De Wild.) N. E. Br.	Agavaceae	Língua-de-sogra	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	8-11	Hemi.	Herbácea	Z10	C30(grupo)
<i>Sasa palmata</i> (Burb.) Camus	Gramineae	Bambu	Paleártico	Perenifólio	1-12	Não floriu**	Hemi.	Herbácea	Z7	C10(grupo)
<i>Schefflera arboricola</i> (Hayata)	Araliaceae	Schefflera	Indomalaio	Perenifólio	1-12	2-4; 7-8	Micro.	Arbusto	Z10	C29(sebe), C31(4)
<i>Schefflera pueckleri</i> (K. Koch) Frodin.	Araliaceae	Cheflera	Indomalaio	Perenifólio	1-12	5-6	Micro.	Árvore	Z10	C13(1), C14A(1)
<i>Schinus molle</i> L. non hort. ex Engl.	Anacardiaceae	Pimenteira- bastarda; Pimenteira-da- índia	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Meso.	Árvore	Z9	C30(1)
<i>Schinus terebinthifolius</i> Raddi	Anacardiaceae	Pimenteira-do- brasil	Neotropical	Perenifólio	1-12	8-10	Micro.	Árvore	Z10	C14(1), C19(1)
<i>Schotia brachypetala</i> Sonder.	Leguminosae (Caesalpiniodeae)	Scótia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	2-5	Micro.	Árvore	Z9	C30(2)
<i>Senna corymbosa</i> (Lam.) Irwin & Barneby	Leguminosae (Caesalpiniodeae)	Cássia-corimbosa	Neotropical	Perenifólio	1-12	8-11	Nano.	Arbusto	Z9	C10(2)
<i>Solenostemon scutellarioides</i> (L.) Codd.	Labiatae	Cóleos	Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C15, C6, C35 (grupo)
<i>Spathodea campanulata</i> Beauv.	Bignoniaceae	Chama-da- floresta; Tulipeiro-africano	Áfricotropical	Caducifólio	1-12 (Variação individual)	1-12	Micro.	Árvore	Z11	C4(1), C10(1), C22(1), C33(1)
<i>Stachys byzantina</i> K. Koch.	Labiatae	Orelhas-de-gato	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-7	Caméfito	Herbácea	Z5	C30(grupo)
<i>Stenotaphrum secundatum</i> (Walter) Kuntze	Gramineae	Relva; Relva-de-correr	Neotropical; Áfricotropical; Oceânia	Perenifólio	1-12	3-11	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z9	C7, C10, C30, C31, C36 (tapete)
<i>Stephanotis floribunda</i> (R. Br.) Brongn.	Asclepiadaceae	Jasmim-de- madagáscar; Flor-de-noíva	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	4-8	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	C35(1)
<i>Strelitzia nicolai</i> Reg. & Köm.	Strelitziaceae	Estrelícia-gigante	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C1(1), C9(1), C13(1), C24(1), C25(1), C29(2)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassm.	Palmae	Coqueiro-de-jardim; Palmeira-rainha	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-7	Micro.	Árvore	Z10	C14(1), C37(1)
<i>Thuja occidentalis</i> L.	Cupressaceae	Tuia-ocidental	Neártico	Perenifólio	1-12	5-8	Micro.	Árvore	Z4	C34(1)
<i>Tibouchina urvilleana</i> (DC.) Cogn.	Melastomataceae	Aranhas; Tibouchina	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C30(2)
<i>Trachelospermum jasminoides</i> (Lindl.) Lem.	Apocynaceae	Jasmim-de-estrela	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-11	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z8	C25(10)
<i>Trachycarpus fortunei</i> (Hook.) H. A. Wendl.	Palmae	Palmeira-de-leque- da- califórnia	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-6	Micro.	Árvore	Z8	C17(4), C18(4)
<i>Tradescantia pallida</i> (Rose) D. Hunt.	Commelinaceae	Tradescantia	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea trepadora	Z8	C26, C29, C30 (grupo)
<i>Tradescantia zebrina</i> hort. ex. Bosse	Commelinaceae	Zebrina	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea trepadora	Z8	C1, C2, C4, C9, C10, C26, C30 (grupo)
<i>Viburnum tinus</i> L.	Caprifoliaceae	Viburno	Paleártico	Perenifólio	1-12	10-4; 7-8	Micro.	Arbusto	Z7	C30(3)
<i>Washingtonia filifera</i> (Lind. ex André) H. A. Wendl.	Palmae	Palmeira-de-leque- da- califórnia	Neártico	Perenifólio	1-12	5-8	Micro.	Árvore	Z9	C14(1), C24(1)
<i>Wisteria sinensis</i> (Sims) Sweet.	Leguminosae (Papilionoideae)	Lilases; Glícinia	Paleártico	Caducifólio	2-12	2-5; 7-8	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z5	C19(1), C21(1), C30(2), C31(2), C36(1)
<i>Woodwardia radicans</i> (L.) Sm.	Blechnaceae	Feto-de-botão	Paleártico	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z8	C30(grupo)
<i>Yucca elephantipes</i> Regel.	Agavaceae	Ílúca	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-10	Micro.	Arbusto	Z10	C10(1), C13(2)
<i>Yushania anceps</i> (Mitford) Yi.	Gramineae	Bambo	Paleártico	Perenifólio	1-12	Não floriu**	Hemi.	Herbácea	Z9	C10(grupo)
<i>Zamia furfuracea</i> L. f. in Aiton	Zamiaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	6-11	Hemi.	Arbusto	Z10	C18(3)

Legenda:

- Plantas que não floriram no período em estudo (Janeiro 2002 – Janeiro 2005): * plantas novas; ** plantas que nunca floriram por falta de aclimação;
- Plantas marcescentes (plantas semiperenifólias e semcaducifólias): 3-2 (**3-4**) – folhas todo o ano mas com renovação significativa em Março e Abril.

Anexo 29
CARACTERIZAÇÃO FITOGEOGRÁFICA DO JARDIM DO HOTEL REID

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Abelia x grandiflora</i> (André) Rehd.	Caprifoliaceae	Abélia	Hortícola	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z5	C3(sebe), C13(1), C15(grupo)
<i>Abelmoschus moschatus</i> Medik.	Malvaceae		Indomalaio	Perenifólio	1-12	4-7	Nano	Herbácea	Z9	C15(1)
<i>Abutilon grandifolium</i> (Willd.) Sweet	Malvaceae	Abutilão	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z9	C6(1), C15(1), C30(1)
<i>Abutilon pictum</i> (Gillies ex Hook. & Arn.) Walp.	Malvaceae	Abutilão	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z9	C25(1)
<i>Acacia baileyana</i> F. Muell.	Leguminosae (Mimosoideae)	Acácia-baileiana	Australiano	Perenifólio	1-12	1-2	Micro.	Árvore	Z8	C25(2)
<i>Acacia retinodes</i> Schldl.	Leguminosae (Mimosoideae)	Acácia	Australiano	Perenifólio	1-12	1-2	Micro.	Árvore	Z8	C30(2)
<i>Acalypha reptans</i> Sw.	Euphorbiaceae		Neártico; Neotropical	Perenifólio	1-12	4-8	Caméfito	Herbácea	Z10	C15(1)
<i>Acalypha wilkesiana</i> Muell. Arg.	Euphorbiaceae	Acálifa; Folha-de-cobre	Oceânia	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C13(grupo), C16(1), C18(grupo), C23(1), C27(grupo)
<i>Acorus gramineus</i> Ait.	Araceae (Acoraceae)		Paleártico	Perenifólio	1-12	4-8	Helófito	Herbácea	Z5	C25(grupo)
<i>Adiantum capillus-veneris</i> L.	Adiantaceae	Avenca; Avenca-das-fontes	Paleártico, Neotropical, Áfricotropical, Indomalaio	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z8	C8, C13, C19 (grupo)
<i>Adromischus cristatus</i> (Haw.) Lem.	Crassulaceae		Áfricotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Caméfito	Herbácea suculenta	Z10	C12(3)
<i>Adromischus cristatus</i> (Haw.) Lem. ssp. <i>clavifolius</i> (Haw.) Toelken.	Crassulaceae		Africotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Caméfito	Herbácea suculenta	Z10	C12(2)
<i>Aechmea caudata</i> var. <i>caudata</i> Lindman	Bromeliaceae	Bromélia	Neotropical	Perenifólio	1-12	3-4	Hemi.	Herbácea	Z11	C13(grupo num vaso grande)
<i>Aechmea fasciata</i> (Lindl.) Bak.	Bromeliaceae	Bromélia	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C15 (grupo)
<i>Aechmea nudicaulis</i> (L.) Griseb.	Bromeliaceae	Bromélia	Neotropical	Perenifólio	1-12	12-4	Hemi.	Herbácea	Z10	C15, C23 (grupo)
<i>Aechmea rubens</i> (L. B. Smith) L. B. Smith	Bromeliaceae	Bromélia	Neotropical	Perenifólio	1-12	3-6	Hemi.	Herbácea	Z11	C15(grupo)
<i>Aeonium arboreum</i> (L.) Webb & Berth.	Crassulaceae	Ensaio; Saião	Paleártico	Perenifólio	1-12	11-4	Nano.	Herbácea suculenta	Z9	C12(7)
<i>Aeonium castello-paivae</i> Bolle.	Crassulaceae	Ensaio	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-7	Nano.	Herbácea suculenta	Z10	C12(2)
<i>Aeonium decorum</i> Webb ex Bolle	Crassulaceae	Ensaio	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-6	Caméfito	Herbácea suculenta	Z10	C12(1)
<i>Aeonium glutinosum</i> (Aiton.) Webb. & Berthel.	Crassulaceae	Farrobo; Ensaio	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-8	Nano.	Herbácea suculenta	Z10	C11, C13, C17, C23, C25, C27 (grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Aeonium haworthii</i> Salm-Dyck ex Webb & Berth.	Crassulaceae	Ensaíão	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-7	Nano.	Herbácea suculenta	Z10	C13(3)
<i>Aeonium lindleyi</i> Webb & Berth.	Crassulaceae	Ensaíão	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-7	Nano.	Herbácea suculenta	Z10	C12(2)
<i>Aeonium simsii</i> (Sweet) Steran.	Crassulaceae	Ensaíão	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-7	Caméfito	Herbácea suculenta	Z10	C13(1)
<i>Aeonium x bollei</i> Kunkell	Crassulaceae	Ensaíão	Hortícola	Perenifólio	1-12	5-7	Nano.	Herbácea suculenta	Z10	C12(2)
<i>Agapanthus praecox</i> Willd. ssp. <i>orientalis</i> (Leighton) Leighton	Liliaceae	Agapantos; Coroas-de- henrique	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	4-9	Hemi.	Herbácea	Z9	C9(3), C12, C13, C15, C16, C18, C27, C30 (mancha)
<i>Agave americana</i> L.	Agavaceae	Agave; Piteira	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-8	Hemi.	Herbácea suculenta	Z9	C8(1), C12(7), C23(1), C24(grupo), C25(4)
<i>Agave atrovirens</i> Salm-Dyck	Agavaceae	Agave	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-8	Hemi.	Herbácea suculenta	Z9	C9(1)
<i>Agave attenuata</i> Salm-Dyck	Agavaceae	Piteira; Agave-pescoço- de-cisne	Neotropical	Perenifólio	1-12	12-3	Nano.	Árvore suculenta	Z9	C1(4), C6(>100), C8(2), C9(>20), C13(2), C14(12), C18, C24, C27, C29 (grupo)
<i>Agave macroacantha</i> Zucc.	Agavaceae	Agave-roseta	Neotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Caméfito	Arbusto suculento	Z9	C9(5),
<i>Agave schidigera</i> Lem.	Agavaceae	Agave	Neotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Hemi.	Herbácea suculenta	Z9	C23(1)
<i>Agave sisalana</i> Perring.	Agavaceae	Sisal	Neotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Nano.	Árvore suculenta	Z9	C12(1)
<i>Agave victoriae-reginae</i> T. Moore	Agavaceae	Agave	Neotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Hemi.	Herbácea suculenta	Z9	C12(3), C23(2)
<i>Ageratina riparia</i> (Reg.) R. King. & H. Robinson	Compositae	Falsa-abundância	Neotropical	Perenifólio	1-12	2-6	Nano.	Herbácea	Z10	C19(grupo)
<i>Ageratum houstonianum</i> Mill.	Compositae		Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Terófito	Herbácea	Z8	C23(grupo)
<i>Agonis flexuosa</i> (Willd.) Sweet.	Myrtaceae		Australiano	Perenifólio	1-12	4-6	Micro.	Árvore	Z9	C22(1)
<i>Aichryson x domesticum</i> Praeger	Crassulaceae	Ensaíão	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-7	Caméfito	Herbácea suculenta	Z10	C12(2)
<i>Alocasia macrorrhiza</i> (L.) G. Don.	Araceae	Taro	Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-5	Hemi.	Herbácea	Z10	C27(1)
<i>Alocasia wentii</i> Engl. & K. Krause	Araceae	Inhame-branco	Oceânia	Perenifólio	1-12	1-4	Hemi.	Herbácea	Z12	C13(1)
<i>Aloe arborescens</i> Mill.	Liliaceae (Aloeaceae)	Aloés, Babosas, Foguetes-de-natal	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	11-2	Nano.	Arbusto suculento	Z9	C6, C11, C17, C9, C22, C23, C24 (grupo)
<i>Aloe broomii</i> Schönl.	Liliaceae (Aloeaceae)	Aloés	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Hemi.	Herbácea suculenta	Z9	C12(1)
<i>Aloe bulbifera</i> H. Perrier	Liliaceae (Aloeaceae)	Aloés	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	11-12	Hemi.	Herbácea suculenta	Z9	C12(3)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Aloe ciliaris</i> Haw.	Liliaceae (Aloeaceae)	Aloés	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	10-6	Fane. trep.	Arbusto trepador e suculento	Z9	C11(1), C16(grupo)
<i>Aloe ferox</i> Mill.	Liliaceae (Aloeaceae)	Aloés	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	12-1	Nano.	Árvore suculenta	Z9	C12(1)
<i>Aloe juvenna</i> Brandham & S. Cárter.	Liliaceae (Aloeaceae)	Aloés	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Caméfito	Arbusto suculento	Z9	C13(grupo)
<i>Aloe marlothi</i> A. Berger.	Liliaceae (Aloeaceae)	Aloés	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	3-4	Nano.	Árvore suculenta	Z9	C23(1)
<i>Aloe mitriformis</i> Mill.	Liliaceae (Aloeaceae)	Aloés	Africotropical	Perenifólio	1-12	6-8	Caméfito	Arbusto suculento	Z9	C12(grupo)
<i>Aloe rauhii</i> G. Reynolds	Liliaceae (Aloeaceae)	Aloés	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Hemi.	Herbácea suculenta	Z9	C12(1)
<i>Aloe rupestris</i> Bak.	Liliaceae (Aloeaceae)	Aloés	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	2-4	Micro.	Árvore suculenta	Z10	C23(1)
<i>Aloe saponaria</i> (Ait. f.) Haw.	Liliaceae (Aloeaceae)	Aloés-sabão	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-7	Hemi.	Herbácea suculenta	Z9	C14, C23(grupo)
<i>Aloe tomentosa</i> Deflers.	Liliaceae (Aloeaceae)	Aloés	Áfricotropical; Paleártico	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Hemi.	Herbácea suculenta	Z9	C12(3)
<i>Aloe trichosantha</i> Berg. ssp. <i>trichosantha</i> A. Berg.	Liliaceae (Aloeaceae)	Aloés	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Hemi.	Herbácea suculenta	Z9	C13(1)
<i>Aloe vaombe</i> Decorse & Poiss.	Liliaceae (Aloeaceae)	Aloés	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Nano.	Arbusto suculento	Z10	C12(1)
<i>Aloe variegata</i> L.	Liliaceae (Aloeaceae)	Aloés	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Hemi.	Herbácea suculenta	Z9	C12(1)
<i>Aloe vera</i> (L.) Burm.	Liliaceae	Aloé-vera; Babosas	Paleártico; Neotropical	Perenifólio	1-12	11-6	Hemi.	Herbácea suculenta	Z8	C12(2), C23(grupo), C25(grupo)
<i>Aloinopsis orpenii</i> (N. E. Br.) L. Bol.	Aizoaceae		Áfricotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Hemi.	Herbácea suculenta	Z10	C12(3)
<i>Aloysia triphylla</i> (L'Hérit) Britt.	Verbenaceae	Pessegueiro- inglês; Lúcia-lima; Limonete	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-10	Nano.	Arbusto	Z8	C25(grupo)
<i>Alpinia calcarata</i> (Haw.) Roscoe.	Zingiberaceae	Gengibre-indiano	Indomalaio	Perenifólio	1-12	4-7	Hemi.	Herbácea	Z10	C11(1)
<i>Alstroemeria pelegrina</i> L.	Liliaceae (Alstroemeriaceae)	Alstroemeria; Açucena-do-peru	Neotropical	Sazonal	4-10	5-9	Geófito	Herbácea	Z9	C15(grupo)
<i>Alstroemeria psittacina</i> Lehm.	Liliaceae (Alstroemeriaceae)	Alstroemeria; Açucena-do-peru	Neotropical	Sazonal	4-10	5-9	Geófito	Herbácea	Z8	C19, C23 (grupo)
<i>Alternanthera ficoidea</i> (L.) R. Br.	Amaranthaceae	Pirriquitos	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Caméfito	Herbácea	Z10	C23 (grupo)
<i>Ananas bracteatus</i> (Lindl.) Schult. var. <i>tricolor</i> (Bertoni) L.B.	Bromeliaceae	Ananás	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-7	Hemi.	Herbácea	Z11	C15, C22, C27 (grupo)
<i>Ananas comosus</i> (L.) Merr.	Bromeliaceae	Ananás	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-7	Hemi.	Herbácea	Z11	C2(1)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Angiopteris evecta</i> (Forst.) Hoffm.	Marattiaceae	Feto-craca	Indomalaio; Australiano	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z10	C25(1)
<i>Anthurium andraeanum</i> André.	Araceae	Antúrio	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z11	C23, C25 (grupo)
<i>Anthurium bonplandii</i> Bunting.	Araceae	Antúrio	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-7	Hemi.	Herbácea	Z12	C23(3)
<i>Anthurium pentaphyllum</i> (Aubl.) G. Don.	Araceae	Antúrio	Neotropical	Perenifólio	1-12	7-10	Hemi.	Herbácea	Z11	C21(1)
<i>Aphelandra squarrosa</i> Nees.	Acanthaceae	Planta-zebra	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-6	Nano.	Arbusto	Z11	C25(mancha)
<i>Apollonias barbujana</i> (Cav.) Bomm.	Lauraceae	Barbusano	Paleártico	Perenifólio	1-12	9-3	Meso.	Árvore	Z10	C15(2)
<i>Aporocactus flagelliformis</i> (L.) Lem.	Cactaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	6-7	Hemi.	Herbácea suculenta	Z10	C23(grupo)
<i>Araucaria bidwillii</i> Hook. f.	Araucariaceae	Araucária-de-bidwill	Australiano	Perenifólio	1-12	2-3	Meso.	Árvore	Z9	C16(1)
<i>Araucaria heterophylla</i> (Salisb.) Franco	Araucariaceae	Araucária	Oceânia	Perenifólio	1-12	2-3	Macro.	Árvore	Z9	C2(1), C13(1), C17(1), C27(1)
<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> H. A. Wendl. & Drude.	Palmae	Palmeira-elegante	Australiano	Perenifólio	1-12	2-10	Meso.	Árvore	Z10	C20(2), C22(2), C27(1), C30(4)
<i>Argyranthemum gracile</i> Schultz-Bip	Compositae	Estreleira	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C8(mancha)
<i>Arthropodium cirrhatum</i> (Forst. f.) R. Br.	Liliaceae		Antártico	Perenifólio	1-12	5-7	Geófita	Herbácea	Z8	C11(grupo)
<i>Asparagus densiflorus</i> (Kunth) Jassop	Liliaceae (Asparagaceae)	Esparto	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	7-8	Nano.	Herbácea	Z9	C7, C8, C14, C17, C19, C20, C24 (grupo)
<i>Asparagus macowanii</i> Baker	Liliaceae (Asparagaceae)	Esparto	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	5-7	Nano.	Arbusto	Z10	C13(1)
<i>Asparagus setaceus</i> (Kunth) Jassop	Liliaceae (Asparagaceae)	Esparto-de-folha-miúda; Esparto	Africotropical	Perenifólio	1-12	9-12	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z9	C19(mancha)
<i>Asparagus umbellatus</i> Link ssp. <i>lowei</i> (Kunth) Valdés	Liliaceae (Asparagaceae)	Esparto-da-madeira	Paleártico	Perenifólio	1-12	11-6	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z11	C6, C30(grupo)
<i>Aspidistra elatior</i> Bl.	Liliaceae (Convallariaceae)		Paleártico	Perenifólio	1-12	6-7	Hemi.	Herbácea	Z8	C2, C16, C19, C23, C30 (grupo)
<i>Asplenium nidus</i> L.	Aspleniaceae	Feto-de-ninho	Neotropical	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z11	C13(3), C19(3), C22(5)
<i>Bambusa vulgaris</i> Schräd. ex Wendl.	Gramineae	Bambu	Paleártico; Indomalaio	Perenifólio	1-12	Não floriu**	Hemi.	Herbácea	Z10	C15, C31 (grupo)
<i>Bartlettina sordida</i> (Less.) R. King & H. Robinson	Compositae		Neotropical	Perenifólio	1-12	3-5	Nano.	Arbusto	Z10	C15(2)
<i>Bauhinia galpinii</i> N. E. Br.	Leguminosae (Caesalpinioideae)	Bauínia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	5-11	Micro.	Arbusto	Z9	C16(1)
<i>Bauhinia variegata</i> L.	Leguminosae (Caesalpinioideae)	Bauínia; Árvore-de-são-tomé	Indomalaio	Marcescente	5-4 (12-4)	10-6	Micro.	Árvore	Z9	C18(1), C19(1), C27(2)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Bauhinia x blakeana</i> Dunn.	Leguminosae (Caesalpinoideae)	Bauínia	Paleártico	Perenifólio	1-12	12-4	Micro.	Árvore	Z10	C18(1)
<i>Begonia aconitifolia</i> A. DC.	Begoniaceae	Begónia; Corações;	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-11	Nano.	Herbácea	Z10	C13, C18, C23 (grupo)
<i>Begonia minor</i> Jacq.	Begoniaceae	Corações; Begónia- sempre- em-flor	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C18(grupo)
<i>Begonia olsoniae</i> L. B. & B. G. Schub.	Begoniaceae	Begónia; Corações	Neotropical	Perenifólio	1-12	3-8	Hemi.	Herbácea	Z10	C13(grupo)
<i>Begonia pseudolubbersii</i> Brade.	Begoniaceae	Begónia-pintada	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-8	Nano.	Herbácea	Z10	C18(grupo)
<i>Begonia rex</i> Putzeys	Begoniaceae	Begónia	Paleártico	Perenifólio	1-12	6-8	Hemi.	Herbácea	Z10	C23(grupo)
<i>Begonia serratifolia</i> Lmsch.	Begoniaceae	Begónia-cor-de- vinho	Oceânia	Perenifólio	1-12	3-8	Nano.	Herbácea	Z10	C18(grupo)
<i>Bergeranthus vespertinus</i> (A. Berger) Schwantes	Aizoaceae		Áfricotropical	Perenifólio	1-12	4-6	Hemi.	Herbácea suculenta	Z9	C12(3)
<i>Bijlia cana</i> N. E. Br.	Aizoaceae		Áfricotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Hemi.	Herbácea suculenta	Z10	C12(3)
<i>Billbergia euphemiae</i> E. Morr. var. <i>purpurea</i> M. B. Fost.	Bromeliaceae	Bromélia	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-7	Hemi.	Herbácea	Z10	C23(grupo)
<i>Billbergia vittata</i> Brongn. ex Morel.	Bromeliaceae	Bromélia	Neotropical	Perenifólio	1-12	11-2	Hemi.	Herbácea	Z10	C13, C23 (grupo)
<i>Billbergia x windii</i> hort. Makoy ex E. Morr.	Bromeliaceae	Planta-da- amizade; Lágrimas-da- rainha	Hortícola	Perenifólio	1-12	11-2	Hemi.	Herbácea	Z10	C21, C23 (grupo)
<i>Bismarchia nobilis</i> Hildebr. & H. Wendl.	Palmae	Palmeira-de- bismark	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-3	Micro.	Árvore	Z10	C15(1), C19(1), C20(1), C27(1)
<i>Blechnum gibbum</i> (Labill.) Mett.	Blechnaceae		Oceânia	Perenifólio	1-12	-----	Nano.	Arbusto	Z10	C13(2), C23(12)
<i>Bougainvillea glabra</i> Choisy	Nyctaginaceae	Buganvília	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	C6, C19, C24, C29, C30 (grupo)
<i>Bougainvillea spectabilis</i> Willd.	Nyctaginaceae	Buganvília	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	C11, C15, C24, C29, C30 (grupo)
<i>Brachychiton acerifolius</i> Cunn. ex. F. Muell.	Sterculiaceae	Árvore-do-fogo	Australiano	Caducifólio	1-5; 8-12	5-8	Micro.	Árvore	Z10	C22(1)
<i>Brahea armata</i> S. Wats.	Palmae	Palmeira-azul	Neártico; Neotropical	Perenifólio	1-12	7-8	Micro.	Árvore	Z9	C7(3)
<i>Brugmansia arborea</i> (L.) Lagerh.	Solanaceae	Trombeteira	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C21(1)
<i>Brugmansia versicolor</i> Lagerh.	Solanaceae	Trombeteira	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C9(1)
<i>Buddleja davidii</i> Franch.	Loganiaceae	Budléia	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-8	Micro.	Arbusto	Z5	C25(1)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Bulbine frutescens</i> (L.) Willd.	Liliaceae (Asphodelaceae)	Bulbine	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Geófita	Herbácea suculenta	Z9	C17, C18, C19 (mancha)
<i>Caesalpinia spinosa</i> (Molina) Kuntze.	Leguminosae (Caesalpinioideae)	Falso-pau-brasil	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-8	Micro.	Arbusto	Z10	C6(2)
<i>Calathea lancifolia</i> Boom	Marantaceae	Calateia	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-7	Hemi.	Herbácea	Z11	C18 (grupo)
<i>Calathea zebrina</i> (Sims) Lindl.	Marantaceae	Calateia-zebra	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-7	Hemi.	Herbácea	Z10	C18(2)
<i>Calendula officinalis</i> L.	Compositae	Calendula	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Terófito	Herbácea	Z6	C23(grupo)
<i>Callistemon phoeniceus</i> Lindl.	Myrtaceae	Martinete-chorão	Australiano	Perenifólio	1-12	4-7	Micro	Arbusto	Z9	C15(1)
<i>Callistemon rigidus</i> R. Br.	Myrtaceae	Martinete	Australiano	Perenifólio	1-12	4-8	Micro.	Arbusto	Z9	C15(1), C16(1), C22(1)
<i>Camellia japonica</i> L.	Theaceae	Camélia; Japoneira	Paleártico	Perenifólio	1-12	11-6	Micro.	Árvore	Z8	C29(2)
<i>Campsis x tagliabuana</i> (Vis.) Rehd.	Bignoniaceae	Campsis	Hortícola	Caducifólio	5-12	5-8	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z6	C24(1)
<i>Canistrum lindenii</i> (Regel) Mez	Bromeliaceae	Bromélia	Neotropical	Perenifólio	1-12	12-3	Hemi.	Herbácea	Z11	C15(grupo)
<i>Canna x generalis</i> L. H. Bail.	Cannaceae	Canas-da-índia; Bananeiras-de-flor	Hortícola	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z9	C18, C19, C22, C23 (grupo)
<i>Cardiospermum grandiflorum</i> Sw.	Sapindaceae	Corriola-dos- balões	Áfricotropical; Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z10	C30(grupo)
<i>Carissa macrocarpa</i> (Ecklon) A. DC.	Apocynaceae	Carissa	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-6	Micro.	Arbusto	Z9	C13(2)
<i>Carruanthus ringens</i> (L.) Boom.	Aizoaceae		Áfricotropical	Perenifólio	1-12	12-6	Hemi.	Herbácea suculenta	Z10	C12(2)
<i>Catharanthus roseus</i> (L.) G. Don.	Apocynaceae	Maravilhas	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Herbácea	Z10	C11, C13, C22 (grupo)
<i>Centranthus ruber</i> (L.) DC.	Valerianaceae	Rosa-da-rocha; Alfinetes	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Caméfito	Herbácea	Z5	C8, C10, C27(grupo)
<i>Cephalocereus senilis</i> (Haw.) Schum.	Cactaceae	Cacto-barba-de- velho	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-7	Nano.	Arbusto suculento	Z9	C12(3)
<i>Ceratostigma plumbaginoides</i> Bunge.	Plumbaginaceae		Paleártico	Perenifólio	1-12	3-9	Nano.	Herbácea	Z6	C27(1)
<i>Cercis siliquastrum</i> L.	Leguminosae (Papilionoideae)	Olaia; Árvore-de- judas	Paleártico	Caducifólio	4-12	2-4	Micro.	Árvore	Z7	C16(1)
<i>Cereus uruguayanus</i> Kiesling.	Cactaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	7-8	Nano.	Árvore suculenta	Z9	C13(7)
<i>Cestrum parqui</i> L'Hérit	Solanaceae	Galã-da-noite	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-11	Nano.	Arbusto	Z9	C25(1)
<i>Cestrum roseum</i> HBK.	Solanaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	3-11	Nano.	Arbusto	Z10	C15(1)
<i>Chamaedorea costaricana</i> Oerst	Palmae	Palmeira-de- salão; Palmeira- bambu	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-6	Micro.	Arbusto	Z10	C20(1)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Chamaedorea elegans</i> Mart.	Palmae	Palmeira-de-salão; Palmeira-bambu	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-6	Micro.	Arbusto	Z10	C17(2), C18(1), C19(1), C21(1), C22(1)
<i>Chamaerops humilis</i> L.	Palmae	Palmeira-das-vassouras	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-5	Micro.	Arbusto	Z9	C8(1), C23(1), C24(1)
<i>Chamaerops humilis</i> L. var. <i>arborescens</i> (Pers.) Steud.	Palmae	Palmeira-das-vassouras	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-5	Micro.	Árvore	Z9	C11(1)
<i>Chasmanthe aethiopica</i> (L.) N. E. Br.	Iridaceae	Antoliza	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	11-3	Geófita	Herbácea	Z9	C23(grupo)
<i>Chlorophytum comosum</i> (Thumb.) Jacques	Liliaceae (Anthericaceae)	Fitinhas	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z9	C13, C16, C18, C19, C20 (mancha)
<i>Chorisia speciosa</i> A. St. Hil.	Bombacaceae	Sumaúma	Neotropical	Caducifólio	3-11	8-11	Meso.	Árvore	Z10	C21(1), C27(1)
<i>Christella dentata</i> (Forssk.) Brownsey & Jermy.	Thelypteridaceae		Áfricotropical; Indomalaio;	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z10	C25(grupo)
<i>Chrysaliocarpus lutescens</i> (Bory) Wendl.	Palmae	Palmeira- amarela; Palmeira- borboleta	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	6-7	Micro.	Arbusto	Z10	C21(1 .nova), C29(1)
<i>Cinnamomum camphora</i> (L.) Sieb.	Lauraceae	Canforeira	Paleártico; Indomalaio	Perenifólio	1-12	2-4	Meso.	Árvore	Z10	C1(1), C2(1), C13(2), C24(1), C30(2), C31(1)
<i>Citrus limon</i> (L.) Burm.	Rutaceae	Limoeiro	Paleártico	Perenifólio	1-12	11-4	Micro.	Árvore	Z9	C25(1)
<i>Citrus sinensis</i> (L.) Osbeck	Rutaceae	Laranjeira	Paleártico	Perenifólio	1-12	2-4	Micro.	Árvore	Z9	C23(1)
<i>Cleistocactus straussi</i> (Heese) Backeb.)	Cactaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	5-8	Nano.	Arbusto suculento	Z9	C12(9)
<i>Cleistocactus winteri</i> D. Hunt.	Cactaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	6-8	Nano.	Arbusto suculento	Z9	C23(6)
<i>Clematis grewiiflora</i> DC.	Ranunculaceae	Clematite	Indomalaio	Perenifólio	1-12	2-5	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z8	C20(1)
<i>Clerodendrum splendens</i> G. Don ex James	Verbenaceae	Clerodendro	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	C28(grupo)
<i>Clerodendrum ugandense</i> Prain.	Verbenaceae	Planta-das-borboletas	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C15(1), C27(1)
<i>Clivia miniata</i> Regel	Amaryllidaceae	Clívia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	2-11	Hemi.	Herbácea	Z10	C23(mancha)
<i>Clivia nobilis</i> Lindl.	Amaryllidaceae	Clívia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	2-11	Hemi.	Herbácea	Z10	C23(mancha)
<i>Clytostoma callistigioides</i> Bur. & Schum.	Bignoniaceae	Clitostoma	Neotropical	Perenifólio	1-12	3-7	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z9	C13 (2)
<i>Coccoloba uvifera</i> (L.) L.	Polygonaceae	Uva-do-mar	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-8	Micro.	Árvore	Z11	C16(1)
<i>Codiaeum variegatum</i> (L.) Bl. var. <i>pictum</i> (Lodd.) Muell. Arg.	Euphorbiaceae	Crótone	Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z11	C16(1), C18(3), C19(5), C20(6),
<i>Colocasia esculenta</i> (L.) Schott.	Araceae	Inhame	Indomalaio	Perenifólio	1-12	5-6	Geófita	Herbácea	Z10	C13(3), C21(grupo)
<i>Combretum microphyllum</i> Klotzsch	Combretaceae	Combreto	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	5-7	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	C17(1)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Commelina benghalensis</i> L.	Commelinaceae	Erva-menina; Flor-dum-dia	Indomalaio Áfricotropical;	Perenifólio	1-12	3-9	Hemi.	Herbácea trepadora	Z9	C7(grupo)
<i>Cordyline australis</i> (Forst.) Endl.	Agavaceae	Cordilina	Antártico	Perenifólio	1-12	4-6	Micro.	Árvore	Z9	C13(19)
<i>Cordyline terminalis</i> (L.) Kunth.	Agavaceae	Árvore-dos-reis	Indomalaio; Australiano; Oceânia; Antártico	Perenifólio	1-12	11-5	Micro.	Arbusto	Z10	C1(3), C7(1), C16(1), C18(1), C21(1), C20(5), C23(grupo)
<i>Corynocarpus laevigatus</i> Forst. & Forst. f.	Corynocarpaceae	Loureiro-da-nova- zelândia	Antártico	Perenifólio	1-12	2-5	Micro.	Árvore	Z10	C9(1)
<i>Cosmos bipinnatus</i> Cav.	Compositae	Cosmos	Neártico; Neotropical	Sazonal	3-7	3-6	Terófito	Herbácea	Z8	C13 (grupo)
<i>Cotyledon macrantha</i> De Smet	Crassulaceae		Áfricotropical	Perenifólio	1-12	12-3	Caméfito	Arbusto suculento	Z10	C12(3)
<i>Cotyledon orbiculata</i> L.	Crassulaceae		Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-3	Nano.	Arbusto suculento	Z10	C12(3)
<i>Crassula arborescens</i> (Mill.) Willd.	Crassulaceae	Crássula	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	11-3	Nano.	Arbusto suculento	Z10	C12(3)
<i>Crassula brevifolia</i> Harv.	Crassulaceae	Crássula	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Nano.	Arbusto suculento	Z10	C12(3)
<i>Crassula deltoidea</i> Thunb.	Crassulaceae	Crássula	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Hemi.	Herbácea suculenta	Z10	C12(3)
<i>Crassula elegans</i> Schönlf. & Bak.	Crassulaceae	Crássula	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Hemi.	Herbácea suculenta	Z10	C12(3)
<i>Crassula multicava</i> Lem.	Crassulaceae	Crássula	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea suculenta	Z10	C15, C25 (grupo)
<i>Crassula muscosa</i> L.	Crassulaceae		Áfricotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Nano.	Arbusto suculento	Z10	C13(3)
<i>Crassula ovata</i> (Mill.) Druce.	Crassulaceae	Ensaio-branco; Planta-de-jade	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	11-3	Nano.	Arbusto suculento	Z10	C13(grupo), C17(1), C31(1)
<i>Crassula perfoliata</i> L. var. <i>falcata</i> (Wendl.) Toelken.	Crassulaceae		Áfricotropical	Perenifólio	1-12	6-10	Nano.	Arbusto suculento	Z10	C12(8)
<i>Crassula perforata</i> Thunb.	Crassulaceae	Espetadas	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	12-2	Hemi.	Herbácea suculenta	Z10	C12(3)
<i>Crassula sarmentosa</i> Harv.	Crassulaceae		Áfricotropical	Perenifólio	1-12	12-2	Nano.	Arbusto suculento	Z10	C25(grupo)
<i>Crassula tetragona</i> L.	Crassulaceae	Pinheirinho	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	6-8	Nano.	Arbusto suculento	Z10	C11(1), C25(grupo)
<i>Crinum moori</i> Hook. f.	Amaryllidaceae	Crino	Áfricotropical	Sazonal	11-9	4-8	Geófito	Herbácea	Z8	C7(grupo)
<i>Crocasmia x crocosmiflora</i> (Burb. & Dean) N.E. Br.	Iridaceae	Monbrécias; Hastes-de-são- josé	Hortícola	Perenifólio	1-12	5-9	Geófito	Herbácea	Z7	C7(1)
<i>Ctenanthe lubbersiana</i> (E. Morr.) Eichl.	Marantaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	4-8	Hemi.	Herbácea	Z10	C4, C16, C18 (núcleo)
<i>Ctenanthe oppenheimiana</i> (C. J. Morren) K. Schum.	Marantaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	4-8	Hemi.	Herbácea	Z10	C22, C25(grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Ctenanthe setosa</i> Eichler.	Marantaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	3-7	Hemi.	Herbácea	Z10	C8, C18, C19, C22 (núcleo)
<i>Cuphea hyssopifolia</i> HBK.	Lythraceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C9(9), C23 (grupo)
<i>Cuphea micropetala</i> HBK.	Lythraceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	4-8	Nano.	Arbusto	Z9	C25(grupo)
<i>Cupressus lusitanica</i> Mill.	Cupressaceae	Cedro-de-goá; Cedro-das- barracas	Neártico; Neotropical	Perenifólio	1-12	1-3	Meso.	Árvore	Z9	C11(1), C15(1)
<i>Cupressus sempervirens</i> L.	Cupressaceae	Cipreste	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-2	Micro.	Árvore	Z8	C16(1), C15(3), C19(3), C20(1), C24(3), C26(8)
<i>Curcuma petiolata</i> Roxb.	Zingiberaceae	Falso-açafrão	Indomalaio	Sazonal	4-7	4-7	Geófita	Herbácea	Z10	C18(grupo)
<i>Cyathea cooperi</i> (F. Mueller) Domin.	Cyatheaceae	Feto-arbóreo	Australiano	Perenifólio	1-12	-----	Micro.	Árvore	Z10	C13(7)
<i>Cycas revoluta</i> Thunb.	Cycadaceae	Cicas-revoluta; Cicas-de-sagú	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-8	Micro.	Árvore	Z9	C11(5), C12(2)
<i>Cylindrophyllum comptonii</i> L. Bol.	Crassulaceae		Áfrotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Caméfito	Herbácea suculenta	Z9	C12(3)
<i>Cymbalaria muralis</i> P. Gaertn., Mey. & Scherb.	Scrophulariaceae	Perpétua-de-roma	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-10	Hemi.	Herbácea	Z3	C23 (grupo)
<i>Cymbogon citratus</i> (DC. ex Nees) Stapf.	Gramineae	Caninha; Cana-com-cheiro- a-limão	Indomalaio	Perenifólio	1-12	9-10	Hemi.	Herbácea	Z9	C25(1)
<i>Cyperus involucratus</i> Rottb.	Cyperaceae		Áfrotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C20, C21(grupo)
<i>Cyperus papyrus</i> L.	Cyperaceae	Papiros	Áfrotropical; Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C21(grupo)
<i>Cyphostema juttae</i> (Dinter & Gilg) Descoings.	Vitaceae		Áfrotropical	Caducifólio	4-10	5-7	Nano.	Arbusto	Z9	C13(1), C23(1)
<i>Cyrtomium falcatum</i> (L. f.) Presl.	Dryopteridaceae	Feto-azevinho	Paleártico; Indomalaio; Áfrotropical; Oceânia	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z9	C1(>10), C2(2), C12, C13, C18(grupo), C22(1)
<i>Dahlia imperialis</i> Roetzl. ex Ortgies.	Compositae	Dália-imperial	Neotropical	Perenifólio	1-12	11-3	Micro.	Arbusto	Z10	C23(1)
<i>Dasylirion acrotrichum</i> (Schiede) Zucc.	Agavaceae (Dracaenaceae)		Neotropical	Perenifólio	1-12	6-9	Nano.	Árvore	Z9	C12(1), C23(1)
<i>Delonix regia</i> (Bojer) Raf.	Leguminosae (Caesalpiniodeae)	Acácia-rubra	Áfrotropical	Caducifólio	6-3	7-9	Micro.	Árvore	Z11	C31(2)
<i>Delphinium elatum</i> L.	Ranunculaceae	Délfínios	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Herbácea	Z3	C9, C25(grupo)
<i>Dichorisandra thyrsiflora</i> Mikan.	Commelinaceae	Dicorisandra	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C19(2), C25(2)
<i>Dichroa febrifuga</i> Lour.	Hydrangeaceae		Indomalaio	Perenifólio	1-12	5-7	Nano.	Arbusto	Z8	C15(1)
<i>Dicksonia antarctica</i> Labill.	Dicksoniaceae	Feto-arbóreo	Australiano	Perenifólio	1-12	-----	Micro.	Árvore	Z8	C13(3)
<i>Dieffenbachia seguine</i> (Jacq.) Schott.	Araceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Herbácea	Z10	C19(1), C22(12)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Dietes bicolor</i> (Steud.) Klatt.	Iridaceae	Dites-bicolor	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	4-8	Geófito	Herbácea	Z9	C10(grupo)
<i>Dietes grandiflora</i> N. E. Br.	Iridaceae	Dietes	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	5-8	Geófito	Herbácea	Z9	C20 (grupo)
<i>Dioscorea elephantipes</i> (L' Hérít) Engl.	Dioscoreaceae	Pata-de-elefante	Áfricotropical	Sazonal	3-10	6-8	Hemi.	Herbácea trepadora	Z10	C13(1)
<i>Dodonaea viscosa</i> (L.) Jacq.	Sapindaceae		Indomalaio; Australianao; Áfricotropical; Neotropical	Perenifólio	1-12	3-6	Micro.	Arbusto	Z9	C13(1)
<i>Dombeya cacuminum</i> Hochr.	Sterculiaceae	Dombeia; Aurora	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-4	Micro.	Árvore	Z10	C23(1), C22(1)
<i>Dracaena deremensis</i> Engl.	Agavaceae (Dracaenaceae)	Dracena	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	11-12	Micro.	Arbusto	Z11	C7(1), C16(2), C18(1), C19(1), C20(10), C25(2)
<i>Dracaena draco</i> L. ssp. <i>draco</i>	Agavaceae	Dragoeiro	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-6	Micro.	Árvore	Z11	C6(8), C15(2), C19(1), C23(2) C24(2)
<i>Dracaena fragrans</i> (L.) Ker- Gawl.	Agavaceae	Dracena	Africotropical	Perenifólio	1-12	11-12	Micro.	Arbusto	Z12	C16(1)
<i>Dracaena marginata</i> Lam.	Agavaceae	Dracena	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu**	Micro.	Arbusto	Z11	C18(4), C19(1), C20(2), C21(1)
<i>Dyckia minarum</i> Mez.	Bromeliaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Caméfito	Herbácea	Z9	C12(3)
<i>Echeveria agavoides</i> Lem.	Crassulaceae	Echeveria	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-6	Caméfito	Herbácea suculenta	Z8	C12(6)
<i>Echeveria elegans</i> Rose.	Crassulaceae	Rosa-mexicana	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-9	Caméfito	Herbácea suculenta	Z8	C12(grupo)
<i>Echeveria pilosa</i> Purpus.	Crassulaceae	Echeveria	Neotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Caméfito	Herbácea suculenta	Z8	C13(1)
<i>Echeveria pulvinata</i> Rose	Crassulaceae	Echevéria	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-6	Caméfito	Herbácea suculenta	Z9	E12(3)
<i>Echeveria sanchez- mejoradae</i> Walth.	Crassulaceae	Echeveria	Neotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Caméfito	Herbácea suculenta	Z8	C12(3)
<i>Echeveria secunda</i> W. B. Booth.	Crassulaceae	Echeveria	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-7	Caméfito	Herbácea suculenta	Z8	C23, C25 (grupo)
<i>Echeveria secunda</i> W. B. Booth. var. <i>glauca</i> (Bak.) Otto.	Crassulaceae	Echeveria	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-7	Caméfito	Herbácea suculenta	Z8	C13(1)
<i>Echinocactus grusonii</i> Hildm.	Cactaceae	Almofada-de-sogra	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-8	Caméfito	Herbácea suculenta	Z9	C12(6)
<i>Echium nervosum</i> Dryand.	Boraginaceae	Massaroco	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-3	Nano.	Arbusto	Z11	C6(3), C9(1), C12(1), C14(3), C15(1), C17(1), C23(2), C24(1)
<i>Encephalartos lehmannii</i> Lehm.	Zamiaceae		Áfricotropical	Perenifólio	1-12	5-11	Nano.	Árvore	Z9	C1(1)
<i>Ensete ventricosum</i> (Welw.) E.E. Cheesm.	Musaceae	Bananeira-da- abissínia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Terófito	Herbácea	Z10	C17(1)
<i>Ephedra fragilis</i> Desf.	Ephedraceae	Efédra	Paleártico	Caducifólio	10-3	6-7	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z8	C6(1)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Epidendrum ibaguense</i> HBK	Orchidaceae	Orquídea-de-cruz	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C25(1)
<i>Epiphyllum crenatum</i> (Lindl.) G. Don ex Loud.	Cactaceae	Cacto-orquídea	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-7	Epífita	Herbácea suculenta	Z10	C23(grupo)
<i>Epipremnum aureum</i> (Lind. & André)	Araceae		Oceânia	Perenifólio	1-12	6-8	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z10	C9(2), C13, C19 (grupo)
<i>Eranthemum pulchellum</i> André	Acanthaceae	Salva-azul	Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C8(1), C27(2)
<i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl.	Rosaceae	Nespereira	Paleártico	Perenifólio	1-12	10-12	Micro.	Árvore	Z8	C31(1)
<i>Eriocephalus africanus</i> L.	Compositae	Alecrim-de-nossa-senhora	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-1	Nano.	Arbusto	Z9	C14(1)
<i>Erythrina crista-galli</i> L.	Leguminosae (Papilionoideae)	Coraleira; Coralina-crista-de-galo	Neotropical	Marcescente	4-3 (12-3)	4-1	Micro.	Árvore	Z8	C10(1)
<i>Erythrina lysistemon</i> Hutch.	Leguminosae (Papilionoideae)	Coralina	Áfricotropical	Marcescente	5-4 (12-4)	12-5	Micro.	Árvore	Z10	C9(1), C14(2)
<i>Eucalyptus gunni</i> Hook.	Myrtaceae	Eucalipto	Australiano	Perenifólio	1-12	11-2	Micro.	Árvore	Z8	C9(1)
<i>Eugenia uniflora</i> L.	Myrtaceae	Pitangueira	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Árvore	Z10	C10(1), C18(1), C20(1), C22(2), C23(1)
<i>Euphorbia cotinifolia</i> L.	Euphorbiaceae	Eufórbia	Neotropical	Caducifólio	3-12	7-11	Micro.	Árvore	Z11	C27(1), C29(2)
<i>Euphorbia grandidentata</i> Haw.	Euphorbiaceae	Eufórbia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Micro.	Arbusto	Z8	C23(1)
<i>Euphorbia ingens</i> E. Mey.	Euphorbiaceae	Eufórbia-gigante	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	10-12	Micro.	Arbusto suculento	Z9	C6(1), C11(2), C25(3)
<i>Euphorbia milii</i> Desmoul.	Euphorbiaceae	Mira-mira-não-me-toques	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C12(1), C16(1), C23(grupo)
<i>Euphorbia nerifolia</i> L.	Euphorbiaceae	Eufórbia	Indomalaio; Oceânia	Perenifólio	1-12	3-7	Micro.	Arbusto suculento	Z10	C11(2)
<i>Euphorbia tirucalli</i> L.	Euphorbiaceae	Eufórbia	Áfricotropical; Indomalaio	Perenifólio	1-12	4-9	Micro.	Arbusto suculento	Z10	C18(2)
<i>Euphorbia trigona</i> Mill.	Euphorbiaceae	Eufórbia	Africotropical	Perenifólio	1-12	6-8	Micro.	Arbusto suculento	Z10	C9(2), C12(1)
<i>Evolvulus pilosus</i> Nutt.	Convolvulaceae		Neártico	Perenifólio	1-12	1-12	Caméfito	Herbácea	Z7	C27(grupo)
<i>Farugium japonicum</i> (L.) Kitam.	Compositae	Patás-de-cavalo; Boinas	Paleártico	Perenifólio	1-12	7-3	Hemi.	Herbácea	Z7	C8, C17, C18, C25 (grupo)
<i>Fascicularia pitcairniifolia</i> (hort. Berlin ex Verl.) Mez.	Bromeliaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Hemi.	Herbácea	Z8	C23(grupo)
<i>Faucaria albidens</i> N.E. Br.	Aizoaceae		Áfricotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Hemi.	Herbácea suculenta	Z9	C12(3)
<i>Faucaria felina</i> (Weston) Schwantes ex Jacobsen	Aizoaceae		Áfricotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Hemi.	Herbácea suculenta	Z9	C12(3)
<i>Faucaria tigrina</i> (Haw.) Schwantes	Aizoaceae		Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea suculenta	Z9	C12(3)
<i>Faucaria tuberculosa</i> (Rolle) Schwantes	Aizoaceae		Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea suculenta	Z9	C12(3)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Ferocactus gracilis</i> H.E. Gates ssp. <i>coloratus</i> (Gates) N. P. Taylor	Cactaceae		Neártico	Perenifólio	1-12	3-4	Caméfito	Herbácea suculenta	Z10	C12(1)
<i>Festuca glauca</i> Vill.	Gramineae	Festuca	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-6	Hemi.	Herbácea	Z3	C7, C9 (mancha)
<i>Ficus benjamina</i> L.	Moraceae	Figueira-da-índia	Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-4	Micro.	Árvore	Z11	C27(4)
<i>Ficus benjamina</i> L. var. <i>nuda</i> (Miq.) Barrett	Moraceae	Figueira-da-índia	Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-4	Meso.	Árvore	Z11	C24(2), C30(1)
<i>Ficus carica</i> L.	Moraceae	Figueira	Paleártico	Caducifólio	4-12	6-7	Micro.	Árvore	Z8	C15(1)
<i>Ficus elastica</i> Roxb. ex Homem	Moraceae	Borracheira	Indomalaio	Perenifólio	1-12	5-8	Micro.	Árvore	Z11	C30(4)
<i>Ficus pumila</i> L.	Moraceae	Pastinha	Indomalaio; Paleártico	Perenifólio	1-12	10-12	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z8	C6, C30 (grupo)
<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	Umbelliferae	Funcho	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-8	Hemi.	Herbácea	Z5	C25(grupo)
<i>Fuchsia magellanica</i> Lam.	Onagraceae	Fúcsia; Brincos-de- princesa; Mimos	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z7	C23(1)
<i>Furcraea foetida</i> (L.) Haw.	Agavaceae	Furcreia; Piteira	Neotropical	Perenifólio	1-12	9-12	Hemi..	Herbácea suculenta	Z10	C27(8)
<i>Furcraea sellosa</i> K. Koch. var. <i>marginata</i> Trel.	Agavaceae	Furcreia; Piteira	Neotropical	Perenifólio	1-12	8-12	Micro.	Árvore suculenta	Z10	C6(2), C12(1), C22(6), C23(1), C25(1), C27(3), C31(3)
<i>Gardenia augusta</i> (L.) Merrill	Rubiaceae	Gardénia	Paleártico; Indomalaio	Perenifólio	1-12	6-8	Nano.	Arbusto	Z10	C13(12)
<i>Gaura lindheimeri</i> Engelm. & Gray.	Onagraceae		Neártico	Perenifólio	1-12	6-8	Hemi.	Herbácea	Z5	C9(grupo)
<i>Gerbera jamesonii</i> Bol. ex Adlam.	Compositae	Gerbera	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z8	C23 (grupo)
<i>Gibbaeum velutinum</i> (L. Bol.) Schwantes	Aizoaceae		Áfricotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Hemi.	Herbácea suculenta	Z9	C12(3)
<i>Gladiolus callianthus</i> Marais.	Iridaceae	Gladiolos	Áfricotropical	Sazonal	6-11	7-10	Geófito	Herbácea	Z11	C10(grupo)
<i>Gladiolus natalensis</i> Hook	Iridaceae	Gladiolos	Áfricotropical	Sazonal	2-7	3-6	Geófito	Herbácea	Z10	C12, C13, C18(grupo)
<i>Glottiphyllum nelii</i> Schwantes	Aizoaceae		Áfricotropical	Perenifólio	1-12	4-6	Caméfito	Herbácea suculenta	Z9	C12(3)
<i>Goniophlebium subauriculatum</i> (Bl.) Presl.	Polypodiaceae	Feto-de- metro; Feto-chorão	Indomalaio; Australiano; Oceânia	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z10	C4, C21 (grupo)
<i>Grevillea robusta</i> A. M. Cunn. ex. R. Br.	Proteaceae	Grevilea	Australiano	Perenifólio	1-12	4-7	Meso.	Árvore	Z8	C29(1)
<i>Guzmania lingulata</i> (L.) Mez. var. <i>minor</i> (Mez.) L. B. Sm.	Bromeliaceae	Bromélia	Neotropical	Perenifólio	1-12	11-5	Hemi.	Herbácea	Z11	C15, C23 (grupo)
<i>Haloragis erecta</i> (Banks ex Murr.) Oken	Halorageaceae		Antártico	Perenifólio	1-12	5-7	Nano.	Herbácea	Z9	C13(grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Haworthia attenuata</i> Haw.	Liliaceae (Aloeaceae)		Áfricotropical	Perenifólio	1-12	4-6	Caméfito	Herbácea suculenta	Z9	C12(5)
<i>Haworthia cymbiformis</i> (Haw.) Duval.	Liliaceae (Aloeaceae)		Áfricotropical	Perenifólio	1-12	4-6	Caméfito	Herbácea suculenta	Z9	C13(grupo)
<i>Hedera canariensis</i> Willd.	Araliaceae	Hera	Paleártico	Perenifólio	1-12	7-10	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	C12(grupo)
<i>Hedera helix</i> L.	Araliaceae	Hera	Paleártico	Perenifólio	1-12	9-10	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z5	C18, C19, C24 (grupo)
<i>Hedychium gardnerianum</i> Ker-Gawl.	Zingiberaceae	Bananilha; Roca-de-vénus; Conteira	Paleártico; Indomalaio	Perenifólio	1-12	7-10	Hemi	Herbácea	Z9	C18(grupo)
<i>Helichrysum bellidioides</i> (Forst. f.) Willd.	Compositae	Perpétua	Antártico	Perenifólio	1-12	5-8	Caméfito	Arbusto	Z7	C15(grupo)
<i>Helichrysum petiolare</i> Hilliard & B. L. Burt.	Compositae		Áfricotropical	Perenifólio	1-12	8-11	Nano.	Arbusto	Z9	C6, C15, C24 (grupo)
<i>Heliconia bihai</i> (L.) L.	Heliconiaceae	Helicónia	Neotropical	Perenifólio	1-12	7-11	Hemi.	Herbácea	Z11	C1(20), C18, C21 (grupo)
<i>Heliotropium arborescens</i> L.	Boraginaceae	Heliotrópio	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z9	C13(2)
<i>Helleborus x sternii</i> Turrill.	Ranunculaceae		Hortícola	Perenifólio	1-12	1-6	Hemi.	Herbácea	Z7	C13(4), C18(5)
<i>Hibbertia scandens</i> (Willd.) Dryand.	Dilleniaceae	Hibértia	Australiano	Perenifólio	1-12	3-7	Fane.trep.	Arbusto trepador	Z9	C30(1)
<i>Hibiscus mutabilis</i> L.	Malvaceae	Rosa-de-algodão	Paleártico	Perenifólio	1-12	6-11	Micro.	Arbusto	Z8	C9(1)
<i>Hibiscus rosa-sinensis</i> L.	Malvaceae	Cardeais; Hibiscos; Rosa-da-china	Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C1(3), C6(2), C9(7), C15(2), C18(1), C19(1), C20(5), C21(7), C22(1), C23(2), C26(6), C27(5), C31(sebe)
<i>Hibiscus schizopetalus</i> (Mast.) Hook.	Malvaceae	Lanterna-japonesa	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	3-11	Micro.	Arbusto	Z10	C7(1), C31(1)
<i>Howea forsteriana</i> (C. Moore & F. Muell.) Becc.	Palmae	Quência	Australiano	Perenifólio	1-12	1-9	Micro.	Árvore	Z10	C19(2), C22(4), C29(4)
<i>Hylocereus triangularis</i> (L.) Britt. & Rose	Cactaceae	Rainha-da-noite; Cacto-trepador	Neotropical	Perenifólio	1-12	7-10	Fane. trep.	Arbusto trepador e suculento	Z10	C6(grupo na rocha), C13(3), C15(grupo na rocha), C18(1), C24(grupo na rocha)
<i>Hymenocallis narcissiflora</i> (Jacq.) Macbr.	Amaryllidaceae	Lírio-aranha	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-6	Geófito	Herbácea	Z9	C25(grupo)
<i>Hyparrhenia hirta</i> (L.) Stapf	Gramineae	Feno	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-5	Hemi.	Herbácea	Z9	C9(grupo)
<i>Impatiens hawkeri</i> Bull.	Balsaminaceae	Maravilhas	Hortícola	Sazonal	4-9	5-8	Terófito	Herbácea	Z10	C4, C23 (grupo)
<i>Impatiens walleriana</i> Hook. f.	Balsaminaceae	Maravilhas	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Herbácea	Z9	C18(grupo)
<i>Ipomoea cyanea</i> (Lindl.) Green.	Solanaceae	Iocroma	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z9	C15(grupo), C25(1)
<i>Ipomoea grandiflora</i> Benth.	Solanaceae	Iocroma	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-8	Micro.	Arbusto	Z9	C15(grupo)
<i>Ipomoea batatas</i> (L.) Poir.	Convolvulaceae	Batata-doce	Neotropical; Oceânia	Perenifólio	1-12	6-10	Geófito	Herbácea trepadora	Z9	C13(grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Ipomoea indica</i> (Burm.) Merrill	Convolvulaceae	Campainhas	Neotropical; Áfricotropical; Indomalaio; Oceânia	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z10	C18, C30 (grupo)
<i>Iresine herbstii</i> Hook.	Amaranthaceae	Iresine	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Caméfito	Herbácea	Z10	C15, C23, C25 (grupo)
<i>Iris germanica</i> L. var. <i>florentina</i> (L.) Dykes	Iridaceae	Lírio-branco	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-6	Geófito	Herbácea	Z4	C27 (grupo)
<i>Iris japonica</i> Thunb.	Iridaceae	Lírio-do-japão	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-8	Geófito	Herbácea	Z8	C27 (grupo)
<i>Iris lutescens</i> Lam.	Iridaceae	Lírio	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-5	Geófito	Herbácea	Z5	C13 (grupo)
<i>Itea ilicifolia</i> Oli.	Grossulariaceae (Iteaceae)		Paleártico	Perenifólio	1-12	7-8	Micro.	Arbusto	Z7	C13(1)
<i>Jacaranda mimosifolia</i> D. Don.	Bignoniaceae	Jacarandá	Neotropical	Caducifólio	5-2	4-6; 9-10	Meso.	Árvore	Z9	C13(1), C27(2), C29(1), C30(7), C31(1)
<i>Jasminum azoricum</i> L.	Oleaceae	Jasmineiro-branco	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-11	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z11	C12(1)
<i>Jasminum polyanthum</i> Franch.	Oleaceae	Jasmim-dos-poetas	Paleártico	Perenifólio	1-12	2-6	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z8	C24(1)
<i>Jasminum sambac</i> (L.) Ait.	Oleaceae	Jasmim-da-arábia	Indomalaio	Perenifólio	1-12	3-7	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	C5(3)
<i>Jatropha integerrima</i> Jacq.	Euphorbiaceae	Jatrofa	Neotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Nano.	Árvore	Z10	C13(1)
<i>Jatropha podagrica</i> Hook.	Euphorbiaceae	Jatrofa	Neotropical	Perenifólio	1-12	12-2	Nano.	Arbusto suculento	Z10	C23(1)
<i>Juniperus excelsa</i> Bieb.	Cupressaceae	Cedro	Paleártico	Perenifólio	1-12	2-3	Micro.	Árvore	Z6	C11(1)
<i>Justicia brandegeana</i> Wassh.	Acanthaceae	Beloperone	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C13 (grupo), C18(1)
<i>Justicia camea</i> Lindl.	Acanthaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	5-10	Nano.	Arbusto	Z12	C7(1)
<i>Kalanchoe ambolensis</i> Humbert	Crassulaceae		Áfricotropical	Perenifólio	1-12	12-3	Nano.	Arbusto suculento	Z10	C12(3)
<i>Kalanchoe beharensis</i> Drake.	Crassulaceae	Arbusto-de-feltro	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	12-3	Micro.	Arbusto suculento	Z10	C8(1), C9(3), C10(5), C12(7), C23(7)
<i>Kalanchoe daigremontiana</i> Hamet & Perrier	Crassulaceae	Calanchoé	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	12-5	Nano.	Arbusto suculento	Z11	C12, C13, C14, C23 (grupo)
<i>Kalanchoe delagouensis</i> Ecklon & Zeyh.	Crassulaceae	Calanchoé	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	12-9	Nano.	Arbusto suculento	Z11	C13, C18, C23 (grupo)
<i>Kalanchoe fedtschenkoi</i> Hamet & Perrier.	Crassulaceae	Calanchoé	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-8	Caméfito	Arbusto suculento	Z11	C8, C27 (grupo)
<i>Kalanchoe flammea</i> Stapf.	Crassulaceae	Calanchoé	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Nano.	Arbusto suculento	Z11	C12(3)
<i>Kalanchoe hildbrandtii</i> Baill.	Crassulaceae	Calanchoé	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Nano.	Arbusto suculento	Z11	C12(3)
<i>Kalanchoe mamorata</i> Bak.	Crassulaceae	Calanchoé	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	11-2	Nano.	Arbusto suculento	Z11	C12(2)
<i>Kalanchoe mamieriana</i> H. Jacobsen	Crassulaceae	Calanchoé	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Nano.	Arbusto suculento	Z11	C12(3)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Kalanchoe millottii</i> Harmet & Perrier	Crassulaceae	Calanchoé	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Caméfito	Arbusto suculento	Z11	C12(3)
<i>Kalanchoe orygalis</i> Bak.	Crassulaceae	Calanchoé	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	5-6	Nano.	Arbusto suculento	Z11	C13(1)
<i>Kalanchoe pinnata</i> (Lam.) Pers.	Crassulaceae	Calanchoé	Neotropical; Áfricotropical; Indomalaio; Oceânia	Perenifólio	1-12	2-5	Nano.	Arbusto suculento	Z11	C8, C12, C20 (grupo)
<i>Kalanchoe thyrsiflora</i> Harv.	Crassulaceae	Calanchoé	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	12-2	Nano.	Arbusto suculento	Z11	C23(grupo)
<i>Kigelia africana</i> (Lam.) Benth.	Bignoniaceae	Árvore-das-salsichas	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	5-7	Micro.	Árvore	Z10	C27(1)
<i>Kleinia amaniensis</i> (Engl.) A. Berger	Compositae		Áfricotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Caméfito	Herbácea suculenta	Z10	C12(3)
<i>Kleinia grantii</i> (Oliv. & Hiern.) Hook.	Compositae		Áfricotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Caméfito	Herbácea suculenta	Z10	C12(3)
<i>Kleinia petraea</i> (R. E. Fries)	Compositae		Áfricotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Caméfito	Herbácea suculenta	Z10	C12(5)
<i>Kohleria eriantha</i> (Benth.) Hanst.	Gesneriaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z11	C23, C25 (grupo)
<i>Lablab purpureus</i> (L.) Sweet	Leguminosae (Papilionoideae)		Áfricotropical	Perenifólio	1-12	3-7	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z9	C15(grupo)
<i>Lagerstroemia indica</i> L.	Lythraceae	Laguerestrémia; Flor-de-merenda; Suspiros	Paleártico; Indomalaio	Caducifólio	3-11	7-9	Micro.	Árvore	Z7	C15(2), C21(1)
<i>Lampranthus aurantiacus</i> (DC.) Swantes.	Aizoaceae	Lamprantos-laranja; Chorão	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	4-12	Fane. trep.	Arbusto trepador e suculento	Z11	C23(grupo)
<i>Lampranthus comptonii</i> (L. Bol.) N. E. Br.	Aizoaceae	Lamprantos-branco; Chorão	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	3-8	Fane. trep.	Arbusto trepador e suculento	Z11	C13, C23(grupo)
<i>Lampranthus deltoides</i> (L.) Glen.	Aizoaceae	Osculária	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	3-8	Fane. trep.	Arbusto trepador e suculento	Z11	C13, C23 (grupo)
<i>Lantana camara</i> L.	Verbenaceae	Lantana	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C20(1), C21(1), C30(1)
<i>Lantana montevidensis</i> (Spreng.) Briq.	Verbenaceae	Lantana	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C13(1)
<i>Laurus nobilis</i> L.	Lauraceae	Loureiro	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-6	Micro.	Árvore	Z7	C7(1)
<i>Lavandula angustifolia</i> Mill.	Labiatae	Alfazema	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z6	C10, C15 (grupo)
<i>Lavandula dentata</i> L.	Labiatae	Alfazema	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z8	C23 (grupo)
<i>Leonotis leonurus</i> (L.) R. Br.	Labiatae	Rabos-de-leão; Orelhas-de-leão	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	3-11	Nano.	Arbusto	Z9	C23(2)
<i>Leucadendron argenteum</i> (L.) R. Br.	Proteaceae	Árvore-de-prata	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	11-1	Micro.	Árvore	Z11	C7(1)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitoceográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) De Wit.	Leguminosae (Mimosoideae)	Aroma-branco; Leucena	Neártico	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z9	C6, C15, C24 (grupo)
<i>Leucanthemum x superbum</i> (J. Ingram) Bergmans ex Kent	Compositae	Estrelas	Hortícola	Perenifólio	1-12	5-8	Nano.	Herbácea	Z5	C7, C9 (grupo)
<i>Ligustrum lucidum</i> Ait. f.	Oleaceae	Ligustro; Alfinheiro	Paleártico	Perenifólio	1-12	7-9	Micro.	Árvore	Z7	C13(1)
<i>Lilium candidum</i> L.	Liliaceae	Lírio-de-nossa-senhora	Paleártico	Sazonal	2-7	4-6	Geófito	Herbácea	Z6	C13, C15, C18 (grupo)
<i>Livistona australis</i> (R. Br.) Mart.	Palmae	Palmeira-de-leque-da-austrália	Australiano	Perenifólio	1-12	4-5	Meso.	Árvore	Z9	C31(3)
<i>Livistona chinensis</i> (Jacq.) R. Br. ex Mart.	Palmae	Palmeira-de-leque-da-china	Paleártico	Perenifólio	1-12	2-5	Meso.	Árvore	Z9	C1(1), C2(1), C10(1), C13(1), C22(5), C25(2), C31(2)
<i>Lobelia laxiflora</i> HBK.	Campanulaceae	Lobélia	Neártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z9	C23(grupo)
<i>Lonicera japonica</i> Thunb.	Caprifoliaceae	Madressilva	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-11	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z4	C10(1), C13(1), C17(1), C22(1), C24(1), C29(1)
<i>Lotus corniculatus</i> L. ssp. <i>hirsutus</i> (W.D.J. Koch) Rothm.	Leguminosae (Papilionoideae)	Lótus	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-7	Nano.	Herbácea	Z5	C14(grupo)
<i>Mackaya bella</i> Harv.	Acanthaceae	Macaia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-7	Micro.	Arbusto	Z10	C19(1)
<i>Magnolia grandiflora</i> L.	Magnoliaceae	Magnólia	Neártico	Perenifólio	1-12	5-8	Micro.	Árvore	Z6	C29(2)
<i>Malvaviscus arboreus</i> Cav.	Malvaceae	Malvavisco	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z9	C23(1)
<i>Mammillaria fittkaui</i> Glass & Foster	Cactaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	7-11	Hemi.	Herbácea suculenta	Z9	C12(9)
<i>Mammillaria sempervivi</i> DC.	Cactaceae	Mamilária	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-8	Hemi.	Herbácea suculenta	Z9	C13(2)
<i>Mandevilla boliviensis</i> (Hook. f.) Woodson	Apocynaceae	Dipladénia-branca	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	C7(3)
<i>Mandevilla sanderi</i> (Hemsl.) Woodson. cvs.	Apocynaceae	Dipladénia - vermelha	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	C20(1), C21(1)
<i>Mangifera indica</i> L.	Anacardiaceae	Mangueiro	Indomalaio	Perenifólio	1-12	11-6	Micro.	Árvore	Z11	C19(1), C23(4)
<i>Medinilla magnifica</i> Lindl.	Melastomataceae	Medinila	Indomalaio	Perenifólio	1-12	6-9	Nano.	Arbusto	Z11	C21(6)
<i>Melianthus major</i> L.	Meliantaceae	Meliantos	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	3-5	Micro.	Arbusto	Z9	C7(1), C8(1), C27(2)
<i>Monstera deliciosa</i> Liebm.	Araceae	Fruto-delicioso; Costela-de-adão	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z10	C7(1), C16(1), C19(2), C27(2)
<i>Montanoa bipinnatifida</i> (Kunth) K. Kock	Compositae	Malmequer-arbóreo	Neotropical	Perenifólio	1-12	11-3	Micro.	Arbusto	Z10	C16(1), C17(2)
<i>Morus nigra</i> L.	Moraceae	Amoreira	Paleártico	Caducifólio	3-12	4-5	Micro.	Árvore	Z6	C23(1)
<i>Murraya paniculata</i> (L.) Jack.	Rutaceae	Jasmim-laranja; Falsa-murta	Indomalaio; Australiano	Perenifólio	1-12	9-12	Micro.	Arbusto	Z10	C21(1), C22(1)
<i>Musa acuminata</i> Colla	Musaceae	Bananeira	Indomalaio; Australiano	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C13, C17, C18, C31 (grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Musa velutina</i> Wendl. & Drude.	Musaceae	Bananeira-de-jardim	Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z9	C13, C18 (grupo)
<i>Neobuxbaumia euphorbioides</i> (Haw.) F. Buxb.	Cactaceae	Cacto	Neotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Nano.	Arbusto suculento	Z9	C12 (grupo)
<i>Neodypsis decaryi</i> Jumelle	Palmae	Palmeira-triangular	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	6-7	Micro.	Árvore	Z11	C19(1), C20(1)
<i>Neomarca caerulea</i> (Ker-Gawl.) Sprague	Iridaceae	Neomárica	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-10	Geófito	Herbácea	Z10	C27(1)
<i>Neoregelia carolinae</i> (Beer) L. B.	Bromeliaceae	Bromélia	Neotropical	Perenifólio	1-12	11-2	Hemi.	Herbácea	Z10	C23(grupo)
<i>Nephrolepis cordifolia</i> (L.) Presl.	Oleandraceae	Feto	Neotropical; Áfricotropical; Indomalaio; Oceânia; Australiano	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z10	C13, C15C18, C19, C20, C25 (grupo)
<i>Nephrolepis exaltata</i> (L.) Schott.	Oleandraceae	Feto	Neotropical; Áfricotropical; Indomalaio; Oceânia; Australiano	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z10	C1, C2, C3, C4 (grupo)
<i>Nerium oleander</i> L.	Apocynaceae	Sevadilha; Loendro	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-11	Micro.	Arbusto	Z9	C1(2), C8(1), C11(4), C18(1), C22(2), C27(1), C30(>20)
<i>Nidularium procerum</i> Lindm.	Bromeliaceae	Bromélia	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-6	Hemi.	Herbácea	Z10	C15(grupo)
<i>Nolina recurvata</i> (Lem.) Hemsl.	Agavaceae	Nolina; Pata-de-elefante	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-8	Micro.	Árvore	Z9	C1(4), C2(1), C13(2), C18(1), C21(1), C22(3), C25(1), C30(1)
<i>Nothoscordum gracile</i> (Ait.) Stearn.	Liliaceae (Alliaceae)	Alinhos	Neotropical	Sazonal	1-4	1-3	Geófito	Herbácea	Z7	C9, C27 (grupo)
<i>Ochna serrulata</i> (Hochst.) Walp.	Ochnaceae	Planta-do-rato-mickey	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	2-4	Nano.	Arbusto	Z9	C15(grupo), C23(1)
<i>Ocimum basilicum</i> L.	Labiatae	Manjerição-grande	Indomalaio	Sazonal	4-9	5-9	Terófito	Herbácea	Z10	C25(grupo)
<i>Ocotea foetens</i> (Aiton) Baill.	Lauraceae	Til	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Meso.	Árvore	Z10	C30(1)
<i>Odontonema strictum</i> (Nees) Kuntze	Acanthaceae	Odontonema; Ramo-de-fogo	Neotropical	Perenifólio	1-12	8-12	Nano.	Arbusto	Z10	C20(1), C21(1), C22(grupo)
<i>Olea maderensis</i> (Lowe) Rivas Mart. & Del Arco	Oleaceae	Oliveira-brava; Oliveira-da-rocha; Zambujeiro	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-6	Micro.	Árvore	Z11	C6(3), C15(1)
<i>Ophiopogon japonicus</i> (L. f.) Ker-Gawl	Liliaceae (Convallariaceae)	Relva-do-japão	Paleártico	Perenifólio	1-12	7-9	Hemi.	Herbácea	Z8	C23(mancha)
<i>Ophiopogon planiscapus</i> Nak.	Liliaceae (Convallariaceae)	Relva-preta-do-japão	Paleártico	Perenifólio	1-12	7-9	Hemi.	Herbácea	Z6	C13, C23(mancha)
<i>Opuntia cylindrica</i> (Lam.) DC.	Cactaceae	Cacto-redondo	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-7	Micro.	Arbusto suculento	Z9	C23(2)
<i>Opuntia macrocentra</i> Engelm.	Cactaceae	Tabaibeira	Neártico	Perenifólio	1-12	5-6	Nano.	Arbusto suculento	Z9	C12(2)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitoceográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Oreopteris limbosperma</i> (All.) Holub	Thelypteridaceae	Feto	Paleártico	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z7	C19(grupo)
<i>Origanum majorana</i> L.	Labiatae	Manjerona	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-9	Nano.	Herbácea	Z7	C25(grupo)
<i>Osmunda regalis</i> L.	Osmundaceae	Feto-real	Paleártico; Neártico	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z3	C25(2)
<i>Othonna capensis</i> L. H. Bail.	Compositae		Áfricotropical	Perenifólio	1-12	6-9	Caméfito	Herbácea suculenta	Z9	C3(1), C18(4)
<i>Oxalis latifolia</i> HBK.	Oxalidaceae	Trevo	Neotropical	Sazonal	10-5	12-4	Geófito	Herbácea	Z9	C10 (grupo)
<i>Pachypodium lamerei</i> Drake	Apocynaceae	Paquipedio	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	8-9	Micro.	Árvore suculenta	Z9	C7(1), C12(4)
<i>Pandorea jasminoides</i> (Lindl.) Schum.	Bignoniaceae	Bignónia	Australiano	Perenifólio	1-12	4-11	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z9	C31(grupo)
<i>Parthenocissus tricuspidata</i> Planchon	Vitaceae	Vinha-virgem	Paleártico	Caducifólio	4-12	5-6	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z4	C26(1), C29(1)
<i>Passiflora amethystina</i> Mikan.	Passifloraceae	Maracujá; Flor-da-paixão	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-7	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	C25(3)
<i>Passiflora caerulea</i> L.	Passifloraceae	Maracujá; Flor-da-paixão	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-7	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z8	C25(1)
<i>Passiflora edulis</i> Sims	Passifloraceae	Maracujá-roxo; Flor-da-paixão	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-11	Fane.trep.	Arbusto trepador	Z10	C22(grupo)
<i>Passiflora x alato-caerulea</i> (P. alata x P. caerulea)	Passifloraceae	Maracujá; Flor-da-paixão	Hortícola	Perenifólio	1-12	5-7	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z9	C25(1), C26(1)
<i>Passiflora x caerulea-racemosa</i> (P. caerulea x P. racemosa)	Passifloraceae	Maracujá; Flor-da-paixão	Hortícola	Perenifólio	1-12	3-6	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z9	C23(grupo)
<i>Pelargonium peltatum</i> (L.) L'Hérit.	Geraniaceae	Malva	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z10	C7, C9, C10, C12, C15, C26 (grupo)
<i>Pelargonium quercifolium</i> (L.) L'Hérit.	Geraniaceae	Malva	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	2-8	Nano.	Arbusto	Z10	C13(2), C15(grupo), C18(grupo)
<i>Pelargonium zonale</i> (L.) L'Hérit.	Geraniaceae	Malva	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C9, C15, C18, C24 (grupo)
<i>Pentas lanceolata</i> (Forssk.) Deflers.	Rubiaceae	Pentas	Áfricotropical; Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C15(grupo)
<i>Peperomia magnoliifolia</i> (Jacq.) Dietr.	Piperaceae	Peperomia	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-10	Caméfito	Herbácea	Z11	C13 (1)
<i>Persea americana</i> Mill.	Lauraceae	Abacateiro	Neotropical	Perenifólio	1-12	11-5	Micro.	Árvore	Z10	C28(1)
<i>Petrea volubilis</i> L.	Verbenaceae	Estrela-azul; Viuvinha	Neotropical	Perenifólio	1-12	3-12	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	C22(1), C28(1)
<i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) A. W. Hill.	Umbelliferae	Salsa	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Herbácea	Z5	C25(grupo)
<i>Petunia x hybrida</i> hort. Vilm.-Andr.	Solanaceae	Petúnia	Hortícola	Sazonal	2-11	2-11	Terófito	Herbácea	Z9	C27(grupo)
<i>Phaedranassa carmoli</i> Bak.	Amaryllidaceae		Neotropical	Sazonal	3-6	3-6	Geófito	Herbácea	Z8	C13(1), C18(1)
<i>Phalaenopsis stuartiana</i> Reichb. f.	Orchidaceae	Falanópsia	Indomalaio	Perenifólio	1-12	10-6	Epífita	Herbácea	Z11	C24(grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Philodendron bipinnatifidum</i> Endl.	Araceae	Filodendro	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-7	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	C23(2)
<i>Philodendron erubescens</i> K. Koch & Augustin	Araceae	Filodendro	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-6	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z11	C13(16), C18(3), C19(1), C22(1)
<i>Philodendron pinnatifidum</i> Schott.	Araceae	Filodendro	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-6	Hemi.	Arbusto	Z11	C18(1), C21(1), C22(4)
<i>Philodendron quinquelobum</i> K. Krause	Araceae	Filodendro	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-6	Fane. trep.	Herbácea	Z12	C13(1)
<i>Philodendron undulatum</i> Engl.	Araceae	Filodendro	Neotropical	Perenifólio	1-12	3-4	Nano.	Arbusto	Z11	C1(1)
<i>Phlebodium aureum</i> (L.) J. Sm.	Polypodiaceae	Polipódio-dourado	Neártico; Neotropical	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z10	C25(grupo)
<i>Phoenix canariensis</i> Chabaud.	Palmae	Palmeira-das-canárias	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-3	Meso.	Árvore	Z11	C4(1), C6(5), C7(1), C9(7), C10(1), C11(4), C13(2), C14(10), C15(4), C17(3), C18(1), C19(2), C21(1), C30(7), C31(6)
<i>Phoenix dactylifera</i> L.	Palmae	Tamareira	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-3	Meso.	Árvore	Z11	C11(1), C13(1), C14(4), C25(1)
<i>Phoenix roebelinii</i> O'Brien.	Palmae	Palmeira-anã	Indomalaio	Perenifólio	1-12	5-7	Micro.	Árvore	Z11	C24(2), C29(2)
<i>Phyllanthus tenellus</i> Roxb.	Euphorbiaceae	Quebra-pedra	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Herbácea	Z11	C19, C23, C25, C27 (grupo)
<i>Phyllis nobla</i> L.	Rubiaceae	Cabreira	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-7	Nano.	Arbusto	Z9	C8(1), C9(1),
<i>Phyllostachys aurea</i> (Carr.) A. & C. Riv.	Gramineae	Bambu	Paleártico	Perenifólio	1-12	Não floriu**	Hemi.	Herbácea	Z6	C6(grupo)
<i>Pilea cadierei</i> Gagnep. & Guillaum.	Urticaceae	Planta-do-alumínio	Indomalaio	Perenifólio	1-12	10-12	Hemi.	Herbácea	Z11	C25(grupo)
<i>Pilea peperomioides</i> Diels.	Urticaceae		Paleártico	Perenifólio	1-12	5-7	Nano.	Herbácea	Z10	C13, C23, C25(grupo)
<i>Pistia stratiotes</i> L.	Araceae	Alface-de-água	Neotropical; Áfricotropical; Indomalaio; Oceânia; Australiano	Perenifólio	1-12	1-12	Hidrófita	Herbácea	Z10	C21(grupo)
<i>Pittosporum phillyraeoides</i> DC.	Pittosporaceae	Pitóspero-chorão; Incenseiro-chorão;	Australiano	Perenifólio	1-12	4-5	Micro.	Árvore	Z9	C16(1)
<i>Pittosporum tobira</i> Ait.	Pittosporaceae	Tobira	Paleártico	Perenifólio	1-12	2-5	Micro.	Árvore	Z9	C7(1)
<i>Pittosporum undulatum</i> Vent.	Pittosporaceae	Incenseiro	Australiano	Perenifólio	1-12	2-4	Micro.	Árvore	Z9	C9(1)
<i>Plantago major</i> L.	Plantaginaceae	Plantago-maior	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-8	Hemi.	Herbácea	Z6	C13(grupo)
<i>Platynerium bifurcatum</i> (Cav.) C. Chr.	Polypodiaceae	Feto-de-corno- de-veado	Indomalaio; Oceânia; Australiano	Perenifólio	1-12	-----	Epífita	Herbácea	Z9	C13(2), C17(1), C23(1), C30(1), C31(1)
<i>Platynerium superbum</i> De Joncheere & Hennisman	Polypodiaceae	Feto-de-corno- de-veado	Australiano	Perenifólio	1-12	-----	Epífita	Herbácea	Z10	C13(1)
<i>Platycladus orientalis</i> (L. f.) Franco	Cupressaceae	Tuia-oriental	Neártico	Perenifólio	1-12	1-3	Micro.	Árvore	Z6	C29(2)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Plectostachys serpyllifolia</i> (A. Berger) Hilliard & B. L. Burt.	Compositae		Áfricotropical	Perenifólio	1-12	3-6	Nano.	Arbusto	Z9	C15(grupo)
<i>Plectranthus argentatus</i> S. T. Blake	Labiatae		Australiano	Perenifólio	1-12	3-8	Nano.	Arbusto	Z10	C10(8), C18, C27 (grupo)
<i>Plectranthus barbatus</i> Andrews	Labiatae	Falso-boldo; Boldo-da-terra	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C10(6), C15(grupo)
<i>Plectranthus forsteri</i> Benth.	Labiatae	Plectratos	Australiano; Oceânia	Perenifólio	1-12	6-11	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z10	C7, C19, C20 (grupo)
<i>Plectranthus saccatus</i> Benth.	Labiatae		Áfricotropical	Perenifólio	1-12	4-7	Nano.	Arbusto	Z10	C23, C27(grupo)
<i>Plumbago auriculata</i> Lam.	Plumbaginaceae	Plúmbago	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z9	C5, C6, C8, C14, C15, C17, C20(2), C25, C27(grupo)
<i>Plumeria rubra</i> L. var. <i>acutifolia</i> (Poir.) Woodson.	Apocynaceae	Planta-dos-dentes	Neotropical	Caducifólio	5-1	6-12	Micro.	Árvore	Z10	C15(1), C21(1), C25(2), C30(2)
<i>Podocarpus salignus</i> D. Don.	Podocarpaceae	Podocarpo	Neotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu**	Micro.	Árvore	Z8	C20(1)
<i>Podranea ricasoliana</i> (Tanf.) Sprague.	Bignoniaceae	Ricassoliana	Neotropical	Caducifólio	5-1	6-12	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z11	C6(grupo)
<i>Polygala myrtifolia</i> L.	Polygalaceae	Polígala	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z9	C9(2)
<i>Polygonum capitatum</i> Buch.-Ham. ex D. Don	Polygonaceae	Polígono-de-jardim	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z8	C10(mancha)
<i>Polygonum runcinatum</i> (Buch-Ham) D. Don	Polygonaceae		Indomalaio	Perenifólio	1-12	4-7	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z12	C18(1)
<i>Polyscias scutellaria</i> (Burm. f.) Fosb.	Araliaceae		Indomalaio; Oceânia	Perenifólio	1-12	Não floriu**	Micro.	Arbustoo	Z11	C18(3)
<i>Portulacaria afra</i> Jacq.	Portulacaceae	Portulacária	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu**	Nano.	Arbusto suculento	Z9	C13(grupo)
<i>Pteris tremula</i> R. Br.	Pteridaceae	Feto	Australiano; Antártico; Oceânia; Áfricotropical	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z10	C25(1)
<i>Pteris vittata</i> L.	Pteridaceae	Feto	Paleártico; Indomalaio; Australiano; Oceânia	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z9	C8, C11, C13, C18, C19, C27 (grupo)
<i>Punica granatum</i> L.	Punicaceae	Romãzeira	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-7	Micro.	Árvore	Z9	C10(1), C13(1), C23(4)
<i>Pyracantha angustifolia</i> (Franch.) Schneid.	Rosaceae	Perinhos; Sarça-ardente	Paleártico	Perenifólio	1-12	2-6	Micro.	Arbusto	Z7	C31(1)
<i>Pyrostegia venusta</i> (Ker-Gawl.) Miers	Bignoniaceae	Gaitinhas	Neotropical	Perenifólio	1-12	11-5	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	C30(grupo)
<i>Reinwardtia indica</i> Dumort.	Linaceae		Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z9	C23(2)
<i>Rhapis excelsa</i> (Thunb.) Henry.	Palmae	Palmeira-de-hong-kong; Pameira-de-senhora	Paleártico	Perenifólio	1-12	6-9	Micro.	Arbusto	Z10	C19(2)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Rhododendron mucronatum</i> G. Don.	Ericaceae	Azálea-japonesa	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z5	C15(grupo), C19(12)
<i>Rhombophyllum dolabriforme</i> (L.) Schwantes	Aizoaceae		Áfricotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Caméfito	Herbácea suculenta	Z11	C12 (3)
<i>Rhombophyllum nelii</i> Schwantes	Aizoaceae		Áfricotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Caméfito	Herbácea suculenta	Z10	C12(3)
<i>Ricinus communis</i> L.	Euphorbiaceae	Rícino; Carrapateira	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z9	C18(7), C23(1)
<i>Roldana petasites</i> (Sims) H. Robinson & Bretell.	Compositae	Senécio	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-4	Micro.	Arbusto	Z9	C25(grupo)
<i>Rosa banksiae</i> Ait.	Rosaceae	Roseira	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z7	C17(1)
<i>Rosa laevigata</i> Michx.	Rosaceae	Roseira	Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z7	C11,C16, C17(grupo)
<i>Rosa x damascena</i> Mill. var. <i>semperflorens</i> (Duhamel) Rowley	Rosaceae	Rosa-de-quatro- estações	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z4	C5, C13, C29(grupo)
<i>Rosmarinus officinalis</i> L.	Labiatae	Alecrim	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z6	C9(5)
<i>Ruellia tweediana</i> Grisebach	Acanthaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	1-6	Nano.	Arbusto	Z10	C23(5)
<i>Russelia equisetiformis</i> Scltd. & Cham.	Scrophulariaceae	Russélia ; Lágrimas-de-amor	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z9	C10, C15, C16, C17, C18, C21 (grupo)
<i>Sabal palmetto</i> (Walt.) Lodd. Ex Scult. f.	Palmae	Palmeira-da- carolina	Neártico	Perenifólio	1-12	6-8	Micro.	Árvore	Z8	C16(1)
<i>Salvia confertiflora</i> Pohl.	Labiatae	Sálvia	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-9	Nano.	Herbácea	Z9	C23(1)
<i>Salvia discolor</i> Kunth.	Labiatae	Sálvia	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-9	Nano.	Herbácea	Z9	C15(grupo)
<i>Salvia elegans</i> Vahl.	Labiatae	Sálvia	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Herbácea	Z8	C15, C23 (grupo)
<i>Salvia guaranitica</i> St.-Hil. ex Benth.	Labiatae	Sálvia	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z9	C19, C20, C27 (grupo)
<i>Salvia leucantha</i> Cav.	Labiatae	Sálvia-branca	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z9	C14, C27, C30 (mancha)
<i>Salvia microphylla</i> Kunth.	Labiatae	Sálvia; Rapazinhos	Neártico; Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z9	C15(mancha)
<i>Sansevieria trifasciata</i> hort. ex Prain.	Agavaceae	Língua-de-sogra	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	8-11	Hemi.	Herbácea	Z10	C9, C25(grupo)
<i>Sansevieria trifasciata</i> Prain var. <i>laurentii</i> (De Wild.) N. E. Br.	Agavaceae	Língua-de-sogra	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	8-11	Hemi.	Herbácea	Z10	C7(1), C9(grupo)
<i>Sapindus saponaria</i> L.	Sapindaceae	Árvore-do-sabão	Neártico; Neotropical	Caducifólio	5-1	7-8	Micro.	Árvore	Z8	C1(1)
<i>Scadoxus multiflorus</i> (Martyn) Raf. ssp. <i>katherinae</i> (Baker) Friis & Nordal	Amaryllidaceae		Áfricotropical	Sazonal	6-12	3-6	Geófito	Herbácea	Z10	C23 (grupo)
<i>Schefflera actinophylla</i> (Endl.) Harms	Araliaceae	Brassaia	Australiano; Oceânia	Perenifólio	1-12	8-10	Meso.	Árvore	Z10	C17(1), C21(1)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Schefflera arboricola</i> (Hayata)	Araliaceae	Schefflera	Indomalaio	Perenifólio	1-12	2-4; 7-8	Micro.	Arbusto	Z10	C19(1), C22(6)
<i>Schefflera elegantissima</i> (Veitch ex Mast.) Lowry & Frodin	Araliaceae	Falsa-arália	Oceânia	Perenifólio	1-12	11-2	Micro.	Arbusto	Z10	C1(1), C8(2), C9(4), C13(7), C17(8), C22(1), C27(2)
<i>Schinus molle</i> L. non hort. ex Engl.	Anacardiaceae	Pimenteira- bastarda; Pimenteira-da- índia	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Meso.	Árvore	Z9	C4(1), C28(4)
<i>Schinus terebinthifolius</i> Raddi	Anacardiaceae	Pimenteira-do- brasil	Neotropical	Perenifólio	1-12	8-10	Micro.	Árvore	Z10	C24 (12)
<i>Schoenoplectus validus</i> (Vahl) Löve	Cyperaceae		Neártico	Perenifólio	1-12	5-7	Helófita	Herbácea	Z7	C13(grupo)
<i>Schotia brachypetala</i> Sonder.	Leguminosae (Caesalpinioideae)	Scótia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	2-5	Micro.	Árvore	Z9	C27(1)
<i>Scilla maderensis</i> Mnzs.	Liliaceae	Cila-da-madeira	Paleártico	Sazonal	9-5	10-11	Geófita	Herbácea	Z11	C21(grupo)
<i>Sedum alboroseum</i> Baker	Crassulaceae		Paleártico	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Nano.	Arbusto suculento	Z8	C25(grupo)
<i>Sedum dendroideum</i> Moc. & Sessé ex DC	Crassulaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Caméfito	Arbusto suculento	Z8	C12(5)
<i>Sedum lucidum</i> R.T. Clausen.	Crassulaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	5-6	Caméfito	Arbusto suculento	Z9	C13(3)
<i>Sedum morganianum</i> Walth.	Crassulaceae	Bananinhas	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-9	Nano.	Herbácea suculenta	Z9	C12(4)
<i>Sedum pachyphyllum</i> Rose	Crassulaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	1-4	Caméfito	Arbusto suculento	Z8	C12(5)
<i>Sedum reflexum</i> L.	Crassulaceae		Paleártico	Perenifólio	1-12	3-7	Caméfito	Herbácea suculenta	Z7	C12(5)
<i>Senecio articulatus</i> (L. f.) Schultz-Bip	Compositae	Senécio	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	9-11	Hemi.	Herbácea suculenta	Z9	C9(grupo)
<i>Senecio cineraria</i> DC.	Compositae	Senécio	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-8	Nano.	Arbusto	Z8	C12, C13, C27 (mancha)
<i>Senecio ficoides</i> (L.) Schultz.-Bip	Compositae		Áfricotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Nano.	Arbusto suculento	Z9	C12(3)
<i>Senecio haworthii</i> (Sw.) Steud.	Compositae		Áfricotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Caméfito	Arbusto suculento	Z9	C12(3)
<i>Senecio serpens</i> G. Rowley	Compositae	Bálsamo-camudo; Bálsamo-de- canudo	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Caméfito	Arbusto suculento	Z9	C7, C9, C12 (grupo)
<i>Senecio spiculosus</i> (Sheph.) G. Rowley	Compositae		Áfricotropical	Perenifólio	1-12	4-6	Nano.	Herbácea suculenta	Z9	C12(3)
<i>Senecio tamoides</i> DC.	Compositae	Senécio	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	10-6	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z9	C25(1)
<i>Senna bicapsularis</i> (L.) Roxb.	Leguminosae (Caesalpinioideae)	Cássia	Áfricotropical; Neotropical; Oceânia; Australiano	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C6(grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Senna didymobotrya</i> (Fres.) Irwin & Barneby.	Leguminosae (Caesalpinioideae)	Planta-das- pipocas; Cássia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C23(1)
<i>Sobralia macrantha</i> Lindl.	Orchidaceae	Orquídea-de-cana; Sobralia	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-8	Hemi.	Herbácea	Z11	C6(grupo), C8(grupo), C9(1), C13(1), C15(1)
<i>Solandra maxima</i> (Sessé & Moc.) P. Green	Solanaceae	Solandra	Neotropical	Perenifólio	1-12	2-5	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	C6(grupo)
<i>Solanum jasminoides</i> Paxt.	Solanaceae	Jasmim-bastardo	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z9	C7(grupo), C20(1)
<i>Solanum mauritanum</i> Scop.	Solanaceae	Tabaqueira	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C25(1)
<i>Spathiphyllum ortgiesii</i> Reg.	Araceae	Lírio-da-paz; Bandeira-branca; Espatífilo	Neotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu**	Hemi.	Herbácea	Z10	C1(1), C2(1)
<i>Spathiphyllum walisii</i> Reg.	Araceae	Lírio-da-paz; Bandeira-branca; Espatífilo	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z11	C19, C22 (grupo)
<i>Spathodea campanulata</i> Beauv.	Bignoniaceae	Chama-da- floresta; Tulipeiro-africano	Áfricotropical	Caducifólio	1-12 (Variação individual)	1-12	Micro.	Árvore	Z11	C26(1), C27(1), C28(1), C29(1)
<i>Stachys byzantina</i> K. Koch.	Labiatae	Orelhas-de-gato	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-7	Caméfito	Herbácea	Z5	C8(grupo)
<i>Stenotaphrum secundatum</i> (Walter) Kuntze	Gramineae	Relva; Relva-de-correr	Neotropical; Áfricotropical; Oceânia	Perenifólio	1-12	3-11	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z9	C11, C29, C30, C31 (tapete)
<i>Stephanotis floribunda</i> (R. Br.) Brongn.	Asclepiadaceae	Jasmim-de- madagáscar	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	4-8	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	C7(4), C8(3)
<i>Strelitzia nicolai</i> Reg. & Körn.	Strelitziaceae	Estrelícia-gigante	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C13, C14, C15, C19, C22 (grupo)
<i>Strelitzia reginae</i> Banks ex Dryand	Strelitziaceae	Estrelícia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C15, C17, C18, C27, C30 (grupo)
<i>Strobilanthes kunthianus</i> T. Anders ex Benth.	Acanthaceae		Indomalaio	Perenifólio	1-12	3-5	Nano.	Arbusto	Z11	C13(1)
<i>Strongylodon macrobotrys</i> A. Gray.	Leguminosae (Papilionoideae)	Vinha-de-jade	Indomalaio	Perenifólio	1-12	3-6	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z11	C16(1)
<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassm.	Palmae	Coqueiro-de- jardim; Palmeira-rainha	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-7	Micro.	Árvore	Z10	C25(3)
<i>Synadenium grantii</i> Hook. f.	Euphorbiaceae	Sinadénio	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	8-11	Micro.	Arbusto suculento	Z10	C13(1)
<i>Syngonium podophyllum</i> Schott.	Araceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	6-7	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z11	C19, C20(grupo)
<i>Tecoma stans</i> (L.) Juss. ex HBK.	Bignoniaceae	Estenolóbio	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C23(1), C30(2)
<i>Tecomanthe dendrophila</i> (Bl.) Schum.	Bignoniaceae	Tecomante	Oceânia	Perenifólio	1-12	5-7	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	C16(1)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Tecomaria capensis</i> (Thunb.) Spach.	Bignoniaceae	Camarões	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C29(grupo)
<i>Tetradenia riparia</i> (Hochst.) Codd.	Labiatae	Iboza (Moschosma)	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	12-5	Nano.	Arbusto	Z10	C15(2), C18(1), C29(grupo)
<i>Tetrapanax papyrifer</i> (Hook.) K. Kock.	Araliaceae	Arália-do-papel	Indomalaio	Perenifólio	1-12	8-12	Micro.	Arbusto	Z8	C19(8)
<i>Thuja occidentalis</i> L.	Cupressaceae	Tuia-ocidental	Neártico	Perenifólio	1-12	5-8	Micro.	Árvore	Z4	C14(1)
<i>Thunbergia grandiflora</i> (Roxb. ex Rottl.) Roxb.	Acanthaceae	Tumbérgia-azul	Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	C20(1), C22(1)
<i>Tibouchina grandifolia</i> Cogn.	Melastomataceae	Aranhas; Tibouchina	Neotropical	Perenifólio	1-12	8-2	Micro.	Arbusto	Z10	C15(1), C18(1), C23(1), C29(2)
<i>Tibouchina urvilleana</i> (DC.) Cogn.	Melastomataceae	Aranhas; Tibouchina	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C25(2), C29(1), C30(2)
<i>Tillandsia lindenii</i> Reg.	Bromeliaceae	Tilandsia	Neotropical	Perenifólio	1-12	11-6	Hemi.	Herbácea	Z10	C15, C23, C24 (grupo)
<i>Trachelium caeruleum</i> L.	Campanulaceae	Traquélio	Paleártico	Perenifólio	1-12	6-8	Nano.	Herbácea	Z9	C15(grupo)
<i>Trachelospermum jasminoides</i> (Lindl.) Lem.	Apocynaceae	Jasmim-de-estrela	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-11	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z8	C7, C9, C13, C18, C20 (grupo)
<i>Trachycarpus fortunei</i> (Hook.) H. A. Wendl.	Palmae	Palmeira-de-moinho-de-vento	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-6	Micro.	Árvore	Z8	C22(1)
<i>Tradescantia fluminensis</i> Vell. Conc.	Commelinaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	4-6	Hemi.	Herbácea trepadora	Z9	C11(grupo)
<i>Tradescantia spathacea</i> Sw.	Commelinaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	10-2	Hemi.	Herbácea	Z9	C25(grupo)
<i>Tradescantia zebrina</i> hort. ex. Bosse	Commelinaceae	Zebrina	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z9	C22, C25 (grupo)
<i>Trochetopsis ebenus</i> Q.C.B. Cronk	Sterculiaceae	Ébano-anão-de-santa-helena	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	7-5	Nano.	Arbusto	Z10	C18(1)
<i>Tulbaghia violacea</i> Harv.	Liliaceae (Alliaceae)	Tulbáguia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	11-6	Geófita	Herbácea	Z8	C15, C25 (grupo)
<i>Vitis vinifera</i> L.	Vitaceae	Vinha-púrpura	Paleártico	Caducifólio	3-12	4-6	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z6	C23(1)
<i>Vriesea splendens</i> (Brongn.) Lem.	Bromeliaceae	Bromélia	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-2	Hemi.	Herbácea	Z11	C23(2)
<i>Washingtonia filifera</i> (Lind. ex André) H. A. Wendl.	Palmae	Palmeira-de-leque-da-califórnia	Neártico	Perenifólio	1-12	5-8	Micro.	Árvore	Z9	C20(1), C30(1)
<i>Washingtonia robusta</i> H. A. Wendl.	Palmae	Palmeira-de-leque-mexicana	Neártico	Perenifólio	1-12	4-6	Micro.	Árvore	Z10	C24(1), C25(1), C31(1)
<i>Wedelia trilobata</i> (L.) Hitchc.	Compositae		Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Herbácea	Z11	C16, C17, C23 (mancha)
<i>Wigandia caracasana</i> HBK.	Hydrophyllaceae	Vigândia	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-5	Micro.	Arbusto	Z10	C15(1)
<i>Wisteria sinensis</i> (Sims) Sweet.	Leguminosae (Papilionoideae)	Lilases; Glicínia	Paleártico	Caducifólio	2-12	2-5; 7-8	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z5	C1(1), C16(1), C11(1), C19(1), C21(2), C22(1)
<i>Woodwardia radicans</i> (L.) Sm.	Blechnaceae	Feto-de-botão	Paleártico	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z8	C23 (grupo)
<i>Xanthosoma violaceum</i> Schott	Araceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	7-8	Geófita	Herbácea	Z11	C13(2), C20(grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Yucca elata</i> Engelm.	Agavaceae		Neártico	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Nano.	Arbusto	Z9	C12(2)
<i>Yucca elephantipes</i> Reg.	Agavaceae	luca-gigante	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-10	Micro.	Arbusto	Z10	C16(1), C19(1)
<i>Yucca gloriosa</i> L.	Agavaceae	luca	Neártico	Perenifólio	1-12	6-11	Micro.	Arbusto	Z7	C11(grupo), C23(3)
<i>Yucca rostrata</i> Engelm. Ex Trel.	Agavaceae	luca	Neártico	Perenifólio	1-12	5-7	Micro.	Arbusto	Z8	C12(1)
<i>Yucca whipplei</i> Torr.	Agavaceae	luca	Neártico	Perenifólio	1-12	Não floriu**	Micro.	Arbusto	Z8	C7(3), C23(1)
<i>Zamia furfuracea</i> L. f. in Aiton	Zamiaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	6-11	Hemi.	Arbusto	Z10	C13(1)
<i>Zantedeschia aethiopica</i> (L.) Spreng.	Araceae	Jarros	Áfricotropical	Sazonal	10-7	11-5	Geófita	Herbácea	Z8	C19 (grupo)
<i>Zygosicyos tripartitus</i> Humbert	Cucurbitaceae		Áfricotropical	Perenifólio	1-12	6-9	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z10	C13(1)

Legenda:

- Plantas que não floriram no período em estudo (Janeiro 2002 – Janeiro 2005): * plantas novas; ** plantas que nunca floriram por falta de aclimação;
- Plantas marcescentes (plantas semiperenifólias e semicaducifólias): 3-2 (**3-4**) – folhas todo o ano mas com renovação significativa em Março e Abril.

Anexo 30
CARACTERIZAÇÃO FITOGEGRÁFICA DO JARDIM DO HOTEL SAVOY

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Abelia x grandiflora</i> (André) Rehd.	Caprifoliaceae	Abélia	Hortícola	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z5	C5, C7(grupo), C11(2), C24(5), C31(grupo), C43(3)
<i>Acalypha wilkesiana</i> Muell. Arg.	Euphorbiaceae	Acálifa;	Oceânia	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C1(7), C2(5), C4(1), C7(2), C18(2), C23(4), C24(1), C27(1), C30(5), C31, C33, C34, C46(grupo)
<i>Acanthus mollis</i> L.	Acanthaceae	Erva-gigante	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-8	Hemi.	Herbácea	Z6	C4(grupo)
<i>Adiantum capillus-veneris</i> L.	Adiantaceae	Avenca	Paleártico, Neotropical, Áfricotropical, Indomalaio	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z8	C1, C4, C26 (grupo)
<i>Aechmea fasciata</i> (Lindl.) Bak.	Bromeliaceae	Bromélia	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C30(grupo)
<i>Aechmea fulgens</i> Brongn.	Bromeliaceae	Bromélia	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-8	Hemi.	Herbácea	Z11	C11, C30 (grupo)
<i>Aechmea gamosepala</i> Wittm.	Bromeliaceae	Bromélia	Neotropical	Perenifólio	1-12	10-2	Hemi.	Herbácea	Z10	C4, C30, C32 (grupo)
<i>Agapanthus praecox</i> Willd. ssp. <i>orientalis</i> (Leighton) Leighton	Liliaceae	Agapantos; Coroas-de-henrique	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	4-9	Hemi.	Herbácea	Z9	C2, C7, C8, C9, C31, C40 (mancha)
<i>Agathis robusta</i> (C. Moore ex F. Muell.) Bail.	Araucariaceae	Pinheiro-de-damara; Pinheiro-folha-de-alegra-campo	Australiano	Perenifólio	1-12	3-4	Meso.	Árvore	Z9	C27(1)
<i>Agave americana</i> L.	Agavaceae	Agave; Piteira	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-8	Hemi.	Herbácea suculenta	Z9	C14(1)
<i>Agave attenuata</i> Salm-Dyck	Agavaceae	Piteira; Agave-pescoço-de-cisne	Neotropical	Perenifólio	1-12	12-3	Nano.	Árvore suculenta	Z9	C1, C2, C4, C5, C7, C8, C13, C20, C23, C31, C32, C33, C34, C45 (grupo)
<i>Agave sisalana</i> Perring.	Agavaceae	Sisal	Neotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Nano.	Árvore suculenta	Z9	C1(1), C2(1), C7(1)
<i>Aloe arborescens</i> Mill.	Liliaceae (Aloeaceae)	Aloés, Babosas, Foguetes-de-natal	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	11-2	Nano.	Arbusto suculento	Z9	C2(grupo)
<i>Aloe saponaria</i> (Ait. f.) Haw.	Liliaceae (Aloeaceae)	Aloés-sabão	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-7	Hemi.	Herbácea suculenta	Z9	C32, C34 (grupo)
<i>Aloe vera</i> (L.) Burm.	Liliaceae	Aloé-vera; Babosas	Paleártico; Neotropical	Perenifólio	1-12	11-6	Hemi.	Herbácea suculenta	Z8	C8, C9, C23, C34 (grupo)
<i>Aloysia triphylla</i> (L'Hérit) Britt.	Verbenaceae	Pessegueiro-inglês; Lúcia-lima; Limonete	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-10	Nano.	Arbusto	Z8	C29(grupo)
<i>Alpinia zerumbet</i> (Pers.) B. L. Burt & Rosemary M. Sm.	Zingiberaceae	Alpínia; Lírio-de-porcelana	Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C2(4), C4(1), C15(1), C22(1), C31(grupo), C34(grupo), C45(1), C46 (grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Annona cherimola</i> Mill.	Annonaceae	Anoneira	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-7	Micro.	Árvore	Z10	C10(1), C29(1), C30(1)
<i>Anredera cordifolia</i> (Ten.) Steenis	Basellaceae	Boussingaultia; Trepadeira-da-madeira	Neotropical	Caducifólio	6-2	7-9	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z9	C2(1), C34(1)
<i>Antirrhinum majus</i> L.	Scrophulariaceae	Bocas-de-peixe; Boca-de-lobo	Paleártico	Sazonal	3-10	3-10	Terófito	Herbácea	Z7	C7, C18 (grupo)
<i>Apium graveolens</i> L.	Umbelliferae	Aipo	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-7	Nano.	Herbácea	Z5	C29(grupo)
<i>Apollonias barbuja</i> (Cav.) Bomm.	Lauraceae	Barbusano	Paleártico	Perenifólio	1-12	9-3	Meso.	Árvore	Z10	C33(1)
<i>Araucaria bidwillii</i> Hook. f.	Araucariaceae	Araucária-de-bidwill	Australiano	Perenifólio	1-12	2-3	Meso.	Árvore	Z9	C4(1), C13(1)
<i>Araucaria heterophylla</i> (Salisb.) Franco	Araucariaceae	Araucária	Oceânia	Perenifólio	1-12	2-3	Macro.	Árvore	Z9	C8(1), C14(1), C34(2)
<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> H. A. Wendl. & Drude.	Palmae	Palmeira-elegante	Australiano	Perenifólio	1-12	2-10	Meso.	Árvore	Z10	C4(1), C12(2), C18(2), C19(1), C23(1), C30(2), C31(1), C33(1), C36(2), C43(1), C43A(1)
<i>Artemisia argentea</i> L' Hérít.	Compositae	Losna	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-7	Nano.	Arbusto	Z11	C29(grupo)
<i>Arundo donax</i> L.	Gramineae	Cana-vieira; Cana-da-roca	Paleártico	Perenifólio	1-12	7-10	Hemi.	Herbácea	Z9	C22(grupo)
<i>Asparagus densiflorus</i> (Kunth) Jassop	Liliaceae (Asparagaceae)	Esparto	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	7-8	Nano.	Herbácea	Z9	C1, C7, C8, C10, C11, C16, C17, C18, C19, C21, C23, C27, C29, C30, C31, C32, C33, C34, C36 (grupo)
<i>Asparagus falcatus</i> L.	Liliaceae (Asparagaceae)	Esparto	Áfricotropical; Indomalaio	Perenifólio	1-12	6-8	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	C2(1), C20(1)
<i>Asparagus setaceus</i> (Kunth) Jassop	Liliaceae (Asparagaceae)	Esparto-de-folha-miúda; Esparto	Africotropical	Perenifólio	1-12	9-12	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z9	C1, C2, C7, C8, C17, C22, C23, 31, 34, 46 (grupo)
<i>Aspidistra elatior</i> Bl.	Liliaceae (Convallariaceae)	Aspidistra	Paleártico	Perenifólio	1-12	6-7	Hemi.	Herbácea	Z8	C2, C4, C7, C16, C19, C20, C31, C33, C45 (grupo)
<i>Aster amellus</i> L.	Compositae	Aster	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-12	Hemi.	Herbácea	Z4	C43 (grupo)
<i>Aster squamatus</i> (Spreng.) Hieron.	Compositae	Áster	Neotropical	Sazonal	4-8	6-8	Terófito	Herbácea	Z9	C2, C18 (grupo)
<i>Aucuba japonica</i> Thunb.	Cornaceae (Aucubaceae)	Aucuba	Paleártico; Indomalaio	Perenifólio	1-12	2-4	Micro.	Arbusto	Z7	C24(2)
<i>Begonia x ricinifolia</i> A. Dietr.	Begoniaceae	Corações; Begónias	Hortícola	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C31(grupo)
<i>Bergenia crassifolia</i> (L.) Fritsch.	Saxifragaceae	Bergénia; Couve-de-jardim	Paleártico	Perenifólio	1-12	11-4	Caméfito	Herbácea	Z3	C26, C43, C43A (grupo)
<i>Billbergia vittata</i> Brongn. ex Morel.	Bromeliaceae	Bromélia	Neotropical	Perenifólio	1-12	11-2	Hemi.	Herbácea	Z10	C19(grupo)
<i>Bougainvillea glabra</i> Choisy	Nyctaginaceae	Buganvília	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	C20(4), C26(6), C27(2), C31, C34 (grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Brachychiton acerifolius</i> Cunn. ex. F. Muell.	Sterculiaceae	Árvore-do-fogo	Australiano	Caducifólio	1-5; 8-12	5-8	Micro.	Árvore	Z10	C2(1), C4(1), C18(1), C26(3), C31(1), C34(1), C34A(1), C43(2), C45(2)
<i>Brachychiton x hybridus</i> hort.	Sterculiaceae	Árvore-do-fogo	Hortícola	Caducifólio	1-5; 8-12	6-10	Micro.	Árvore	Z10	C46(1)
<i>Breynia nivosa</i> (W.G. Sm.) Small.	Euphorbiaceae		Oceânia	Perenifólio	1-12	7-8	Nano.	Arbusto	Z11	C7(3)
<i>Brugmansia versicolor</i> Lagerh.	Solanaceae	Trombeteira	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C2(1), C4(1), C33(1), C39(1), C45(1)
<i>Buxus microphylla</i> Sieb. & Zucc.	Buxaceae	Buxo	Paleártico; Indomalaio	Perenifólio	1-12	3-4	Nano.	Arbusto	Z6	C20(grupo)
<i>Callistephus chinensis</i> (L.) Nees.	Compositae	Não-me-deixes	Paleártico	Sazonal	3-12	4-12	Terófito	Herbácea	Z6	C45(grupo)
<i>Camellia japonica</i> L.	Theaceae	Camélia; Japoneira	Paleártico	Perenifólio	1-12	11-4	Micro.	Árvore	Z8	C40(1)
<i>Campsis radicans</i> (L.) Seem.	Bignoniaceae	Campsis	Neártico	Caducifólio	5-12	5-9	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z4	C22(5), C23(12)
<i>Canna indica</i> L.	Cannaceae	Canas-da-índia; Bananeiras-de- flor	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Geófito	Herbácea	Z9	C1, C7, C13, C15, C24, C27 (grupo)
<i>Canna x generalis</i> L. H. Bail.	Cannaceae	Canas-da-índia; Bananeiras-de- flor	Hortícola	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z9	C2, C18, C36, C39, C40, C45 (grupo)
<i>Capsicum frutescens</i> L.	Solanaceae	Pimenteira	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-10	Nano.	Arbusto	Z9	C13(1), C18(1), C29(grupo), C43(1)
<i>Cardiospermum grandiflorum</i> Sw.	Sapindaceae	Corriola-dos- balões	Afrotropical; Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z10	C1, C13(grupo)
<i>Carica papaya</i> L.	Caricaceae	Papaieira	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Árvore	Z10	C31(2), C32(1)
<i>Catharanthus roseus</i> (L.) G. Don.	Apocynaceae	Maravilhas	Áfrotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Herbácea	Z10	C13, C18, C35 (grupo)
<i>Celosia argentea</i> L.	Amaranthaceae	Crista-de-galo	Indomalaio; Áfrotropical Neotropical	Sazonal	5-12	7-12	Terófito	Herbácea	Z10	C36(grupo)
<i>Centranthus ruber</i> (L.) DC.	Valerianaceae	Rosa-da-rocha; Alfinetes	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Caméfito	Herbácea	Z5	C1, C17, C32 (grupo)
<i>Centratherum muticum</i> (Humb., Bonpl. & Kunth) Less.	Compositae		Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Caméfito	Herbácea	Z10	C23, C25(grupo)
<i>Cestrum diurnum</i> L. non Weston	Solanaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	6-12	Micro.	Arbusto	Z9	C2(1)
<i>Chamaedorea elegans</i> Mart.	Palmae	Palmeira-de- salão; Palmeira- bambu	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-6	Micro.	Arbusto	Z10	C2(1), C4(1), C7(1), C12(2), C15(3), C19(1), C20(1), C24(1), C27(2), C30(1), C31(1), 34(1)
<i>Chlorophytum comosum</i> (Thumb.) Jacques	Liliaceae (Anthericaceae)	Fitinhas	Áfrotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z9	C1, C2, C4, C7, C18, C20 C21, C22, C23, C25, C26, C31, C33 C36, C39, C41, C42, C45, C46 (grupo)
<i>Chorisia speciosa</i> A. St. Hil.	Bombacaceae	Sumaúma	Neotropical	Caducifólio	3-11	8-11	Meso.	Árvore	Z10	C42(1), C44(1)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Chrysalidocarpus lutescens</i> (Bory) Wendl.	Palmae	Palmeira- amarela; Palmeira- borboleta	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	6-7	Micro.	Arbusto	Z10	C14(1), C15(2), C20(3), C24(6), C27(3)
<i>Cinnamomum camphora</i> (L.) Sieb.	Lauraceae	Canforeira	Paleártico; Indomalaio	Perenifólio	1-12	2-4	Meso.	Árvore	Z10	C34(1)
<i>Clerodendrum splendens</i> G. Don ex James	Verbenaceae	Clerodendro	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	5-11	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	C12(1), C45(grupo)
<i>Clivia miniata</i> Regel	Amaryllidaceae	Clívia	Áfricotropical	Perenifólio	1-8	2-11	Hemi.	Herbácea	Z10	C5, C16, C23, C32, C33, C34, C43, C43A (grupo)
<i>Clivia nobilis</i> Lindl.	Amaryllidaceae	Clívia	Áfricotropical	Perenifólio	1-8	2-11	Hemi.	Herbácea	Z10	C5, C43(grupo)
<i>Clytostoma callistigioides</i> Bur. & Schum.	Bignoniaceae	Clitostoma	Neotropical	Perenifólio	1-12	3-7	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z9	C23 (1)
<i>Codiaeum variegatum</i> (L.) Bl. var. <i>pictum</i> (Lodd.) Muell. Arg.	Euphorbiaceae	Crótone	Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z11	C1(1), C2(2), C4(6), C5(8), C7(4), C10(1), C17(1), C19(8), C23(7), C24(3), C26(1), C30(1), C31(3), C36(2), C43(1), C45(1)
<i>Commelina benghalensis</i> L.	Commelinaceae	Erva-menina; Flor-dum-dia	Indomalaio Áfricotropical;	Perenifólio	1-12	3-9	Hemi.	Herbácea trepadora	Z9	C2, C18(grupo)
<i>Coprosma repens</i> A. Rich.	Rubiaceae	Coprosma	Antártico; Australiano	Perenifólio	1-12	4-5	Micro.	Arbusto	Z9	C1(1), C8(1), C10(1), C31(1)
<i>Cordyline australis</i> (Forst.) Endl.	Agavaceae	Cordilina	Antártico	Perenifólio	1-12	4-7	Micro.	Árvore	Z9	C20(1), C24(2)
<i>Cordyline stricta</i> (Sims) Endl.	Agavaceae	Cordilina	Australiano	Perenifólio	1-12	1-6	Nano.	Arbusto	Z10	C2, C7, C8, C12, C25, C27, C30, C34, C37, C42, C45, C46 (grupo)
<i>Cordyline terminalis</i> (L.) Kunth.	Agavaceae	Árbore-dos-reis	Indomalaio; Australiano; Oceânia; Antártico	Perenifólio	1-12	11-5	Micro.	Arbusto	Z10	C2(2), C4(2), C5(2), C7(grupo), C8(1), C16(1), C19(4), C20(1), C23(2), C24(2), C27(1), C34(2), C43(1), C46(1)
<i>Costus barbatus</i> Suess.	Zingiberaceae	Gengibre-espiral- vermelha	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-9	Geófita	Herbácea	Z11	C4(1)
<i>Crassula multicava</i> Lem.	Crassulaceae		Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea suculenta	Z10	C1, C2, C29, C32 (grupo)
<i>Crassula ovata</i> (Mill.) Druce.	Crassulaceae	Ensaio-branco	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	11-3	Nano.	Arbusto suculento	Z10	C1, C2, C4, C5, C7, C8, C13, C18, C20, C23, C24, C26, C31, C33, C34, C38, C46 (grupo)
<i>Crinum x powellii</i> L. H. Bail.	Amaryllidaceae	Crino	Hortícola	Sazonal	11-9	3-8	Geófita	Herbácea	Z6	C13, C18 (grupo)
<i>Ctenanthe lubbersiana</i> (E. Morr.) Eichl.	Marantaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	4-8	Hemi.	Herbácea	Z10	C10(1)
<i>Cupressus funebris</i> Endl.	Cupressaceae		Paleártico	Perenifólio	1-12	2-3	Micro.	Árvore	Z7	C33(1), C34(1)
<i>Cupressus lusitanica</i> Mill.	Cupressaceae	Cedro-de-goia	Neártico; Neotropical	Perenifólio	1-12	1-3	Meso.	Árvore	Z9	C2(1), C4(1)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Cupressus sempervirens</i> L.	Cupressaceae	Cipreste	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-2	Micro.	Árvore	Z8	C23(1)
<i>Cyathea australis</i> (R. Br.) Domin.	Cyatheaceae	Feto-arbóreo	Australiano	Perenifólio	1-12	-----	Micro.	Árvore	Z9	C10(2), C12(6), C14(10), C15(5), C27(2)
<i>Cyathea cooperi</i> (F. Mueller) Domin.	Cyatheaceae	Feto-arbóreo	Australiano	Perenifólio	1-12	-----	Micro.	Árvore	Z10	C2(2), C27(1), C36(2)
<i>Cycas circinalis</i> L.	Cycadaceae	Cicas	Indomalaio	Perenifólio	1-12	2-6	Micro.	Árvore	Z10	C24(1)
<i>Cycas revoluta</i> Thunb.	Cycadaceae	Cicas-revoluta; Cicas-de-sagú	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-8	Micro.	Árvore	Z9	C5(1), C7(1), C20(1), C24(4), C31(1), C32(1), C43(1)
<i>Cymbalaria muralis</i> P. Gaertn., Mey. & Scherb.	Scrophulariaceae	Perpétua-de-roma	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-10	Hemi.	Herbácea	Z3	C4, C21, C33 (grupo)
<i>Cymbogon citratus</i> (DC. ex Nees) Stapf.	Gramineae	Caninha; Cana-com-cheiro-a-limão	Indomalaio	Perenifólio	1-12	9-10	Hemi.	Herbácea	Z9	C9(grupo)
<i>Cyperus involucratus</i> Rottb.	Cyperaceae		Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C2, C4, C7, C9, C11, C12, C20, C27, C 31, C32, C34 (grupo)
<i>Cyrtomium falcatum</i> (L. f.) Presl.	Dryopteridaceae	Feto-azevinho	Paleártico; Indomalaio; Áfricotropical; Oceânia	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z9	C2, C7, C11, C14, C17, C19, C21, C29, C31, C32 (grupo)
<i>Davallia fejeensis</i> Hook.	Davalliaceae	Renda-portuguesa	Oceânia	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z10	C16(grupo)
<i>Dendranthema x grandiflorum</i> Kitam.	Compositae	Crisântemo-das-floristas	Hortícola	Perenifólio	1-12	10-12	Nano.	Herbácea	Z4	C5, C11, C26, C27, C31, C43 (grupo)
<i>Deparia petersenii</i> (Kunze) Kato	Woodsiaceae	Feto-de-senhora-do-japão	Indomalaio; Paleártico; Australiano; Oceânia; Antártico	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z9	C2, C7, C8 (grupo)
<i>Dichondra micrantha</i> Urban.	Convolvulaceae	Relva-redonda	Australiano; Antártico	Perenifólio	1-12	3-6	Hemi.	Herbácea	Z9	C17(tapete)
<i>Dichorisandra thyrsiflora</i> Mikan.	Commelinaceae	Dicorisandra	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C19(1), C27(1)
<i>Dieffenbachia seguine</i> (Jacq.) Schott.	Araceae	Diefenbáquia	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Herbácea	Z10	C4(grupo)
<i>Dombeya wallichii</i> (Lindl.) B. D. Jackson	Sterculiaceae	Dombeia; Aurora	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	12-2	Micro.	Árvore	Z10	C7(1), C45(1)
<i>Dracaena deremensis</i> Engl.	Agavaceae	Dracena	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	11-12	Micro.	Arbusto	Z11	C4(1), C16(1), C19(1), C34(3)
<i>Dracaena draco</i> L. ssp. <i>draco</i>	Agavaceae	Dragoeiro	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-6	Micro.	Árvore	Z11	C5(1), C8(1), C11(2), C20(1), C23(1), C27(1), C28(1), C34(1), C43(1)
<i>Dracaena marginata</i> Lam.	Agavaceae	Dracena	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu**	Micro.	Arbusto	Z11	C10(1)
<i>Dracaena reflexa</i> (Decne.) Lam.	Agavaceae	Dracena	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	4-5	Micro.	Arbusto	Z10	C20(3), C24(3)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Drimiopsis maculata</i> Lindl. & Paxt.	Liliaceae (Hyacinthaceae)		Áfricotropical	Perenifólio	1-12	4-8	Geófita	Herbácea	Z10	C7(grupo)
<i>Duranta erecta</i> L.	Verbenaceae	Duranta	Neotropical	Perenifólio	1-12	7-1	Micro.	Arbusto	Z10	C5(grupo), C7(2), C32(1), C43(1)
<i>Ensete ventricosum</i> (Welw.) E.E. Cheesm.	Musaceae	Bananeira-da-abissínia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Terófita	Herbácea	Z10	C15(1)
<i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl.	Rosaceae	Nespereira	Paleártico	Perenifólio	1-12	10-12	Micro.	Árvore	Z8	C5(1), C7(1), C8(1), C22(2), C33(1)
<i>Erythrina abyssinica</i> Lam. ex DC.	Leguminosae (Papilionoideae)	Coralina-da-abissínia	Áfricotropical	Caducifólio	5-1	1-6; 9-10	Micro.	Árvore	Z10	C6(1)
<i>Erythrina crista-galli</i> L.	Leguminosae (Papilionoideae)	Coraleira; Coralina-crista-de-galo	Neotropical	Marcescente	4-3 (12-3)	4-1	Micro.	Árvore	Z8	C38(1)
<i>Erythrina lysistemon</i> Hutch.	Leguminosae (Papilionoideae)	Coralina	Áfricotropical	Marcescente	5-4 (12-4)	12-5	Micro.	Árvore	Z10	C2(2), C8(1), C39(1)
<i>Eugenia uniflora</i> L.	Myrtaceae	Pitangueira	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Árvore	Z10	C1(1), C11(1), C23(1), C27(1), C33(2), C34(2), C37(7), C46(1)
<i>Euphorbia canariensis</i> L.	Euphorbiaceae	Eufórbia-das-canárias	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-8	Micro.	Arbusto suculento	Z11	C13(1), C43(1)
<i>Euphorbia cotinifolia</i> L.	Euphorbiaceae	Eufórbia	Neotropical	Caducifólio	3-12	7-11	Micro.	Árvore	Z11	C5(6), C20(1), C24(2), C25(4), C29(4), C43(2)
<i>Euphorbia ingens</i> E. Mey.	Euphorbiaceae	Eufórbia-gigante	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	10-12	Micro.	Arbusto suculento	Z9	C1(1), C4(2), C10(1)
<i>Euphorbia nerifolia</i> L.	Euphorbiaceae	Eufórbia	Indomalaio; Oceânia	Perenifólio	1-12	3-7	Micro.	Arbusto suculento	Z10	C8(2), C9(2), C32(2), C34(3)
<i>Euphorbia pulcherrima</i> Willd. ex Klotzsch.	Euphorbiaceae	Manhã-de-páscoa	Neotropical	Caducifólio	5-2	10-3	Micro.	Arbusto	Z10	C1(5), C7(grupo), C13(2), C18(4), C22(1), C34(3), C36(1), C44(1), C45(3)
<i>Euphorbia tirucalli</i> L.	Euphorbiaceae	Eufórbia	Áfricotropical; Indomalaio	Perenifólio	1-12	4-9	Micro.	Arbusto suculento	Z10	C1(1), C4(1), C13(1), C18(2), C22(6), C34(4), C45(grupo)
<i>Euphorbia trigona</i> Mill.	Euphorbiaceae	Eufórbia	Africotropical	Perenifólio	1-12	6-8	Micro.	Arbusto suculento	Z10	C19(1), C34(1)
<i>Farugium japonicum</i> (L.) Kitam.	Compositae	Patás-de-cavalo; Boinas	Paleártico	Perenifólio	1-12	7-3	Hemi.	Herbácea	Z7	C26, C37, C38, C45 (grupo)
<i>Ficus benjamina</i> L.	Moraceae	Figueira-da-índia	Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-4	Micro.	Árvore	Z11	C2(1), C7(1), C20(1), C24(3), C27(3), C30(1), C34(1)
<i>Ficus benjamina</i> L. var. <i>nuda</i> (Miq.) Barrett	Moraceae	Figueira-da-índia	Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-4	Meso.	Árvore	Z11	C2(1), C10(1), C16(1), C19(sebe), C20(1), C23(1), C25(1), C27(1), C34(1)
<i>Ficus carica</i> L.	Moraceae	Figueira	Paleártico	Caducifólio	4-12	6-7	Micro.	Árvore	Z8	C8(1), C36(1)
<i>Ficus elastica</i> Roxb. ex Homem	Moraceae	Borracheira	Indomalaio	Perenifólio	1-12	5-8	Micro.	Árvore	Z11	C13(5), C17(1), C18(1), C30(1)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Ficus lyrata</i> Warb.	Moraceae		Áfrotropical	Perenifólio	1-12	4-6	Micro.	Árvore	Z11	C25(1), C26(1), C28(1)
<i>Ficus pumila</i> L.	Moraceae	Pastinha	Indomalaio; Paleártico	Perenifólio	1-12	10-12	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z8	C7, C10, C12, C18, C19, C21, C22 (grupo)
<i>Fuchsia arborescens</i> Sims.	Onagraceae	Fúcsia -arbórea	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z9	C8(1)
<i>Gerbera jamesonii</i> Bol. ex Adlam.	Compositae	Gerbera	Áfrotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z8	C13, C31(grupo)
<i>Goniophlebium subauriculatum</i> (Bl.) Presl.	Polypodiaceae	Feto-de- metro; Feto-chorão	Indomalaio; Australiano; Oceânia	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z10	C4 (grupo)
<i>Grevillea robusta</i> A. M. Cunn. ex. R. Br.	Proteaceae	Grevillea	Australiano	Perenifólio	1-12	4-7	Meso.	Árvore	Z8	C2(1), C33A(1), C36(1), C37(1), C45(1)
<i>Hedera canariensis</i> Willd.	Araliaceae	Hera	Paleártico	Perenifólio	1-12	7-10	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	C30(grupo)
<i>Hedera helix</i> L.	Araliaceae	Hera	Paleártico	Perenifólio	1-12	9-10	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z5	C7, C30, C34 (grupo)
<i>Hedychium gardnerianum</i> Ker- Gawl.	Zingiberaceae	Bananilha; Roca-de-vénus; Conteira	Paleártico; Indomalaio	Perenifólio	1-12	7-10	Hemi	Herbácea	Z9	C45(grupo)
<i>Heliconia bihai</i> (L.) L.	Heliconiaceae	Helicónia	Neotropical	Perenifólio	1-12	7-11	Hemi.	Herbácea	Z11	C1(1), C2(1), C7(1), C19(1), C32(2), C34(1), C34A(1), C46(1)
<i>Hemerocallis dumortieri</i> E. Morr.	Liliaceae (Hemerocallida-ceae)	Hemerocalis; Lírio-dum-dia	Paleártico	Perenifólio	1-12	6-10	Geófita	Herbácea	Z5	C18(grupo)
<i>Hibiscus rosa-sinensis</i> L.	Malvaceae	Cardeais; Hibiscos; Rosa-da-china	Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C1(1), C2(4), C4(1), C10(grupo), C13(sebe), C17(2), C18(1), C32(2), C34(2), C45(2), C46(1)
<i>Hibiscus syriacus</i> L.	Malvaceae	Cardeal-roxo; Hibisco-da-síria	Paleártico; Indomalaio	Caducifólio	5-11	7-9	Micro.	Arbusto	Z5	C1(1), C2(2), C5(grupo), C13(6), C25(10), C31(1), C32(sebe), C36(2), C43(2)
<i>Holmskioldia sanguinea</i> Retz.	Verbenaceae	Chapéus-de- mandarin; Chapéus-chineses	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C22(1)
<i>Howea belmoreana</i> (C. Moore & F. Muell.) Becc.	Palmae	Quência	Australiano	Perenifólio	1-12	1-9	Micro.	Árvore	Z10	C20(1)
<i>Howea forsteriana</i> (C. Moore & F. Muell.) Becc.	Palmae	Quência	Australiano	Perenifólio	1-12	1-9	Micro.	Árvore	Z10	C2(1), C12(1), C18(1), C24(6), C29(1)
<i>Hydrangea macrophylla</i> (Thunb.) Ser.	Hydrangeaceae	Hortênsias; Novelos	Paleártico	Caducifólio	3-12	5-10	Nano.	Arbusto	Z6	C2, C13, C17, C21, C26, C36(grupo)
<i>Hylocereus triangularis</i> (L.) Britt. & Rose	Cactaceae	Rainha-da-noite; Cacto-trepador	Neotropical	Perenifólio	1-12	7-10	Fane. trep.	Arbusto trepador e suculento	Z10	C1(1), C4(3), C13(1), C18(1)
<i>Ilex aquifolium</i> L.	Aquifoliaceae	Azevinho- comum; Azevinho- inglês	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-6	Micro.	Árvore	Z6	C7(1), C24(3), C43(2)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Ilex x afflaclarensis</i> (hort. ex Loud.) Dallim.	Aquifoliaceae	Azevinho	Hortícola	Perenifólio	1-12	12-8	Micro.	Árvore	Z6	C10(1)
<i>Impatiens walleriana</i> Hook. f.	Balsaminaceae	Maravilhas	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Herbácea	Z9	C1, C2, C14, C16, C18, C24, C26, C31, C32, C36, C38, C42, C43A, C46 (grupo)
<i>Ipomoea indica</i> (Burm.) Merrill	Convolvulaceae	Camapinhas	Neotropical; Áfricotropical; Indomalaio; Oceânia	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z10	C45(grupo)
<i>Iresine herbstii</i> Hook.	Amaranthaceae	Iresine	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Caméfito	Herbácea	Z10	C1, C2, C4, C5, C13, C16, C39, C43 (grupo)
<i>Iris germanica</i> L. var. <i>florentina</i> (L.) Dykes	Iridaceae	Lírio-branco	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-6	Geófito	Herbácea	Z4	C15, C18, C26 (grupo)
<i>Jacaranda mimosifolia</i> D. Don.	Bignoniaceae	Jacarandá	Neotropical	Caducifólio	5-2	4-6; 9-10	Meso.	Árvore	Z9	C5(1), C9(1)
<i>Joannesia princeps</i> Vell	Euphorbiaceae	Purga-de-cavalo; Cutieira	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-5	Micro.	Árvore	Z12	C34(1)
<i>Kalanchoe blossfeldiana</i> Poelln.	Crassulaceae	Calanchoé	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto suculento	Z11	C15, C18, C26 (grupo)
<i>Kalanchoe daigremontiana</i> Hamet & Perrier	Crassulaceae	Calanchoé	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	12-5	Nano.	Arbusto suculento	Z11	C2 (grupo)
<i>Kalanchoe delagouensis</i> Ecklon & Zeyh.	Crassulaceae	Calanchoé	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	12-9	Nano.	Arbusto suculento	Z11	C1, C2, C4 (grupo)
<i>Kalanchoe fedtschenkoi</i> Hamet & Perrier.	Crassulaceae	Calanchoé	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-8	Caméfito	Arbusto suculento	Z11	C19, C24 (grupo)
<i>Lagerstroemia indica</i> L.	Lythraceae	Laguerestrémia; Flor-de-merenda; Suspiros	Paleártico; Indomalaio	Caducifólio	3-11	7-10	Micro.	Árvore	Z7	C2(1), C9(1), C18(1), C19(3), C25(5), C36(1), C42(1)
<i>Lampranthus blandus</i> (Haw.) Schwantes	Aizoaceae	Lamprantos; Chorão	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	3-9	Fane. trep.	Arbusto trepador e suculento	Z11	C20(grupo)
<i>Laurus novocanariensis</i> Rivas Mart. & al.	Lauraceae	Loureiro	Paleártico	Perenifólio	1-12	11-3	Meso.	Árvore	Z10	C29(1)
<i>Leucadendron salignum</i> Bergius x <i>L. laurifolium</i> (Lam.) Fourc.	Proteaceae	Safari-sunset	Hortícola	Perenifólio	1-12	11-2	Micro.	Arbusto	Z9	C24(1)
<i>Leucanthemum x superbum</i> (J. Ingram) Bergmans ex Kent	Compositae	Estrelas	Hortícola	Perenifólio	1-12	5-8	Nano.	Herbácea	Z5	C1, C18, C43 (grupo)
<i>Ligustrum lucidum</i> Ait. f.	Oleaceae	Ligustro; Alfinheiro	Paleártico	Perenifólio	1-12	7-9	Micro.	Árvore	Z7	C7(2), C8(2), C14(1), C15(2), C22(1), C30(1), C45(1)
<i>Ligustrum ovalifolium</i> Hassk.	Oleaceae	Ligustro; Alfinheiro	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-7	Nano.	Arbusto	Z5	C5(grupo)
<i>Livistona australis</i> (R. Br.) Mart.	Palmae	Livistona-da- austrália	Australiano	Perenifólio	1-12	4-5	Meso.	Árvore	Z9	C7(1)
<i>Livistona chinensis</i> (Jacq.) R. Br. ex Mart.	Palmae	Palmeira-de- leque-da-china	Paleártico	Perenifólio	1-12	2-5	Meso.	Árvore	Z9	C27(1)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitoceográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Lobularia maritima</i> (L.) Desv.	Cruciferae (Brassicaceae)	Lobulária	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z8	C15, C18, C20, C31, C33 (grupo)
<i>Magnolia grandiflora</i> L.	Magnoliaceae	Magnólia	Neártico	Perenifólio	1-12	5-8	Micro.	Árvore	Z6	C5(1), C34(2), C43(1)
<i>Malvaviscus arboreus</i> Cav.	Malvaceae	Malvavisco	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z9	C31(grupo)
<i>Mangifera indica</i> L.	Anacardiaceae	Mangueiro	Indomalaio	Perenifólio	1-12	11-6	Micro.	Árvore	Z11	C4(2), C16(1), C32(1), C33(1), C34(1), C42(1), C45(1)
<i>Mentha spicata</i> L.	Labiatae	Hortelã-de-leite	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Herbácea	Z3	C29(grupo)
<i>Mentha x piperita</i> L.	Labiatae	Hortelã-pimenta	Hortícola	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Herbácea	Z3	C29 (grupo)
<i>Mirabilis jalapa</i> L.	Nyctaginaceae	Boas-noites	Neotropical	Sazonal	3-10	5-9	Geófita	Herbácea	Z8	C1(1), C27(1), C29(1)
<i>Monstera deliciosa</i> Liebm.	Araceae	Fruto-delicioso; Costela-de-adão	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z10	C2, C4, C7, C15, C20, C22, C23, C30, C32, C34, C43 (grupo)
<i>Musa acuminata</i> Colla	Musaceae	Bananeira	Indomalaio; Australianao	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C27, C34 (grupo)
<i>Musa x paradisiaca</i> L.	Musaceae	Bananeira-de-prata	Hortícola	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C2, C13, C9, C38 (grupo)
<i>Nephrolepis cordifolia</i> (L.) Presl.	Oleandraceae	Feto	Neotropical; Áfricotropical; Indomalaio; Oceânia; Australiano	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z10	C1, C2, C4, C7, C24, C31, C34, C46 (grupo)
<i>Nerium oleander</i> L.	Apocynaceae	Sevadilha; Loendro	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-11	Micro.	Arbusto	Z9	C1(1), C4(4), C5(1), C7(2), C9(1), C10(1)C13(1), C14(2), C17(1), C22(2), C25(1), C26(1), C31(1), C34(1)
<i>Nolina recurvata</i> (Lem.) Hemsl.	Agavaceae	Nolina; Pata-de-elefante	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-8	Micro.	Árvore	Z9	C2(1), C4(1), C5(1), C8(2), C11(2), C20(1), C24(2), C27(1), C30(1), C33(5), C42(1)
<i>Ochna serrulata</i> (Hochst.) Walp.	Ochnaceae	Planta-do-rato-mickey	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	2-4	Nano.	Arbusto	Z9	C9(1), C18(1), C22(5), C23(1), C43(1), C46(1)
<i>Ocimum basilicum</i> L.	Labiatae	Manjerição-grande	Indomalaio	Sazonal	4-9	5-9	Terófita	Herbácea	Z10	C29 (grupo)
<i>Ocotea foetens</i> (Aiton) Baill.	Lauraceae	Til	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Meso.	Árvore	Z10	C30(1), C34(2)
<i>Odontonema strictum</i> (Nees) Kuntze	Acanthaceae	Odontonema; Ramo-de-fogo	Neotropical	Perenifólio	1-12	8-12	Nano.	Arbusto	Z10	C1(1), C2(12), C4(1), C7(grupo), C8(1), C20(4), C24(2), C26(1), C31 C32, C34, C36(grupo), C43(3), C43A(1), C45(6), C46(grupo)
<i>Ophiopogon japonicus</i> (L. f.) Ker-Gawl	Liliaceae (Convallariaceae)	Relva-do-japão	Paleártico	Perenifólio	1-12	7-9	Hemi.	Herbácea	Z8	C2, C12, C20, C24, C27, C32, C34 (mancha)
<i>Opuntia brasiliensis</i> (Willd.) Haw.	Cactaceae	Tabaibeira-do-brasil	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-8	Micro.	Árvore suculenta	Z9	C4(1), C32(1)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Opuntia cylindrica</i> (Lam.) DC.	Cactaceae	Cacto-redondo	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-7	Micro.	Arbusto suculento	Z9	C9(3), C13(1), C34(2)
<i>Origanum majorana</i> L.	Labiatae	Manjerona	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-9	Nano.	Herbácea	Z7	C29(grupo)
<i>Origanum vulgare</i> L.	Labiatae	Orégão	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-9	Nano.	Herbácea	Z5	C29(grupo)
<i>Paspalum dilatatum</i> Poir.	Gramineae	Erva-rija; Erva-do-governo	Neotropical	Perenifólio	1-12	3-9	Hemi.	Herbácea	Z8	C13, C30 (mancha)
<i>Passiflora edulis</i> Sims.	Passifloraceae	Maracujá-roxo	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-11	Fane.trep.	Arbusto trepador	Z10	C27(2), C30(1), C31(1)
<i>Pelargonium quercifolium</i> (L.) L'Hérit.	Geraniaceae	Malva	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	2-8	Nano.	Arbusto	Z10	C1(grupo)
<i>Pelargonium zonal</i> (L.) L'Hérit	Geraniaceae	Malva	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C14, C15, C29, C30, C32, C33 (grupo)
<i>Persea americana</i> Mill.	Lauraceae	Abacateiro	Neotropical	Perenifólio	1-12	11-5	Micro.	Árvore	Z10	C2(1), C22(1), C30(1), C43A(1)
<i>Petunia x hybrida</i> hort. Vilm.- Andr.	Solanaceae	Petúnia	Hortícola	Sazonal	2-11	2-11	Terófito	Herbácea	Z9	C24 (grupo)
<i>Philodendron bipinnatifidum</i> Endl.	Araceae	Filodendro	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-7	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	C2(1)
<i>Philodendron erubescens</i> K. Koch & Augustin	Araceae	Filodendro	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-6	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z11	C2(2), C4(11), C7(grupo), C16(1), C22(1), C32, C44, C46(grupo)
<i>Phlebodium aureum</i> (L.) Sm.	Polypodiaceae	Polipódio-dourado	Neártico; Neotropical	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z10	C4, C13 (grupo)
<i>Phoenix canariensis</i> Chabaud.	Palmae	Palmeira-das- canárias	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-3	Meso.	Árvore	Z11	C2(9), C5(1), C6(4), C7(2), C13(1), C16(2), C17(3), C18(1), C22 (3), C23(1), C27(2), C45(1)
<i>Phoenix reclinata</i> Jacq.	Palmae	Tamareira-do- senegal	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	5-7	Micro.	Árvore	Z11	C2(1)
<i>Phoenix roebelinii</i> O' Brien.	Palmae	Palmeira-anã	Indomalaio	Perenifólio	1-12	5-7	Micro.	Árvore	Z11	C18(1)
<i>Phyllanthus tenellus</i> Roxb.	Euphorbiaceae	Quebra-pedra	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Herbácea	Z11	C1, C27, C29 (grupo)
<i>Phyllostachis bambusoides</i> Sieb. & Zucc.	Gramineae	Bambu	Paleártico	Perenifólio	1-12	Não floriu**	Hemi.	Herbácea	Z8	C28 (grupo)
<i>Phytolacca dioica</i> (L.) Moq.	Phytolaccaceae	Bela-sombra	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-9	Meso.	Árvore	Z11	C1(1), C2(2), C30(1), C31(1)
<i>Pistia stratiotes</i> L.	Araceae	Alface-de- água	Neotropical; Áfricotropical; Indomalaio; Oceânia; Australiano	Perenifólio	1-12	1-12	Hidrófito	Herbácea	Z10	C34(grupo)
<i>Pittosporum undulatum</i> Vent.	Pittosporaceae	Incenseiro	Australiano	Perenifólio	1-12	2-4	Micro.	Árvore	Z9	C1(1), C2(2), C45(1)
<i>Plantago major</i> L.	Plantaginaceae	Plantago-maior	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-8	Hemi.	Herbácea	Z6	C18(grupo)
<i>Platyserium bifurcatum</i> (Cav.) C. Chr.	Polypodiaceae	Feto-de-corno- de- veado	Indomalaio; Oceânia; Australiano	Perenifólio	1-12	-----	Epífita	Herbácea	Z9	C4(1), C17(2)
<i>Playcladus orientalis</i> (L. f.) Franco	Cupressaceae	Tuia	Neártico	Perenifólio	1-12	1-3	Micro.	Árvore	Z6	C2(2), C45(1)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Plumbago auriculata</i> Lam.	Plumbaginaceae	Plúmbago	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z9	C2(1), C15(1), C20(1), C22(grupo), C33(1)
<i>Plumeria rubra</i> L. var. <i>acutifolia</i> (Poir.) Woodson.	Apocynaceae	Planta-dos-dentes	Neotropical	Caducifólio	5-1	6-12	Micro.	Árvore	Z10	C2(1), C4(1), C7(1), C8(1), C9(1), C10(1), C13(1), C23(1), C26(1), C27(2), C31(1), C35(1), C36(1)
<i>Podranea ricasoliana</i> (Tanf.) Sprague.	Bignoniaceae	Ricassoliana	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	4-10	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z9	C45 (grupo)
<i>Polyscias guilfoylei</i> (Bull) L. H. Bail	Araliaceae	Poliscias	Indomalaio	Perenifólio	1-12	Não floriu**	Micro.	Arbusto	Z11	C4(1), C13(1), C17(1), C30(1)
<i>Portulacaria afra</i> Jacq.	Portulacaceae	Portulacária	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu**	Nano.	Arbusto suculento	Z9	C2(1), C7(1), C14(1)
<i>Psidium littorale</i> Raddi	Myrtaceae	Araçazeiro; Araçaleiro	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-7	Micro.	Árvore	Z10	C31(1), C43A(1)
<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn.	Dennstaedtiaceae	Feiteira	Paleártico; Neártico	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z4	C13, C20 (grupo)
<i>Pteris vittata</i> L.	Pteridaceae	Feto	Paleártico; Indomalaio; Australiano; Oceânia	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z9	C2, C11, C18, C20, C27, C29, C33, C34 (grupo)
<i>Punica granatum</i> L.	Punicaceae	Romãzeira	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-7	Micro.	Árvore	Z9	C10(1), C16(1), C22(1)
<i>Pyracantha angustifolia</i> (Franch.) Schneid.	Rosaceae	Perinhos; Sarça-ardente	Paleártico	Perenifólio	1-12	2-6	Micro.	Arbusto	Z7	C1(1)
<i>Pyrostegia venusta</i> (Ker-Gawl.) Miers	Bignoniaceae	Gaitinhas	Neotropical	Perenifólio	1-12	11-5	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	C23, C36, C46 (grupo)
<i>Rhododendron mucronatum</i> G. Don.	Ericaceae	Azálea-japonesa	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z5	C35(5), C43(2), C43A(6)
<i>Ricinus communis</i> L.	Euphorbiaceae	Ricino; Carrapateira	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z9	C2(1)
<i>Rivina humilis</i> L.	Phytolaccaceae	Planta-vermelha	Neártico; Neotropical	Perenifólio	1-12	5-10	Nano.	Herbácea	Z9	C20(8)
<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Leguminosae (Papilionoideae)	Robinia	Neártico; Neotropical	Perenifólio	1-12	5-10	Nano.	Herbácea	Z9	C5(1)
<i>Rosa laevigata</i> Michx.	Rosaceae	Roseira	Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z7	C23(1)
<i>Rosa x damascena</i> Mill. var. <i>semperflorens</i> (Duhamel) Rowley	Rosaceae	Rosa-de-quatro-estações	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z4	C1(1), C18(1), C20(1)
<i>Rosmarinus officinalis</i> L.	Labiatae	Alecrim	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z6	C11(1), C29(1)
<i>Roystonea regia</i> (H.B.K.) Cook	Palmae	Palmeira-real	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-6	Micro.	Árvore	Z11	C27(1)
<i>Ruellia makoyana</i> hort. Makoy ex Closon	Acanthaceae	Ruélia	Neotropical	Perenifólio	1-12	9-12	Nano.	Herbácea	Z10	C20(grupo)
<i>Ruscus hypophyllum</i> L.	Liliaceae (Asparagaceae)	Ruscus	Paleártico	Perenifólio	1-12	11-12	Nano.	Herbácea	Z8	C4, C7, C15, C20, C24 (grupo)
<i>Ruta chapelensis</i> L.	Rutaceae	Arruda	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-9	Nano.	Arbusto	Z8	C29(1)
<i>Saccharum officinarum</i> L.	Gramineae	Cana-sacarina; Cana-de-açúcar	Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-3	Hemi.	Herbácea	Z9	C13, C24, C36 (grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Salvia officinalis</i> L.	Labiatae	Salva	Paleártico	Perenifólio	1-12	6-8	Nano.	Herbácea	Z5	C29 (grupo)
<i>Sansevieria trifasciata</i> Prain	Agavaceae	Língua-de-sogra	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	8-11	Hemi.	Herbácea	Z10	C1, C2, C4, C15, C23, C24, C31, C32, C34 (grupo)
<i>Sansevieria trifasciata</i> Prain var. <i>laurentii</i> (De Wild.) N. E. Br.	Agavaceae	Língua-de-sogra	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	8-11	Hemi.	Herbácea	Z10	C1, C2, C4, C15, C24 (grupo)
<i>Scabiosa atropurpurea</i> L.	Dipsacaceae		Áfricotropical	Perenifólio	1-12	6-9	Hemi.	Herbácea	Z7	C7 (grupo)
<i>Schefflera actinophylla</i> (Endl.) Harms	Araliaceae	Brassaia	Australiano; Oceânia	Perenifólio	1-12	8-10	Meso.	Árvore	Z10	C12(1), C20(1), C25(2), C27(1), C43(1)
<i>Schefflera arboricola</i> (Hayata)	Araliaceae	Schefflera	Indomalaio	Perenifólio	1-12	2-4; 7-8	Micro.	Arbusto	Z10	C1(2), C10(1), C13(1), C16(1), C19(2), C20(4), C24(3), C26(8), C29(1), C33(1), C38(1), C46(2)
<i>Schefflera elegantissima</i> (Veitch ex Mast.) Lowry & Frodin	Araliaceae	Falsa-arália	Oceânia	Perenifólio	1-12	11-2	Micro.	Arbusto	Z10	C20(1)
<i>Schinus molle</i> L. non hort. ex Engl.	Anacardiaceae	Pimenteira-bastarda; Pimenteira-da-índia	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Meso.	Árvore	Z9	C28(1)
<i>Senecio cineraria</i> DC.	Compositae	Senécio	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-8	Nano.	Arbusto	Z8	C7, C16, C19, C25, C32, C35 (grupo)
<i>Senna pendula</i> (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Irwin & Barneby var. <i>glabrata</i> (Vogel) Irwin & Barneby	Leguminosae (Caesalpiniodeae)	Chuva-de-ouro; Cássia	Neotropical; Neártico	Perenifólio	1-12	10-1	Micro.	Arbusto	Z9	C34(1)
<i>Solanum seaforthianum</i> Andrews	Solanaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	5-11	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	C20(1)
<i>Spathodea campanulata</i> Beauv.	Bignoniaceae	Chama-da-floresta; Tulipeiro- africano	Áfricotropical	Caducifólio	1-12 (Variação individual)	1-12	Micro.	Árvore	Z11	C7(1), C43(1)
<i>Stenotaphrum secundatum</i> (Walter) Kuntze	Gramineae	Relva; Relva-de-correr	Neotropical; Áfricotropical; Oceânia	Perenifólio	1-12	3-11	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z9	C5, C6, C7, C23, C31, C32, C33, C34, C45 (tapete)
<i>Strelitzia nicolai</i> Reg. & Köm.	Strelitziaceae	Estrelícia-gigante	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C2(2), C4(1), C6(1), C13(1), C24(1), C45(1)
<i>Strelitzia reginae</i> Banks ex Dryand	Strelitziaceae	Estrelícia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C4, C5, C6, C8, C18, C31, C36, C37, C39, C42, C43, C43A (grupo)
<i>Synadenium grantii</i> Hook. f.	Euphorbiaceae	Sinadénio	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	8-11	Micro.	Arbusto suculento	Z10	C1(4), C2(4), C4(3), C8(4), C13(3), C23(2), C24(1), C32(2), C35(grupo), C36(2), C37(1), C39(1), C42(2), C43(1), C46(2)
<i>Syngonium hoffmannii</i> Schott.	Araceae	Singónio	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-7	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z11	C4, C7, C34 (grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Syngonium wendlandii</i> Schott.	Araceae	Singónio	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-7	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z11	C2(1), C4(2), C19(1), C30(1), C34(1), C46(1)
<i>Syzygium jambos</i> (L.) Alston.	Myrtaceae	Jambeiro	Indomalaio	Perenifólio	1-12	3-7	Micro.	Árvore	Z10	C33(1)
<i>Tagetes patula</i> L.	Compositae	Cravos-de-burro	Neotropical	Sazonal	1-9	3-8	Terófito	Herbácea	Z9	C1, C5, C18, C24, C26, C31, C45 (grupo)
<i>Tecoma stans</i> (L.) Juss. ex HBK.	Bignoniaceae	Estenolóbio	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C1(1)
<i>Tecomaria capensis</i> (Thunb.) Spach.	Bignoniaceae	Camarões	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C2(grupo), C20(4), C27(grupo), C30(4)
<i>Tetragonia tetragonioides</i> (Pallas) O. Ktze.	Aizoaceae	Espinafre; Espinafre-da-nova- zelândia	Antártico; Australiano	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea trepadora e suculenta	Z8	C29(grupo)
<i>Thymus vulgaris</i> L.	Labiatae	Segurelha	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-6	Nano.	Arbusto	Z7	C29(grupo)
<i>Tibouchina urvilleana</i> (DC.) Cogn.	Melastomataceae	Aranhas; Tibouchina	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C10(1), C15(2)
<i>Trachelospermum jasminoides</i> (Lindl.) Lem.	Apocynaceae	Jasmim-de-estrela	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-11	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z8	C5(6), C33(1)
<i>Tradescantia pallida</i> (Rose) D. Hunt.	Commelinaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea trepadora	Z8	C1, C2, C7, C18, C32, C34, C45 (grupo)
<i>Tradescantia spathacea</i> Sw.	Commelinaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	10-2	Hemi.	Herbácea	Z9	C15(grupo)
<i>Tradescantia zebrina</i> hort. ex. Bosse	Commelinaceae	Zebrina	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z9	C7, C34 (grupo)
<i>Verbena rigida</i> Spreng.	Verbenaceae	Verbena-rija	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-9	Caméfito	Herbácea	Z8	C22, C27 (grupo)
<i>Washingtonia filifera</i> (Lind. ex André) H. A. Wendl	Palmae	Palmeira-de-leque- da- califórnia	Neártico	Perenifólio	1-12	5-8	Micro.	Árvore	Z9	C7(2), C10(1), C13(2), C33(1)
<i>Washingtonia robusta</i> H. A. Wendl	Palmae	Palmeira-de-leque- mexicana	Neártico	Perenifólio	1-12	4-6	Micro.	Árvore	Z10	C4(1)
<i>Wisteria sinensis</i> (Sims) Sweet.	Leguminosae (Papilionoideae)	Lilases; Glicínia	Paleártico	Caducifólio	2-12	2-5; 7-8	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z5	C22(1), C31(1), C33(1), C45(1)
<i>Woodwardia radicans</i> (L.) Sm.	Blechnaceae	Feto-de-botão	Paleártico	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z8	C2, C12, C14, C15, C16, C36, C43A (grupo)
<i>Yucca elephantipes</i> Reg.	Agavaceae	luca	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-10	Micro.	Arbusto	Z10	C5(1), C30(3)
<i>Yucca gloriosa</i> L..	Agavaceae	lúca	Neártico	Perenifólio	1-12	6-11	Micro.	Arbusto	Z7	C5(1), C6(1), C9(grupo), C10(1), C13(1), C20(1)
<i>Yushania anceps</i> (Mitford) Yi	Gramineae	Bambo	Paleártico	Perenifólio	1-12	Não floriu**	Hemi.	Herbácea	Z9	C19, C20, C30, C45 (grupo)
<i>Zinnia elegans</i> Jacq.	Compositae	Zinia	Neotropical	Sazonal	6-10	6-8	Terófito	Herbácea	Z8	C45 (grupo)

Legenda:

- Plantas que não floriram no período em estudo (Janeiro 2002 – Janeiro 2005): * plantas novas; ** plantas que nunca floriram por falta de aclimação;
- Plantas marcescentes (plantas semiperenifólias e semcaducifólias): 3-2 (**3-4**) – folhas todo o ano mas com renovação significativa em Março e Abril.

Anexo 31
CARACTERIZAÇÃO FITOGEOGRÁFICA DO CEMITÉRIO DE SÃO GONÇALO

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Acalypha wilkesiana</i> Muell. Arg.	Euphorbiaceae	Acálifa; Folha-de-cobre	Oceânia	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C3(4), C4(6), C5(6), C16(1)
<i>Agathis robusta</i> (C. Moore ex. F. Muell.) Bail.	Araucariaceae	Pinheiro-de-damara; Pinheiro-com-folha-de-alegra-campo	Australiano	Perenifólio	1-12	3-4	Meso.	Árvore	Z9	C4(2), C15(1), C19(1)
<i>Anemone hupehensis</i> Lem.	Ranunculaceae	Anêmona	Paleártico	Perenifólio	1-12	8-12	Hemi.	Herbácea	Z6	C3(grupo)
<i>Argyranthemum frutescens</i> (L.) Schultz-Bip.	Compositae	Estrelas; Estreleiras; Pampilhos; Malmequeres	Hortícola	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C3, C5, C13 (grupo)
<i>Asclepias curassavica</i> L.	Asclepiadaceae	Planta-da-seda	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z9	C7(1), C14(1)
<i>Asparagus asparagoides</i> (L.) Druce	Liliaceae (Asparagaceae)	Alegre-campo-miúdo	Neotropical	Perenifólio	1-12	3-4	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z10	C7 (grupo)
<i>Asparagus setaceus</i> (Kunth) Jassop	Liliaceae (Asparagaceae)	Esparto-de-folha-miúda; Esparto	Afrotropical	Perenifólio	1-12	9-12	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z9	C3(grupo), C10(grupo)
<i>Begonia x ricinifolia</i> A. Dietr.	Begoniaceae	Corações; Begônias	Hortícola	Perenifólio	1-12	7-2	Hemi.	Herbácea suculenta	Z10	C1, C2 (grupo)
<i>Bougainvillea glabra</i> Choisy	Nyctaginaceae	Buganvília	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	C16(5)
<i>Callistephus chinensis</i> (L.) Nees.	Compositae	Não-me-deixes	Paleártico	Sazonal	3-12	4-12	Terófito	Herbácea	Z6	C1, C2 (grupo)
<i>Chorisia speciosa</i> A. St. Hil.	Bombacaceae	Sumaúma	Neotropical	Caducifólio	3-11	8-11	Meso.	Árvore	Z10	C3(2), C4(2), C15(1)
<i>Clivia miniata</i> Regel	Amaryllidaceae	Clívia	Afrotropical	Perenifólio	1-12	2-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C1, C2, C3, C6 (grupo)
<i>Crassula ovata</i> (Mill.) Druce.	Crassulaceae	Ensaio-branco; Planta-de-jade	Áfrotropical	Perenifólio	1-12	11-3	Nano.	Arbusto suculento	Z10	C6(grupo)
<i>Cuphea ignea</i> A. DC.	Lythraceae	Cigarrinhos	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Caméfito	Arbusto	Z10	C11(3), C15(23)
<i>Cupressus sempervirens</i> L.	Cupressaceae	Cipreste	Paleártico	Perenifólio	1-12	2-3	Meso.	Árvore	Z8	C3(1), C5(1), C6(22), C7(26), C14(16), C15(15), C17(20), C18(20)
<i>Dendranthema x grandiflorum</i> Kitam.	Compositae	Crisântemo-das-floristas	Hortícola	Perenifólio	1-12	11-12	Nano.	Arbusto	Z4	C2, C5, C6 (grupo)
<i>Dianthus caryophyllus</i> L.	Caryophyllaceae	Craveiro	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-8	Caméfito	Arbusto	Z8	C5 (grupo)
<i>Euonymus japonicus</i> Thunb.	Celastraceae	Verdegaio	Paleártico	Perenifólio	1-12	7-8	Micro.	Arbusto	Z7	C3(1)
<i>Euphorbia pulcherrima</i> Willd. ex Klotzsch.	Euphorbiaceae	Manhã-de-páscoa	Neotropical	Caducifólio	5-2	10-3	Micro.	Arbusto	Z10	C3(46), C4(9), C5(1), C6(38), C7(27), C14(25), C15(18), C16(49)
<i>Euryops pectinatus</i> Cass.	Compositae	Estreleira-amarela	Áfrotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z9	C3(2), C5(1), C11(2), C13(1)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Gazania rigens</i> (L.) Gaertn..	Compositae	Gazania	Afrotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z9	C3 (grupo)
<i>Gerbera jamesonii</i> Bol. ex Adlam.	Compositae	Gerbera	Afrotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z8	C1, C3 (grupo)
<i>Hedera helix</i> L.	Araliaceae	Hera	Paleártico	Perenifólio	1-12	9-10	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z5	C5, C16, C20 (grupo)
<i>Hibiscus rosa-sinensis</i> L.	Malvaceae	Cardeais; Hibiscos; Rosa-da-china	Indomalaio; Oceânia	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C4, C5, C8, C9, C10, C11, C12, C13, C15, C18, C20 (sebe), C16(3)
<i>Hydrangea macrophylla</i> (Thunb.) Ser.	Hydrangeaceae	Hortênsia; Novelos	Paleártico	Caducifólio	3-12	5-11	Nano.	Arbusto	Z6	C5 (grupo)
<i>Impatiens walleriana</i> Hook. f.	Balsaminaceae	Maravilhas	Afrotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Herbácea	Z9	C5 (grupo)
<i>Iresine herbstii</i> Hook.	Amaranthaceae	Iresine	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Caméfito	Herbácea	Z10	C3, C6 (grupo)
<i>Ligustrum lucidum</i> Ait. f.	Oleaceae	Ligustro; Alfinheiro	Paleártico	Perenifólio	1-12	6-8	Micro.	Árvore	Z7	C5(1)
<i>Magnolia grandiflora</i> L.	Magnoliaceae	Magnólia	Neártico	Perenifólio	1-12	6-8	Micro.	Árvore	Z6	C1(1), C2(1)
<i>Markhamia lutea</i> (Benth.) Schum.	Bignoniaceae	Marcâmia	Afrotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Meso.	Árvore	Z11	C4(1)
<i>Narcissus tazetta</i> L.	Amaryllidaceae	Junquinhos	Paleártico	Sazonal	11-5	12-3	Geófito	Herbácea	Z8	C5 (grupo)
<i>Neoregelia caroliniae</i> (Beer) L. B.	Bromeliaceae	Bromélia	Neotropical	Perenifólio	1-12	11-2	Hemi.	Herbácea	Z10	C5(2)
<i>Nephrolepis cordifolia</i> (L.) Presl.	Oleandraceae	Feto	Neotropical; Afrotropical; Indomalaio; Oceânia; Australiano	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z10	C3, C5, C6, C7, C14, C15 (grupo)
<i>Ochna serrulata</i> (Hochst.) Walp.	Ochnaceae	Planta-do-rato-mickey	Afrotropical	Perenifólio	1-12	2-3	Nano.	Arbusto	Z9	C6(1)
<i>Pelargonium zonale</i> (L.) L'Hérit	Geraniaceae	Malva	Áfrotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C5 (grupo)
<i>Persea americana</i> Mill.	Lauraceae	Abacateiro	Neotropical	Perenifólio	1-12	11-3	Micro.	Árvore	Z10	C19(2)
<i>Pilea microphylla</i> (L.) Liebm.	Urticaceae	Arrozinho	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C3(grupo)
<i>Pteris vittata</i> L.	Pteridaceae	Feto	Paleártico; Áfrotropical; Indomalaio; Oceânia	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z9	C16 (grupo)
<i>Rosmarinus officinalis</i> L.	Labiatae	Alecrim	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z6	C5(6), C11(grupo), C20(grupo)
<i>Salvia splendens</i> Sell ex Roem. & Scult.	Labiatae	Camarões; Sálvia	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Herbácea	Z10	C3, C6 (grupo)
<i>Senna pendula</i> (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Irwin & Barmeby var. <i>glabrata</i> (Vogel) Irwin & Barmeby	Leguminosae (Caesalpinioideae)	Chuva-de-ouro; Cássia	Neotropical; Neártico	Perenifólio	1-12	10-1	Micro.	Arbusto	Z9	C16(8)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Stenotaphrum secundatum</i> (Walter) Kuntze	Gramineae	Relva; Relva-de-correr	Neotropical; Africotropical; Oceânia	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z9	C1, C2, C4, C6, C7, C14, C15, C17, C18 (tapete)
<i>Strelitzia reginae</i> Banks ex Dryand.	Strelitziaceae	Estrelícia	Africotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C5 (grupo)
<i>Tagetes patula</i> L.	Compositae	Cravos-de-burro	Neotropical	Sazonal	1-9	3-8	Terófito	Herbácea	Z9	C2(grupo)
<i>Tibouchina urvilleana</i> (DC.) Cogn.	Melastomataceae	Aranhas; Tibouchina	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C3(7)
<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	Leguminosae (Papilionoideae)	Tipuana	Neotropical	Marcescente	5-4 (3-4)	4-7	Meso.	Árvore	Z9	C3(1)

Legenda:

- Plantas que não floriram no período em estudo (Janeiro 2002 – Janeiro 2005): * plantas novas; ** plantas que nunca floriram por falta de aclimação;
- Plantas marcescentes (plantas semiperenifólias e semicaducifólias): 3-2 (3-4) – folhas todo o ano mas com renovação significativa em Março e Abril.

Anexo 32
CARACTERIZAÇÃO FITOGEGRÁFICA DO CEMITÉRIO DE SÃO MARTINHO

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Abelia x grandiflora</i> (André) Rehd.	Caprifoliaceae	Abélia	Hortícola	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z5	C17(2)
<i>Acalypha wilkesiana</i> Muell. Arg.	Euphorbiaceae	Acálifa; Folha-de-cobre	Oceânia	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C5(grupo), C7(sebe), C20(1), C31, C33(sebe)
<i>Acanthus mollis</i> L.	Acanthaceae	Erva-gigante	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-8	Hemi.	Herbácea	Z6	C5(grupo)
<i>Aechmea fulgens</i> Brongn. var. <i>discolor</i> (Morr.) Brongn. ex Bak.	Bromeliaceae	Bromélia	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-8	Hemi.	Herbácea	Z11	C17(grupo)
<i>Agapanthus praecox</i> Willd. ssp. <i>orientalis</i> (Leighton) Leighton	Liliaceae	Agapantos; Coroas-de-Henrique	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	4-9	Hemi.	Herbácea	Z9	C5, C9, C30, C32 (grupo)
<i>Agave attenuata</i> Salm-Dyck	Agavaceae	Piteira; Agave-pescoço-de-cisne	Neotropical	Perenifólio	1-12	12-3	Nano.	Árvore suculenta	Z9	C5(2), C7(8), C17(6), C18(3)
<i>Ageratum houstonianum</i> Mill.	Compositae		Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Terófito	Herbácea	Z8	C18 (grupo)
<i>Aloe arborescens</i> Mill.	Liliaceae (Aloeaceae)	Aloés, Babosas, Foguetes-de-natal	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	11-2	Nano.	Arbusto suculento	Z9	C24(grupo)
<i>Alternanthera ficoidea</i> (L.) R. Br.	Amaranthaceae	Piriquitos	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Caméfito	Herbácea	Z10	C1, C9, C19, C20, C24, C26, C27 (grupo)
<i>Annona cherimola</i> Mill.	Annonaceae	Anoneira	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-7	Micro.	Árvore	Z10	C20(1)
<i>Anthurium andraeanum</i> André	Araceae	Antúrio	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z11	C4(grupo)
<i>Apollonias barbijana</i> (Cav.) Bomm.	Lauraceae	Barbusano	Paleártico	Perenifólio	1-12	9-3	Meso.	Árvore	Z10	C17(2)
<i>Araucaria columnaris</i> (Forst. f.) Hook.	Araucariaceae	Pinheiro-da-nova-caledónia; Araucária	Oceânia	Perenifólio	1-12	5-7	Macro.	Árvore	Z10	C8(1), C14(1), C17(1), C25(1)
<i>Araujia sericifera</i> Brot.	Asclepiadaceae	Corriola-de-seda	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-9	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z9	C21(1)
<i>Arctotis x hybrida</i> hort.	Compositae	Margarida- africana	Hortícola	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z9	C18(grupo)
<i>Asclepias curassavica</i> L.	Asclepiadaceae	Planta-da-seda	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z9	C31(1)
<i>Asparagus asparagoides</i> (L.) Druce	Liliaceae (Asparagaceae)	Alegre-campo-miúdo	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	3-4	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z10	C5, C17, C19 (grupo)
<i>Asparagus densiflorus</i> (Kunth) Jassop	Liliaceae (Asparagaceae)	Esparto	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	7-8	Nano.	Herbácea	Z9	C31(grupo)
<i>Asparagus setaceus</i> (Kunth) Jassop	Liliaceae (Asparagaceae)	Esparto-de-folha-miúda; Esparto	Africotropical	Perenifólio	1-12	9-12	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z9	C2, C5, C7, C10, C15, C27 (grupo)
<i>Begonia minor</i> Jacq.	Begoniaceae	Corações; Begónias	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C15 (grupo)
<i>Begonia x ricinifolia</i> A. Dietr.	Begoniaceae	Corações; Begónias	Hortícola	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C1, C2, C12 (grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Bergenia crassifolia</i> (L.) Fritsch.	Saxifragaceae	Bergénia; Couve-de-jardim	Paleártico	Perenifólio	1-12	11-4	Caméfito	Herbácea	Z3	C4, C15, C19, C20 (grupo)
<i>Billbergia vittata</i> Brongn. ex Morel.	Bromeliaceae	Bromélia	Neotropical	Perenifólio	1-12	11-2	Hemi.	Herbácea	Z10	C10, C16 (grupo)
<i>Bougainvillea glabra</i> Choisy	Nyctaginaceae	Buganvília	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	C17(9), C21(12), C28(19)
<i>Brachychiton acerifolius</i> Cunn. ex F. Muell.	Sterculiaceae	Árvore-do-fogo	Australiano	Caducifólio	1-5; 8-12	5-8	Micro.	Árvore	Z10	C16(1)
<i>Buxus sempervirens</i> L.	Buxaceae	Buxo	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-4; 10-11	Nano.	Arbusto	Z5	C1, C3, C10, C12, C19, C32 (grupo)
<i>Canna x generalis</i> L.H. Bail.	Cannaceae	Bananeiras-de-flor; Canas-da-índia	Hortícola	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z9	C8, C18, C29, C30 (grupo)
<i>Carpobrotus edulis</i> (L.) L. Bol.	Aizoaceae	Bálsamo; Chorão	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	3-8	Fane. trep.	Herbácea suculenta e trepadora	Z9	C9, C16 (grupo)
<i>Catharanthus roseus</i> (L.) G. Don.	Apocynaceae	Catarantos; Maravilhas;	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Herbácea	Z10	C9, C24, C26, C31, C33 (grupo)
<i>Centranthus ruber</i> (L.) DC.	Valerianaceae	Rosa-da-rocha; Alfinetes	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Caméfito	Herbácea	Z5	C25, C30, C31 (grupo)
<i>Cephalophyllum alstonii</i> Marloth.	Aizoaceae	Chorão	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	3-11	Fane. trep.	Herbácea trepadora e suculenta	Z11	C10, C19 (grupo)
<i>Chlorophytum comosum</i> (Thumb.) Jacques	Liliaceae (Anthericaceae)	Fitinhas	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z9	C1, C2, C3, C8, C9, C11A, C14, C17, C27 (grupo)
<i>Chorisia speciosa</i> A. St. Hil.	Bombacaceae	Sumaúma	Neotropical	Caducifólio	3-11	8-11	Meso.	Árvore	Z10	C6(1)
<i>Cinnamomum camphora</i> (L.) Sieb.	Lauraceae	Canforeira	Paleártico; Indomalaio	Perenifólio	1-12	2-4	Meso.	Árvore	Z10	C4(1), C6(1), C17(1)
<i>Codiaeum variegatum</i> (L.) Bl. var. <i>pictum</i> (Lodd) Muell. Arg.	Euphorbiaceae	Crótone	Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z11	C3(3), C4(10), C5(2), C7(2)
<i>Colocasia esculenta</i> (L.) Schott	Araceae	Inhame	Indomalaio	Perenifólio	1-12	5-6	Geófito	Herbácea	Z10	C7(4)
<i>Coprosma repens</i> A. Rich.	Rubiaceae	Coprosma	Antártico; Australiano	Perenifólio	1-12	6-7	Micro.	Arbusto	Z9	C24(1)
<i>Cordyline stricta</i> (Sims) Endl.	Agavaceae	Cordilina	Australiano	Perenifólio	1-12	1-6	Nano.	Arbusto	Z10	C2(grupo), C5(2), C8(grupo), C9(1), C14(1), C15(grupo), C25(1), C27(1)
<i>Cordyline terminalis</i> (L.) Kunth.	Agavaceae	Árvore-dos-reis	Indomalaio; Australiano; Oceânia; Antártico	Perenifólio	1-12	11-5	Micro.	Arbusto	Z10	C9(1), C14(1), C24(1), C25(2), C29(1)
<i>Coronilla valentina</i> L. ssp. <i>glauca</i> (L.) Battand.	Leguminosae (Papilionoideae)	Pascoinhas	Paleártico	Perenifólio	1-12	12-6	Nano.	Arbusto	Z9	C19(2)
<i>Crassula ovata</i> (Mill.) Druce.	Crassulaceae	Ensaio-branco; Planta-de-jade	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	11-3	Nano.	Arbusto suculento	Z10	C3, C5, C8, C9, C15, C20, C24, C26, C29, C31, C33 (grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Ctenanthe lubbersiana</i> (E. Morr.) Eichl.	Marantaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	4-8	Hemi.	Herbácea	Z10	C1, C2, C5, C8, C9, C11, C12, C15 (grupo)
<i>Ctenanthe oppenheimiana</i> (C. J. Morren) K. Schum.	Marantaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	4-8	Hemi.	Herbácea	Z10	C5, C18, C19 (grupo)
<i>Cupressus lusitanica</i> Mill.	Cupressaceae	Cedro-de-goia; Cedro-das-barracas	Neártico; Neotropical	Perenifólio	1-12	1-3	Meso.	Árvore	Z9	C6(14), C27(3), C33(5)
<i>Cupressus sempervirens</i> L.	Cupressaceae	Cipreste	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-2	Micro.	Árvore	Z8	C1(8), C6(4), C8(1), C9(6), C10(6), C11(4), C11A(9), C12(12), C14(1), C15(4), C16(3), C18(4), C19(3), C20(4), C25(1), C26(4), C27(3), C28(2), C30(1), C31(4), C32(2), C33(7)
<i>Cyathea cooperi</i> (F. Mueller) Domin.	Cyatheaceae	Feto-arbóreo	Australiano	Perenifólio	1-12	-----	Micro.	Árvore	Z10	C4(4)
<i>Cyperus involucratus</i> Rottb.	Cyperaceae		Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C29(grupo)
<i>Dendranthema x grandiflorum</i> Kitam.	Compositae	Crisântemo-das-floristas	Hortícola	Perenifólio	1-12	10-12	Nano.	Herbácea	Z4	C6, C20 (grupo)
<i>Deparia petersenii</i> (Kunze) Kato	Woodsiaceae	Feto-de-senhora-do-japão	Indomalaio; Paleártico; Australiano; Oceânia; Antártico	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z9	C19(grupo)
<i>Dieffenbachia seguine</i> (Jacq.) Schott.	Araceae	Diefenbáquia	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Herbácea	Z10	C1(1)
<i>Dracaena deremensis</i> Engl.	Agavaceae (Dracaenaceae)	Dracena	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	11-12	Micro.	Arbusto	Z11	C2(grupo), C5(grupo), C6(4), C9(2), C10(1), C14(1), C15(grupo), C20(1), C24(2), C27(3)
<i>Dracaena draco</i> L. ssp. <i>draco</i>	Agavaceae	Dragoeiro	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-6	Micro.	Árvore	Z11	C6(1), C7(2)
<i>Dracaena fragrans</i> (L.) Ker-Gawl.	Agavaceae	Dracena	Africotropical	Perenifólio	1-12	11-12	Micro.	Arbusto	Z12	C9(1), C19(1)
<i>Dracaena marginata</i> Lam.	Agavaceae	Dracena	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu**	Micro.	Arbusto	Z11	C32(1)
<i>Duranta erecta</i> L.	Verbenaceae	Duranta	Neotropical	Perenifólio	1-12	7-1	Micro.	Arbusto	Z10	C17(5)
<i>Euonymus japonicus</i> Thunb.	Celastraceae	Verdegaio	Paleártico	Perenifólio	1-12	7-8	Micro.	Arbusto	Z7	C13(1)
<i>Euphorbia pulcherrima</i> Willd. Ex Klotzsch.	Euphorbiaceae	Manhã-de-páscoa	Neotropical	Caducifólio	5-2	10-3	Micro.	Arbusto	Z10	C6(1), C7(20), C9(2), C10(15), C14(52), C16(40), C17(33), C20(40), C24(44), C27(29), C29(1), C31(11), C32(1), C33(20)
<i>Euphorbia tirucalli</i> L.	Euphorbiaceae	Eufórbia	Áfricotropical; Indomalaio	Perenifólio	1-12	4-9	Micro.	Arbusto suculento	Z10	C9(1)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Farfugium japonicum</i> (L.) Kitam.	Compositae	Patas-de- cavalo; Boinas	Paleártico	Perenifólio	1-12	7-3	Hemi.	Herbácea	Z7	C1,C9,C15, C16,C17, C18,C32 (grupo)
<i>Ficus pumila</i> L.	Moraceae	Pastinha	Indomalaio; Paleártico	Perenifólio	1-12	10-12	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z8	C2, C3 (grupo)
<i>Gazania rigens</i> (L.) Gaertn..	Compositae	Gazania	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z9	C2, C5, C9, C15, C16, C18, C19, C20, C24, C25, C26, C27, C30 (grupo)
<i>Gerbera jamesonii</i> Bol. ex Adlam.	Compositae	Gerbera	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z8	C6, C9, C14, C20, C24, C30, C31 (grupo)
<i>Grevillea robusta</i> A. M. Cunn. Ex. R. Br.	Proteaceae	Grevilia	Australiano	Perenifólio	1-12	4-6	Meso.	Árvore	Z8	C30(1)
<i>Hibiscus rosa-sinensis</i> L.	Malvaceae	Cardeais; Hibiscos; Rosa-da-china	Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C4, C6, C7, C13, C14, C17 (sebe), C9(2), C33(3)
<i>Hibiscus syriacus</i> L.	Malvaceae	Cardeal-roxo; Hibisco-da-síria	Paleártico; Indomalaio	Caducifólio	5-11	7-9	Micro.	Arbusto	Z5	C2(1), C11(5)
<i>Holmskioldia sanguinea</i> Retz.	Verbenaceae	Chapéus-de- mandarim; Chapéus-chineses	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C17(1)
<i>Hydrangea macrophylla</i> (Thunb.) Ser.	Hydrangeaceae	Hortênsia; Novelos	Paleártico	Caducifólio	3-12	5-10	Nano.	Arbusto	Z6	C2, C5, C9, C14, C24, C31 (grupo)
<i>Impatiens walleriana</i> Hook. F.	Balsaminaceae	Maravilhas	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Herbácea	Z9	C5, C19, C29 (grupo)
<i>Iresine herbstii</i> Hook.	Amaranthaceae	Iresine	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Caméfito	Herbácea	Z10	C1, C4, C7, C9, C12, C14, C20, C27 (grupo)
<i>Iris germanica</i> L.	Iridaceae	Lírio	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-8	Geófito	Herbácea	Z4	C4, C8, C19 (grupo)
<i>Jacaranda mimosifolia</i> D. Don.	Bignoniaceae	Jacarandá	Neotropical	Caducifólio	5-2	4-6; 9-10	Meso.	Árvore	Z9	C6(2), C11B(5)
<i>Kalanchoe blossfeldiana</i> Poelln.	Crassulaceae		Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto suculento	Z11	C10(grupo)
<i>Kalanchoe daigremontiana</i> Hamet & Perrier	Crassulaceae	Calanchoé	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	12-5	Nano.	Arbusto suculento	Z11	C10 (grupo)
<i>Kalanchoe delagouensis</i> Ecklon & Zeyh.	Crassulaceae	Rainhas	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	12-9	Nano.	Arbusto suculento	Z11	C25, C26, C32 (grupo)
<i>Lampranthus aurantiacus</i> (DC.) Swantes	Aizoaceae (Mesembryanthemaceae)	Lamprantos; Chorão	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	4-12	Fane. trep.	Arbusto trepador e suculento	Z11	C16 (grupo)
<i>Lantana camara</i> L.	Verbenaceae	Lantana	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C20(1)
<i>Leptospermum scoparium</i> Forst. & Forst.	Myrtaceae	Leptospermo; Urze- de-jardim	Australiano; Antártico	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z8	C6(sebe)
<i>Ligustrum obtusifolium</i> Sieb. & Zucc..	Oleaceae	Ligustro; Alfinheiro	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-6; 11-12	Micro.	Arbusto	Z3	C31, C33 (sebe)
<i>Magnolia grandiflora</i> L.	Magnoliaceae	Magnólia	Neártico	Perenifólio	1-12	5-8	Micro.	Árvore	Z6	C17(2)
<i>Mirabilis jalapa</i> L.	Nyctaginaceae	Boas-noites	Neotropical	Sazonal	3-10	5-9	Geófito	Herbácea	Z8	C33(2)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Myrtus communis</i> L.	Myrtaceae	Murta	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-7; 10-11	Micro.	Arbusto	Z8	C33(1)
<i>Narcissus tazetta</i> L.	Amaryllidaceae	Junquinhos	Paleártico	Sazonal	11-5	12-3	Geófita	Herbácea	Z8	C9, C20 (grupo)
<i>Neoregelia carolinae</i> (Beer) L. B.	Bromeliaceae	Bromélia	Neotropical	Perenifólio	1-12	11-2	Hemi.	Herbácea	Z10	C3, C11A, C17 (grupo)
<i>Nephrolepis cordifolia</i> (L.) Presl.	Oleandraceae	Feto	Neotropical; Áfricotropical; Indomalaio; Oceânia; Australiano	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z10	C3, C5, C6, C8, C9, C10, C15, C20, C25, C27, C30, C32 (grupo)
<i>Nerium oleander</i> L.	Apocynaceae	Sevadilha; Loendro	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-11	Micro.	Arbusto	Z9	C19(2), C29(2), C34(75)
<i>Ochna serrulata</i> (Hochst.) Walp.	Ochnaceae	Planta-do-rato- mickey	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	2-4	Nano.	Arbusto	Z9	C5(1), C9(2), C20(2), C26(2)
<i>Ocotea foetens</i> (Aiton) Baill.	Lauraceae	Til	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Meso.	Árvore	Z10	C17(3)
<i>Ophiopogon japonicus</i> (L. f.) Ker-Gawl	Liliaceae (Convallariaceae)	Relva-do-japão	Paleártico	Perenifólio	1-12	7-9	Hemi.	Herbácea	Z8	C9, C11A (mancha)
<i>Osteospermum barbereae</i> (Harv.) Norl.	Compositae	Estrelas-do-cabo	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Caméfito	Arbusto	Z10	C9, C14, C15, C17, C24, C25, C26 (grupo)
<i>Oxalis latifolia</i> HBK	Oxalidaceae	Trevo	Neotropical	Sazonal	10-5	12-4	Geófita	Herbácea	Z9	C1, C12 (grupo)
<i>Pelargonium cucullatum</i> (L.) L' Hérít.	Geraniaceae	Malva	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	4-9	Nano.	Arbusto	Z10	C19, C22, C26 (grupo)
<i>Pelargonium peltatum</i> (L.) L'Hérít.	Geraniaceae	Malva	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z10	C16, C22 (grupo)
<i>Pelargonium zonale</i> (L.) L'Hérít.	Geraniaceae	Malva	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C16, C31 (grupo)
<i>Phlebodium aureum</i> (L.) J. Sm.	Polypodiaceae	Polipódio-dourado	Neártico; Neotropical	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z10	C31 (grupo)
<i>Phoenix canariensis</i> ex. Chabaud.	Palmae	Palmeira-das- canárias	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-3	Meso.	Árvore	Z11	C6(1), C7(4)
<i>Pilea cadierei</i> Gagnep. & Guillaum.	Urticaceae	Planta-do- alumínio	Indomalaio	Perenifólio	1-12	10-12	Hemi.	Herbácea	Z11	C20(grupo)
<i>Pilea microphylla</i> (L.) Liebm.	Urticaceae	Arrozinho	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C6, C8, C14, C15, C18 (grupo)
<i>Pittosporum undulatum</i> Vent.	Pittosporaceae	Incenseiro	Australiano	Perenifólio	1-12	2-4	Micro.	Árvore	Z9	C9(1)
<i>Plumbago auriculata</i> Lam.	Plumbaginaceae	Plumbago	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z9	C21(grupo)
<i>Polygonum capitatum</i> Buch. -Ham. ex D. Don	Polygonaceae	Polígono-de- jardim	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z8	C30(grupo)
<i>Portulacaria afra</i> Jacq.	Portulacaceae	Portulacária	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu**	Nano.	Arbusto suculento	Z9	C7(2), C18 (2)
<i>Pteris vittata</i> L.	Pteridaceae	Feto	Paleártico; Indomalaio; Australiano; Oceânia	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z9	C19, C25, C30 (grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Pyrostegia venusta</i> (Ker-Gawl.) Miers	Bignoniaceae	Gaitinhas	Neotropical	Perenifólio	1-12	11-3	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	C21 (grupo)
<i>Rhododendron mucronatum</i> G. Don.	Ericaceae	Azálea-japonesa	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z5	C1(8), C2 (6), C10(2), C12(6)
<i>Sansevieria trifasciata</i> hort. ex Prain.	Agavaceae	Língua-de-sogra	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	8-11	Hemi.	Herbácea	Z10	C7, C14, C15, C19, C30, C31, C32, C33 (grupo)
<i>Sansevieria trifasciata</i> Prain var. <i>laurentii</i> (De Wild.) N. E. Br.	Agavaceae	Língua-de-sogra	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	8-11	Hemi.	Herbácea	Z10	C20, C26 (grupo)
<i>Senecio serpens</i> G. Rowley	Compositae	Bálsamo-carnudo; Bálsamo-de-canudo	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Caméfito	Arbusto suculento	Z9	C5, C9, C10, C14, C15, C16, C17, C26, C27, C32 (grupo)
<i>Senna pendula</i> (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Irwin & Bameby var. <i>glabrata</i> (Vogel) Irwin & Bameby	Leguminosae (Caesalpiniodeae)	Chuva-de-ouro; Cássia	Neotropical; Neártico	Perenifólio	1-12	10-1	Micro.	Arbusto	Z9	C17(2)
<i>Solenostemon scutellarioides</i> (L.) Codd.	Labiatae	Cóleos	Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C1, C3, C4, C5, C9, C12 (grupo)
<i>Spathodea campanulata</i> Beauv.	Bignoniaceae	Chama-da-floresta; Tulipeiro-africano	Áfricotropical	Caducifólio	1-12 (Variação individual)	1-12	Micro.	Árvore	Z11	C5(1), C7(1), C17(5)
<i>Stachys byzantina</i> K. Koch	Labiatae	Orelha-de-gato	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-7	Caméfito	Herbácea	Z5	C18 (grupo)
<i>Stenotaphrum secundatum</i> (Walter) Kuntze	Gramineae	Relva; Relva-de-correr	Neotropical; Áfricotropical; Oceânia	Perenifólio	1-12	3-11	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z9	C1, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12, C14, C15, C16, C17, C20, C27, C28, C31, C33 (tapete)
<i>Strelitzia reginae</i> Banks ex Dryand.	Strelitziaceae	Estrelícia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C2(grupo), C24(1), C27(grupo), C31(1)
<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassm.	Palmae	Coqueiro-de-jardim; Palmeira-rainha	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-7	Micro.	Árvore	Z10	C1(1), C5(2), C12(1)
<i>Synadenium grantii</i> Hook. f.	Euphorbiaceae	Sinadénio	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	8-11	Micro.	Arbusto suculento	Z10	C31(1)
<i>Tagetes patula</i> L.	Compositae	Cravos-de-burro	Neotropical	Sazonal	1-9	3-8	Terófito	Herbácea	Z9	C4 (grupo)
<i>Trachelospermum jasminoides</i> (Lindl.) Lem.	Apocynaceae	Jasmim-de-estrela	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-11	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z8	C5(1), C15(1)
<i>Tradescantia pallida</i> (Rose) D. Hunt.	Commelinaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea trepadora	Z8	C1, C3, C5, C6, C12, C14, C16, C18 (grupo)
<i>Viola riviniana</i> Rchb.	Violaceae	Violeta	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z5	C14 (grupo)
<i>Wisteria sinensis</i> (Sims) Sweet.	Leguminosae (Papilionoidae)	Lilases; Glícinia	Paleártico	Caducifólio	2-12	2-5; 7-8	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z5	C19(2)
<i>Zantedeschia aethiopica</i> (L.) Spreng.	Araceae	Jarros; Bocas-de-jarro	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	12-5	Hemi.	Herbácea	Z8	C14(1), C31(1)

Legenda:

- Plantas que não floriram no período em estudo (Janeiro 2002 – Janeiro 2005): * plantas novas; ** plantas que nunca floriram por falta de aclimação;
- Plantas marcescentes (plantas semiperenifólias e semcaducifólias): 1-12 (**3-12**) – folhas todo o ano mas com perda significativa em Janeiro e Fevereiro

Anexo 33
CARACTERIZAÇÃO FITOGEGRÁFICA DO CEMITÉRIO INGLÊS

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Acacia meamsii</i> De Wildeman.	Leguminosae (Mimisoideae)	Mimosa	Australiano	Perenifólio	1-12	1-8	Micro.	Árvore	Z8	C13(1)
<i>Acalypha wilkesiana</i> Muell. Arg.	Euphorbiaceae	Acálifa; Folha-de-cobre	Oceânia	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C1(2), C2(1), C5(1), C10(2), C13(1), C16(3), C17(1)
<i>Agapanthus praecox</i> Willd. ssp. <i>orientalis</i> (Leighton) Leighton	Liliaceae	Agapantos; Coroas-de- henrique	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	4-9	Hemi.	Herbácea	Z9	C1, C2A, C10, C13(mancha)
<i>Alcea rosea</i> L.	Malvaceae	Malvas	Paleártico	Sazonal	3-10	5-9	Terófito	Herbácea	Z4	C3, C6 (grupo)
<i>Alstroemeria ligtu</i> L.	Liliaceae (Alstroemeriaceae)	Alstroeméria	Neotropical	Sazonal	4-10	5-9	Geófito	Herbácea	Z8	C2, C3, C4(grupo)
<i>Alstroemeria psittacina</i> Lehm.	Liliaceae (Alstroemeriaceae)	Alstroemeria	Neotropical	Sazonal	4-10	5-9	Geófito	Herbácea	Z8	C2, C3, C4(grupo)
<i>Annona cherimola</i> Mill.	Annonaceae	Anoneira	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-7	Micro.	Árvore	Z10	C13(3), C16(1)
<i>Apollonias barbuja</i> (Cav.) Bomm.	Lauraceae	Barbusano	Paleártico	Perenifólio	1-12	9-3	Meso.	Árvore	Z10	C13(1), C16(1)
<i>Aptenia cordifolia</i> (L. f.) Schwant.	Aizoaceae	Apténia; Rosinha-de-sol	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Herbácea trepadora e suculenta	Z9	C2A, C16(grupo)
<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> H. A. Wendl. & Drude.	Palmae	Palmeira-elegante	Australiano	Perenifólio	1-12	4-10	Meso.	Árvore	Z10	C2(1)
<i>Argyranthemum pinnatifidum</i> (L. f.) Lowe ssp. <i>pinnatifidum</i>	Compositae	Estrelas; Pampilhos; Malmequeres	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C5(1), C10(2)
<i>Arundo donax</i> L. var. <i>versicolor</i> (Mill.) Stokes	Gramineae	Cana-vieira; Cana-de-roca	Paleártico	Perenifólio	1-12	8-10	Hemi.	Herbácea	Z9	C1, C10 (grupo)
<i>Asparagus densiflorus</i> (Kunth) Jassop	Liliaceae (Asparagaceae)	Esparto	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	7-8	Nano.	Herbácea	Z9	C4(grupo)
<i>Asparagus setaceus</i> (Kunth) Jassop	Liliaceae (Asparagaceae)	Esparto-de-folha- miúda; Esparto	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	9-12	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z9	C13, C14(grupo)
<i>Aster ericoides</i> L.	Compositae	Áster	Neártico	Perenifólio	1-12	6-9	Nano.	Herbácea	Z4	C3(grupo)
<i>Begonia minor</i> Jacq.	Begoniaceae	Corações; Begónia	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C13A(grupo)
<i>Begonia x ricinifolia</i> A. Dietr.	Begoniaceae	Corações; Begónia	Hortícola	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C6, C8, C9 (grupo)
<i>Brachychiton acerifolius</i> Cunn. ex. F. Muell.	Sterculiaceae	Árvore-do-fogo	Australiano	Caducifólio	1-5; 8-12	5-8	Micro.	Árvore	Z10	C17(1)
<i>Brassica oleracea</i> L.	Cruciferae	Couve	Paleártico	Perenifólio	1-12	12-2	Terófito	Herbácea	Z8	C16, C18(grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Brugmansia versicolor</i> Lagerh.	Solanaceae	Trombeteira	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C6(1), C9(2), C10(8), C12(1), C14(11)
<i>Brunfelsia pauciflora</i> (Cham. & Södl.) Benth.	Solanaceae	Brunfelsia; Manacá	Neotropical	Perenifólio	1-12	2-10	Micro.	Arbusto	Z10	C10(2), C13(1), C16(1)
<i>Buxus sempervirens</i> L.	Buxaceae	Buxo	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-4; 10-11	Nano.	Arbusto	Z5	C10(sebe), C13(1)
<i>Calendula officinalis</i> L.	Compositae	Calendula	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Terófito	Herbácea	Z6	C13(grupo)
<i>Camellia japonica</i> L.	Theaceae	Camélia; Japoneira	Paleártico	Perenifólio	1-12	11-3	Micro.	Árvore	Z8	C2(1)
<i>Canna indica</i> L.	Cannaceae	Canas-da-índia; Bananeira-de-flor	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Geófito	Herbácea	Z9	C10(grupo)
<i>Canna x generalis</i> L.H. Bail.	Cannaceae	Canas-da-índia; Bananeiras-de-flor	Hortícola	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z9	C8(1), C10(grupo)
<i>Capsicum frutescens</i> L.	Solanaceae	Pimenteira	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-10	Nano.	Arbusto	Z9	C10(1), C12(1), C16(1)
<i>Catharanthus roseus</i> (L.) G. Don.	Apocynaceae	Catarantos; Maravilhas;	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Herbácea	Z10	C14(grupo)
<i>Celtis australis</i> L.	Ulmaceae	Lódão-bastardo; Conteira; Sementeira	Paleártico	Caducifólio	4-1	5-6	Meso.	Árvore	Z8	C13(1), C16(1)
<i>Centranthus ruber</i> (L.) DC.	Valerianaceae	Rosa-da-rocha; Alfinetes	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Caméfito	Herbácea	Z5	C10(grupo)
<i>Ceratonia siliqua</i> L.	Leguminosae (Caesalpinoideae)	Alfarrobeira	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-9	Micro.	Árvore	Z9	C10(1)
<i>Chlorophytum comosum</i> (Thumb.) Jacques	Liliaceae (Anthericaceae)	Fitinhas	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z9	C1, C2, C3, C6, C8 (grupo)
<i>Citrus limon</i> (L.) Burm.	Rutaceae	Limoeiro	Paleártico	Perenifólio	1-12	2-4	Micro.	Árvore	Z9	C16(1)
<i>Citrus nobilis</i> Lour.	Rutaceae	Tangerineira	Indomalaio	Perenifólio	1-12	2-4	Micro.	Árvore	Z10	C13(3)
<i>Citrus sinensis</i> (L.) Osbeck	Rutaceae	Laranjeira	Paleártico	Perenifólio	1-12	2-4	Micro.	Árvore	Z9	C13(1), C16(1)
<i>Codiaeum variegatum</i> (L.) Bl. var. <i>pictum</i> (Lodd) Muell. Arg.	Euphorbiaceae	Crótone	Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z11	C2A(2), C6(1), C9(2), C12(1)
<i>Cordyline stricta</i> (Sims) Endl.	Agavaceae	Cordilene	Australiano	Perenifólio	1-12	1-6	Nano.	Arbusto	Z10	C13(grupo)
<i>Crassula multicava</i> Lem.	Crassulaceae	Crássula	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea suculenta	Z10	C14, C16(grupo)
<i>Crassula ovata</i> (Mill.) Druce.	Crassulaceae	Ensaído-branco ; Planta-de-jade	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	11-3	Nano.	Arbusto suculento	Z10	C10, C13, C14, C15, C16 (grupo)
<i>Ctenanthe oppenheimiana</i> (C. J. Morren) K. Schum.	Marantaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	4-8	Hemi.	Herbácea	Z10	C14 (grupo)
<i>Cucurbita moschata</i> (Duchesne ex Lam.) Duchesne ex Poir.	Cucurbitaceae	Aboboreira	Neártico; Neotropical	Perenifólio	1-12	7-9	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z10	C13(2)
<i>Cuphea hyssopifolia</i> HBK.	Lythraceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C10(grupo)
<i>Cupressus lusitanica</i> Mill.	Cupressaceae	Cedro-de-goá; Cedro-das- barracas	Neártico; Neotropical	Perenifólio	1-12	1-3	Meso.	Árvore	Z9	C6(1), C16(1)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Cupressus sempervirens</i> L.	Cupressaceae	Cipreste	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-2	Micro.	Árvore	Z8	C10(1), C16(1)
<i>Cycas revoluta</i> Thunb.	Cycadaceae	Cicas-revoluta; Cicas-de-sagú	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-8	Micro.	Árvore	Z9	C4(1)
<i>Cydonia oblonga</i> Mill.	Rosaceae	Marmeleiro	Paleártico	Caducifólio	4-12	6-7	Micro.	Árvore	Z6	C17(1)
<i>Dendranthema x grandiflorum</i> Kitam.	Compositae	Crisântemo-das- floristas	Hortícola	Perenifólio	1-12	10-12	Nano.	Herbácea	Z4	C6, C8, C10(grupo)
<i>Dianthus barbatus</i> L.	Caryophyllaceae	Craveiro	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-7	Nano.	Herbácea	Z4	C10(1)
<i>Dichorisandra thyrsiflora</i> Mikan.	Commelinaceae	Dicorisandra	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C12(grupo)
<i>Dieffenbachia seguine</i> (Jacq.) Schott.	Araceae	Diefenbáquia	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Herbácea	Z10	C17(1)
<i>Dracaena deremensis</i> Engl.	Agavaceae (Dracaenaceae)	Dracena	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	11-12	Micro.	Arbusto	Z11	C3(1), C13(grupo), C14(1), C17(1)
<i>Dracaena draco</i> (L.) L. ssp. <i>draco</i>	Agavaceae	Dragoeiro	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-6	Micro.	Árvore	Z11	C6(1)
<i>Emilia coccinea</i> (Sims) D. Don.	Compositae	Emilia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Herbácea	Z11	C6(grupo)
<i>Epipremnum aureum</i> (Lind. & André)	Araceae		Oceânia	Perenifólio	1-12	6-8	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z10	C2A(1)
<i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl.	Rosaceae	Nespereira	Paleártico	Perenifólio	1-12	11-12	Micro.	Árvore	Z8	C10(1), C16(1)
<i>Eugenia uniflora</i> L.	Myrtaceae	Pitangueira	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Árvore	Z10	C10(8), C12(8) C13(12)
<i>Euonymus japonicus</i> Thunb.	Celastraceae	Verdegaio	Paleártico	Perenifólio	1-12	7-8	Micro.	Arbusto	Z7	C8(1)
<i>Euphorbia pulcherrima</i> Willd. ex Klotzsch.	Euphorbiaceae	Manhã-de-páscoa	Neotropical	Caducifólio	5-2	10-3	Micro.	Arbusto	Z10	C2(1), C2A(1), C3(6), C5, C6(grupo), C8(3), C9(2), C13, C14, C16, C17(grupo)
<i>Farfugium japonicum</i> (L.) Kitam.	Compositae	Patas-de-cavalo; Boinas	Paleártico	Perenifólio	1-12	7-3	Hemi.	Herbácea	Z7	C6(1)
<i>Ficus benjamina</i> L.	Moraceae	Figueira-da-índia	Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-4	Micro.	Árvore	Z11	C13(1)
<i>Ficus carica</i> L.	Moraceae	Figueira	Paleártico	Caducifólio	4-12	6-7	Micro.	Árvore	Z8	C16(1), C17(2)
<i>Ficus pumila</i> L.	Moraceae	Pastinha	Indomalaio; Paleártico	Perenifólio	1-12	10-12	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z8	C10(1)
<i>Gazania rigens</i> (L.) Gaertn..	Compositae	Gazania	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z9	C12(grupo)
<i>Goniophlebium subauriculatum</i> (Bl.) Presl.	Polypodiaceae	Feto-de-metro; Feto-chorão	Indomalaio; Australiano; Oceânia	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z10	C4(1)
<i>Grevillea robusta</i> A. M. Cunn. Ex. R. Br.	Proteaceae	Grevília	Australiano	Perenifólio	1-12	4-6	Meso.	Árvore	Z8	C13(3), C17(1)
<i>Hedychium gardnerianum</i> Ker-Gawl.	Zingiberaceae	Roca-de-vénus; Conteira; Bananilha	Paleártico; Indomalaio	Perenifólio	1-12	7-10	Hemi	Herbácea	Z9	C1(1)
<i>Helianthus annuus</i> L.	Compositae	Girassol	Neártico	Sazonal	4-8	4-8	Terófito	Herbácea	Z4	C10(grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Helichrysum bracteatum</i> (Vent.) Andrews	Compositae	Margarida-de-papel	Australiano	Sazonal	3-10	4-10	Terófito	Herbácea	Z8	C3, C5, C6(grupo)
<i>Heliconia bihai</i> (L.) L.	Heliconiaceae	Helicônia	Neotropical	Perenifólio	1-12	7-10	Hemi.	Herbácea	Z11	C10, C12, C14, C16, C17(grupo)
<i>Hibiscus rosa-sinensis</i> L.	Malvaceae	Cardeais	Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C1, C5, C9, C10, C15 (grupo)
<i>Hibiscus syriacus</i> L.	Malvaceae	Cardeal-roxo; Hibisco-da-síria	Paleártico; Indomalaio	Caducifólio	5-11	7-9	Micro.	Arbusto	Z5	C9(1)
<i>Hymenosporum flavum</i> (Hook.) F. Muell.	Pittosporaceae	Himenosporo	Australiano	Perenifólio	1-12	3-8	Micro.	Árvore	Z9	C16(1)
<i>Hyophorbe verschaffeltii</i> (L. H. Bailey) H. Wendl.	Palmae	Palmeira-fusifor-me	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	6-7	Micro.	Árvore	Z12	C16(2)
<i>Iresine herbstii</i> Hook.	Amaranthaceae	Iresine	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Caméfito	Herbácea	Z10	C5, C10 (grupo)
<i>Jacaranda mimosifolia</i> D. Don.	Bignoniaceae	Jacarandá	Neotropical	Caducifólio	5-2	4-6; 9-10	Meso.	Árvore	Z9	C10(1), C13(1)
<i>Kalanchoe blossfeldiana</i> Poeckl.	Crassulaceae	Calanchoé	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto suculento	Z11	C10(1), C13(1)
<i>Kalanchoe daigremontiana</i> Hamet & Perrier	Crassulaceae	Calanchoé	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	12-5	Nano.	Arbusto suculento	Z11	C16(grupo)
<i>Kalanchoe delagoensis</i> Ecklon & Zeyh.	Crassulaceae	Calanchoé	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	12-9	Nano.	Arbusto suculento	Z11	C14(grupo)
<i>Lagerstroemia indica</i> L.	Lythraceae	Laguerestrémia; Flor-de-merenda; Suspiros	Paleártico; Indomalaio	Caducifólio	3-11	7-9	Micro.	Árvore	Z7	C9(1)
<i>Leucanthemum x superbum</i> (J. Ingram) Bergmans ex Kent	Compositae	Estrelas; Margarida-grande	Hortícola	Perenifólio	1-12	5-8	Nano.	Herbácea	Z5	C3(grupo)
<i>Ligustrum lucidum</i> Ait. f.	Oleaceae	Ligustro; Alfinheiro	Paleártico	Perenifólio	1-12	6-9	Micro.	Árvore	Z7	C4(1), C9(sebe), C13(3), C16(2)
<i>Ligustrum ovalifolium</i> Hassk.	Oleaceae	Ligustro; Alfinheiro	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-7	Nano.	Arbusto	Z5	C1, C14, C15, C16(grupo)
<i>Lilium candidum</i> L.	Liliaceae	Açucena-branca; Açucena-de- nossa-senhora	Paleártico	Sazonal	2-7	4-6	Geófito	Herbácea	Z6	C14, C16 (grupo)
<i>Livistona chinensis</i> (Jacq.) R. Br. ex Mart.	Palmae	Palmeira-de-leque	Paleártico	Perenifólio	1-12	2-3	Meso.	Árvore	Z9	C16(5), C17(9)
<i>Lycopersicon esculentum</i> Mill.	Solanaceae	Tomateiro	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-8	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z9	C16, C18 (grupo)
<i>Magnolia grandiflora</i> L.	Magnoliaceae	Magnólia	Neártico	Perenifólio	1-12	5-8	Micro.	Árvore	Z6	C9(1), C13(1)
<i>Mangifera indica</i> L.	Anacardiaceae	Mangueiro	Indomalaio	Perenifólio	1-12	11-6	Micro.	Árvore	Z11	C10(1)
<i>Melianthus major</i> L.	Melanthaceae		Áfricotropical	Perenifólio	1-12	3-5	Micro.	Arbusto	Z9	C13(1)
<i>Monstera deliciosa</i> Liebm.	Araceae	Costela-de-adão	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z10	C5(1), C9(2), C13(grupo)
<i>Morus nigra</i> L.	Moraceae	Amoreira	Paleártico	Caducifólio	3-12	4-5	Micro.	Árvore	Z6	C9(2), C10(1)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Musa x paradisiaca</i> L.	Musaceae	Bananeira-de-prata	Hortícola	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C13, C16(grupo)
<i>Myrtus communis</i> L.	Myrtaceae	Murta	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-7; 10-11	Micro.	Arbusto	Z8	C17(1)
<i>Nephrolepis cordifolia</i> (L.) Presl.	Oleandraceae	Feto	Neotropical; Áfricotropical; Indomalaio; Oceânia; Australiano	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z10	C15(grupo)
<i>Nerium oleander</i> L.	Apocynaceae	Sevadilha; Loendro	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-11	Micro.	Arbusto	Z9	C8(1), C9(1), C10(1)
<i>Nolina recurvata</i> (Lem.) Hemsl.	Agavaceae	Nolina; Pata-de-elefante	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-8	Micro.	Árvore	Z9	C16(1)
<i>Ochna serrulata</i> (Hochst.) Walp.	Ochnaceae	Planta-do-rato-mickey	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	2-4	Nano.	Arbusto	Z9	C16(1)
<i>Ocotea foetens</i> (Aiton) Baill.	Lauraceae	Til	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Meso.	Árvore	Z10	C5(1), C9(1)
<i>Odontonema strictum</i> (Nees) Kuntze	Acanthaceae	Odontonema; Ramo-de-fogo	Neotropical	Perenifólio	1-12	8-12	Nano.	Arbusto	Z10	C5(1)
<i>Pamianthe peruviana</i> Stapf	Amaryllidaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	10-12	Geófita	Herbácea	Z10	C5(3)
<i>Paspalum dilatatum</i> Poir.	Gramineae	Erva-rija; Erva-do-governo	Neotropical	Perenifólio	1-12	3-9	Hemi.	Herbácea	Z8	C4(tapete)
<i>Passiflora edulis</i> Sims	Passifloraceae	Maracujá-roxo; Flor-da-paixão	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-11	Fane.trep.	Arbusto trepador	Z10	C10, C12, C13, C16, C17(grupo)
<i>Pelargonium peltatum</i> (L.) L'Hérit.	Geraniaceae	Malva	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z10	C10(grupo)
<i>Persea americana</i> Mill.	Lauraceae	Abacateiro	Neotropical	Perenifólio	1-12	11-3	Micro.	Árvore	Z10	C11(1), C13(1), C17(4)
<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	Leguminosae (Papilionoideae)	Feijoeiro	Neotropical	Sazonal	4-8	5-6	Terófito	Herbácea trepadora	Z7	C18(grupo)
<i>Phoenix canariensis</i> Chabaud.	Palmae	Palmeira-das-canárias	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-3	Meso.	Árvore	Z11	C9(7 peq.), C10(4), C13(1)
<i>Phyllanthus tenellus</i> Roxb.	Euphorbiaceae	Quebra-pedra	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Herbácea	Z11	C16, C17 (grupo)
<i>Pilea microphylla</i> (L.) Liebm.	Urticaceae	Arrozinho	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C12(grupo)
<i>Pittosporum undulatum</i> Vent.	Pittosporaceae	Incenseiro	Australiano	Perenifólio	1-12	2-4	Micro.	Árvore	Z9	C1(2), C9(1)
<i>Plectranthus argentatus</i> S. T. Blake	Labiatae	Plectranto	Australiano	Perenifólio	1-12	3-8	Nano.	Arbusto	Z10	C16(1)
<i>Plectranthus barbatus</i> Andrews	Labiatae	Falso-boldo; Boldo-da-terra	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	C12(1)
<i>Plectranthus forsteri</i> Benth.	Labiatae	Plectrantos	Australiano; Oceânia	Perenifólio	1-12	6-10	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z10	C2A, C14, C15 (grupo)
<i>Plumeria rubra</i> L. var. <i>acutifolia</i> (Poir.) Woodson.	Apocynaceae	Planta-dos-dentes	Neotropical	Caducifólio	5-1	6-12	Micro.	Árvore	Z10	C17(2)
<i>Portulaca grandiflora</i> Hook.	Portulacaceae	Portulaca	Neotropical	Sazonal	4-11	6-11	Terófito	Herbácea	Z10	C10(grupo)
<i>Prunus persica</i> (L.) Batsch.	Rosaceae	Pessegueiro	Paleártico	Caducifólio	3-11	3-6	Micro.	Árvore	Z5	C17(1)
<i>Prunus x domestica</i> L.	Rosaceae	Ameixeira	Hortícola	Caducifólio	4-11	3-4	Micro.	Árvore	Z5	C10(1), C13(2), C16(2)
<i>Psidium guajava</i> L.	Myrtaceae	Goiabeira	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-7	Micro.	Árvore	Z10	C10(1), C12(1)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Psidium littorale</i> Raddi	Myrtaceae	Araçaleiro; Araçazeiro	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-7	Micro.	Árvore	Z10	C2A(1), C13(1)
<i>Quercus suber</i> L.	Fagaceae	Sobreiro	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-4	Micro.	Árvore	Z8	C1(1)
<i>Rivina humilis</i> L.	Phytolaccaceae	Planta-vermelha	Neártico; Neotropical	Perenifólio	1-12	5-10	Nano.	Herbácea	Z9	C14(2), C16(grupo)
<i>Rosa x damascena</i> Mill. var. <i>semperflorens</i> (Duhamel) Rowley	Rosaceae	Rosa-de-quatro- estações	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z4	C10(1)
<i>Rosmarinus officinalis</i> L.	Labiatae	Alecrim	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z6	C10(1)
<i>Rudbeckia lacinata</i> L.	Compositae	Rudebêquia	Neártico	Perenifólio	1-12	5-10	Nano.	Herbácea	Z3	C3, C8, C17(grupo)
<i>Salvia guaranitica</i> St.-Hil. ex Benth.	Labiatae	Sálvia	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z9	C3, C8(grupo)
<i>Salvia microphylla</i> Kunth.	Labiatae	Sálvia; Rapazinhos	Neártico; Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z9	C5, C8(grupo)
<i>Salvia splendens</i> Sell ex Roem. & Scult.	Labiatae	Camarões; Sálvias	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Herbácea	Z10	C2, C3, C5, C12 (grupo)
<i>Sambucus nigra</i> L.	Caprifoliaceae	Sabugueiro	Paleártico	Caducifólio	3-12	5-6	Micro.	Árvore	Z5	C16(1)
<i>Sansevieria trifasciata</i> hort. ex Prain.	Agavaceae	Língua-de-sogra	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	8-11	Hemi.	Herbácea	Z10	C10(grupo)
<i>Sansevieria trifasciata</i> Prain var. <i>laurentii</i> (De Wild.) N. E. Br.	Agavaceae	Língua-de-sogra	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	8-11	Hemi.	Herbácea	Z10	C1(1), C10(grupo)
<i>Schefflera arboricola</i> (Hayata)	Araliaceae	Schefflera	Indomalaio	Perenifólio	1-12	2-4; 7-8	Micro.	Arbusto	Z10	C5(1), C8(1), C17(1)
<i>Schinus molle</i> L. non hort. ex Engl.	Anacardiaceae	Pimenteira- bastarda; Pimenteira-da- índia	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Meso.	Árvore	Z9	C9(1), C13(1), C14(1), C16(1)
<i>Sechium edule</i> (Jacq.) Sw.	Cucurbitaceae	Pepinela; Caiota; Chuchu	Neotropical	Perenifólio	1-12	7-9	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z10	C18(1)
<i>Semele androgyna</i> (L.) Kunth.	Liliaceae	Alegre-campo	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-5	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	C1(1), C9(1)
<i>Senecio cineraria</i> DC.	Compositae	Senécio	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-8	Nano.	Arbusto	Z8	C5, C10(grupo)
<i>Sonchus fruticosus</i> L.fil.	Compositae	Leituga; Língua-de vaca; Serralha-da- rocha	Paleártico	Perenifólio	1-12	6-8	Nano.	Arbusto	Z10	C9(1)
<i>Strelitzia reginae</i> Banks ex Dryand	Strelitziaceae	Estrelícia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	C3(1), C6(1), C17(grupo)
<i>Tagetes patula</i> L.	Compositae	Cravos-de-burro	Neotropical	Sazonal	1-9	3-8	Terófito	Herbácea	Z9	C13A, C17(grupo)
<i>Tecomaria capensis</i> (Thunb.) Spach.	Bignoniaceae	Camarões	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C1, C9(sebe)
<i>Tibouchina urvilleana</i> (DC) Cogn.	Melastomataceae	Aranhas	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	C6(1)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Tradescantia zebrina</i> hort. ex. Bosse	Commelinaceae	Zebrina	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z9	C4(grupo)
<i>Wedelia trilobata</i> (L.) Hitchc.	Compositae		Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Herbácea	Z11	C16(grupo)
<i>Zantedeschia aethiopica</i> (L.) Spreng.	Araceae	Jarros	Áfricotropical	Sazonal	10-7	11-5	Geófito	Herbácea	Z8	C6(1)
<i>Zea mays</i> L.	Gramineae	Milho	Neártico	Sazonal	3-8	6-7	Terófito	Herbácea	Z7	C16, C17(grupo)

Legenda:

- Plantas que não floriram no período em estudo (Janeiro 2002 – Janeiro 2005): * plantas novas; ** plantas que nunca floriram por falta de aclimação;
- Plantas marcescentes (plantas semiperenifólias e semicaducifólias): 1-12 (**3-12**) – folhas todo o ano mas com perda significativa em Janeiro e Fevereiro

Anexo 34
CARACTERIZAÇÃO FITOGEOGRÁFICA DOS ESPAÇOS VERDES DO CONCELHO DO FUNCHAL

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Abelia graebneriana</i> Rehd.	Caprifoliaceae	Abélia	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-10	Nano.	Arbusto	Z5	E31(2)
<i>Abelia x grandiflora</i> (André) Rehd.	Caprifoliaceae	Abélia	Hortícola	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z5	E2(2), E4(4), E5(4), E6(6), E8(grupo), E9(5), E10(10), E12, E13, E14, E16 (grupo), E17(10), E18(6), E19(grupo), E21(127), E22(11), E23(grupo), E24(1), E25(1), E26(13), E27(grupo), E28(3), E29(1), E30(17), E31(2)
<i>Abelmoschus moschatus</i> Medik.	Malvaceae		Indomalaio	Perenifólio	1-12	4-7	Nano.	Herbácea	Z9	E12(1)
<i>Abies alba</i> Mill.	Pinaceae	Abeto-prateado	Paleártico	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Micro.	Árvore	Z6	E28(1)
<i>Abies nordmanniana</i> (Steven) Spach.	Pinaceae	Abeto-do-cáucaso	Paleártico	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Micro.	Árvore	Z4	E28(3)
<i>Abutilon arboreum</i> Sweet.	Malvaceae	Abutilão-arbóreo	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Árvore	Z9	E25(1)
<i>Abutilon grandifolium</i> (Willd.) Sweet	Malvaceae	Abutilão	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z9	E9(2), E12(3), E19(1), E20(grupo), E21(2), E23(1), E29(grupo), E32(1)
<i>Abutilon megapotamicum</i> (Spreng.) St.-Hil. & Naudin.	Malvaceae	Abutilão; Lanternas	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z9	E22(3), E30(7)
<i>Abutilon pictum</i> (Gillies ex Hook. & Arn.) Walp.	Malvaceae	Abutilão; Lanterna-chinesa	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z9	E5(grupo), E10(11), E11(6), E12(1), E18(2), E20(grupo), E22(1), E26(1)
<i>Abutilon x hybridum</i> hort.	Malvaceae	Abutilão; Lanterna-chinesa	Hortícola	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z9	E5(1), E10(grupo), E14(24), E19(2), E26(4), E31(7)
<i>Abutilon x milleri</i> hort.	Malvaceae	Lanterna-chinesa	Hortícola	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z9	E10(2)
<i>Acacia baileyana</i> F. Muell.	Leguminosae (Mimosoideae)	Acácia-baileiana	Australiano	Perenifólio	1-12	1-2	Micro.	Árvore	Z8	E12(2), E26(1)
<i>Acacia dealbata</i> Link.	Leguminosae (Mimosoideae)	Mimosa	Australiano	Perenifólio	1-12	12-3	Meso.	Árvore	Z8	E10(2), E22(2) E26(10), E28(grupo)
<i>Acacia farnesiana</i> (L.) Willd.	Leguminosae (Mimosoideae)	Aromeira	Neotropical	Perenifólio	1-12	7-2	Micro.	Árvore	Z11	E18(1)
<i>Acacia linifolia</i> (Vent.) Willd.	Leguminosae (Mimosoideae)	Acácia; Mimosa	Australiano	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Árvore	Z9	E31(6)
<i>Acacia longifolia</i> (Andrews) Willd.	Leguminosae (Mimosoideae)	Acácia-das- espigas	Australiano	Perenifólio	1-12	1-6	Micro.	Árvore	Z8	E10(1), E18(2), E26(2), E28(3)
<i>Acacia mearnsii</i> De Wildeman.	Leguminosae (Mimosoideae)	Mimosa	Australiano	Perenifólio	1-12	1-8	Micro.	Árvore	Z8	E3(1), E20(1), E22(grupo), E23(2), E26(4), E28(grupo), E31(9)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Acacia melanoxylon</i> R. Br.	Leguminosae (Mimosoideae)	Acácia-austrália	Australiano	Perenifólio	1-12	1-4	Meso.	Árvore	Z8	E19(grupo), E23(2), E26(>70), E27(1), E28(grupo), E30(13)
<i>Acacia podalyriifolia</i> G. Don.	Leguminosae (Mimosoideae)	Acácia	Australiano	Perenifólio	1-12	12-3	Micro.	Árvore	Z8	E10(1), E31(5)
<i>Acacia pravissima</i> F. Muell.	Leguminosae (Mimosoideae)	Acácia	Australiano	Perenifólio	1-12	2-4	Micro.	Árvore	Z8	E26(1)
<i>Acacia retinodes</i> Schldtl.	Leguminosae (Mimosoideae)	Acácia	Australiano	Perenifólio	1-12	1-2	Micro.	Árvore	Z8	E4(1), E12(2)
<i>Acacia salicina</i> Lindl.	Leguminosae (Mimosoideae)	Acácia	Australiano	Perenifólio	1-12	12-2	Micro.	Árvore	Z9	E31(11)
<i>Acacia verticillata</i> (L'Hérit.) Willd.	Leguminosae (Mimosoideae)	Acácia	Australiano	Perenifólio	1-12	1-3	Micro.	Árvore	Z8	E28(1)
<i>Acalypha godseffiana</i> hort. Sander ex Mast.	Euphorbiaceae	Acálifa	Oceânia	Perenifólio	1-12	2-8	Micro.	Arbusto	Z11	E10(3), E19(2), E24(1), E32(1)
<i>Acalypha hispida</i> Burm.	Euphorbiaceae	Rabo-de-gato- vermelho	Indomalaio; Oceânia	Perenifólio	1-12	7-11	Nano.	Arbusto	Z11	E6(1), E19(1)
<i>Acalypha reptans</i> Sw.	Euphorbiaceae		Neártico; Neotropical	Perenifólio	1-12	4-8	Caméfito	Herbácea	Z10	E12(1)
<i>Acalypha wilkesiana</i> Muell. Arg.	Euphorbiaceae	Acálifa; Folha-de-cobre	Oceânia	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	E1(17), E2(grupo), E3(11), E4(grupo), E5(5), E6(6), E7(13), E8(2), E9(10), E10(23), E11, E12, E13(grupo), E14(9), E16(grupo), E17(16), E18(15), E19(grupo), E20(11), E21(129), E23(grupo), E24(11), E25(19), E27(grupo), E28(3), E29(grupo), E31(1), E32(10), E33(2)
<i>Acanthus mollis</i> L.	Acanthaceae	Erva-gigante	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-8	Hemi.	Herbácea	Z6	E2, E5, E6, E10, E13, E14, E22, E26, E27, E28, E29, E31 (grupo)
<i>Acca sellowiana</i> (O. Berg.) Burret	Myrtaceae	Goiabeira-ananás	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-7	Micro.	Árvore	Z8	E5(2), E10(1), E19(2), E22(2), E23(2), E25(1), E26(1), E27(2), E30(2), E31(3)
<i>Acer negundo</i> L.	Aceraceae	Ácer	Neártico	Caducifólio	4-11	5-6	Micro.	Árvore	Z4	E22(2), E28(3)
<i>Acer palmatum</i> Thunb.	Aceraceae	Ácer-do-japão	Paleártico	Caducifólio	4-11	4	Micro.	Árvore	Z5	E11(13), E22(6), E26(2), E28(9), E30(4)
<i>Acer platanoides</i> L.	Aceraceae	Ácer	Paleártico	Caducifólio	4-11	4	Meso.	Árvore	Z4	E6(1), E28(2)
<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	Aceraceae	Ácer; Sicómoro	Paleártico	Caducifólio	4-11	4	Meso.	Árvore	Z5	E18(1), E22(1), E26(2), E28(3)
<i>Achillea millefolium</i> L.	Compositae	Aquileia	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-8	Caméfito	Herbácea	Z2	E18, E26, E31, E32 (grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Achyranthes sicula</i> (L.) All.	Amaranthaceae		Paleártico	Perenifólio	1-12	2-10	Nano.	Arbusto	Z9	E23, E28(grupo)
<i>Acoelorrhaphe wrightii</i> (Griseb. & H. A. Wendl.) H. A. Wendl. ex Becc.	Palmae	Palmeira-de-serra	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-5	Micro.	Árvore	Z10	E30(5)
<i>Acokanthera oblongifolia</i> (Hochst.) Codd.	Apocynaceae	Arbusto-das-setas-envenenadas	Áfrotropical	Perenifólio	1-12	2-4	Micro.	Arbusto	Z9	E32(1)
<i>Acorus gramineus</i> Ait.	Araceae (Acoraceae)		Paleártico	Perenifólio	1-12	4-8	Helófito	Herbácea	Z5	E12, E30(grupo)
<i>Adansonia digitata</i> L.	Bombacaceae	Baobá; Embondeiro	Áfrotropical	Caducifólio	3-10	Não floriu*	Nano.	Árvore	Z11	E19(1)
<i>Adenium obesum</i> (Forssk.) Roem. & Schult.	Apocynaceae	Adénio	Áfrotropical	Perenifólio	1-12	7-9	Nano.	Arbusto suculento	Z11	E10(1)
<i>Adiantum aneitense</i> Carr.	Adiantaceae	Feto	Oceânia	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z10	E30(grupo)
<i>Adiantum capillus-veneris</i> L.	Adiantaceae	Avenca	Paleártico, Neotropical, Áfrotropical, Indomalaio	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z8	E5, E6, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E17, E21, E22, E24, E25 E26, E27, E28, E30, E31 (grupo)
<i>Adiantum formosum</i> R. Br.	Adiantaceae	Avenca-formosa	Australiano; Antártico	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z9	E25, E30 (grupo)
<i>Adiantum hispidulum</i> Swartz	Adiantaceae	Feto-pata-de-galinha	Paleártico, Áfrotropical, Indomalaio, Oceânia, Australiano, Antártico	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z10	E22, E26, E30(grupo)
<i>Adiantum radianum</i> C. Presl.	Adiantaceae	Avenca	Neotropical	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z10	E25, E26, E29, E30 (grupo)
<i>Adiantum reniforme</i> L. ssp. <i>reniforme</i>	Adiantaceae	Feto-redondo; Feto-de-rim	Paleártico	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z10	E26, E30, E31(grupo)
<i>Adromischus cristatus</i> (Haw.) Lem.	Crassulaceae		Áfrotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Caméfito	Herbácea suculenta	Z10	E12(3)
<i>Adromischus cristatus</i> (Haw.) Lem. ssp. <i>clavifolius</i> (Haw.) Toelken.	Crassulaceae		Áfrotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Caméfito	Herbácea suculenta	Z10	E12(2)
<i>Aechmea caudata</i> var. <i>caudata</i> Lindman	Bromeliaceae	Bromélia	Neotropical	Perenifólio	1-12	3-4	Hemi.	Herbácea	Z11	E12, E29, E32(grupo)
<i>Aechmea distichantha</i> Lem.	Bromeliaceae	Bromélia	Neotropical	Perenifólio	1-12	2-7	Hemi.	Herbácea	Z10	E32 (grupo)
<i>Aechmea fasciata</i> (Lindl.) Bak.	Bromeliaceae	Bromélia	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	E5, E8, E10, E12, E13, E22, E26, E29, E31, E32(grupo)
<i>Aechmea fulgens</i> Brongn.	Bromeliaceae	Bromélia	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-8	Hemi.	Herbácea	Z11	E31(grupo)
<i>Aechmea fulgens</i> Brongn. var. <i>discolor</i> (Morr.) Brongn. ex Bak.	Bromeliaceae	Bromélia	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-8	Hemi.	Herbácea	Z11	E2, E5, E10, E13, E19, E25, E31 (grupo)
<i>Aechmea gamosepala</i> Witm.	Bromeliaceae	Bromélia	Neotropical	Perenifólio	1-12	10-2	Hemi.	Herbácea	Z10	E5, E13, E19 (grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Aechmea luddemanniana</i> (K. Koch) Mez.	Bromeliaceae	Bromélia	Neotropical	Perenifólio	1-12	11-1	Hemi.	Herbácea	Z10	E5(grupo)
<i>Aechmea nudicaulis</i> (L.) Griseb.	Bromeliaceae	Bromélia	Neotropical	Perenifólio	1-12	12-4	Hemi.	Herbácea	Z10	E4, E12, E18, E19, E29 (grupo), E32(1)
<i>Aechmea recurvata</i> (Klotzsch) L.B. Sm.	Bromeliaceae	Bromélia	Neotropical	Perenifólio	1-12	2-5	Hemi.	Herbácea	Z9	E26(grupo)
<i>Aechmea rubens</i> (L. B. Smith) L. B. Smith	Bromeliaceae	Bromélia	Neotropical	Perenifólio	1-12	3-6	Hemi.	Herbácea	Z11	E12(grupo)
<i>Aechmea weilbachii</i> Didr.	Bromeliaceae	Bromélia	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-3	Epífita	Herbácea	Z10	E5(2)
<i>Aeonium arboreum</i> (L.) Webb. & Berth.	Crassulaceae	Ensaíão; Saião	Paleártico	Perenifólio	1-12	11-4	Nano.	Herbácea suculenta	Z9	E5, E10, E12, E14, E19(grupo), E24(3) E26, E31, E32(grupo)
<i>Aeonium balsamiferum</i> Webb & Berth.	Crassulaceae	Ensaíão	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-8	Nano.	Herbácea suculenta	Z10	E26(1)
<i>Aeonium castello-paivae</i> Bolle.	Crassulaceae	Ensaíão	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-7	Nano.	Herbácea suculenta	Z10	E12(2), E31(grupo)
<i>Aeonium decorum</i> Webb ex Bolle	Crassulaceae	Ensaíão	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-6	Caméfito	Herbácea suculenta	Z10	E12(1), E19, E27 (grupo)
<i>Aeonium glandulosum</i> (Aiton) Webb & Berthel	Crassulaceae	Ensaíão; Saião	Paleártico	Perenifólio	1-12	7-8	Caméfito	Herbácea suculenta	Z10	E22(1)
<i>Aeonium glutinosum</i> (Ait.)	Crassulaceae	Ensaíão; Farrobo; Saião	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-8	Nano.	Herbácea suculenta	Z10	E5(grupo), E8(1), E10(2), E12, E19, E22, E26, E30, E31, E33 (grupo)
<i>Aeonium haworthii</i> Salm-Dyck ex Webb & Berth.	Crassulaceae	Ensaíão	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-7	Nano.	Herbácea suculenta	Z10	E12(3)
<i>Aeonium lindleyi</i> Webb & Berth.	Crassulaceae	Ensaíão	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-7	Nano.	Herbácea suculenta	Z10	E12(2)
<i>Aeonium manriqueorum</i> Bolle.	Crassulaceae	Ensaíão	Paleártico	Perenifólio	1-12	6-8	Nano.	Herbácea suculenta	Z10	E19(grupo)
<i>Aeonium simsii</i> (Sweet) Steran.	Crassulaceae	Ensaíão	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-7	Caméfito	Herbácea suculenta	Z10	E12(1)
<i>Aeonium x bollei</i> Kunkell	Crassulaceae	Ensaíão	Hortícola	Perenifólio	1-12	5-7	Nano.	Herbácea suculenta	Z10	E12(2)
<i>Aeschynanthus lobbianus</i> Hook.	Gesneriaceae	Planta-do-batom	Oceânia	Perenifólio	1-12	10-4	Epífita	Herbácea	Z11	E25(3)
<i>Aesculus hippocastanum</i> L.	Hippocastanaceae	Castanheiro-de-cavalo; Castanheiro-da-índia	Paleártico	Caducifólio	3-12	4-5	Meso.	Árvore	Z6	E22(4), E28(4)
<i>Aesculus x carnea</i> Hayne	Hippocastanaceae	Castanheiro-da-índia; Castanheiro-dos-cavalos	Hortícola	Caducifólio	3-11	4-5	Micro.	Árvore	Z4	E26(1), E28(1)
<i>Agapanthus campanulatus</i> F. M. Leighton	Liliaceae	Agapantos	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	5-8	Hemi.	Herbácea	Z9	E19, E26, E31(grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Agapanthus praecox</i> Willd. ssp. <i>orientalis</i> (Leighton) Leighton	Liliaceae	Agapantos; Coroas-de- henrique	Áfrotropical	Perenifólio	1-12	4-9	Hemi.	Herbácea	Z9	E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8,, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E16, E17, E19, E20, E21, E22, E23, E24, E26, E27, E28, E29, E30, E31, E32, E33 (mancha)
<i>Agathis robusta</i> (C. Moore ex F. Muell.) Bail.	Araucariaceae	Pinheiro-de- damara; Pinheiro- com-folha-de- alegra-campo	Australiano	Perenifólio	1-12	3-4	Meso.	Árvore	Z9	E1(4), E5(3), E6(4), E7(3), E9(3), E11(1), E13(1), E14(22), E17(6), E18(7), E19(1), E20(6), E21(9), E22(5), E24(3), E25(3), E29(2), E30(3), E31(1), E32(1), E33(1)
<i>Agave americana</i> L.	Agavaceae	Piteira	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-8	Hemi.	Herbácea suculenta	Z9	E5(grupo), E7(3), E8(1), E9(grupo), E10(grupo), E12(grupo), E13(1), E17(1), E18(1), E19(grupo), E21(15), E23(grupo), E26(6), E29(1), E31(grupo), E33(4)
<i>Agave angustifolia</i> Haw.	Agavaceae	Agave	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-8	Nano.	Árvore suculenta	Z9	E4(4), E5(2), E8(grupo), E10(grupo), E19(2), E23(grupo), E24(1) E26(1), E30(2), E33(3)
<i>Agave atrovirens</i> Salm-Dyck	Agavaceae	Agave	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-8	Hemi.	Herbácea suculenta	Z9	E12(1)
<i>Agave attenuata</i> Salm-Dyck	Agavaceae	Piteira; Agave-pescoço- de-cisne	Neotropical	Perenifólio	1-12	12-3	Nano.	Árvore suculenta	Z9	E2, E5, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E18, E19, E20, E21, E22, E23, E24, E26, E27, E28, E29, E31, E33 (grupo)
<i>Agave celsii</i> Hook var. <i>albicans</i> (Jacobi) Gent.	Agavaceae	Agave	Neotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Hemi.	Herbácea suculenta	Z9	E10(1)
<i>Agave chiapensis</i> Jacobi	Agavaceae	Agave	Neotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Nano.	Árvore suculenta	Z9	E10(2)
<i>Agave decipiens</i> Bak.	Agavaceae	Agave	Neártico	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Nano.	Arbusto suculento	Z9	E23(grupo)
<i>Agave filifera</i> Salm-Dyck	Agavaceae	Agave	Neotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Hemi.	Herbácea suculenta	Z9	E10(grupo)
<i>Agave macroacantha</i> Zucc.	Agavaceae	Agave-roseta	Neotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Caméfito	Arbusto suculento	Z9	E5(1),E10(grupo), E12(5)
<i>Agave schidigera</i> Lem.	Agavaceae	Agave	Neotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Hemi.	Herbácea suculenta	Z9	E12(1)
<i>Agave sisalana</i> Perring.	Agavaceae	Sisal	Neotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Nano.	Árvore suculenta	Z9	E12(1), E13(3)
<i>Agave victoriae-reginae</i> T. Moore	Agavaceae	Agave	Neotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Hemi.	Herbácea suculenta	Z9	E10(grupo), E12(5)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Ageratina adenophora</i> (Spreng.) R. King & H. Robinson	Compositae	Abundância	Neotropical	Perenifólio	1-12	3-7	Nano.	Herbácea	Z10	E5, E8, E18, E19, E21, E22, E26, E28, E29, E30, E31 (grupo)
<i>Ageratina ligustrina</i> (DC.) R. King & H. Robinson	Compositae		Neotropical	Perenifólio	1-12	7-1	Micro.	Herbácea	Z10	E10(1), E26(1)
<i>Ageratina riparia</i> (Reg.) R. King. & H. Robinson	Compositae	Falsa-abundância	Neotropical	Perenifólio	1-12	2-6	Nano.	Herbácea	Z10	E5,, E10, E12, E22, E26, E28, E30, E31 (grupo)
<i>Ageratum houstonianum</i> Mill.	Compositae		Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Terófito	Herbácea	Z8	E2, E4, E5, E8, E12, E17, E18, E21, E23, E26, E27, E29, E31, E32, E33(grupo)
<i>Agonis flexuosa</i> (Willd.) Sweet.	Myrtaceae		Australiano	Perenifólio	1-12	4-7	Micro.	Árvore	Z9	E10(1), E12(1) E26(3), E31(2)
<i>Aichryson x domesticum</i> Praeger	Crassulaceae	Ensaio	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-7	Caméfito	Herbácea suculenta	Z10	E12(2)
<i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle	Simaroubaceae	Ailanto; Árvore-do-céu	Paleártico	Caducifólio	5-1	6-9	Micro.	Árvore	Z6	E6(6)
<i>Ajuga reptans</i> L.	Labiatae	Ajuga	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z6	E14, E19, E30(grupo)
<i>Alberta magna</i> E. Meyer	Rubiaceae		Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	E26(2)
<i>Albizia julibrissin</i> Durazz.	Leguminosae (Mimosoideae)	Árvore-da-seda; Albízia-de- constantinopla	Paleártico	Caducifólio	4-12	5-8	Micro.	Árvore	Z8	E6(5), E11(1), E14(9), E19(1), E24(2)
<i>Albizia lophantha</i> Benth.	Leguminosae (Mimosoideae)	Albízia	Australiano	Perenifólio	1-12	10-1	Micro.	Árvore	Z9	E22(1), E28(grupo)
<i>Albizia saman</i> F. Muell.	Leguminosae (Mimosoideae)	Enterolóbio; Samaneiro; Árvore-da-chuva	Neotropical	Caducifólio	4-12	7-11	Meso.	Árvore	Z9	E18 (1), E19(3)
<i>Albuca humilis</i> Bak.	Liliaceae (Hyacinthaceae)		Áfricotropical	Perenifólio	1-12	3-5	Geófito	Herbácea	Z10	E26(8)
<i>Alcea rosea</i> L.	Malvaceae	Malvas	Paleártico	Sazonal	3-10	5-9	Terófito	Herbácea	Z4	E3, E4, E18, E22, E26, E31(grupo)
<i>Aleurites moluccana</i> (L.) Willd	Euphorbiaceae	Aleurites; Nós-vômica	Indomalaio	Perenifólio	1-12	6-10	Micro.	Árvore	Z10	E19(1), E21(1)
<i>Allamanda cathartica</i> L.	Apocynaceae	Alamanda; Flor-de-manteiga	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-12	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z11	E4(2), E5(2), E8(9), E11(7), E17(1), E19(2), E24(1)
<i>Allium giganteum</i> Reg.	Liliaceae (Alliaceae)	Alho-gigante	Paleártico	Sazonal	3-6	4-7	Geófito	Herbácea	Z6	E30(grupo)
<i>Allium triquetrum</i> L.	Liliaceae (Alliaceae)	Alinho; Alho-bravo	Paleártico	Sazonal	12-4	12-4	Geófito	Herbácea	Z8	E22, E26, E28, E30 (grupo)
<i>Allocasuarina verticillata</i> (Lam.) L. A. S. Johnson	Casuarinaceae	Casuarina	Australiano	Perenifólio	1-12	12-3	Micro.	Árvore	Z8	E19(3)
<i>Alocasia macrorrhiza</i> (L.) G. Don.	Araceae	Taro	Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-8	Hemi.	Herbácea	Z10	E12(1), E22(2), E29(1)
<i>Alocasia sanderiana</i> Bull.	Araceae	Alocásia	Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-6	Geófito	Herbácea	Z11	E5 (grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Alocasia wentii</i> Engl. & K. Krause	Araceae	Inhame-branco	Oceânia	Perenifólio	1-12	1-4	Hemi.	Herbácea	Z12	E12(1)
<i>Aloe arborescens</i> Mill.	Liliaceae (Aloeaceae)	Babosas; Foguetes-de-natal	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	11-2	Nano.	Arbusto suculento	Z9	E2, E4, E5, E6, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E17, E19, E21, E22, E23, E26, E29, E30, E31, E32 (grupo)
<i>Aloe aristata</i> Haw.	Liliaceae (Aloeaceae)	Aloés	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	11-1; 7-8	Hemi.	Herbácea suculenta	Z9	E26, E31 (grupo)
<i>Aloe branddraaiensis</i> Groenewald	Liliaceae (Aloeaceae)	Aloés	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Hemi.	Herbácea suculenta	Z9	E10 (grupo)
<i>Aloe broomii</i> Schönl.	Liliaceae (Aloeaceae)	Aloés	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Hemi.	Herbácea suculenta	Z9	E12(1)
<i>Aloe bulbifera</i> H. Perrier	Liliaceae (Aloeaceae)	Aloés	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	11-12	Hemi.	Herbácea suculenta	Z9	E12(3)
<i>Aloe candelabrum</i> Berger.	Liliaceae (Aloeaceae)	Aloés	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	11-2	Micro.	Árvore suculenta	Z9	E19(2), E31(3)
<i>Aloe capitata</i> Bak.	Liliaceae (Aloeaceae)	Aloés	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	4-5	Hemi.	Herbácea suculenta	Z9	E5, E8, E19, E21, E28, E32 (grupo)
<i>Aloe ciliaris</i> Haw.	Liliaceae (Aloeaceae)	Aloés	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	10-6	Fane. trep.	Arbusto trepador e suculento	Z9	E5, E6, E10, E12, E14, E19, E21, E26, E31, E32 (grupo)
<i>Aloe comosa</i> Marloth & A. Berger	Liliaceae (Aloeaceae)	Aloés	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	11-12	Caméfito	Arbusto suculento	Z9	E31(1)
<i>Aloe doei</i> Lavranos	Liliaceae (Aloeaceae)	Aloés	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	6-8	Caméfito	Arbusto suculento	Z9	E8(grupo)
<i>Aloe excelsa</i> A. Berger.	Liliaceae (Aloeaceae)	Aloés	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-3	Micro.	Árvore suculenta	Z9	E4(6), E5(2), E10(3), E19 (grupo), E31(6) E32(grupo),
<i>Aloe ferox</i> Mill.	Liliaceae (Aloeaceae)	Aloés	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	12-2	Nano.	Árvore suculenta	Z9	E10 (grupo), E12(1), E19(2), E31(2), E33(3)
<i>Aloe juvenna</i> Brandham & S. Cáter.	Liliaceae (Aloeaceae)	Aloés	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Caméfito	Arbusto suculento	Z9	E12(grupo)
<i>Aloe marlothi</i> A. Berger.	Liliaceae (Aloeaceae)	Aloés	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	3-4	Nano.	Árvore suculenta	Z9	E10(5), E12(1), E32(1)
<i>Aloe mitriformis</i> Mill.	Liliaceae (Aloeaceae)	Aloés	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	6-8	Caméfito	Arbusto suculento	Z9	E8, E10, E12, E19, E26, E29, E31, E33 (grupo)
<i>Aloe plicatilis</i> (L.) Mill.	Liliaceae (Aloeaceae)	Aloés	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	2-4	Nano.	Árvore suculenta	Z9	E4(1), E5(6), E7(1), E10(1), E19(8), E21(1), E28(2), E32(1), E33(2)
<i>Aloe pluridens</i> Haw.	Liliaceae (Aloeaceae)	Aloés	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	12-1	Nano.	Árvore suculenta	Z9	E19(grupo)
<i>Aloe pratensis</i> Bak.	Liliaceae (Aloeaceae)	Aloés	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	12-2	Caméfito	Arbusto suculento	Z9	E10(1), E26(5), E28(grupo)
<i>Aloe pretoriensis</i> Pole Evans	Liliaceae (Aloeaceae)	Aloés	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea suculenta	Z9	E8, E23(grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Aloe rauhii</i> G. Reynolds	Liliaceae (Aloeaceae)	Aloés	áfricotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Hemi.	Herbácea suculenta	Z9	E12(1)
<i>Aloe rupestris</i> Bak.	Liliaceae (Aloeaceae)	Aloés	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	2-4	Micro.	Árvore suculenta	Z10	E4(4), E12(1), E24(4), E26(1), E32(2)
<i>Aloe saponaria</i> (Ait. f.) Haw.	Liliaceae (Aloeaceae)	Aloés-sabão	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-7	Hemi.	Herbácea suculenta	Z9	E4, E5, E10, E12, E13, E19 (grupo) E21(2), E24, E27, E28, (grupo), E29(1), E31, E32, E33(grupo)
<i>Aloe squarrosa</i> Bak.	Liliaceae (Aloeaceae)	Alóes	Indomalaio	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Hemi.	Herbácea suculenta	Z10	E8(4)
<i>Aloe striata</i> Haw.	Liliaceae (Aloeaceae)	Aloés	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	12-5	Caméfito	Arbusto suculento	Z9	E10, E19(grupo)
<i>Aloe striatula</i> Haw.	Liliaceae (Aloeaceae)	Aloés	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Nano.	Arbusto suculento	Z9	E10 (1)
<i>Aloe tomentosa</i> Deflers.	Liliaceae (Aloeaceae)	Aloés	Áfricotropical; Paleártico	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Hemi.	Herbácea suculenta	Z9	E12(3)
<i>Aloe trichosantha</i> Berg. ssp. <i>trichosantha</i> A. Berg.	Liliaceae (Aloeaceae)	Aloés	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Hemi.	Herbácea suculenta	Z9	E12(1)
<i>Aloe vaombe</i> Decorse & Poiss.	Liliaceae (Aloeaceae)	Aloés	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Nano.	Arbusto suculento	Z10	E12(1)
<i>Aloe variegata</i> L.	Liliaceae (Aloeaceae)	Aloés	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Hemi.	Herbácea suculenta	Z9	E12(1)
<i>Aloe vera</i> (L.) Burm.	Liliaceae (Aloeaceae)	Aloés-vera; Babosas	Paleártico; Neotropical	Perenifólio	1-12	11-6	Hemi.	Herbácea suculenta	Z8	E5, E10, E12, E13, E14, E19 (grupo) E21(2), E22(grupo), E23(grupo), E29(3), E30(grupo), E31(1), E32(2), E33(grupo)
<i>Aloinopsis orpenii</i> (N. E. Br.) L. Bol.	Aizoaceae		Áfricotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Hemi.	Herbácea suculenta	Z10	E12(3)
<i>Alonsoa warsewiczii</i> Reg.	Scrophulariaceae	Alonsoa	Neotropical	Perenifólio	1-12	3-8	Nano.	Arbusto	Z9	E26(grupo)
<i>Aloysia triphylla</i> (L'Hérit) Britt.	Verbenaceae	Pessegueiro- inglês; Lúcia-lima; Limonete	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-10	Nano.	Arbusto	Z8	E12, E13(grupo), E19(1), E30(3)
<i>Alpinia calcarata</i> (Haw.) Roscoe.	Zingiberaceae	Gengibre-indiano	Indomalaio	Perenifólio	1-12	4-7	Hemi.	Herbácea	Z10	E12(1)
<i>Alpinia zerumbet</i> (Pers.) B. L. Burr & Rosemary M. Sm.	Zingiberaceae	Alpinia; Lírio-de-porcelana	Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	E5(grupo), E6(1), E10(grupo), E13(grupo), E18(1), E24(1), E26, E29, E31(grupo), E32(1)
<i>Alstroemeria haemantha</i> Ruiz & Pav.	Liliaceae (Alstroemeriaceae)	Alstroemeria	Neotropical	Sazonal	4-10	5-9	Geófita	Herbácea	Z7	E19(grupo)
<i>Alstroemeria ligtu</i> L.	Liliaceae (Alstroemeriaceae)	Alstroemeria	Neotropical	Sazonal	4-10	5-9	Geófita	Herbácea	Z8	E3, E18, E19, E24, E25, E29, E31, E32 (grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Alstroemeria pelegrina</i> L.	Liliaceae (Alstroemeriaceae)	Alstroemeria; Açucena-do-peru	Neotropical	Sazonal	4-10	5-9	Geófita	Herbácea	Z9	E12(grupo)
<i>Alstroemeria psittacina</i> Lehm.	Liliaceae (Alstroemeriaceae)	Alstroemeria	Neotropical	Sazonal	4-10	5-9	Geófita	Herbácea	Z8	E3, E5, E12, E17, E18, E26, E31, E32 (grupo)
<i>Alternanthera ficoidea</i> (L.) R. Br.	Amaranthaceae	Pirriquitos	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Caméfito	Herbácea	Z10	E2, E10, E12, E14, E18, E21, E25, E27, E28, E32 (grupo)
<i>Amaranthus caudatus</i> L.	Amaranthaceae		Áfricotropical; Indomalaio; Neotropical	Sazonal	3-10	6-9	Terófito	Herbácea	Z8	E20(1), E24(1)
<i>Amaranthus hypocondriacus</i> L.	Amaranthaceae		Neártico	Sazonal	6-1	6-1	Terófito	Herbácea	Z8	E19(1)
<i>Amaryllis belladonna</i> L.	Amaryllidaceae	Açucenas-da- serra; Belas-donas	Áfricotropical	Sazonal	5-7	8-11	Geófita	Herbácea	Z8	E5, E10, E22, E26, E28, E29, E30, E31 (grupo)
<i>Anagallis arvensis</i> L.	Primulaceae	Pimpinella	Paleártico	Sazonal	3-12	3-12	Terófito	Herbácea	Z7	E19 (grupo)
<i>Ananas bracteatus</i> (Lindl.) Schult. var. <i>tricolor</i> (Bertoni) L.B.	Bromeliaceae	Ananás	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-7	Hemi.	Herbácea	Z11	E10(6), E12(grupo), E32(2)
<i>Ananas comosus</i> (L.) Merr.	Bromeliaceae	Ananás	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-7	Hemi.	Herbácea	Z11	E5(grupo), E12(1), E18(7), E19(8), E21(24), E29(grupo)
<i>Ananas nanus</i> (L.B. Sm.) L.B. Sm.	Bromeliaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	5-7	Hemi.	Herbácea	Z11	E22, E26(grupo)
<i>Andryala glandulosa</i> Lam. ssp. <i>glandulosa</i>	Compositae	Andriala; Bofe-de-burro	Paleártico	Perenifólio	1-12	6-8	Caméfito	Herbácea	Z11	E19 (grupo)
<i>Anemia dregeana</i> Kunze	Schizaeaceae		Áfricotropical	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z10	E30(grupo)
<i>Anemone hupehensis</i> Lem.	Ranunculaceae	Anémoma	Paleártico	Perenifólio	1-12	8-12	Hemi.	Herbácea	Z6	E1, E17, E19, E22, E26, E30(grupo)
<i>Anemone x hybrida</i> Paxt.	Ranunculaceae	Anémoma	Hortícola	Perenifólio	1-12	8-12	Hemi.	Herbácea	Z6	E10, E31(grupo)
<i>Angiopteris evecta</i> (Forst.) Hoffm.	Marattiaceae	Feto-craca	Indomalaio; Australiano	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z10	E5(2), E12(1), E18(1), E19(2), E25(2), E27(1), E30(2)
<i>Anigozanthos flavidus</i> DC.	Haemodoraceae	Pata-de-canguru	Australiano	Perenifólio	1-12	3-7	Nano.	Herbácea	Z9	E10(3), E26(grupo)
<i>Anisodonta capensis</i> (L.) Bates	Malvaceae	Malva-do-cabo	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	3-10	Nano.	Arbusto	Z9	E10(1), E22 (15)
<i>Annona cherimola</i> Mill.	Annonaceae	Anoneira	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-7	Micro.	Árvore	Z10	E2(1), E3(4), E5(3), E6(3), E8(3), E13(3), E19(2), E21(1), E22(4), E26(1), E27(2), E31(7)
<i>Annona muricata</i> L.	Annonaceae	Anoneira	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-7	Micro	Árvore	Z10	E19(1)
<i>Anomatheca laxa</i> (Thunb.) Goldbl.	Iridaceae		Áfricotropical	Sazonal	4-9	6-7	Geófita	Herbácea	Z8	E31(grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Anredera cordifolia</i> (Ten.) Steenis	Basellaceae	Boussingaultia; Trepadeira-da-madeira	Neotropical	Caducifólio	6-2	7-9	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z9	E6(1), E10(2), E11(1), E13(2), E21(grupo), E23(1), E27, E29, E31 (grupo)
<i>Anthurium andraeanum</i> André.	Araceae	Antúrio	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z11	E2, E5, E10, E12, E19, E25, E27, E31, E32 (grupo)
<i>Anthurium bonplandii</i> Bunting.	Araceae	Antúrio	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-7	Hemi.	Herbácea	Z12	E12(3)
<i>Anthurium coriaceum</i> G. Don	Araceae	Antúrio-de-pedra	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-7	Hemi.	Herbácea	Z11	E5(2), E19(1), E32(1)
<i>Anthurium pentaphyllum</i> (Aubl.) G. Don.	Araceae	Antúrio	Neotropical	Perenifólio	1-12	7-10	Hemi.	Herbácea	Z11	E12(1)
<i>Anthurium scherzerianum</i> Schott.	Araceae	Antúrio-rabinho-de-porco	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	E5, E14, E25 (grupo)
<i>Antidesma buniis</i> (L.) Spreng.	Euphorbiaceae		Indomalaio; Australiano	Perenifólio	1-12	7-9	Micro.	Árvore	Z10	E19(1)
<i>Antirrhinum majus</i> L.	Scrophularia-ceae	Bocas-de-peixe	Paleártico	Sazonal	3-10	3-10	Terófito	Herbácea	Z7	E4, E5, E13, E21, E26, E28, E30, E31, E32 (grupo)
<i>Aphelandra squarrosa</i> Nees.	Acanthaceae	Planta-zebra	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-6	Nano.	Arbusto	Z11	E10, E12 (grupo)
<i>Apium graveolens</i> L.	Umbelliferae	Aipo	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-7	Nano.	Herbácea	Z5	E13(grupo)
<i>Apollonias barbuiana</i> (Cav.) Bomm.	Lauraceae	Barbusano	Paleártico	Perenifólio	1-12	9-3	Meso.	Árvore	Z10	E2(2), E3(2), E4(1), E5(2), E6(1), E7(6), E9(1), E11(2), E12(2), E13(1), E14(8), E15(2), E18(2), E19(6), E20(4), E21(4), E22(1), E23(26), E25(2), E28(2), E29(4), E30(14), E31(19), E32(7)
<i>Aponogeton distachyos</i> L. f.	Aponogetona-ceae		Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hidrófito	Herbácea	Z9	E26, E30(grupo)
<i>Aporocactus flagelliformis</i> (L.) Lem.	Cactaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	6-7	Hemi.	Herbácea suculenta	Z10	E12(grupo)
<i>Aptenia cordifolia</i> (L. f.) Schwant.	Aizoaceae	Apténia; Rosinha-de-sol	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Herbácea trepadora e suculenta	Z9	E3, E4, E8, E11, E20, E23, E32 (grupo)
<i>Aquilegia alpina</i> L.	Ranunculaceae	Aquilégia	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-8	Hemi.	Herbácea	Z5	E5, E22, E26, E30 (grupo)
<i>Araucaria angustifolia</i> (Bertol.) Kuntze.	Araucariaceae	Araucária-do-brasil; Pinheiro-do-brasil	Neotropical	Perenifólio	1-12	2-3	Meso.	Árvore	Z9	E26(1)
<i>Araucaria araucana</i> (Molina) K. Koch.	Araucariaceae	Araucária-do-chile; Pinheiro-do-chile	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-5	Meso.	Árvore	Z8	E21(1)
<i>Araucaria bidwillii</i> Hook. f.	Araucariaceae	Araucária-de-bidwill	Australiano	Perenifólio	1-12	2-3	Meso.	Árvore	Z9	E5(1), E7(1), E9(1), E10(1), E12(1), E13(2), E14(3), E18(1), E19(3), E20(1), E23(2), E25(2), E26(1), E28(2), E29(2), E30(1), E31(1)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Araucaria columnaris</i> (Forst. f.) Hook.	Araucariaceae	Pinheiro-da-nova-caledônia; Araucária	Oceânia	Perenifólio	1-12	5-7	Macro.	Árvore	Z10	E2(4), E9(7), E11(1), E18(1), E21(2), E23(2), E26(1), E32(3)
<i>Araucaria heterophylla</i> (Salisb.) Franco	Araucariaceae	Araucária; Pinheira	Oceânia	Perenifólio	1-12	2-3	Macro.	Árvore	Z9	E7(5), E9(2), E10(2), E11(1), E12(4), E13(4), E18(2), E19(2), E21(2), E22(2), E23(1), E24(1), E25(1), E26(5), E28(4), E29(1), E30(3), E32(1)
<i>Araujia sericifera</i> Brot.	Asclepiadaceae	Planta-da-seda	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-9	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z9	E2(1), E5(3), E26(2), E31(grupo)
<i>Arbutus menziesii</i> Pursh.	Ericaceae	Medronheiro	Neártico	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Micro.	Árvore	Z7	E28(2)
<i>Arbutus unedo</i> L.	Ericaceae	Medronheiro	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Árvore	Z7	E19(2), E26(1), E28(3), E30(2), E31(2)
<i>Arbutus x andrachnoides</i> Link.	Ericaceae	Medronheiro	Paleártico	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Micro.	Árvore	Z6	E28(2)
<i>Archontophoenix alexandrae</i> (Muell.) Wendl. & Drude	Palmae	Palmeira-real-da-austrália	Australiano	Perenifólio	1-12	1-5	Micro.	Árvore	Z10	E10(46)
<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> H. A. Wendl. & Drude.	Palmae	Palmeira-elegante	Australiano	Perenifólio	1-12	2-10	Meso.	Árvore	Z10	E3(1), E4(13), E5(8), E6(2), E7(4), E9(1), E11(6), E12(9), E13(15), E14(12), E18(1), E19(15), E21(14), E23(1), E24(10), E25(3), E26(3), E27(1), E29(3), E30(123), E32(4), E33(1)
<i>Arctium minus</i> Bernh.	Compositae	Bardana	Paleártico	Perenifólio	1-12	7-9	Hemi.	Herbácea	Z3	E28 (grupo)
<i>Arctotis fastuosa</i> Jacq.	Compositae	Margarida-do-cabo	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	3-12	Hemi.	Herbácea	Z9	E19, E29 (grupo)
<i>Arctotis x hybrida</i> hort.	Compositae	Arctótis; Margarida-africana	Hortícola	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z9	E2, E4, E22, E23, E26, E28, E30, E31 (grupo)
<i>Ardisia crenata</i> Sims.	Myrsinaceae	Ardisia	Paleártico	Perenifólio	1-12	7-8	Nano.	Arbusto	Z8	E5(10)
<i>Areca catechu</i> L.	Palmae	Palmeira-do-bétel	Indomalaio	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Micro.	Árvore	Z11	E30(1)
<i>Argyranthemum dissectum</i> (Lowe) Lowe	Compositae	Pampilhos; Estreleira; Malmequeres	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-7	Nano.	Arbusto	Z10	E4(1), E10(1), E19(grupo), E25(1), E28(grupo), E32(1)
<i>Argyranthemum frutescens</i> (L.) Schultz-Bip.	Compositae	Estrelas; Estreleiras; Pampilhos; Malmequeres	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	E1,E4, E8, E9, E10, E18, E19, E21, E22, E23, E26, E27, E29 (grupo), E31(2), E32(grupo)
<i>Argyranthemum gracile</i> Schultz-Bip	Compositae	Estreleira	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	E10, E12, E16(grupo)
<i>Argyranthemum haematomma</i> (Lowe) Lowe	Compositae	Estreleira; Malmequeres	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-7	Nano.	Arbusto	Z10	E4(1), E19(grupo), E25(1), E28(1)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Argyranthemum pinnatifidum</i> (L. f.) Lowe ssp. <i>pinnatifidum</i>	Compositae	Estrelas; Pampilhos; Malmequeres	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	E3(3), E4, E5, E8, E17, E19, E20, E21, E22, E23, E27, E28, E30 (grupo), E33(1)
<i>Argyranthemum pinnatifidum</i> (L. f.) Lowe ssp. <i>succulentum</i> (Lowe) Humphr.	Compositae	Estrelas; Pampilhos; Malmequeres	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-7	Nano.	Arbusto	Z11	E28(1)
<i>Arisarum vulgare</i> Targ.-Tozz.	Araceae		Paleártico	Sazonal	10-3	11-2	Geófita	Herbácea	Z9	E26(grupo)
<i>Aristea ecklonii</i> Bak.	Iridaceae	Aristeia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	5-7	Geófita	Herbácea	Z10	E26(grupo)
<i>Aristea major</i> Andrews	Iridaceae	Aristeia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	5-7	Geófita	Herbácea	Z10	E26(grupo)
<i>Aristea platycaulis</i> Bak.	Iridaceae	Aristeia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	5-7	Geófita	Herbácea	Z10	E26(grupo)
<i>Aristea woodii</i> N. E. Br.	Iridaceae	Aristeia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	4-8	Geófita	Herbácea	Z10	E5, E26(grupo)
<i>Aristolochia gigantea</i> Mart. & Zucc.	Aristolochiaceae	Cachimbo- holandês	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-11	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z11	E10(2), E26(1)
<i>Aristolochia grandiflora</i> Sw.	Aristolochiaceae	Flor-pelicano	Neotropical	Perenifólio	1-12	7-8	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z11	E26(2)
<i>Armeria maritima</i> (Mill.) Willd.	Plumbaginaceae	Arméria-marítima	Paleártico; Neártico	Perenifólio	1-12	3-8	Hemi.	Herbácea	Z4	E23(grupo)
<i>Artemisia argentea</i> L'Hérit.	Compositae	Losna	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-7	Nano.	Arbusto	Z11	E13, E19(grupo), E22(4), E25(1), E26(1), E28(2)
<i>Arthropodium cirrhatum</i> (Forst. f.) R. Br.	Liliaceae		Antártico	Perenifólio	1-12	5-7	Geófita	Herbácea	Z8	E10, E12, E26(grupo)
<i>Artocarpus heterophyllus</i> Lam.	Moraceae	Jaca; Jaqueira	Indomalaio	Perenifólio	1-12	5-6	Micro.	Árvore	Z11	E5(1), E19(2)
<i>Arum italicum</i> Mill. ssp. <i>canariense</i> (Webb & Berthel.) P. C. Boyce	Araceae	Bigalhó	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-5	Geófita	Herbácea	Z10	E25 (1), E30(grupo)
<i>Arundo donax</i> L.	Gramineae	Cana-vieira; Cana-da-roca	Paleártico	Perenifólio	1-12	7-10	Hemi.	Herbácea	Z9	E8, E13, E19, E20, E23, E26, E29, E31 (grupo)
<i>Arundo donax</i> L. var. <i>versicolor</i> (Mill.) Stokes	Gramineae	Cana-vieira; Cana-de-roca	Paleártico	Perenifólio	1-12	7-10	Hemi.	Herbácea	Z9	E3, E19, E26(grupo)
<i>Asclepias curassavica</i> L.	Asclepiadaceae	Planta-da-seda	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z9	E1(2), E2(1), E10(2), E24(1), E26(1)
<i>Asclepias fruticosa</i> L.	Asclepiadaceae	Planta-da-seda	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	5-11	Nano.	Arbusto	Z8	E5(5), E20(2), E30(3), E31(grupo)
<i>Asclepias physocarpa</i> (E. Mey.) Schltr.	Asclepiadaceae	Planta-da-seda; Balões-de-são- joão	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	5-7	Nano.	Arbusto	Z9	E10(1), E24(4), E28(1)
<i>Asparagus asparagoides</i> (L.) Druce	Liliaceae (Asparagaceae)	Alegre-campo- miúdo	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	3-4	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z10	E1, E2, E5, E6, E8, E26, E27, E29, E31(grupo)
<i>Asparagus densiflorus</i> (Kunth) Jassop	Liliaceae (Asparagaceae)	Esparto	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	7-8	Nano.	Herbácea	Z9	E3, E5, E8, E10, E11, E12, E13, E14, E17, E19, E21, E24, E25, E26, E29, E30, E31, E32, E33 (grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Asparagus falcatus</i> L.	Liliaceae (Asparagaceae)	Esparto	Áfrotropical; Indomalaio	Perenifólio	1-12	6-8	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	E8(1), E13(2)
<i>Asparagus macowanii</i> Baker	Liliaceae (Asparagaceae)	Esparto	Áfrotropical	Perenifólio	1-12	5-8	Nano.	Arbusto	Z10	E12(1), E30(grupo)
<i>Asparagus officinalis</i> L.	Liliaceae (Asparagaceae)	Espargo	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Herbácea	Z4	E5(grupo)
<i>Asparagus scoparius</i> Lowe	Liliaceae (Asparagaceae)	Esparto	Paleártico	Perenifólio	1-12	12-2	Nano.	Arbusto	Z11	E19(1), E26(1), E31(1)
<i>Asparagus setaceus</i> (Kunth) Jassop	Liliaceae (Asparagaceae)	Esparto-de-folha- miúda; Esparto	Afrotropical	Perenifólio	1-12	9-12	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z9	E1, E2, E3, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E17, E18, E19, E21, E22, E24, E26, E27, E29, E30, E31, E32, E33 (grupo)
<i>Asparagus umbellatus</i> Link ssp. <i>lowei</i> Kunth	Liliaceae (Asparagaceae)	Esparto-da- madeira	Paleártico	Perenifólio	1-12	11-6	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z11	E5(1), E10(1), E12, E29, E31(grupo)
<i>Asphodelus albus</i> Mill.	Liliaceae (Asphodelaceae)		Paleártico	Perenifólio	1-12	11-4	Geófita	Herbácea	Z6	E26(grupo)
<i>Aspidistra elatior</i> Bl.	Liliaceae (Convallariaceae)	Aspidistra	Paleártico	Perenifólio	1-12	6-7	Hemi.	Herbácea	Z8	E5, E9, E10, E12, E13, E18, E22, E27, E32, E33 (grupo)
<i>Asplenium anceps</i> Lowe ex Hook. & Grev.	Aspleniaceae	Falsa-avenca	Paleártico	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z10	E28, E30, E31(grupo)
<i>Asplenium bulbiferum</i> Forst. f.	Aspleniaceae	Asplénio	Australiano; Antártico	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z10	E5(grupo)
<i>Asplenium nidus</i> L.	Aspleniaceae	Feto-ninho	Neotropical	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z11	E5(7), E8(1), E12(11), E14(grupo), E19(2), E32(1)
<i>Asplenium onopteris</i> L.	Aspleniaceae	Avenca-negra	Paleártico	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z6	E28(grupo)
<i>Astelia grandis</i> Hook. f. ex Kirk	Liliaceae (Asteliaceae)		Antártico	Perenifólio	1-12	1-2	Hemi.	Herbácea	Z9	E26(2)
<i>Aster amellus</i> L.	Compositae	Áster	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-12	Hemi.	Herbácea	Z4	E9, E13 (grupo)
<i>Aster ericoides</i> L.	Compositae	Áster	Neártico	Perenifólio	1-12	6-9	Nano.	Herbácea	Z4	E3(grupo)
<i>Aster squamatus</i> (Spreng.) Hieron.	Compositae	Áster	Neotropical	Sazonal	4-8	6-8	Terófita	Herbácea	Z9	E5, E13 (grupo)
<i>Astilboides tabularis</i> (Hemsl.) Engl.	Saxifragaceae		Paleártico	Perenifólio	1-12	5-8	Hemi.	Herbácea	Z7	E30(grupo)
<i>Athyrium filix-femina</i> (L.) Roth.	Woodsiaceae	Feto-de-senhora	Paleártico; Neártico	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z5	E30(grupo)
<i>Atriplex halimus</i> L.	Chenopodiaceae	Salgadeira	Paleártico	Perenifólio	1-12	7-8	Nano.	Arbusto	Z6	E10(1), E23(3), E31(2)
<i>Aucuba japonica</i> Thunb.	Comaceae (Aucubaceae)	Aucuba	Paleártico; Indomalaio	Perenifólio	1-12	2-4	Micro.	Arbusto	Z7	E11(2), E13(2), E19(2), E26(grupo), E30(1)
<i>Aurinia saxatilis</i> (L.) Desv.	Cruciferae		Paleártico	Perenifólio	1-12	3-8	Caméfito	Herbácea	Z4	E26(grupo)
<i>Averrhoa carambola</i> L.	Oxalidaceae	Carambola	Indomalaio; Oceânia	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Micro.	Árvore	Z11	E19(1)
<i>Azorina vidalii</i> (H. Wats.) Feer.	Campanulaceae	Vidália	Paleártico	Perenifólio	1-12	7-9	Nano.	Arbusto	Z9	E26(6)
<i>Babiana plicata</i> Ker-Gawl.	Iridaceae	Babiana	Áfrotropical	Perenifólio	1-12	2-5	Geófita	Herbácea	Z9	E26(grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Babiana rubrocyanea</i> (Jacq.) Ker-Gawl.	Iridaceae	Babiana	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-5	Geófita	Herbácea	Z9	E26, E30, E31(grupo)
<i>Babiana stricta</i> (Ait.) Ker-Gawl.	Iridaceae	Babiana	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	2-5	Geófita	Herbácea	Z9	E26, E31(grupo)
<i>Baeckea virgata</i> (Forst. & Forst. f.) Andrews.	Myrtaceae	Urze-miúda	Australiano	Perenifólio	1-12	6-8	Nano.	Arbusto	Z9	E5(1), E22(2), E28(20), E30(6), E31(3)
<i>Bambusa multiplex</i> (Lour.) Rausch.	Gramineae	Bambu	Indomalaio	Perenifólio	1-12	Não floriu**	Hemi.	Herbácea	Z9	E26(grupo)
<i>Bambusa vulgaris</i> Schräd. ex Wendl.	Gramineae	Bambu	Paleártico; Indomalaio	Perenifólio	1-12	Não floriu**	Hemi.	Herbácea	Z10	E5, E6, E11, E12, E18, E21, E29, E31, E32 (grupo)
<i>Banksia ericifolia</i> L. f.	Proteaceae	Banksia-co-folhas-de-urze	Australiano	Perenifólio	1-12	10-1	Micro.	Arbusto	Z9	E26(2)
<i>Banksia grandis</i> Willd.	Proteaceae	Banksia-touro	Australiano	Perenifólio	1-12	5-6	Micro.	Árvore	Z9	E26(1)
<i>Banksia integrifolia</i> L. f.	Proteaceae	Banksia-da-costa	Australiano	Perenifólio	1-12	10-5	Micro.	Árvore	Z9	E10(2), E26(1)
<i>Banksia serrata</i> L. Saw.	Proteaceae	Banksia-serrote	Australiano	Perenifólio	1-12	5-8	Micro.	Árvore	Z9	E26(1)
<i>Bartlettina sordida</i> (Less.) R. King & H. Robinson	Compositae		Neotropical	Perenifólio	1-12	3-5	Nano.	Arbusto	Z10	E12(2), E26(7)
<i>Bassia scoparia</i> (L.) A. J. Scott f. <i>trichophylla</i> (Schmeiss) Schinz & Thell.	Chenopodiaceae	Pinheirinho	Paleártico	Sazonal	6-11	8-9	Terófita	Herbácea	Z8	E31(grupo)
<i>Bauhinia aculeata</i> L.	Leguminosae (Caesalpinioideae)	Bauínia	Neotropical	Perenifólio	1-12	3-7	Micro.	Árvore	Z9	E31(1)
<i>Bauhinia galpinii</i> N. E. Br.	Leguminosae (Caesalpinioideae)	Bauínia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	5-11	Micro.	Arbusto	Z9	E5(1), E8(1), E10(1), E12(1)
<i>Bauhinia malabarica</i> Roxb.	Leguminosae (Caesalpinioideae)	Bauínia	Indomalaio	Perenifólio	1-12	7-8	Micro.	Árvore	Z9	E7(1)
<i>Bauhinia purpurea</i> L. non hort.	Leguminosae (Caesalpinioideae)	Bauínia	Indomalaio	Perenifólio	1-12	2-7	Micro.	Árvore	Z11	E19(5)
<i>Bauhinia variegata</i> L.	Leguminosae (Caesalpinioideae)	Bauínia	Indomalaio	Marcescente	5-4 (12-4)	10-6	Micro.	Árvore	Z9	E5(5), E8(1), E9(3), E10(7), E12(4), E14(11), E19(15), E20(1), E21(4), E22(2), E26(2), E31(2)
<i>Bauhinia x blakeana</i> Dunn.	Leguminosae (Caesalpinioideae)	Bauínia	Paleártico	Perenifólio	1-12	12-4	Micro.	Árvore	Z10	E5(1), E12(1), E19(6), E25(1)
<i>Beaufortia sparsa</i> R. Br.	Myrtaceae	Limpa-garrafas	Australiano	Perenifólio	1-12	5-7	Nano.	Arbusto	Z9	E5(1), E27(1)
<i>Beaumontia grandiflora</i> Wallich.	Apocynaceae		Indomalaio	Perenifólio	1-12	3-6	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z9	E10(1)
<i>Begonia aconitifolia</i> A. DC.	Begoniaceae	Begónia	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-11	Nano.	Herbácea	Z10	E5(grupo), E7(1), E12(grupo)
<i>Begonia bowerae</i> Ziesenh.	Begoniaceae	Corações; Begónia	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-9	Caméfito	Herbácea	Z10	E30(grupo)
<i>Begonia coccinea</i> Hook.	Begoniaceae	Begónia; Corações	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Herbácea	Z10	E5(2)
<i>Begonia imperialis</i> Lem.	Begoniaceae	Begónia	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-9	Caméfito	Herbácea	Z10	E10 (grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Begonia maculata</i> Raddi	Begoniaceae	Corações; Begónia	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-9	Nano.	Herbácea	Z10	E30 (grupo)
<i>Begonia manicata</i> Brongn. ex. Cels.	Begoniaceae	Begónia	Neotropical	Perenifólio	1-12	2-11	Hemi.	Herbácea	Z10	E7(3), E30(grupo)
<i>Begonia minor</i> Jacq.	Begoniaceae	Corações; Begónia	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	E2, E3, E5, E6, E10, E11, E12, E24, E25, E27, E29, E30, E31, E32, E33(grupo)
<i>Begonia olsoniae</i> L. B. Sm. & Schubert.	Begoniaceae	Begónias	Neotropical	Perenifólio	1-12	3-8	Hemi.	Herbácea	Z10	E5(1), E12(grupo)
<i>Begonia pseudolubbersii</i> Brade.	Begoniaceae	Begónia-pintada	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-8	Nano.	Herbácea	Z10	E12(grupo)
<i>Begonia rex</i> Putzeys	Begoniaceae	Begónia	Paleártico	Perenifólio	1-12	6-8	Hemi.	Herbácea	Z10	E12(grupo)
<i>Begonia serratifolia</i> Lmsch.	Begoniaceae	Begónia-cor-de-vinho	Oceânia	Perenifólio	1-12	3-8	Nano.	Herbácea	Z10	E12, E30(grupo)
<i>Begonia venosa</i> Skan ex Hook. f.	Begoniaceae	Begónia	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-8	Hemi.	Herbácea	Z10	E10(grupo)
<i>Begonia x ricinifolia</i> A. Dietr.	Begoniaceae	Corações; Begónia	Hortícola	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	E1, E2, E3, E4, E6, E7, E9, E13, E16, E17, E18, E22, E25, E26, E27, E29, E30 (grupo)
<i>Bencomia caudata</i> (Aiton.) Webb & Berthel.	Rosaceae	Bencómia	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-4	Micro.	Arbusto	Z10	E30(5)
<i>Berberis heterophylla</i> Juss.	Berberidaceae	Ameixeira-de-espinhos	Neotropical	Caducifólio	4-12	8-9	Nano.	Arbusto	Z8	E26(1)
<i>Berberis maderensis</i> Lowe	Berberidaceae	Ameixeira-de-espinho; Fustete	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-5	Micro.	Arbusto	Z10	E19(4), E22(1), E22(3)
<i>Berberis thunbergii</i> DC	Berberidaceae	Ameixeira-de-espinhos	Paleártico	Caducifólio	4-12	4-5	Micro.	Arbusto	Z4	E26(3)
<i>Bergenia crassifolia</i> (L.) Fritsch.	Saxifragaceae	Bergénia; Couve-de-jardim	Paleártico	Perenifólio	1-12	11-4	Caméfito	Herbácea	Z3	E2, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E13, E16, E18, E19, E20, E21, E22, E24, E26, E27, E28, E29, E30, E32, E33(grupo)
<i>Bergeranthus vespertinus</i> (A. Berger) Schwantes	Aizoaceae		Áfricotropical	Perenifólio	1-12	4-6	Hemi.	Herbácea suculenta	Z9	E12(3)
<i>Beta procumbens</i> C. Sm. ex Homem.	Chenopodiaceae	Beterraba	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-7	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z11	E23(grupo)
<i>Betula pendula</i> Roth.	Betulaceae	Bétula; Vidoeiro-branco	Paleártico	Caducifólio	4-11	3-4	Micro.	Árvore	Z2	E28(2), E30(34)
<i>Bidens ferulifolia</i> (Jacq.) DC.	Compositae	Bidenes	Neártico; Neotropical	Perenifólio	1-12	5-10	Hemi.	Herbácea	Z8	E8, E16, E19(grupo)
<i>Bijlia cana</i> N. E. Br.	Aizoaceae		Áfricotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Hemi.	Herbácea suculenta	Z10	E12(3)
<i>Billbergia amoena</i> (Lodd.) Lindl.	Bromeliaceae	Bromélia	Neotropical	Perenifólio	1-12	12-3	Hemi.	Herbácea	Z11	E22(grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Billbergia euphemiae</i> E. Morr. var. <i>purpurea</i> M. B. Fost.	Bromeliaceae	Bromélia	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-7	Hemi.	Herbácea	Z10	E12(grupo)
<i>Billbergia nutans</i> H. Wendl.	Bromeliaceae	Bromélia	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-7	Hemi.	Herbácea	Z10	E10, E30, E31(grupo)
<i>Billbergia pyramidalis</i> (Sims.) Lindl.	Bromeliaceae	Bromélia	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-8	Hemi.	Herbácea	Z10	E5(2), E24, E25 (grupo)
<i>Billbergia viridiflora</i> H. Wendl.	Bromeliaceae	Bromélia	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-4	Hemi.	Herbácea	Z10	E24(grupo)
<i>Billbergia vittata</i> Brongn. ex Morel.	Bromeliaceae	Bromélia	Neotropical	Perenifólio	1-12	11-2	Hemi.	Herbácea	Z10	E2, E4, E5, E6, E7, E10, E12, E13, E19, E21, E24, E25, E31, E32 (grupo)
<i>Billbergia x windii</i> hort. Makoy ex E. Morr.	Bromeliaceae	Planta-da- amizade; Lágrimas-da- rainha	Hortícola	Perenifólio	1-12	11-2	Hemi.	Herbácea	Z10	E12, E31 (grupo)
<i>Billbergia zebrina</i> (Herb.) Lindl.	Bromeliaceae	Bromélia	Neotropical	Perenifólio	1-12	12-1	Hemi.	Herbácea	Z10	E30(grupo)
<i>Bischofia javanica</i> Blume.	Euphorbiaceae		Indomalaio	Perenifólio	1-12	12-2	Micro.	Árvore	Z9	E10(1)
<i>Bismarchia nobilis</i> Hildebr. & H. Wendl.	Palmae	Palmeira-de- bismark	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-3	Micro.	Árvore	Z10	E12(4)
<i>Bituminaria bituminosa</i> (L.) C. H. Stirt.	Leguminosae	Fedegosos	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z8	E5, E19, E23, E31 (grupo)
<i>Bixa orellana</i> L.	Bixaceae	Anato	Neotropical	Perenifólio	1-12	8-10	Micro.	Árvore	Z10	E19(2)
<i>Blechnum gibbum</i> (Labill.) Mett.	Blechnaceae		Oceânia	Perenifólio	1-12	-----	Nano.	Arbusto	Z10	E5(1), E12(14), E19(1), E30(2)
<i>Blechnum spicant</i> (L.) Roth.	Blechnaceae	Feto-de-pente	Paleártico; Neártico	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z4	E22, E30(grupo)
<i>Bletilla striata</i> (Thunb.) Rchb. f.	Orchidaceae		Paleártico	Sazonal	12-7	1-6	Geófita	Herbácea	Z7	E26(grupo)
<i>Boehmeria nivea</i> (L.) Gaudich.	Urticaceae	Planta-da-seda	Paleártico; Indomalaio	Perenifólio	1-12	8-11	Nano.	Arbusto	Z7	E19(1)
<i>Bolusanthus speciosus</i> (Bol.) Harms.	Leguminosae (Papilionoideae)	Árvore-glicínia (Wisteria-tree)	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	5-7	Micro.	Árvore	Z9	E10(1)
<i>Bomarea carderi</i> Masters	Liliaceae (Alstroemeriaceae)		Neotropical	Perenifólio	1-12	3-8	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z9	E26(1)
<i>Bougainvillea glabra</i> Choisy	Nyctaginaceae	Buganvília	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	E1, E2, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13 (grupo), E14(26), E15(10), E17(7), E18(2), E19, E20, E21, E23, E24, E25 (grupo), E26(3), E27(11), E28(grupo), E30(2), E31, E32(grupo), E33(5)
<i>Bougainvillea spectabilis</i> Willd.	Nyctaginaceae	Buganvília	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	E10, E12, E21, E24, E25(grupo), E27(4), E31(grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Bougainvillea x buttiana</i> Holtt. & Standl.	Nyctaginaceae	Buganvília	Hortícola	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	E10(grupo)
<i>Bouvardia ternifolia</i> (Cav.) Schldl.	Rubiaceae	Bouvardia	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-8	Nano.	Arbusto	Z9	E31(1)
<i>Brachychiton acerifolius</i> Cunn. ex. F. Muell.	Sterculiaceae	Árvore-do-fogo	Australiano	Caducifólio	1-5; 8-12	5-8	Micro.	Árvore	Z10	E2(1), E3(1), E6(4), E9(6), E10(1), E12(1), E13(13), E15(3), E16(1), E17(1), E18(2), E19(11), E20(2), E21(1), E22(3), E23(1), E24(1), E25(1), E26(3), E29(1), E30(4), E31(6), E32(1), E33(2)
<i>Brachychiton discolor</i> F. Muell.	Sterculiaceae	Árvore-do-fogo	Australiano	Caducifólio	1-5; 8-12	5-8	Micro.	Árvore	Z10	E19(1), E31(3)
<i>Brachychiton gregorii</i> F. Muell.	Sterculiaceae		Australiano	Perenifólio	1-12	5-7	Micro	Árvore	Z9	E19(1)
<i>Brachychiton populneus</i> R. Br.	Sterculiaceae	Estercúlia	Australiano	Perenifólio	1-12	5-6	Meso.	Árvore	Z10	E7(1), E14(17), E26(1), E31(2)
<i>Brachychiton x hybridus</i> hort.	Sterculiaceae	Árvore-do-fogo	Hortícola	Caducifólio	1-5; 8-12	6-10	Micro.	Árvore	Z10	E5(1), E8(1), E13(1), E20(1), E21(1), E25(1), E29(1)
<i>Brahea armata</i> S. Wats.	Palmae	Palmeira-azul	Neártico; Neotropical	Perenifólio	1-12	7-8	Micro.	Árvore	Z9	E12(3), E17(1), E18(1), E24(2)
<i>Brahea dulcis</i> (Kunth) Mart.	Palmae	Palmeira-das-rochas	Neotropical	Perenifólio	1-12	7-9	Micro.	Árvore	Z10	E19(1), E26(1)
<i>Brassavola cucullata</i> (L.) R. Br.	Orchidaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	12-1	Epífita	Herbácea	Z10	E25(grupo)
<i>Brassica oleracea</i> L.	Cruciferae	Couve	Paleártico	Perenifólio	1-12	12-2	Terófito	Herbácea	Z8	E3(grupo)
<i>Breynia nivosa</i> (W.G. Sm.) Small.	Euphorbiaceae		Oceânia	Perenifólio	1-12	7-8	Nano.	Arbusto	Z11	E5(2), E7(1), E13(3), E18(1), E19(2), E27(4), E31(1)
<i>Bromelia balansae</i> Mez	Bromeliaceae	Bromélia	Neotropical	Perenifólio	1-12	3-6	Hemi.	Herbácea	Z9	E26(grupo)
<i>Brosimum alicastrum</i> Swartz	Moraceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	10-4	Micro.	Árvore	Z11	E5(4)
<i>Brugmansia arborea</i> (L.) Lagerh.	Solanaceae	Trombeteira	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	E12(1), E19(2), E22(11), E26(1), E31(1)
<i>Brugmansia aurea</i> Lagerh.	Solanaceae	Trombeteira	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	E14(8), E26(2), E28(1), E30(3), E31(1), E32(2)
<i>Brugmansia sanguinea</i> (Ruiz & Pav.) D. Don.	Solanaceae	Trombeteira	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	E22(1), E26(5), E31(1)
<i>Brugmansia versicolor</i> Lagerh.	Solanaceae	Trombeteira	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	E3(23), E5(4), E6(8), E8(3), E10(27), E11(1), E12(1), E13(5), E16(6), E18(7), E19(7), E20(5), E21(5), E22(15), E23(1), E25(grupo), E26(7), E27(1), E28(5), E29(1),

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
										E31(grupo), E32(1)
<i>Brugmansia x candida</i> Pers.	Solanaceae	Trombeteira; Belas-noites	Hortícola	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	E10(3), E18(5), E21(1), E26(12), E30(1), E32(4)
<i>Brugmansia x insignis</i> (Barb. Rodr.) Lockw.	Solanaceae	Trombeteira	Hortícola	Perenifólio	1-12	5-8	Micro.	Arbusto	Z10	E26(2)
<i>Brunfelsia americana</i> L.	Solanaceae	Dama-da-noite	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-7	Micro.	Arbusto	Z10	E24(1)
<i>Brunfelsia pauciflora</i> (Cham. & Scltd.) Benth.	Solanaceae	Brunfêlsia; Manacá	Neotropical	Perenifólio	1-12	2-10	Micro.	Arbusto	Z10	E3(4), E4(1), E5(11), E7(1), E8(1), E10(9), E11(1), E18(1), E22(8), E24(3), E26(5), E28(3), E30(5), E31(8), E32(4)
<i>Buddleja davidii</i> Franch.	Loganiaceae	Budleia	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-10	Micro.	Arbusto	Z5	E10(6), E12(1), E22(2), E26(1), E28(2)
<i>Buddleja madagascariensis</i> Lam.	Loganiaceae	Budléia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-7	Micro.	Arbusto	Z9	E10(2), E16(1)
<i>Bulbine frutescens</i> (L.) Willd.	Liliaceae (Asphodelaceae)	Bulbine	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Geófito	Herbácea suculenta	Z9	E4, E5, E6, E7, E9, E10, E11, E12, E14, E16, E19, E21, E22, E23, E24, E25, E26, E27, E28, E31(grupo)
<i>Bulbine latifolia</i> (L.f.) Haw	Liliaceae (Asphodelaceae)	Bulbine	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-8	Geófito	Herbácea suculenta	Z9	E26(grupo), E30(3)
<i>Bulbinella hookeri</i> (Hook. f.) Cheesem.	Liliaceae (Asphodelaceae)	Bulbinela	Antártico	Perenifólio	1-12	1-12	Geófito	Herbácea suculenta	Z8	E26, E31 (grupo)
<i>Burchelia bubalina</i> (L.f.) Sims.	Rubiaceae		Áfricotropical	Perenifólio	1-12	11-5	Micro.	Arbusto	Z9	E26(1)
<i>Butea monosperma</i> (Lamb.) Taub.	Leguminosae (Papilionoideae)		Indomalaio	Caducifólio	6-3	5-7	Micro.	Árvore	Z10	E18(1)
<i>Butia capitata</i> (Mart.) Becc.	Palmae	Palmeira-da- geleia	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-8	Micro.	Árvore	Z10	E5(1), E10(1), E11(1), E18(1), E19(1), E21(1), E29(1), E30(8)
<i>Buxus microphylla</i> Sieb. & Zucc.	Buxaceae	Buxo	Paleártico; Indomalaio	Perenifólio	1-12	3-4	Nano.	Arbusto	Z6	E5, E6, E11, E13 E26, E27, E28, E30, E31 (grupo)
<i>Buxus sempervirens</i> L.	Buxaceae	Buxo	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-4; 10-11	Nano.	Arbusto	Z5	E2, E3, E5, E6, E8, E10, E11, E19, E22, E25, E26, E27, E28, E30, E31, E32 (grupo)
<i>Buxus sempervirens</i> L. var. <i>arborescens</i>	Buxaceae	Buxo	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-4	Micro.	Abusto	Z5	E26, E28(grupo), E30(2)
<i>Caesalpinia echinata</i> Lam.	Leguminosae (Caesalpinioideae)	Pau-brasil	Neotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Nano.	Árvore	Z11	E19(1)
<i>Caesalpinia pulcherrima</i> (L.) Sw.	Leguminosae (Caesalpinioideae)	Orgulho-de- barbados; Flor-do-paraiso	Neotropical	Perenifólio	1-12	7-2	Micro.	Árvore	Z11	E19(2), E32(1)
<i>Caesalpinia spinosa</i> (Molina) Kuntze.	Leguminosae (Caesalpinioideae)	Falso-pau-brasil	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-8	Micro.	Arbusto	Z10	E12(2)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Calathea argyrea</i> Kōm	Marantaceae	Calateia	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-7	Hemi.	Herbácea	Z11	E29(grupo)
<i>Calathea crocata</i> E. Morr. & Joriss.	Marantaceae	Calateia	Neotropical	Perenifólio	1-12	11-2	Hemi.	Herbácea	Z11	E32(grupo)
<i>Calathea lancifolia</i> Boom	Marantaceae	Calateia	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-7	Hemi.	Herbácea	Z11	E12 (grupo)
<i>Calathea louiseae</i> Gagnep.	Marantaceae	Calateia	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-7	Hemi.	Herbácea	Z11	E5, E10, E25(grupo)
<i>Calathea picturata</i> (Linden) Koch. & Linden	Marantaceae	Calateia	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-7	Hemi.	Herbácea	Z11	E5(grupo)
<i>Calathea tigrina</i> Hort.	Marantaceae	Calateia	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-7	Hemi.	Herbácea	Z11	E5(grupo)
<i>Calathea zebrina</i> (Sims) Lindl.	Marantaceae	Calateia-zebra	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-7	Hemi.	Herbácea	Z10	E10, E12(grupo),
<i>Calceolaria tomentosa</i> Ruiz & Pav.	Scrophulariaceae	Calceolária	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-8	Nano.	Herbácea	Z9	E26, E28, E31(grupo)
<i>Calendula officinalis</i> L.	Compositae	Calendula	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Terófito	Herbácea	Z6	E3, E5, E8, E12, E16, E17, E18, E21, E22, E24, E26, E27, E30 (grupo)
<i>Calliandra portoricensis</i> (Jacq.) Benth.	Leguminosae (Mimosoideae)	Caliandra	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-9	Micro.	Arbusto	Z10	E28(3)
<i>Calliandra surinamensis</i> Benth.	Leguminosae (Mimosoideae)	Caliandra	Neotropical	Perenifólio	1-12	9-11	Micro.	Arbusto	Z11	E28(3)
<i>Calliandra tweedii</i> Benth.	Leguminosae (Mimosoideae)	Caliandra	Neotropical	Perenifólio	1-12	11-3	Micro.	Arbusto	Z10	E7(3), E19(1), E26(1), E28(3), E32(1)
<i>Callicoma serratifolia</i> Andrews	Cunoniaceae		Australiano	Perenifólio	1-12	3-5	Micro.	Árvore	Z9	E26(1)
<i>Callisia fragrans</i> (Lindl.) Wood.	Commelinaceae	Calisia	Neotropical	Perenifólio	1-12	3-4	Hemi.	Herbácea trepadora	Z10	E5, E10, E25, E31 (grupo)
<i>Callisia repens</i> L.	Commelinaceae	Calisia	Neártico; Neotropical	Perenifólio	1-12	3-4	Hemi.	Herbácea trepadora	Z9	E10(grupo)
<i>Callistemon citrinus</i> (Curtis) Skeels.	Myrtaceae	Martinete	Australiano	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z8	E5(2), E10(11), E14(27), E19(2), E23(16), E26(2), E27(2), E28(6), E30(3)
<i>Callistemon formosus</i> S. T. Blake	Myrtaceae	Martinete	Australiano	Perenifólio	1-12	4-6	Micro.	Arbusto	Z10	E28(1), E32(1)
<i>Callistemon linearis</i> DC.	Myrtaceae	Martinete	Australiano	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z9	E28(3), E31(1)
<i>Callistemon paludosus</i> F. Muell.	Myrtaceae	Martinete	Australiano	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Micro.	Arbusto	Z9	E28(1)
<i>Callistemon phoeniceus</i> Lindl.	Myrtaceae	Martinete-chorão	Australiano	Perenifólio	1-12	4-7	Micro	Arbusto	Z9	E12(1)
<i>Callistemon rigidus</i> R. Br.	Myrtaceae	Martinete	Australiano	Perenifólio	1-12	4-8	Micro.	Arbusto	Z9	E5(2), E8(5), E11(2), E12(3), E17(1), E19(7), E21(4), E24(1), E25(1), E26(9), E27(2), E28(4), E29(2), E30(3), E31(3)
<i>Callistemon salignus</i> (Sm.) DC.	Myrtaceae	Martinete	Australiano	Perenifólio	1-12	3-11	Micro.	Arbusto	Z9	E23(6), E28(2)
<i>Callistemon viminalis</i> (Sol. ex Gaertn.) G. Don ex Loud.	Myrtaceae	Martinete-chorão	Australiano	Perenifólio	1-12	3-9	Micro.	Arbusto	Z9	E5(1), E6(1), E9(5), E10(6), E17(3), E18(2), E19(6), E21(1), E25(1), E26(1),

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
										E33(1)
<i>Callistephus chinensis</i> (L.) Nees.	Compositae	Não-me-deixes	Paleártico	Sazonal	3-12	4-12	Terófito	Herbácea	Z6	E1, E4, E6, E8, E13, E18, E24, E25, E26, E29, E30, E32, E33 (grupo)
<i>Callitriche palustris</i> L.	Callitrichaceae	Estrela-de-água	Neártico	Perenifólio	1-12	7-8	Hidrófito	Herbácea	Z8	E30(mancha)
<i>Callitris rhomboidea</i> R. Br. ex Rich.	Cupressaceae	Falso-cedro	Australiano	Perenifólio	1-12	3-4	Micro.	Árvore	Z8	E28(2)
<i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull.	Ericaceae	Caluna	Paleártico; Neártico	Perenifólio	1-2	6-10	Nano.	Arbusto	Z4	E30(grupo)
<i>Calocedrus decurrens</i> (Torr.) Florin.	Cupressaceae	Cedro-do-incenso	Neártico	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Micro.	Árvore	Z5	E28(3)
<i>Calodendrum capense</i> (L. f.) Thunb.	Rutaceae	Castanheiro-do- cabo	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	3-6	Micro.	Árvore	Z9	E18(1), E24(1), E25(1), E28(1)
<i>Caltha palustris</i> L.	Ranunculaceae		Paleártico	Perenifólio	1-12	4-5	Helófito	Herbácea	Z3	E26(3)
<i>Calycanthus floridus</i> L.	Calycanthaceae	Carocha (Carolina- allspice)	Neártico	Caducifólio	3-11	3-7	Micro.	Arbusto	Z6	E6(1), E19(1) E26(2), E30(1)
<i>Calycanthus occidentalis</i> Hook. & Arn.	Calycanthaceae	Carocha (Californian- allspice)	Neártico	Caducifólio	4-11	4-8	Micro.	Arbusto	Z7	E22(1), E26(1)
<i>Camellia granthamiana</i> Sealy.	Theaceae	Camélia-de-hong- kong	Indomalaio	Perenifólio	1-12	10-1	Micro.	Árvore	Z9	E26(5)
<i>Camellia japonica</i> L.	Theaceae	Camélia; Japoneira	Paleártico	Perenifólio	1-12	11-6	Micro.	Árvore	Z8	E3(1), E5(10), E6(12), E7(2), E9(12), E12(2), E13(1), E19(4), E22(62), E26(1174), E28(43), E30(32), E31(2), E32(2)
<i>Camellia reticulata</i> Lindl.	Theaceae	Camélia	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-5	Micro.	Árvore	Z8	E22(1), E26(8)
<i>Camellia saluenensis</i> Stapf ex Bean.	Theaceae	Camélia	Paleártico	Perenifólio	1-12	11-5	Micro.	Árvore	Z8	E26(1)
<i>Camellia sasanqua</i> Thunb.	Theaceae	Camélia	Paleártico	Perenifólio	1-12	11-2	Micro.	Árvore	Z9	E19(1), E26(19)
<i>Camellia sinensis</i> (L.) Kuntze	Theaceae	Planta-do-chá	Paleártico	Perenifólio	1-12	9-11	Nano.	Arbusto	Z9	E5(2), E19(4)
<i>Campsis radicans</i> (L.) Seem.	Bignoniaceae	Campsis	Neártico	Caducifólio	5-12	5-9	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z4	E5(3), E13(17), E29(grupo)
<i>Campsis x tagliabuana</i> (Vis.) Rehd.	Bignoniaceae	Campsis	Hortícola	Caducifólio	5-12	5-8	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z6	E12 (1), E18(2)
<i>Canarina canariensis</i> (L.) Kuntze.	Campanulaceae	Canarina	Paleártico	Sazonal	11-6	12-5	Geófito	Herbácea trepadora	Z10	E26(grupo)
<i>Canistrum aurantiacum</i> H. E. Moore	Bromeliaceae	Cabeça-vermelha	Neotropical	Perenifólio	1-12	12-1	Hemi.	Herbácea	Z11	C11(grupo)
<i>Canistrum lindenii</i> (Regel) Mez	Bromeliaceae	Bromélia	Neotropical	Perenifólio	1-12	12-3	Hemi.	Herbácea	Z11	E12, E29 (grupo)
<i>Canna indica</i> L.	Cannaceae	Canas-da-índia; Bananeira-de-flor	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Geófito	Herbácea	Z9	E3, E5, E10, E13, E18, E19, E20, E22, E26, E30, E31(grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Canna iridiflora</i> Ruiz & Pav.	Cannaceae	Canas-da-índia; Bananeiras-de-flor	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Geófita	Herbácea	Z9	E10(2)
<i>Canna x generalis</i> L.H. Bail.	Cannaceae	Canas-da-índia; Bananeiras-de-flor	Hortícola	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z9	E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E12, E13, E16, E17, E18, E19, E20, E21, E22, E23, E24, E25, E27, E28, E29, E31, E32, E33 (grupo)
<i>Cantua buxifolia</i> Juss. ex Lam.	Polemoniaceae	Flor-sagrada-dos- incas	Neotropical	Perenifólio	1-12	3-6	Micro.	Arbusto	Z9	E26(2)
<i>Capparis spinosa</i> L.	Capparidaceae	Alcaparra	Paleártico; Indomalaio	Perenifólio	1-12	6-11	Nano.	Arbusto	Z8	E31(1)
<i>Capsicum frutescens</i> L.	Solanaceae	Pimenteira	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-10	Nano.	Arbusto	Z9	E3(3), E5(grupo), E8(grupo), E11(3), E13, E29, E32(grupo)
<i>Caralluma burchardii</i> N.E. Br.	Asclepiadaceae	Caraluma	Paleártico	Perenifólio	1-12	9-12	Caméfito	Herbácea suculenta	Z9	E31(grupo)
<i>Cardiospermum grandiflorum</i> Sw.	Sapindaceae	Corriola-dos- balões	Afrotropical; Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z10	E7, E9, E10, E12, E13, E17, E19, E21, E23, E27, E29, E31, E33 (grupo)
<i>Carduus squarrosus</i> (DC.) Lowe	Compositae	Cardo-branco	Paleártico	Sazonal	4-9	6-8	Terófito	Herbácea	Z10	E30(grupo)
<i>Carex fraseri</i> Andreus	Gramineae	Carex	Neártico	Perenifólio	1-12	7-9	Hemi.	Herbácea	Z5	E19 (grupo)
<i>Carex oshimensis</i> Nak.	Cyperaceae	Carex	Paleártico	Perenifólio	1-12	7-9	Hemi.	Herbácea	Z8	E30(grupo)
<i>Carica papaya</i> L.	Caricaceae	Papaieira	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Árvore	Z10	E11 (grupo), E13(3), E18(1), E21(2), E32(1)
<i>Carissa macrocarpa</i> (Ecklon) A. DC.	Apocynaceae	Carissa	Áfrotropical	Perenifólio	1-12	1-6	Micro.	Arbusto	Z9	E10(1), E12(2)
<i>Carlina salicifolia</i> (L.f.) Cav.	Compositae	Cardo-branco; Carlina	Paleártico	Perenifólio	1-12	6-8	Nano.	Arbusto	Z10	E19 (grupo), E25(1), E30(1)
<i>Carpobrotus edulis</i> (L.) L. Bol.	Aizoaceae	Bálsamo; Chorão	Áfrotropical	Perenifólio	1-12	3-8	Fane. trep.	Herbácea suculenta e trepadora	Z9	E2, E8, E9, E19, E23 (mancha)
<i>Carruanthus ringens</i> (L.) Boom.	Aizoaceae		Áfrotropical	Perenifólio	1-12	12-6	Hemi.	Herbácea suculenta	Z10	E12(2)
<i>Caryota maxima</i> Bl.	Palmae	Palmeira-rabo-de- peixe	Indomalaio	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Micro.	Árvore	Z10	E10(1)
<i>Caryota mitis</i> Lour.	Palmae	Palmeira-de-rabo- de-peixe	Indomalaio	Perenifólio	1-12	6-8	Micro.	Árvore	Z10	E19(5), E23(1), E27(1), E29(4)
<i>Caryota urens</i> L.	Palmae	Palmeiro-rabo-de- peixe	Indomalaio	Perenifólio	1-12	6-8	Micro.	Árvore	Z10	E6(2)
<i>Casimiroa edulis</i> Llave & Lex.	Rutaceae	Pêra-mexicana; Sapota	Neotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Micro.	Árvore	Z11	E5(1)
<i>Casimiroa sapota</i> Oerst.	Rutaceae	Sapota-branca	Neotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Micro.	Árvore	Z11	E5(1)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Cassia ferruginea</i> (Schräd.) Schräd ex DC.	Leguminosae (Caesalpinoideae)	Cássia	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-7	Meso.	Árvore	Z10	E18(1)
<i>Cassia javanica</i> L.	Leguminosae (Caesalpinoideae)	Cássia-rosa; Chuveiro-rosa	Indomalaio	Caducifólio	5-1	6-8	Micro.	Árvore	Z11	E19(1), E31(1)
<i>Castanea sativa</i> Mill.	Fagaceae	Castanheiro	Paleártico	Caducifólio	3-12	3-8	Meso.	Árvore	Z5	E6(2), E22(16) E26(2), E28(15)
<i>Casuarina equisetifolia</i> Forst. & Forst. f.	Casuarinaceae	Casuarina	Indomalaio; Australiano; Oceânia	Perenifólio	1-12	6-11	Meso.	Árvore	Z10	E4(2), E6(18), E7(1), E11(24), E19(15), E20(39), E23(78), E25(5), E29(>150), E30(1), E31(1)
<i>Catalpa bignonioides</i> Walter	Bignoniaceae	Catalpa	Neártico	Caducifólio	5-12	6-7	Micro.	Árvore	Z5	E26 (1)
<i>Catharanthus roseus</i> (L.) G. Don.	Apocynaceae	Catarantos; Maravilhas;	Áfrotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Herbácea	Z10	E2, E3, E8, E10, E12, E13, E21, E24, E25, E29, E31, E32 (grupo)
<i>Cattleya mossiae</i> Hook.	Orchidaceae	Cateleia	Neotropical	Perenifólio	1-12	11-5	Epífita	Herbácea	Z11	E25(grupo)
<i>Cattleya trianae</i> Linden & Reichb. f.	Orchidaceae	Cateleia	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-2	Epífita	Herbácea	Z11	E5(grupo)
<i>Cattleya warneri</i> T. Moore	Orchidaceae	Cateleia	Neotropical	Perenifólio	1-12	10-5	Epífita	Herbácea	Z11	E25(grupo)
<i>Ceanothus arboreus</i> Greene.	Rhamnaceae	Lilás-da-califórnia	Neártico	Perenifólio	1 – 12	12-7	Micro.	Arbusto	Z8	E26(4), E31(2)
<i>Ceanothus impressus</i> Trel x <i>C. papillosus</i> Torr. & A. Gray.	Rhamnaceae	Lilás-da-califórnia	Neártico	Perenifólio	1 – 12	12-5	Nano.	Arbusto	Z8	E26(1)
<i>Cedronella canariensis</i> (L.) W. & B.	Labiatae	Hortelã-de- cabra; Hortelã-de- burro	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-8	Nano.	Herbácea	Z10	E30(grupo)
<i>Cedrus deodara</i> (D. Don) G. Don.	Pinaceae	Cedro-deodara; Cedro-dos- himalaia	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-5	Meso.	Árvore	Z7	E5(1), E21(1), E22(3), E26(1), E28(2), E30(1), E32(1)
<i>Cedrus libani</i> A. Rich. ssp. <i>atlantica</i> (Endl.) Battand. & Trabut	Pinaceae	Cedro-do-atlas	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-5	Meso.	Árvore	Z9	E26(4), E28(4), E30(4), E31(1)
<i>Celastrus scandens</i> L.	Celastraceae		Neártico	Caducifólio	2-11	Não floriu**	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z3	E5(1)
<i>Celosia argentea</i> L.	Amaranthaceae	Crista-de-galo	Indomalaio; Áfrotropical Neotropical	Sazonal	5-12	7-12	Terófito	Herbácea	Z10	E8, E12, E23, E32 (grupo)
<i>Celtis australis</i> L.	Ulmaceae	Lódão-bastardo; Conteira; Sementeira	Paleártico	Caducifólio	4-1	5-6	Meso.	Árvore	Z8	E3(2), E5(3), E6(6), E10(1), E11(1), E16(17), E18(1), E20(4), E21(1), E22(2), E25(1), E26(3), E28(3), E29(5), E31(33), E33(2)
<i>Centaurea cineraria</i> L.	Compositae	Centaurea	Paleártico	Perenifólio	1-12	6-8	Nano.	Herbácea	Z7	E22 (grupo)
<i>Centradenia inaequalateralis</i> G. Don.	Melastomataceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	E10(grupo)
<i>Centranthus ruber</i> (L.) DC.	Valerianaceae	Rosa-da-rocha; Alfinetes	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Caméfito	Herbácea	Z5	E2, E3, E5, E9, E10, E11, E12, E13, E21, E24, E26, E28, E29, E31, E32 (grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Centratherum muticum</i> (Humb., Bonpl. & Kunth) Less.	Compositae	Flor-botão	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Caméfito	Herbácea	Z10	E13, E24, E31, E32 (grupo)
<i>Cephalocereus columna- trajani</i> (Karw. Ex Pfeiff.) Schum.	Cactaceae	Cacto	Neotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Nano.	Arbusto suculento	Z9	E33(grupo)
<i>Cephalocereus senilis</i> (Haw.) Schum.	Cactaceae	Cacto-barba-de- velho	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-7	Nano.	Arbusto suculento	Z9	E12(3)
<i>Cephalophyllum alstonii</i> Marloth.	Aizoaceae	Chorão	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	3-11	Fane. trep.	Herbácea trepadora e suculenta	Z11	E2, E21, E23 (grupo)
<i>Cephalotaxus harringtoniana</i> (Forbes) Koch.	Cephalotaxa-ceae		Paleártico	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Micro.	Arbusto	Z6	E28(2)
<i>Cerantia siliqua</i> L.	Leguminosae (Caesalpinoideae)	Alfarrobeira	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-9	Micro.	Árvore	Z9	E3(1), E11(1), E24(1), E27(1), E29(1)
<i>Ceratostigma plumbaginoides</i> Bunge.	Plumbaginaceae		Paleártico	Perenifólio	1-12	3-9	Nano.	Herbácea	Z6	E12(1)
<i>Ceratozamia mexicana</i> Brongn.	Zamiaceae	Ceratozamia	Neártico	Perenifólio	1-12	2-6	Nano.	Arbusto	Z10	E25(1), E29(1)
<i>Cercis siliquastrum</i> L.	Leguminosae (Papilionoideae)	Olaia; Árvore-de-judas	Paleártico	Caducifólio	4-11	10-5	Micro.	Árvore	Z7	E12(1), E17(2), E22(2), E23(1), E24(1), E26(5), E27(3), E30(3), E33(2)
<i>Cereus jamacaru</i> DC.	Cactaceae	Cacto	Neotropical	Perenifólio	1-12	7-8	Nano.	Árvore suculenta	Z9	E4(4), E5(6), E33(1)
<i>Cereus uruguayanus</i> Kiesling	Cactaceae	Cacto-vela-de-cera	Neotropical	Perenifólio	1-12	7-8	Nano.	Árvore suculenta	Z9	E8(1), E12(grupo), E19(2), E21(1), E29(1), E32(2)
<i>Cereus validus</i> Haw.	Cactaceae	Cacto-candelabro	Neotropical	Perenifólio	1-12	7-8	Nano.	Árvore suculenta	Z9	E5(2), E8(1), E33(3)
<i>Cestrum aurantiacum</i> Lindl.	Solanaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z11	E5(grupo), E10(grupo), E25(1), E26(2), E31(5)
<i>Cestrum diurnum</i> L. non Weston	Solanaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	6-12	Micro.	Arbusto	Z9	E13(1), E19(2)
<i>Cestrum elegans</i> (Brongn.) Schldl.	Solanaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	E10(grupo), E26(1)
<i>Cestrum fasciculatum</i> (Schldl.) Miers.	Solanaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	E10(2), E26(2)
<i>Cestrum nocturnum</i> L.	Solanaceae	Galã-da-noite	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-12	Micro.	Arbusto	Z11	E10(grupo), E19(1), E20(2), E26(4)
<i>Cestrum parqui</i> L'Hérit	Solanaceae	Galã-da-noite	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-11	Nano.	Arbusto	Z9	E12(1), E23(1), E31(1)
<i>Cestrum roseum</i> HBK.	Solanaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	3-11	Nano.	Arbusto	Z10	E4(1), E8(1), E12(1), E19(1), E20(2), E21(2), E23(1), E26(1), E27(1)
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> (Murray) Parl.	Cupressaceae	Cedro-de-oregão	Neártico	Perenifólio	1-12	1-2	Micro.	Árvore	Z6	E6(5), E11(grupo), E19(5), E20(4), E22(14), E24(1) E26(23), E28(grupo), E30(49)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Chamaecyparis nootkatensis</i> (D. Don) Spach.	Cupressaceae	Cipreste-amarelo	Neártico	Perenifólio	1-12	2-3	Meso.	Árvore	Z4	E25(1), E30(6)
<i>Chamaecyparis obtusa</i> (Sieb. & Zucc.) Endl.	Cupressaceae		Paleártico	Perenifólio	1-12	1-2	Micro.	Árvore	Z6	E26(1), E29(1), E30(10)
<i>Chamaecyparis thyoides</i> (L.) BSP.	Cupressaceae		Neártico	Perenifólio	1-12	Nunca floriu	Micro.	Árvore	Z5	E26(1), E28(4)
<i>Chamaedorea costaricana</i> Oerst	Palmae	Palmeira-de-salão; Palmeira-bambu	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-6	Micro.	Arbusto	Z10	E5(13), E11(8), E12(1), E33(1)
<i>Chamaedorea elegans</i> Mart.	Palmae	Palmeira-de-salão; Palmeira-bambu	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-6	Micro.	Arbusto	Z10	E5(6), E6(grupo), E8(1), E9(3), E11(3), E12(6), E13(16), E18(grupo), E19(5), E21(1), E22(2), E23(3), E24(grupo), E25(grupo), E27(2), E29, E30, E32(grupo)
<i>Chamaedorea erumpens</i> H. E. Moore.	Palmae	Palmeira- bambu	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-6	Micro.	Arbusto	Z10	E30(1)
<i>Chamaerops humilis</i> L.	Palmae	Palmeira-das-vassouras	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-5	Micro.	Arbusto	Z9	E5(9), E6(2), E8(2), E10(1), E11(7), E12(3), E19(1), E23(5), E25(1), E26(2), E29(1), E30(3), E31(1)
<i>Chamaerops humilis</i> L. var. <i>arborescens</i> (Pers.) Steud.	Palmae	Palmeira-das-vassouras	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-5	Micro.	Árvore	Z9	E12(1)
<i>Chambeyronia macrocarpa</i> (Brongn.) Vieill. ex Becc.	Palmae	Palmeira-rubra	Oceânia	Perenifólio	1-12	1-2	Micro.	Árvore	Z10	E5(2), E8(1), E9(1), E17(1), E18(1), E19(10), E25(1), E29(2), E30(2)
<i>Chamelaucium uncinatum</i> Schauer.	Myrtaceae	Flor-de-cera	Australiano	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	E28(3), E30(5)
<i>Chasmanthe aethiopica</i> (L.) N. E. Br.	Iridaceae	Antoliza	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	11-3	Geófita	Herbácea	Z9	E8, E10, E12, E22, E26, E28, E30, E31 (grupo)
<i>Chelidonium majus</i> L.	Papaveraceae	Celidónia; Cedronha	Paleártico	Perenifólio	1-12	2-8	Hemi.	Herbácea	Z6	E22, E25, E26, E27, E28 (grupo)
<i>Chlorophytum comosum</i> (Thumb.) Jacques	Liliaceae (Anthericaceae)	Fitinhas	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z9	E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E10, E11, E12, E13, E14, E16, E17, E18, E21, E22, E24, E26, E27, E28, E30, E31, E32 (grupo)
<i>Choisya ternata</i> HBK.	Rutaceae	Laranjeira-do-méxico	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z7	E14(grupo), E22(63), E30(4)
<i>Chorisia speciosa</i> A. St. Hil.	Bombacaceae	Sumaúma	Neotropical	Caducifólio	3-11	8-11	Meso.	Árvore	Z10	E1(5), E2(1), E5(1), E6(12), E7(2), E8(1), E9(3), E11(2), E12(2), E13(2), E14(7), E16(6), E17(2), E18(8), E19(2), E20(6), E21(5), E22(2), E24(1), E25(1),

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLOGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
										E27(3), E29(5), E31(3), E32(1), E33(8)
<i>Christella dentata</i> (Forssk.) Brownsey & Jermy	Thelypterida-ceae	Feto	Áfricotropical; Indomalaio;	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z10	E8, E12, E19, E25, E26, E29, E30 (grupo)
<i>Chrysaliocarpus lutescens</i> (Bory) Wendl.	Palmae	Palmeira- amarela; Palmeira- borboleta	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	6-7	Micro.	Arbusto	Z10	E5(2), E6(1), E8(5), E10(6), E11(1), E12(2), E13(14), E19(2), E21(1), E29(2), E30(3)
<i>Chrysanthemum segetum</i> L.	Compositae	Crisântemo- amarelo	Paleártico	Sazonal	3-7	4-6	Terófito	Herbácea	Z7	E26(grupo)
<i>Cinnamomum camphora</i> (L.) Sieb.	Lauraceae	Canforeira	Paleártico; Indomalaio	Perenifólio	1-12	2-4	Meso.	Árvore	Z10	E2(3), E4(1), E5(4), E6(34), E7(3), E8(1), E9(7), E10(8), E12(8), E13(1), E14(10), E16(3), E18(1), E19(2), E20(14), E21(13), E23(4), E24(1), E25(1), E26(1), E27(3), E28(1), E29(14), E31(5), E32(4), E33(1)
<i>Cinnamomum zeylanicum</i> Bl.	Lauraceae	Caneleira; Árvore-da-canel	Indomalaio	Perenifólio	1-12	2-4	Micro.	Árvore	Z11	E5(1), E7(1), E16(1), E17(1), E19(3), E24(1), E25(1), E27(2)
<i>Cissus antarctica</i> Vent.	Vitaceae	Vinha-virgem	Australianao	Perenifólio	1-12	4-7	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z9	E10(2)
<i>Cistus monspeliensis</i> L.	Cistaceae	Esteva	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-8	Nano.	Arbusto	Z8	E26(4)
<i>Cistus salvifolius</i> L.	Cistaceae	Esteva; Sagano	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-7	Nano.	Arbusto	Z8	E30(grupo)
<i>Citrus bergamia</i> Risso & Poit.	Rutaceae	Bergamota	Paleártico	Perenifólio	1-12	2-5	Micro.	Árvore	Z9	E26(1)
<i>Citrus limon</i> (L.) Burm.	Rutaceae	Limoeiro	Paleártico	Perenifólio	1-12	11-4	Micro.	Árvore	Z9	E3(1), E6(1), E9(1), E12(1), E19(2) E26(5), E28(1), E30(1), E31(12)
<i>Citrus nobilis</i> Lour.	Rutaceae	Tangerineira	Indomalaio	Perenifólio	1-12	2-4	Micro.	Árvore	Z10	E3(3)
<i>Citrus sinensis</i> (L.) Osbeck	Rutaceae	Laranjeira	Paleártico	Perenifólio	1-12	2-4	Micro.	Árvore	Z9	E3(2), E5(1), E6(2), E9(1), E12(1), E19(2), E22(3), E30(2), E31(10), E33(1)
<i>Citrus x paradisi</i> Macfad.	Rutaceae	Toranja	Hortícola	Perenifólio	1-12	2-4	Micro.	Árvore	Z9	E26(1)
<i>Cleistocactus straussi</i> (Heese) Backeb.	Cactaceae	Cacto	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-8	Nano.	Arbusto suculento	Z9	E4(2), E12(9)
<i>Cleistocactus winteri</i> D. Hunt.	Cactaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	6-8	Nano.	Arbusto suculento	Z9	E12(6)
<i>Clematis aristata</i> R. Br.	Ranunculaceae	Clematite-da- austrália	Australiano	Perenifólio	1-12	6-9	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z8	E22(2), E30(2), E31(grupo)
<i>Clematis armandii</i> Franch.	Ranunculaceae	Clematite	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-4	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z5	E31(2)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Clematis florida</i> Thunb.	Ranunculaceae	Clematite	Paleártico	Marcescente	3-2 (11-2)	3-6	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z8	E25 (2)
<i>Clematis grandiflora</i> DC.	Ranunculaceae	Clematite	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	2-5	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	E26(2)
<i>Clematis greuiiflora</i> DC.	Ranunculaceae	Clematite	Indomalaio	Perenifólio	1-12	2-5	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z8	E12(1)
<i>Cleome hassleriana</i> Chodat.	Capparidaceae	Cleome	Neotropical	Sazonal	5-10	5-10	Terófito	Herbácea	Z9	E6(2)
<i>Clerodendrum philippinum</i> Schauer	Verbenaceae	Clerodendro	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-7	Micro.	Arbusto	Z10	E10(8)
<i>Clerodendrum speciosissimum</i> Van Geert	Verbenaceae	Clerodendro	Indomalaio	Perenifólio	1-12	7-12	Nano.	Arbusto	Z11	E19(1)
<i>Clerodendrum splendens</i> G. Don ex James	Verbenaceae	Clerodendro	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	E5(4), E8(2), E12(grupo), E13(grupo), E18(1), E31(4), E32(4)
<i>Clerodendrum thomsoniae</i> Balf. f.	Verbenaceae	Clerodendro; Lágrima-de-cristo; Coração-de-jesus	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	5-11	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	E5(1), E8(2), E10(1), E19(1)
<i>Clerodendrum ugandense</i> Prain.	Verbenaceae	Planta-das- borboletas	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	E12(2), E26(4)
<i>Clerodendrum x speciosum</i> Dombr.	Verbenaceae	Clerodendro	Hortícola	Perenifólio	1-12	5-11	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	E11(8)
<i>Clethra arborea</i> Ait.	Clethraceae	Folhado	Paleártico	Perenifólio	1-12	7-10	Micro.	Árvore	Z10	E6(1), E11(10), E14(11), E22(44), E26(15), E28(3), E30(70)
<i>Clianthus puniceus</i> (G. Don) Sol. ex Lindl.	Leguminosae (Papilionoideae)	Cliantos-branco	Antártico	Perenifólio	1-12	12-6	Micro.	Arbusto	Z8	E26(2)
<i>Clinopodium ascendens</i> (Jord.) Samp.	Labiatae	Neveda	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-10	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z7	E28(grupo)
<i>Clivia miniata</i> Regel	Amaryllidaceae	Clívia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	2-11	Hemi.	Herbácea	Z10	E1, E4, E5, E6, E9, E10, E12, E13, E14, E16, E17, E18, E20, E21, E22, E24, E25, E26, E27, E28, E29, E30, E31, E32, E33 (grupo)
<i>Clivia nobilis</i> Lindl.	Amaryllidaceae	Clívia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	2-11	Hemi.	Herbácea	Z10	E5, E12, E13, E16, E18, E19, E20, E21, E22, E24, E25, E26, E27, E28, E29, E30, E31, E32, E33 (grupo)
<i>Clytostoma callistigioides</i> Bur. & Schum.	Bignoniaceae	Clitostoma	Neotropical	Perenifólio	1-12	3-7	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z9	E8(1), E10(1), E12(2), E13(1), E31(1)
<i>Coccoloba uvifera</i> (L.) L.	Polygonaceae	Uva-do-mar	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-8	Micro.	Árvore	Z11	E8(5), E12(1), E19(1)
<i>Cocculus laurifolius</i> DC.	Menispermaceae	Cóculo	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-6	Micro.	Árvore	Z8	E10(2)
<i>Cocos nucifera</i> L.	Palmae	Coqueiro	Indomalaio; Oceânia	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Micro.	Árvore	Z12	E19(2)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Codiaeum variegatum</i> (L.) Bl. var. <i>pictum</i> (Lodd) Muell. Arg.	Euphorbiaceae	Crótone	Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z11	E2(17), E3(6), E4(3), E5(grupo), E6(13), E7(41), E9(32), E10(9), E11(25), E12(15), E13(50), E14(11), E16(5), E18(1), E19(grupo), E21(6), E23(grupo), E24(grupo), E25(17), E27(33), E32(26), E33(13)
<i>Coelogyne cristata</i> Lindl.	Orchidaceae	Orquídea	Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-4	Epífita	Herbácea	Z10	E25, E28, E30 (grupo), E32(1)
<i>Coelogyne cristata</i> Lindl. var. <i>hololeuca</i> Rchb. f.	Orchidaceae	Orquídea	Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-4	Epífita	Herbácea	Z10	E25(grupo)
<i>Coelogyne dayana</i> Reichb. f.	Orchidaceae	Orquídea	Indomalaio	Perenifólio	1-12	3-5	Epífita	Herbácea	Z11	E25(grupo)
<i>Coelogyne mooreana</i> hort. ex Rolfe x <i>C. beccarii</i> Rchb. f.	Orchidaceae	Orquídea	Hortícola	Perenifólio	1-12	6-7	Epífita	Herbácea	Z11	E31(grupo)
<i>Coffea arabica</i> L.	Rubiaceae	Cafézeiro; Café	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	4-5; 8-9	Micro.	Arbusto	Z11	E4(1), E5(4), E6(1), E7(1), E19(6), E25(1)
<i>Colletia hystrix</i> Clos.	Rhamnaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	3-8	Nano.	Arbusto	Z8	E26(1)
<i>Colletia paradoxa</i> (Spreng) Escal.	Rhamnaceae	Planta-das- âncoras	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-5; 10-11	Micro.	Arbusto	Z9	E25(1)
<i>Colocasia esculenta</i> (L.) Schott	Araceae	Inhame	Indomalaio	Perenifólio	1-12	5-6	Geófito	Herbácea	Z10	E2(4), E12, E18, E19, E22, E23, E24 (grupo), E27(1), E31, E32(grupo)
<i>Combretum microphyllum</i> Klotzsch	Combretaceae	Combreto	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	5-7	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	E12 (1)
<i>Combretum paniculatum</i> Vent.	Combretaceae	Combreto	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	11-6	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	C31(1)
<i>Commelina benghalensis</i> L.	Commelinaceae	Erva-menina; Flor-dum-dia	Indomalaio Áfricotropical;	Perenifólio	1-12	3-9	Hemi.	Herbácea trepadora	Z9	E4, E11, E12, E13, E19, E22, E26, E27, E28, E29, E30, E31 (grupo)
<i>Convolvulus althaeoides</i> L.	Convolvulaceae	Campainhas	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-10	Geófito	Herbácea trepadora	Z8	E19, E23 (grupo)
<i>Convolvulus canariensis</i> L.	Convolvulaceae	Covólulos-de- canárias	Paleártico	Perenifólio	1-12	2-6	Geófito	Herbácea trepadora	Z10	E26(grupo)
<i>Convolvulus cneorum</i> L.	Convolvulaceae		Paleártico	Perenifólio	1-12	3-8	Nano.	Arbusto	Z8	E15, E23, E26, E32 (grupo)
<i>Convolvulus floridus</i> L. f.	Convolvulaceae	Convólulos	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-6	Micro.	Arbusto	Z10	E31(2)
<i>Convolvulus massonii</i> Dietr.	Convolvulaceae	Corriola-da- madeira; Convólulos-da- madeira	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-8	Geófito	Herbácea trepadora	Z10	E19(1), E25(1), E32(1)
<i>Coprosma repens</i> A. Rich.	Rubiaceae	Coprosma; Doiradinha	Antártico; Australiano	Perenifólio	1-12	4-5	Micro.	Arbusto	Z9	E2(1), E6(3), E8(3), E9(1), E10(5), E13(4), E19(1), E24(3), E25(2), E26(8), E28(3)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Coprosma x kirkii</i> Chesem.	Rubiaceae	Coprosma	Hortícola	Perenifólio	1-12	4-5	Nano.	Arbusto	Z8	E10(grupo)
<i>Cordia myxa</i> L. non Forssk.	Boraginaceae		Paleártico; Indomalaio; Africano	Perenifólio	1-12	3-6	Micro.	Árvore	Z10	E18(1)
<i>Cordyline australis</i> (Forst.) Endl.	Agavaceae	Cordilina	Antártico	Perenifólio	1-12	4-7	Micro.	Árvore	Z9	E6(1), E9(27), E10(34), E11(8), E12(19), E13(3), E18(1), E19(1), E22(4), E26(12), E28(11), E30(11)
<i>Cordyline indivisa</i> (Forst.) Steud.	Agavaceae	Cordilina	Antártico	Perenifólio	1-12	3-6	Micro.	Árvore	Z9	E11(34), E23(4) E26(7), E30(23)
<i>Cordyline stricta</i> (Sims) Endl.	Agavaceae	Cordiline	Australiano	Perenifólio	1-12	1-10	Nano.	Arbusto	Z10	E2(grupo), E3(grupo), E5(1), E6(7), E7(7), E10(grupo), E11(1), E13 (grupo), E18(15), E19(grupo), E22(grupo), E23(1), E26, E30, E31(grupo), E32(3), E33(4)
<i>Cordyline terminalis</i> (L.) Kunth.	Agavaceae	Árvore-dos-reis	Indomalaio; Australiano; Oceânia; Antártico	Perenifólio	1-12	11-5	Micro.	Arbusto	Z10	E2(6), E4(1), E5(53), E6(1), E7(5), E10, E11, E12, E13(grupo), E17(2), E18(7), E19(grupo), E21(3), E23(3), E24(3), E25(5), E27(3), E29(10), E30(10), E31(4), E32(2), E33(1)
<i>Coreopsis auricula</i> L.	Compositae	Margarida-amarela	Neártico	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z4	E19, E28, E32 (grupo)
<i>Cornus capitata</i> Wallich.	Comaceae		Paleártico	Perenifólio	1-12	7-8	Micro.	Árvore	Z8	E26(4)
<i>Cornus florida</i> L.	Comaceae		Neártico	Perenifólio	1-12	7-8	Micro.	Árvore	Z5	E26(1)
<i>Cornus kousa</i> (Buerger ex Miq.) Hance	Comaceae		Paleártico	Caducifólio	3-12	6-7	Micro.	Árvore	Z6	E19(1)
<i>Cornus nuttallii</i> Aud.	Comaceae		Neártico	Caducifólio	3-12	6-7	Micro.	Árvore	Z7	E31(1)
<i>Cornus sanguinea</i> L.	Comaceae		Paleártico	Caducifólio	4-12	5-8	Micro.	Arbusto	Z5	E30(1)
<i>Coronilla valentina</i> L. ssp. <i>glauca</i> (L.) Battand.	Leguminosae (Papilionoideae)	Pascoinhas	Paleártico	Perenifólio	1-12	12-6	Nano.	Arbusto	Z9	E2(2), E5(grupo), E26(grupo), E31(4)
<i>Cortaderia selloana</i> (Schult. & Schult. f.) Asch. & Gräbn.	Gramineae	Plumas; Erva-das-pampas; Penacho-branco	Neotropical	Perenifólio	1-12	7-10	Hemi.	Herbácea	Z6	E8(8), E9(2), E11(2), E19(2), E21(3), E22(grupo), E23(3), E25(1), E26(grupo), E27(1), E28, E29, E31 (grupo)
<i>Corylus avellana</i> L.	Betulaceae (Corylaceae)		Paleártico	Caducifólio	4-12	3-4	Micro.	Árvore	Z4	E30(1)
<i>Corylus maxima</i> Mill.	Betulaceae (Corylaceae)		Paleártico	Perenifólio	1-12	8-12	Micro.	Arbusto	Z5	E22(21), E26(grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Corynocarpus laevigatus</i> Forst. & Forst. f.	Corynocarpa-ceae	Loureiro-da-nova- zelândia	Antártico	Perenifólio	1-12	2-5	Micro.	Árvore	Z10	E5(1), E6(2), E8(1), E12(1), E19(2), E27(1), E29(1), E30(1)
<i>Cosmos bipinnatus</i> Cav.	Compositae	Cosmos	Neártico; Neotropical	Sazonal	3-7	3-6	Terófito	Herbácea	Z8	E12, E21, E22, E25, E28 (grupo)
<i>Costus barbatus</i> Suess.	Zingiberaceae	Gingibre-espiral- vermelha	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-9	Geófito	Herbácea	Z11	E13(1)
<i>Cotoneaster dammeri</i> Schneid.	Rosaceae	Pereirinho-de- jardim	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-5	Nano.	Arbusto	Z5	E26(4)
<i>Cotoneaster franchetii</i> Bois.	Rosaceae	Pereirinho-de- jardim	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-6	Micro.	Arbusto	Z6	E29(2)
<i>Cotoneaster horizontalis</i> Decne.	Rosaceae	Pereirinho-de- jardim	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-5	Nano.	Arbusto	Z5	E8(1), E26(3), E32(grupo)
<i>Cotoneaster lacteus</i> W. W. Sm.	Rosaceae	Pereirinho-de- jardim	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-7	Micro.	Arbusto	Z7	E23(6)
<i>Cotoneaster pannosus</i> Franch.	Rosaceae	Pereirinho-de- jardim	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-5	Micro.	Arbusto	Z7	E5(3), E9(grupo), E11(5), E19(17), E22(2), E24(6), E25(grupo), E26(5), E27(1), E33(grupo)
<i>Cotyledon macrantha</i> De Smet	Crassulaceae		Áfricotropical	Perenifólio	1-12	12-4	Caméfito	Arbusto suculento	Z10	E12(3), E30(grupo)
<i>Cotyledon orbiculata</i> L.	Crassulaceae		Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-3	Nano.	Arbusto suculento	Z10	E5(4), E10(grupo), E12(3), E19(grupo), E23(grupo)
<i>Crassula arborescens</i> (Mill.) Willd.	Crassulaceae	Crássula	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	11-3	Nano.	Arbusto suculento	Z10	E12(3)
<i>Crassula brevifolia</i> Harv.	Crassulaceae	Crássula	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Nano.	Arbusto suculento	Z10	E12(3)
<i>Crassula coccinea</i> L.	Crassulaceae	Crássula-vermelha	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	7-8	Nano.	Arbusto suculento	Z10	E26, E32(grupo)
<i>Crassula deltoidea</i> Thunb.	Crassulaceae	Crássula	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Hemi.	Herbácea suculenta	Z10	E12(3)
<i>Crassula elegans</i> Schönl. & Bak.	Crassulaceae	Crássula	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Hemi.	Herbácea suculenta	Z10	E12(3)
<i>Crassula multicava</i> Lem.	Crassulaceae	Crássula	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea suculenta	Z10	E3, E10, E11, E12, E13, E22, E23, E26, E30, E31 (grupo)
<i>Crassula muscosa</i> L.	Crassulaceae		Áfricotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Nano.	Arbusto suculento	Z10	E12(3)
<i>Crassula ovata</i> (Mill.) Druce.	Crassulaceae	Ensaio-branco ; Planta-de-jade	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	11-3	Nano.	Arbusto suculento	Z10	E1, E2, E3(grupo), E4(1), E5(4), E6, E7 (grupo), E10(4), E11, E12, E13, E14, E15, (grupo), E16(7), E17, E18, E21, E23, E27, E30, E31(grupo), E32(1), E33(2)
<i>Crassula perfoliata</i> L. var. <i>falcata</i> (Wendl.) Toelken.	Crassulaceae		Áfricotropical	Perenifólio	1-12	6-10	Nano.	Arbusto suculento	Z10	E12(8), E14(grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Crassula perforata</i> Thunb.	Crassulaceae		Áfricotropical	Perenifólio	1-12	12-2	Hemi.	Herbácea suculenta	Z10	E10 (grupo), E12(3)
<i>Crassula sarmentosa</i> Harv.	Crassulaceae		Áfricotropical	Perenifólio	1-12	12-2	Nano.	Arbusto suculento	Z10	E12(grupo)
<i>Crassula tetragona</i> L.	Crassulaceae	Pinheirinho	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	6-8	Nano.	Arbusto suculento	Z10	E10(2), E12, E17, E19(grupo)
<i>Crataegus laevigata</i> (Poir.) DC	Rosaceae	Pilriteiro	Paleártico	Caducifólio	5-12	5-6	Micro.	Árvore	Z5	E26(1), E28(1)
<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	Rosaceae	Pilriteiro	Paleártico	Caducifólio	3-11	4-5	Micro.	Árvore	Z5	E26(1), E28(1), E30(2), E31(1)
<i>Crinum asiaticum</i> L.	Amaryllidaceae	Crino	Indomalaio	Perenifólio	1-12	5-8	Geófita	Herbácea	Z10	E18(2), E26(grupo)
<i>Crinum moorei</i> Hook. f.	Amaryllidaceae	Crino	Áfricotropical	Sazonal	11-9	4-8	Geófita	Herbácea	Z8	E10, E12, E18, E19, E22, E25, E26, E30, E31 (grupo)
<i>Crinum x powellii</i> L. H. Bail.	Amaryllidaceae	Crino; Acucena-gigante	Hortícola	Sazonal	11-9	3-8	Geófita	Herbácea	Z6	E5, E7, E13, E26, E27, E31 (grupo)
<i>Crithmum maritimum</i> L.	Umbelliferae	Perrexil; Funcho-marítimo	Paleártico	Perenifólio	1-12	6-9	Caméfito	Herbácea suculenta	Z7	E23(grupo)
<i>Crocsmia x crocosmiiflora</i> (Burb. & Dean) N.E. Br.	Iridaceae	Monbrécias; Hastes-de-são-josé	Hortícola	Perenifólio	1-12	5-9	Geófita	Herbácea	Z7	E5, E6, E10, E12, E22 E26, E30 (grupo)
<i>Cryptomeria japonica</i> D. Don	Taxodiaceae	Criptoméria	Paleártico	Perenifólio	1-12	12-3	Meso.	Árvore	Z7	E6(18), E19(3), E22(2), E26(68), E27(1), E28(9), E29(1), E30(8)
<i>Ctenanthe lubbersiana</i> (E. Morr.) Eichl.	Marantaceae	Maranta-cinza; Tenante	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-8	Hemi.	Herbácea	Z10	E2, E4, E10, E12, E13, E18, E32, E33 (grupo)
<i>Ctenanthe oppenheimiana</i> (C. J. Morren) K. Schum.	Marantaceae	Tenante	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-8	Hemi.	Herbácea	Z10	E2, E3, E4, E5, E7, E10, E12, E21, E29, E30, E32 (grupo)
<i>Ctenanthe setosa</i> (Roscoe) Eichl.	Marantaceae	Tenante	Neotropical	Perenifólio	1-12	3-7	Hemi.	Herbácea	Z10	E5, E10, E12, E24, E25, E30, E32 (grupo)
<i>Cucurbita moschata</i> (Duchesne ex Lam.) Duchesne ex Poir.	Cucurbitaceae	Aboboreira	Neártico; Neotropical	Perenifólio	1-12	7-9	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z10	E3(2), E23(grupo)
<i>Culcita macrocarpa</i> C. Presl.	Dicksoniaceae	Feto-abrum; Feto-cabelinho	Paleártico	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z9	E28(1), E30(8)
<i>Cuphea hyssopifolia</i> HBK.	Lythraceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	E3, E5, E9, E10, E12, E17, E23, E26, E27, E29 (grupo)
<i>Cuphea ignea</i> A. DC.	Lythraceae	Cigarrinhos	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	E1, E16, E17, E18, E19, E21, E22, E25, E26(grupo), E27(4), E29, E32(grupo)
<i>Cuphea micropetala</i> HBK.	Lythraceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	4-8	Nano.	Arbusto	Z9	E6(1), E10, E12 (grupo)
<i>Cupressus arizonica</i> Green.	Cupressaceae	Cedro-do-arizona	Neártico	Perenifólio	1-12	11-1	Micro.	Árvore	Z7	E6(1), E11(4), E20(2), E23(10), E29(1), E30(1)
<i>Cupressus funebris</i> Endl.	Cupressaceae	Cipreste-chorão- da-china	Paleártico	Perenifólio	1-12	2-3	Micro.	Árvore	Z7	E9(1), E13(2), E26(3), E29(2)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Cupressus lusitanica</i> Mill.	Cupressaceae	Cedro-de-goa; Cedro-das- barracas	Neártico; Neotropical	Perenifólio	1-12	1-3	Meso.	Árvore	Z9	E2(22), E3(2), E5(sebe), E9(1), E11(41), E12(2), E13(2), E19(3), E22(sebe), E26(3), E28(4), E29(11), E30(6), E31(3)
<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartw. ex Gordon	Cupressaceae	Cipreste-de- monterrey; Cedro-de- monterrey	Neártico	Perenifólio	1-12	1-2	Meso.	Árvore	Z8	E4(3), E5(2), E6(3), E9(1), E11(22), E19(6), E25(1), E26(1), E28(1), E30(17)
<i>Cupressus sempervirens</i> L. f. <i>horizontalis</i> (Mill.) Voss.	Cupressaceae	Cipreste	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-2	Meso.	Árvore	Z8	E9(1)
<i>Cupressus sempervirens</i> L.	Cupressaceae	Cipreste	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-2	Micro.	Árvore	Z8	E1(121), E2(95), E3(2), E5(13), E6(39), E8(4), E10(2), E11(16), E12(19), E13(1), E19(23), E20(3), E21(1), E25(7), E26(51), E27(2), E29(1), E30(40), E31(5)
<i>Curculigo latifolia</i> Dryand.	Hypoxidaceae	Curculigo	Indomalaio	Perenifólio	1-12	6-8	Hemi.	Herbácea	Z10	E5, E19 (grupo)
<i>Curcuma longa</i> L.	Zingiberaceae	Açafrão-da-india	Indomalaio	Perenifólio	1-12	6-8	Geófita	Herbácea	Z10	E19 (grupo)
<i>Curcuma petiolata</i> Roxb.	Zingiberaceae	Falso-açafrão	Indomalaio	Sazonal	4-7	4-7	Geófita	Herbácea	Z10	E12(grupo)
<i>Cyanotis somaliensis</i> C. B. Clarke.	Commelinaceae		Áfricotropical	Perenifólio	1-12	6-7	Hemi.	Herbácea trepadora	Z9	E26(grupo)
<i>Cyathea australis</i> (R. Br.) Domin	Cyatheaceae	Feto-arbóreo	Australiano	Perenifólio	1-12	-----	Micro.	Árvore	Z9	E6(1), E13(25), E18(30), E19(2), E21(5), E22(17), E26(4), E27(1), E30(>200)
<i>Cyathea cooperi</i> (F. Mueller) Domin.	Cyatheaceae	Feto-arbóreo	Australiano	Perenifólio	1-12	-----	Micro.	Árvore	Z10	E2(4), E5(44), E6(7), E8(3), E10(3), E12(7), E13(5), E14(3), E16(15), E18(3), E19(35), E21(1), E22(87), E24(2), E25(22), E26(10), E27(11), E28(4), E29(1), E30(>200), E32(21), E33(7)
<i>Cyathea dealbata</i> (Forst. f.) Sw.	Cyatheaceae	Feto-arbóreo	Antártico	Perenifólio	1-12	-----	Micro.	Árvore	Z9	E26(1)
<i>Cyathea leichhardtiana</i> (F. Muell.)	Cyatheaceae	Feto-arbóreo	Australiano	Perenifólio	1-12	-----	Micro.	Árvore	Z9	E30(1)
<i>Cyathea medullaris</i> (Forst. f.) Sw.	Cyatheaceae	Feto-arbóreo- negro	Australiano; Oceânia; Antártico	Perenifólio	1-12	-----	Micro.	Árvore	Z9	E19(1), E26(6), E30(1)
<i>Cycas circinalis</i> L.	Cycadaceae	Cicas	Indomalaio	Perenifólio	1-12	2-7	Micro.	Árvore	Z10	E5(6), E13(1), E14(6), E18(1), C19(1), E24(2), E25(2), E29(4)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Cycas revoluta</i> Thunb.	Cycadaceae	Cicas-revoluta; Cicas-de-sagú	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-8	Micro.	Árvore	Z9	E3(1), E5(19), E6(2), E8(6), E11(7), E12(7), E13(10), E14(7), E15(2), E18(8), E19(2), E21(4), E23(2), E24(2), E25(13), E26(1), E29(6), E30(936), E31(1), E32(6)
<i>Cycas thouarsii</i> R. Br. ex Gaudich	Cycadaceae	Cicas	Indomalaio; Áfricotropical	Perenifólio	1-12	4-8	Micro.	Árvore	Z10	E30(3)
<i>Cyclamen persicum</i> Mill.	Primulaceae	Ciclame	Paleártico	Perenifólio	1-12	11-2	Geófito	Herbácea	Z9	E5(grupo)
<i>Cydonia oblonga</i> Mill.	Rosaceae	Marmeleiro	Paleártico	Caducifólio	4-12	6-7	Micro.	Árvore	Z6	E3(1), E5(1)
<i>Cylindrophyllym comptonii</i> L. Bol.	Crassulaceae		Áfricotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Caméfito	Herbácea suculenta	Z9	E12(3)
<i>Cymbalaria muralis</i> P. Gaertn., Mey. & Scherb.	Scrophularia-ceae	Perpétua-de-roma	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-10	Hemi.	Herbácea	Z3	E12, E13, E22, E25, E27, E29, E30, E31 (grupo)
<i>Cymbidium insigne</i> Rolfe	Orchidaceae	Orquídea-de- haste; Cimbidio	Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-8	Hemi.	Herbácea	Z9	E5, E10, E14, E19 (grupo), E22(2), E25, E26(grupo), E30(>300), E31, E32 (grupo)
<i>Cymbidium lowianum</i> (Reichb. f.) Reichb. f.	Orchidaceae	Orquídea-de- haste; Cimbidio	Indomalaio	Perenifólio	1-12	2-5	Hemi.	Herbácea	Z9	E25, E26(grupo)
<i>Cymbopogon citratus</i> (DC. ex Nees) Stapf.	Gramineae	Caninha; Cana-com-cheiro- a-limão	Indomalaio	Perenifólio	1-12	9-10	Hemi.	Herbácea	Z9	E5, E12, E13, E19, E32 (grupo)
<i>Cynara scolymus</i> L.	Compositae	Alcachofra	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-5	Nano.	Herbácea	Z6	E26(10)
<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.	Gramineae	Relva-bermuda (Bermuda grass)	Cosmopolita	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z7	E4, E11, E14, E15, E23, E28 (tapete)
<i>Cyperus involucratus</i> Rottb.	Cyperaceae		Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	E2, E5, E10, E12, E13, E14, E16, E19, E21, E23, E24, E29, E30, E31, E32 (grupo)
<i>Cyperus papyrus</i> L.	Cyperaceae	Papiros	Áfricotropical; Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	E5, E11, E12, E19, E30 (grupo)
<i>Cyphomandra crassicaulis</i> (Ortega) Kuntze	Solanaceae	Tomateiro- arbóreo; Tomateiro-inglês	Neotropical	Perenifólio	1-12	3-10	Micro.	Arbusto	Z9	E5(1), E19(2), E26(1), E31(1), E32(1)
<i>Cyphostema juttae</i> (Dienter & Gilg) Descoings.	Vitaceae		Áfricotropical	Caducifólio	4-10	5-7	Nano.	Arbusto	Z9	E12(2)
<i>Cyrtanthus elatus</i> (Jacq.) Traub.	Amaryllidaceae	Cirtantos	Áfricotropical	Sazonal	4-9	7-8	Geófito	Herbácea	Z9	E26(grupo)
<i>Cyrtanthus obliquus</i> (L. f.) Ait.	Amaryllidaceae	Cirtantos	Áfricotropical	Sazonal	4-9	4-7	Geófito	Herbácea	Z9	E26(grupo)
<i>Cyrtomium falcatum</i> (L. f.) Presl.	Dryopterida-ceae	Feto-azevinho	Paleártico; Indomalaio; Australiano; Oceânia	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z9	E5, E6, E8, E10, E11, E12, E13, E19, E24, E27, E28, E29, E30, E31, E32 (grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link	Leguminosae (Papilionoideae)	Giesta	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-7	Micro.	Arbusto	Z5	E5(1), E19(grupo), E22(2), E23(2), E28(grupo)
<i>Cytisus striatus</i> (Hill) Rothm.	Leguminosae (Papilionoideae)	Giesta	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-7	Micro.	Arbusto	Z5	E19(grupo)
<i>Daboecia cantabrica</i> (Huds.) K. Koch.	Ericaceae	Daboécia	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-10	Nano.	Arbusto	Z7	E30 (grupo)
<i>Dahlia imperialis</i> Roetz. ex Ortgies.	Compositae	Dália-imperial	Neotropical	Perenifólio	1-12	11-4	Micro.	Arbusto	Z10	E12(1), E22(11), E25(3), E26(4)
<i>Dais cotinifolia</i> L.	Thymelaeaceae		Áfricotropical	Perenifólio	1-12	7-8; 11-2	Micro.	Arbusto	Z10	E5(1), E19(1), E26(1), E31(4)
<i>Darmera peltata</i> Voss.	Saxifragaceae		Neártico	Perenifólio	1-12	3-5	Hemi.	Herbácea	Z5	E30(grupo)
<i>Dasyllirion acrotrichum</i> (Schiede) Zucc.	Agavaceae (Dracaenaceae)		Neotropical	Perenifólio	1-12	6-9	Nano.	Árvore	Z9	E12(2), E25(1), E30(1)
<i>Dasyllirion longissimum</i> Lem.	Agavaceae (Dracaenaceae)		Neotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Nano.	Árvore	Z9	E28(3)
<i>Dasyllirion serratifolium</i> Karw. ex Schult. F.	Agavaceae		Neártico; Neotropical	Perenifólio	1-12	6-9	Nano.	Árvore	Z9	E11(6), E21(1), E28(3), E29(3)
<i>Datura metel</i> L.	Solanaceae	Datura	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-7	Nano.	Herbácea	Z9	E10(1)
<i>Davallia canariensis</i> (L.) Sm.	Davalliaceae	Cabrinhas	Paleártico	Perenifólio	1-12	-----	Epífita	Herbácea	Z9	E5, E22, E26, E27, E28, E30, E31, E32 (grupo)
<i>Davallia fejeensis</i> Hook.	Davalliaceae	Renda-portuguesa	Oceânia	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z10	E13(grupo)
<i>Davallia mariesii</i> Moore ex Bak.	Davalliaceae	Davália	Paleártico; Indomalaio	Perenifólio	1-12	-----	Epífita	Herbácea	Z8	E25(grupo)
<i>Davidia involucrata</i> Bail.	Nyssaceae (Davidiaceae)		Paleártico	Caducifólio	4-12	4-6	Micro.	Árvore	Z7	E26(1)
<i>Delairea odorata</i> Lem.	Compositae	Tasneirinha	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	12-3	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z9	E22(grupo), E26(12), E28, E30(grupo)
<i>Delonix regia</i> (Bojer) Raf.	Leguminosae (Caesalpinoideae)	Acácia-rubra	Áfricotropical	Caducifólio	6-3	7-9	Micro.	Árvore	Z11	E5(1), E6(1), E7(1), E8(2), E10(1), E12(2), E14(14), E18(1), E19(7), E20(1), E23(1), E25(1)
<i>Delphinium elatum</i> L.	Ranunculaceae	Esporas	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Herbácea	Z3	E12, E26, E32(grupo)
<i>Delphinium grandiflorum</i> L.	Ranunculaceae	Esporas	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Herbácea	Z3	E5, E6, E18(grupo)
<i>Delphinium x belladonna</i> hort. ex Bergmans	Ranunculaceae	Esporas	Hortícola	Sazonal	4-9	5-8	Terófito	Herbácea	Z3	E28(grupo)
<i>Dendranthema pacificum</i> (Nak.) Kitam	Compositae		Paleártico	Perenifólio	1-12	10-12	Caméfito	Herbácea	Z7	E5, E14, E19 (grupo)
<i>Dendranthema x grandiflorum</i> Kitam.	Compositae	Crisântemo-das- floristas	Hortícola	Perenifólio	1-12	10-12	Nano.	Herbácea	Z4	E1, E2, E3, E5, E9, E13, E22, E23, E30 (grupo),
<i>Dendrobium fimbriatum</i> Hook.	Orchidaceae	Dendróbio	Indomalaio	Perenifólio	1-12	2-4	Epífita	Herbácea	Z10	E25 (grupo)
<i>Dendrobium nobile</i> Lindley	Orchidaceae	Dendróbio	Indomalaio	Perenifólio	1-12	2-4	Epífita	Herbácea	Z10	E5, E25(grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Deparia petersenii</i> (Kunze) M. Kato.	Woodsiaceae	Feto	Indomalaio; Paleártico; Australiano; Oceânia; Antártico	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z9	E2, E5, E9, E10, E11, E13, E26, E29, E30, E31 (grupo)
<i>Desmodium elegans</i> DC.	Leguminosae (Papilionoideae)		Paleártico	Caducifólio	4-12	6-8	Micro.	Arbusto	Z9	E26(1)
<i>Deutzia gracilis</i> Sieb. & Zucc.	Hydrangeaceae	Deutzia	Paleártico	Caducifólio	4-12	5-8	Nano.	Arbusto	Z4	E26(2)
<i>Deutzia scabra</i> Thunb.	Hydrangeaceae	Deutzia	Paleártico	Caducifólio	4-12	5-8	Nano.	Arbusto	Z5	E26(2)
<i>Dianella caerulea</i> Sims.	Liliaceae (Phormiaceae)		Australiano; Oceânia	Perenifólio	1-12	5-7	Hemi.	Herbácea	Z9	E19(1), E30(1)
<i>Dianthus barbatus</i> L.	Caryophyllaceae	Craveiro	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-7	Nano.	Herbácea	Z4	E3(1), E8, E22, E24, E26 (grupo)
<i>Dianthus caryophyllus</i> L.	Caryophyllaceae	Craveiro	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-8	Nano.	Herbácea	Z8	E1, E8(grupo)
<i>Dianthus chinensis</i> L.	Caryophyllaceae	Cravo-chinês	Paleártico	Sazonal	3-8	4-6	Terófito	Herbácea	Z7	E25(grupo)
<i>Dichondra micrantha</i> Urban.	Convolvulaceae	Relva-redonda	Australiano; Antártico	Perenifólio	1-12	3-6	Hemi.	Herbácea	Z9	E9, E13, E15, E30, E32 (tapete)
<i>Dichorisandra thyrsiflora</i> Mikan.	Commelinaceae	Dicorisandra	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	E3(grupo), E5(1), E10(6), E12(4), E13(2), E18(3), E25(2), E30(1), E31(grupo), E32(11)
<i>Dichroa febrifuga</i> Lour.	Hydrangeaceae		Indomalaio	Perenifólio	1-12	5-7	Nano.	Arbusto	Z8	E12(1)
<i>Dicksonia antarctica</i> Labill.	Dicksoniaceae	Feto-arbóreo	Australiano	Perenifólio	1-12	-----	Micro.	Árvore	Z8	E5(1), E10(1), E11(2), E12(3), E14(11), E22(7), E26(5), E30(10), E32(3)
<i>Didiplera suberecta</i> (Andre) Bremek	Acanthaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	5-8	Nano.	Arbusto	Z8	E26(1), E10(grupo)
<i>Dieffenbachia seguine</i> (Jacq.) Schott.	Araceae	Diefenbáquia	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Herbácea	Z10	E2(1), E3(1), E12(13), E13(grupo)
<i>Dierama pulcherrimum</i> (Hook. f.) Bak.	Iridaceae	Varinha-de-condão	Áfricotropical	Sazonal	3-8	3-8	Geófito	Herbácea	Z9	E26(grupo)
<i>Dietes bicolor</i> (Steud.) Klatt.	Iridaceae	Dites-bicolor	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	4-8	Geófito	Herbácea	Z9	E12, E22, E26, E29, E31 (grupo)
<i>Dietes grandiflora</i> N. E. Br.	Iridaceae	Dietes	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	5-8	Geófito	Herbácea	Z9	E12, E26(grupo)
<i>Dietes iridioides</i> (L.) Klatt.	Iridaceae	Dietes	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-5	Geófito	Herbácea	Z9	E10, E19, E22, E27, E28, E29 (grupo)
<i>Dietes robinsoniana</i> (F. Muell.) Klatt.	Iridaceae	Dietes	Australiano	Perenifólio	1-12	2-5	Geófito	Herbácea	Z9	E26(9)
<i>Digitalis purpurea</i> L.	Scrophulariaceae	Dedaleira	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-6	Nano.	Herbácea	Z5	E26(grupo)
<i>Dioon edule</i> Lindley	Zamiaceae	Dion	Neártico	Perenifólio	1-12	8-11	Nano.	Árvore	Z10	E19(1), E29(2), E30(2)
<i>Dioscorea elephantipes</i> (L' Hér.) Engl.	Dioscoreaceae	Pata-de-elefante	Áfricotropical	Sazonal	3-10	6-8	Hemi.	Herbácea trepadora	Z10	E12(1)
<i>Diosma ericoides</i> L.	Rutaceae	Urze-de-cheiro	Áfricotropical	Perenifólio	1 – 12	2 – 5	Nano.	Arbusto	Z9	E26(grupo)
<i>Diospyros kaki</i> L. f.	Ebenaceae	Dióspiros	Paleártico	Caducifólio	3-11	5-6	Micro.	Árvore	Z8	E26(24), E30(1)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Diospyros virginiana</i> L.	Ebenaceae	Diospiros- americano	Neártico	Caducifólio	4-11	5-6	Micro.	Árvore	Z5	E26(3)
<i>Diplazium assimile</i> (Endl.) Bedd	Woodsiaceae	Feto	Australiano	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z10	E7(5)
<i>Diplazium caudatum</i> (Cav.) Jermy	Woodsiaceae	Feto	Paleártico	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z10	E22, E26, E30 (grupo)
<i>Distictis buccinatoria</i> (DC.) A. Gentry.	Bignoniaceae	Dedos-de-senhora	Neotropical	Perenifólio	1-12	3-11	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z11	E6, E19 (grupo), E26(1)
<i>Dodonaea viscosa</i> (L.) Jacq.	Sapindaceae		Indomalaio; Australiano; Áfricotropical; Neotropical	Perenifólio	1-12	3-7	Micro.	Arbusto	Z9	E12(1), E22(1)
<i>Dombeya cacuminum</i> Hochr.	Sterculiaceae	Dombeia; Aurora	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-4	Micro.	Árvore	Z10	E5(4), E10(5), E12(2), E18(1), E19(6), E26(3), E31(7)
<i>Dombeya rotundifolia</i> (Hochst.) Planch.	Sterculiaceae	Dombeia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	4-5	Micro.	Árvore	Z9	E31(1)
<i>Dombeya wallichii</i> (Lindl.) B. D. Jackson	Sterculiaceae	Dombeia; Aurora	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	12-2	Micro.	Árvore	Z10	E5(1), E7(1), E8(3), E13(2), E19(5), E20(2), E22(1), E24(1), E25(2), E26(2), E29(1), E30(1), E31(3)
<i>Doodia caudata</i> (Cav.) R. Br.	Blechnaceae	Feto	Australiano; Antártico	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z9	E30(grupo)
<i>Doryanthes excelsa</i> Corr.	Agavaceae	Doriantes	Australiano	Perenifólio	1-12	7-9	Hemi.	Herbácea	Z10	E14(12)
<i>Doryanthes palmeri</i> W. Hill.	Agavaceae	Doriantes	Australiano	Perenifólio	1-12	3-6	Hemi.	Herbácea	Z10	E5(2), E10(1), E19(9), E21(14), E24(1), E26(3), E31(3)
<i>Dovyalis caffra</i> (Hook. f. & Harv.) Hook. F.	Flacourtiaceae		Áfricotropical	Perenifólio	1-12	10-11	Micro.	Arbusto	Z9	E19(1), E25(1)
<i>Dracaena deremensis</i> Engl.	Agavaceae (Dracaenaceae)	Dracena	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	11-12	Micro.	Arbusto	Z11	E2(grupo), E3(grupo), E4(1), E6(11), E9(1), E10(5), E12(17), E13(6), E16(2), E18(27), E21(2), E24(4), E25(1), E27(2), E29(1), E30(3), E31(7), E32(3)
<i>Dracaena draco</i> (L.) L. ssp. <i>draco</i>	Agavaceae (Dracaenaceae)	Dragoeiro	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-6	Micro.	Árvore	Z11	E2(3), E3(1), E5(17), E6(4), E7(7), E8(1), E9(5), E10(17), E11(3), E12(15), E13(10), E14(69), E15(1), E16(1), E18(3), E19(35), E20(2), E21(4), E23(36), E25(7), E26(2), E27(1), E28(2), E29(4), E30(54), E31(15), E32(5), E33(3)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Dracaena fragrans</i> (L.) Ker-Gawl.	Agavaceae (Dracaenaceae)	Dracena	Africotropical	Perenifólio	1-12	11-1	Micro.	Arbusto	Z12	E2(2), E10(5), E11(grupo), E12(1), E16(2), E18(7), E21(2), E24(6), E25(1), E27(1), E32(1), E33(1)
<i>Dracaena marginata</i> Lam.	Agavaceae (Dracaenaceae)	Dracena	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu**	Micro.	Arbusto	Z11	E2(1), E5(6), E6(2), E10(7), E11(3), E12(8), E13(1), E19(3), E23(1), E30(3), E32(1)
<i>Dracaena reflexa</i> (Decne.) Lam.	Agavaceae (Dracaenaceae)	Dracena	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	4-5	Micro.	Arbusto	Z10	E8(4), E10(2), E13(6)
<i>Drimiopsis maculata</i> Lindl. & Paxt.	Liliaceae (Hyacinthaceae)		Áfricotropical	Perenifólio	1-12	4-8	Geófita	Herbácea	Z10	E10, E13, E30(grupo)
<i>Drimys winteri</i> Forst & Forst. f.	Winteraceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	11-5	Micro.	Árvore	Z8	E26(2)
<i>Drosanthemum barwickii</i> L. Bolus	Aizoaceae	Arrozinho	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	3-6	Fane. trep.	Arbusto trepador e suculento	Z9	E26(grupo)
<i>Drosanthemum floribundum</i> (Haw.) Schwantes	Aizoaceae	Arrozinho	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	5-7	Fane. trep.	Arbusto trepador e suculento	Z9	E11, E23, E24 (grupo)
<i>Dryopteris affinis</i> (Lowe) Fraser-Jenk.	Dryopterida-ceae	Feto	Paleártico	Perenifólio	1-12		Hemi.	Herbácea	Z6	E26 (grupo)
<i>Duchesnea indica</i> (Andrews) Focke.	Rosaceae	Morangueiro-selvagem	Paleártico; Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea trepadora	Z6	E5, E10, E11, E14, E22, E28, E30 (mancha)
<i>Duranta erecta</i> L.	Verbenaceae	Duranta; Violeteira-da-brasil	Neotropical	Perenifólio	1-12	7-1	Micro.	Arbusto	Z10	E2(5), E4(1), E5(7), E6(2), E8(1), E10, E11, E13(grupo), E16(1), E18(grupo), E19(6), E20(grupo), E21(29), E22(12), E23(12), E24(1), E25(2), E26(grupo), E27(4), E29(1), E30(6), E31(grupo), E33(8)
<i>Dyckia brevifolia</i> Bak.	Bromeliaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	6-11	Caméfita	Herbácea suculenta	Z9	E26(grupo)
<i>Dyckia minarum</i> Mez.	Bromeliaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Caméfita	Herbácea	Z9	E12(3)
<i>Echeveria agavoides</i> Lem.	Crassulaceae	Echeveria	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-6	Caméfita	Herbácea suculenta	Z8	C12(6)
<i>Echeveria albicans</i> Walth.	Crassulaceae	Echevéria	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-9	Caméfita	Herbácea suculenta	Z8	E5(1)
<i>Echeveria elegans</i> Rose.	Crassulaceae	Rosa-mexicana	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-9	Caméfita	Herbácea suculenta	Z8	E10, E12, E26, E31 (grupo)
<i>Echeveria pilosa</i> Purpus.	Crassulaceae	Echeveria	Neotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Caméfita	Herbácea suculenta	Z8	E12(1)
<i>Echeveria pulvinata</i> Rose	Crassulaceae	Echevéria	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-6	Caméfita	Herbácea suculenta	Z9	E10 (grupo), E12(3), E27(grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Echeveria sanchez-mejoradae</i> Walth.	Crassulaceae	Echeveria	Neotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Caméfito	Herbácea suculenta	Z8	E12(3)
<i>Echeveria secunda</i> W. B. Booth. var. <i>glauca</i> (Bak.) Otto.	Crassulaceae	Echeveria	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-7	Caméfito	Herbácea suculenta	Z8	E12(1)
<i>Echeveria secunda</i> W. B. Booth.	Crassulaceae	Rosa-mexicana	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-9	Caméfito	Herbácea suculenta	Z8	E12, E14, E26(grupo)
<i>Echinocactus grusonii</i> Hildm.	Cactaceae	Almofada-de-sogra	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-8	Caméfito	Herbácea suculenta	Z9	E5(2), E8(4), E10(grupo), E12(6), E19(2), E32(3)
<i>Echinopsis backebergii</i> Werderm ex Backeb.	Cactaceae	Cacto	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-6	Caméfito	Arbusto suculento	Z9	E4(1)
<i>Echinopsis macrogona</i> (Salm-Dyck) Friedrich & Rowley	Cactaceae	Cacto	Desconhecida	Perenifólio	1-12	5-6	Micro.	Arbusto suculento	Z9	E4(1)
<i>Echinopsis spachiana</i> (Lem.) Friedrich & G. Rowley	Cactaceae	Cacto	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-6	Nano.	Arbusto suculento	Z9	E4(2)
<i>Echinopsis terscheckii</i> (Parmentier ex Pfeiff.) Friedrich & Rowley	Cactaceae	Cacto	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-6	Nano	Arbusto suculento	Z9	E32(1), E33(2)
<i>Echium candicans</i> L. f.	Boraginaceae	Massaroco	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-6	Micro.	Arbusto	Z10	E11(grupo), E14(grupo), E22(28), E26(2), E28(6), E30(12)
<i>Echium nervosum</i> Dryand.	Boraginaceae	Massaroco	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-6	Nano.	Arbusto	Z11	E4(3), E8, E10, E11 (grupo), E12(13), E14, E19, E20, E21 (grupo), E22(10), E23(grupo), E25(7), E26(2), E29(2), E30(17), E31(grupo), E32(2)
<i>Echium plantaginium</i> L.	Boraginaceae	Invejosa	Paleártico	Perenifólio	1-12	2-6	Nano.	Herbácea	Z9	E19, E23, E26 (grupo)
<i>Echium simplex</i> DC.	Boraginaceae	Massaroco	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-5	Caméfito	Arbusto	Z11	E5(18)
<i>Eichhornia crassipes</i> (Mart.) Solms-Laub.	Pontederiaceae	Jacinto-de-água	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-10	Hidrófita	Herbácea	Z10	E5, E14, E25, E26, E29, E30, E31, E33 (grupo)
<i>Elaeagnus angustifolia</i> L.	Elaeagnaceae	Oliveira-do-paraiso	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-6	Micro.	Árvore	Z7	E30(2)
<i>Elaeagnus pungens</i> Thunb.	Elaeagnaceae		Paleártico	Perenifólio	1-12	9-10	Micro.	Arbusto	Z7	E19(5), E26(17), E30(1)
<i>Elaeagnus umbellata</i> Thunb.	Elaeagnaceae	Groselha	Paleártico	Caducifólio	3-12	3-8	Micro.	Arbusto	Z7	E5(1), E19(9)
<i>Emilia coccinea</i> (Sims) D. Don.	Compositae	Emilia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Herbácea	Z11	E3, E4, E8, E10, E19, E21, E29, E32, E33 (grupo)
<i>Encephalartos altensteinii</i> Lehm	Zamiaceae	Cica; Encefalartos	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	7-10	Micro.	Árvore	Z9	E29(4), E30(15)
<i>Encephalartos altensteinii</i> Lehm x <i>E. arenarius</i> R. A. Dyer.	Zamiaceae	Cica; Encefalartos	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	6-10	Micro.	Árvore	Z9	E30(12)
<i>Encephalartos altensteinii</i> Lehm x <i>E. latifrons</i> Lehm.	Zamiaceae	Cica; Encefalartos	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	7-10	Micro.	Árvore	Z9	E30(1)
<i>Encephalartos altensteinii</i> Lehm x <i>E. lehmannii</i> Lehm.	Zamiaceae	Cica; Encefalartos	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu**	Micro.	Árvore	Z9	E30(1)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Encephalartos altensteinii</i> Lehm. x <i>E. longifolius</i> (Jacq.) Lehm.	Zamiaceae	Cica; Encefalartos	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	7-10	Micro.	Árvore	Z9	E30(10)
<i>Encephalartos altensteinii</i> Lehm. x <i>E. princeps</i> R. A. Dyer.	Zamiaceae	Cica; Encefalartos	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu**	Micro.	Árvore	Z9	E30(5)
<i>Encephalartos altensteinii</i> Lehm. x <i>E. trispinosus</i> (Hook) R. A. Dyer	Zamiaceae	Cica; Encefalartos	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	7-11	Micro.	Árvore	Z9	E30(21)
<i>Encephalartos altensteinii</i> Lehm. x <i>E. villosus</i> Lem.	Zamiaceae	Cica; Encefalartos	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	6-11	Micro.	Árvore	Z9	E30(8)
<i>Encephalartos arenarius</i> R. A. Dyer.	Zamiaceae	Cica; Encefalartos	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	7-11	Nano.	Árvore	Z9	E30(25)
<i>Encephalartos arenarius</i> R. A. Dyer. x <i>E. horridus</i> (Jacq.) Lehm.	Zamiaceae	Cica; Encefalartos	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu**	Nano.	Árvore	Z9	E30(1)
<i>Encephalartos arenarius</i> R. A. Dyer. x <i>E. trispinosus</i> (Hook) R. A. Dyer	Zamiaceae	Cica; Encefalartos	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	7-11	Nano.	Árvore	Z9	E30(15)
<i>Encephalartos arenarius</i> R. A. Dyer. x <i>E. lehmannii</i> Lehm.	Zamiaceae	Cica; Encefalartos	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu**	Nano.	Árvore	Z9	E30(6)
<i>Encephalartos caffer</i> (Thunb.) Lehm.	Zamiaceae	Cica; Encefalartos	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu**	Caméfito	Arbusto	Z9	E30(5)
<i>Encephalartos chimanimaniensis</i> R. A. Dyer & Verd.	Zamiaceae	Cica; Encefalartos	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu**	Nano.	Árvore	Z9	E30(1)
<i>Encephalartos cupidus</i> R. A. Dyer	Zamiaceae	Cica; Encefalartos	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu**	Caméfito	Arbusto	Z9	E30(4)
<i>Encephalartos cycadifolius</i> (Jacq.) Lehm.	Zamiaceae	Cica; Encefalartos	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	4-9	Nano.	Arbusto	Z9	E30(15)
<i>Encephalartos dolomiticus</i> Lavrano & Goode	Zamiaceae	Cica; Encefalartos	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu**	Nano.	Árvore	Z9	E30(1)
<i>Encephalartos dyerianus</i> Lavrano & Goode	Zamiaceae	Cica; Encefalartos	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	6-11	Micro.	Árvore	Z9	E30(1)
<i>Encephalartos eugene-maraisii</i> I. Verd.	Zamiaceae	Cica; Encefalartos	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	6-11	Micro.	Árvore	Z9	E30(6)
<i>Encephalartos ferox</i> G. Bertol.	Zamiaceae	Cica; Encefalartos	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu**	Nano.	Arbusto	Z9	E30(8)
<i>Encephalartos ferox</i> G. Bertol. x <i>E. natalensis</i> R. A. Dyer & Verd.	Zamiaceae	Cica; Encefalartos	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu**	Micro.	Árvore	Z9	E30(1)
<i>Encephalartos friderici-guilielmii</i> Lhem.	Zamiaceae	Cica; Encefalartos	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	5-10	Micro.	Árvore	Z9	E30(16)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Encephalartos ghellinckii</i> Lem.	Zamiaceae	Cica; Encefalartos	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu**	Micro.	Árvore	Z9	E30(12)
<i>Encephalartos heenanii</i> R. A. Dyer	Zamiaceae	Cica; Encefalartos	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu**	Micro.	Árvore	Z9	E30(2)
<i>Encephalartos horridus</i> (Jacq.) Lehm.	Zamiaceae	Cica; Encefalartos	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	5-10	Nano.	Árvore	Z9	E30(20)
<i>Encephalartos horridus</i> (Jacq.) Lehm. x <i>E. lehmannii</i> Lehm.	Zamiaceae	Cica; Encefalartos	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	5-10	Nano.	Árvore	Z9	E5(2), E30(10)
<i>Encephalartos horridus</i> (Jacq.) Lehm. x <i>E. longifolius</i> (Jacq.) Lehm.	Zamiaceae	Cica; Encefalartos	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	5-10	Nano.	Árvore	Z9	E30(3)
<i>Encephalartos inopinus</i> R. A. Dyer	Zamiaceae	Cica; Encefalartos	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu**	Micro.	Árvore	Z9	E30(5)
<i>Encephalartos laevifolius</i> Stapf & Burtt-Davy	Zamiaceae	Cica; Encefalartos	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu**	Micro.	Árvore	Z9	E30(5)
<i>Encephalartos lanatus</i> Stapf & Burtt-Davy	Zamiaceae	Cica; Encefalartos	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	5-10	Nano.	Árvore	Z9	E30(3)
<i>Encephalartos latifrons</i> Lehm.	Zamiaceae	Cica; Encefalartos	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	5-11	Micro.	Árvore	Z9	E30(34)
<i>Encephalartos latifrons</i> Lehm. x <i>E. longifolius</i> (Jacq.) Lehm.	Zamiaceae	Cica; Encefalartos	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu**	Micro.	Árvore	Z9	E30(1)
<i>Encephalartos latifrons</i> Lehm. x <i>E. trispinosus</i> (Hook) R. A. Dyer	Zamiaceae	Cica; Encefalartos	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	5-10	Micro.	Árvore	Z9	E30(1)
<i>Encephalartos lebomboensis</i> I. Verd.	Zamiaceae	Cica; Encefalartos	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	5-10	Micro.	Árvore	Z9	E30(17)
<i>Encephalartos lehmannii</i> Lehm.	Zamiaceae	Cica; Encefalartos	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	5-11	Nano.	Árvore	Z9	E12(1), E19(1), E25(2), E26(1), E29(2), E30(46)
<i>Encephalartos lehmannii</i> Lehm. X <i>E. longifolius</i> (Jacq.) Lehm.	Zamiaceae	Cica; Encefalartos	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu**	Micro.	Árvore	Z9	E30(9)
<i>Encephalartos lehmannii</i> Lehm. x <i>E. trispinosus</i> (Hook) R. A. Dyer	Zamiaceae	Cica; Encefalartos	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu**	Nano.	Árvore	Z9	E30(3)
<i>Encephalartos longifolius</i> (Jacq.) Lehm.	Zamiaceae	Cica; Encefalartos	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	5-10	Micro.	Árvore	Z9	E30(24)
<i>Encephalartos longifolius</i> (Jacq.) Lehm. x <i>E. trispinosus</i> (Hook) R. A. Dyer	Zamiaceae	Cica; Encefalartos	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu**	Micro.	Árvore	Z9	E30(1)
<i>Encephalartos manikensis</i> (Gilliland) Gilliland	Zamiaceae	Cica; Encefalartos	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	5-11	Nano.	Árvore	Z9	E30(11)
<i>Encephalartos middelburgensis</i> Robertse, Vorster & Van der Westhuizen	Zamiaceae	Cica; Encefalartos	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu**	Micro.	Árvore	Z9	E30(3)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Encephalartos murchii</i> R. A. Dyer & I. Verd.	Zamiaceae	Cica; Encefalartos	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu**	Nano.	Árvore	Z9	E30(5)
<i>Encephalartos natalensis</i> R. A. Dyer & Verd.	Zamiaceae	Cica; Encefalartos	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	6-11	Micro.	Árvore	Z9	E30(29)
<i>Encephalartos ngoyanus</i> I. Verd.	Zamiaceae	Cica; Encefalartos	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	6-11	Hemi.	Arbusto	Z9	E30(6)
<i>Encephalartos paucidentatus</i> Stapf & Burtt Davy	Zamiaceae	Cica; Encefalartos	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu**	Micro.	Árvore	Z9	E30(4)
<i>Encephalartos princeps</i> R. A. Dyer	Zamiaceae	Cica; Encefalartos	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	6-11	Micro.	Árvore	Z9	E30(29)
<i>Encephalartos senticosus</i> Vorster	Zamiaceae	Cica; Encefalartos	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	5-10	Micro.	Árvore	Z9	E30(9)
<i>Encephalartos transvenosus</i> Stapf & Burtt Davy.	Zamiaceae	Cica; Encefalartos	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	5-11	Micro.	Árvore	Z9	E5(4), E18(3), E19(1), E21(5), E22(1), E30(7), E32(2)
<i>Encephalartos trispinosus</i> (Hook) R. A. Dyer	Zamiaceae	Cica; Encefalartos	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	5-11	Nano.	Árvore	Z9	E30(55)
<i>Encephalartos umbeluziensis</i> R. A. Dyer	Zamiaceae	Cica; Encefalartos	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu**	Hemi.	Arbusto	Z9	E30(3)
<i>Encephalartos villosus</i> Lem.	Zamiaceae	Cica; Encefalartos	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	4-11	Hemi.	Arbusto	Z9	E5(2), E30(12)
<i>Encephalartos woodii</i> Sander x <i>E. natalensis</i> R. A. Dyer & Verd.	Zamiaceae	Cica; Encefalartos	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	5-11	Micro.	Árvore	Z9	E30(4)
<i>Ensete ventricosum</i> (Welw.) E.E. Cheesm.	Musaceae	Bananeira-da-abissínia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Terófito	Herbácea	Z10	E5(3), E11(1), E12(1), E13(1), E18(4), E19(1), E26(7)
<i>Enterolobium cyclocarpa</i> (Jacq.) Griseb.	Leguminosae (Mimosoidae)	Enterolóbio; Orelha-de-elefante	Neotropical	Caducifólio	5-1	7-8	Meso.	Árvore	Z11	E7(1), E29(1)
<i>Ephedra fragilis</i> Desf.	Ephedraceae	Efédra	Paleártico	Caducifólio	10-3	6-7	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z8	E12(1)
<i>Epidendrum falcatum</i> Lindley	Orchidaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	E5(1)
<i>Epidendrum ibaguense</i> HBK	Orchidaceae	Orquídea-de-cruz	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	E5 (grupo), E12(1), E19, E25(grupo), E30(1), E31(3)
<i>Epilobium obscurum</i> Schreber	Onagraceae		Paleártico	Sazonal	6-11	7-9	Terófito	Herbácea	Z6	E26(grupo)
<i>Epiphyllum crenatum</i> (Lindl.) G. Don ex Loud.	Cactaceae	Cacto-orquídea	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-7	Epífita	Herbácea suculenta	Z10	E12(grupo)
<i>Epiphyllum laui</i> M. Kimmach	Cactaceae	Cacto-orquídea	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-7	Epífita	Herbácea suculenta	Z10	E31(grupo)
<i>Epipremnum aureum</i> (Lind. & André)	Araceae		Oceânia	Perenifólio	1-12	6-8	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z10	E3(1), E5(11), E8(2), E10(grupo), E12(grupo), E18(2), E19(1), E25(1), E30(10), E33(1)
<i>Eranthemum pulchellum</i> André	Acanthaceae	Salva-azul	Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	E12(3), E19(1), E31(4)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Erica arborea</i> L.	Ericaceae	Urze-arbórea; Urze-molar; Betouro	Paleártico	Perenifólio	1-12	12-4	Micro.	Arbusto	Z8	E10(1), E19(grupo), E28(2), E30(74)
<i>Erica australis</i> L.	Ericaceae	Urze-espanhola	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-7	Nano.	Arbusto	Z9	E30(grupo)
<i>Erica carnea</i> L.	Ericaceae	Urze-de-inverno	Paleártico	Perenifólio	1-12	11-2	Nano.	Arbusto	Z5	E22, E30(grupo)
<i>Erica ciliaris</i> L.	Ericaceae	Urze	Paleártico	Perenifólio	1-12	7-10	Nano.	Arbusto	Z7	E26, E30(grupo)
<i>Erica cinerea</i> L.	Ericaceae	Urze-das- camapainhas	Paleártico	Perenifólio	1-12	6-8	Nano.	Arbusto	Z5	E30(grupo)
<i>Erica erigena</i> R. Ross.	Ericaceae	Urze-irlandesa	Paleártico	Perenifólio	1-12	12-3	Nano.	Arbusto	Z7	E30(grupo)
<i>Erica lusitanica</i> Rudolphi.	Ericaceae	Urze-portuguesa	Paleártico	Perenifólio	1-12	12-4	Micro.	Arbusto	Z8	E30(grupo)
<i>Erica platycodon</i> (Webb & Berthel.) Rivas Mart. & al. ssp. <i>madericola</i> (D. C. McClint.) Rivas Mart. & al.	Ericaceae	Urze-das- vassouras; Urze-durázia	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-6	Micro.	Arbusto	Z10	E14(7), E19(grupo), E22(15), E26(1), E28(4), E30 (27)
<i>Erica tetralix</i> L.	Ericaceae	Urze	Paleártico	Perenifólio	1-12	6-10	Caméfito	Arbusto	Z3	E30(grupo)
<i>Erica vagans</i> L.	Ericaceae	Urze	Paleártico	Perenifólio	1-12	6-10	Nano.	Arbusto	Z5	E30(grupo)
<i>Erica x darleyensis</i> Bean.	Ericaceae	Urze	Hortícola	Perenifólio	1-12	12-4	Nano.	Arbusto	Z6	E30(grupo)
<i>Erigeron karvinskianus</i> DC.	Compositae	Floricos; Intrometidas; Margaridas	Neotropical	Perenifólio	1-12	3-11	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z7	E10, E22, E26, E30, E31 (grupo)
<i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl.	Rosaceae	Nespereira	Paleártico	Perenifólio	1-12	10-12	Micro.	Árvore	Z8	E3(2), E5(6), E6(5), E10(8), E12(1), E13(6), E17(2), E20(1), E21(2), E22(2), E23(14), E24(1), E26(6), E27(2), E28(1), E29(3), E31(5), E32(1)
<i>Eriocephalus africanus</i> L.	Compositae	Alecrim-de-nossa- senhora	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-1	Nano.	Arbusto	Z9	E12(1), E19, E22 (grupo), E27(2)
<i>Erysimum bicolor</i> (Homem.) DC.	Cruciferae	Goivo-da-serra	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-5	Nano.	Arbusto	Z10	E22(2), E25(1), E28(3), E30(16)
<i>Erythrina abyssinica</i> Lam. ex DC.	Leguminosae (Papilionoideae)	Coralina-da- abissínia	Áfricotropical	Caducifólio	5-1	1-6; 9-10	Micro.	Árvore	Z10	E4(1), E7(1), E9(2), E13(1), E16(1), E19(3), E21(10), E23(3), E27(3), E30(1), E31(1)
<i>Erythrina americana</i> Mill.	Leguminosae (Papilionoideae)	Coralina	Neártico	Caducifólio	4-12	1-3	Micro.	Árvore	Z9	E16(1)
<i>Erythrina atitlanensis</i> Krukoff & Barneby	Leguminosae (Papilionoideae)	Coralina	Neotropical	Marcescente	3-2 (12-2)	12-2	Micro.	Árvore	Z10	E19(2)
<i>Erythrina caffra</i> Thunb.	Leguminosae (Papilionoideae)	Coralina	Africotropical	Caducifólio	4-11	1-5	Micro.	Árvore	Z9	E5(1), E31(2)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLOGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Erythrina crista-galli</i> L.	Leguminosae (Papilionoideae)	Coraleira; Coralina-crista-de-galo	Neotropical	Marcescente	4-3 (12-3)	4-1	Micro.	Árvore	Z8	E4(3), E9(20), E10(3), E11(6), E12(1), E13(1), E14(8), E19(5), E20(2), E21(1), E23(2), E24(6), E26(1), E29(3), E31(6), E32(2), E33(2)
<i>Erythrina falcata</i> Lour.	Leguminosae (Papilionoideae)	Coralina-falcata	Neotropical	Marcescente	6-5 (1-5)	2-6	Micro.	Árvore	Z10	E19(2)
<i>Erythrina livingstoniana</i> Bak.	Leguminosae (Papilionoideae)	Coralina	Áfricotropical	Caducifólio	4-12	3-5	Micro.	Árvore	Z10	E8(2)
<i>Erythrina lysistemon</i> Hutch.	Leguminosae (Papilionoideae)	Coralina	Áfricotropical	Marcescente	5-4 (12-4)	12-4; 7	Micro.	Árvore	Z10	E4(1), E5(3), E7(2), E8(3), E9(1), E10(1), E11(2), E12(3), E13(4), E18(1), E19(2), E20(1), E21(2), E24(1), E25(1), E26(1), E31(1)
<i>Erythrina speciosa</i> Andrews	Leguminosae (Papilionoideae)	Coralina-elegante	Neotropical	Caducifólio	4-11	12-4	Micro.	Árvore	Z10	E4(1), E7(2), E9(2), E11(2), E18(2), E19(5), E20(2), E21(7), E23(3), E32(2)
<i>Escallonia bifida</i> Link & Otto	Grossulariaceae	Escalónia	Neotropical	Perenifólio	1-12	3-1	Micro.	Arbusto	Z9	E6(1), E9(2), E19(2), E20(3), E23(6), E27(3), E31(1)
<i>Escallonia rosea</i> Griseb.	Grossulariaceae	Escalónia-cor-rosa	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-1	Micro.	Arbusto	Z9	E10(2), E19(1)
<i>Eschscholzia californica</i> Cham.	Papaveraceae	Papoila-da-califórnia	Neártico	Sazonal	3-6	3-6	Terófito	Herbácea	Z6	E26, E28 (grupo)
<i>Etlingera elatior</i> (Jack) Rosemary M. Sm.	Zingiberaceae	Bastão-do-imperador; Rosa-de-porcelana	Indomalaio	Perenifólio	1-12	2-10	Hemi.	Herbácea	Z12	E5, E19(grupo),
<i>Eucalyptus calophylla</i> R. Br. ex Lindl.	Myrtaceae	Eucalipto	Australiano	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Árvore	Z10	E10(1)
<i>Eucalyptus camaldulensis</i> Dehnh.	Myrtaceae	Eucalipto	Australiano	Perenifólio	1-12	9-11	Meso.	Árvore	Z9	E19(1)
<i>Eucalyptus citriodora</i> Hook.	Myrtaceae	Eucalipto-limão	Australiano	Perenifólio	1-12	12-1	Meso.	Árvore	Z10	E21(1), E27(1), E31(1)
<i>Eucalyptus creba</i> F. J. Muell.	Myrtaceae	Eucalipto	Australiano	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Meso.	Árvore	Z9	E11(1)
<i>Eucalyptus ficifolia</i> F. Muell.	Myrtaceae	Eucalipto-vermelho	Australiano	Perenifólio	1-12	1-12	Meso.	Árvore	Z9	E6(5), E7(3), E10(2), E11(1), E14(1), E19(2), E20(1), E26(20), E31(3)
<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.	Myrtaceae	Eucalipto	Australiano	Perenifólio	1-12	11-4	Meso.	Árvore	Z8	E5(6), E11(1), E22(3) E23(1), E26(1), E30(1), E31(2), E33(1)
<i>Eucalyptus gunni</i> Hook.	Myrtaceae	Eucalipto	Australiano	Perenifólio	1-12	11-2	Micro.	Árvore	Z8	E12(1), E19(1), E26(3)
<i>Eucalyptus kruseana</i> F. Mueller	Myrtaceae	Eucalipto	Australiano	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	E10(1)
<i>Eucalyptus orbifolia</i> F. Muell.	Myrtaceae	Eucalipto-de-folha-redonda	Australianao	Perenifólio	1-12	7-1	Micro.	Árvore	Z10	E19(3)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Eucalyptus pruinosa</i> Schaner	Myrtaceae	Eucalipto	Australiano	Perenifólio	1-12	11-1	Micro.	Árvore	Z9	E19(1)
<i>Eucalyptus pyriformis</i> Turcz.	Myrtaceae	Eucalipto	Australiano	Perenifólio	1-12	11-2	Micro.	Árvore	Z9	E5(1)
<i>Eucalyptus robusta</i> Sm.	Myrtaceae	Eucalipto	Australiano	Perenifólio	1-12	1-2	Meso.	Árvore	Z9	E26(2), E28(1)
<i>Eucalyptus sideroxylon</i> A. Cunn. ex Wools	Myrtaceae	Eucalipto	Australiano	Perenifólio	1-12	8-9	Meso.	Árvore	Z9	E6(3), E14(1), E21(1), E26(1)
<i>Eucomis bicolor</i> Bak.	Liliaceae (Hyacinthaceae)	Flor-ananás	Áfricotropical	Sazonal	6-10	7-8	Geófito	Herbácea	Z8	E26(grupo), E31(3)
<i>Eucomis comosa</i> (Houtt.) Wehrh.	Liliaceae (Hyacinthaceae)	Flor-ananás	Áfricotropical	Sazonal	6-10	7-8	Geófito	Herbácea	Z8	E19(2), E26(grupo)
<i>Eugenia brasiliensis</i> Lam.	Myrtaceae	Cereja-do-brasil	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-5	Micro.	Árvore	Z10	E18(1)
<i>Eugenia uniflora</i> L.	Myrtaceae	Pitangueira	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Árvore	Z10	E3(grupo), E5(12), E6(3), E7(5), E9(2), E10(6), E12(6), E13(16), E16(1), E17(2), E18(1), E19(4), E21(10), E23(7), E24(4), E25(3), E27(7), E29(17), E31(13), E32(5), E33(2)
<i>Euonymus fortunei</i> (Turcz) Hand –Mazz	Celastraceae	Verdegaio	Paleártico	Perenifólio	1-12	7-8	Micro.	Arbusto	Z5	E19(1)
<i>Euonymus japonicus</i> Thunb.	Celastraceae	Verdegaio	Paleártico	Perenifólio	1-12	7-8; 11-12	Micro.	Arbusto	Z7	E1(1), E2(1), E3(1), E8(2), E11(12), E22(14), E26(1), E28(3), E30(grupo)
<i>Euphorbia canariensis</i> L.	Euphorbiaceae	Eufórbia-das-canárias	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-8	Micro.	Arbusto suculento	Z11	E5(3), E13(2), E19(5), E31(grupo)
<i>Euphorbia candelabrum</i> Kotschy	Euphorbiaceae		Áfricotropical	Perenifólio	1-12	12-2	Micro.	Arbusto suculento	Z9	E4(1), E19(5)
<i>Euphorbia cotinifolia</i> L.	Euphorbiaceae	Eufórbia	Neotropical	Caducifólio	3-12	6-11	Micro.	Árvore	Z11	E4(3), E6(9), E8(3), E10(5), E11(5), E12(3), E13(19), E19(4), E24(5), E29(2), E32(1), E33(3)
<i>Euphorbia echinus</i> Hook. f. & Coss.	Euphorbiaceae	Eufórbia	Paleártico	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Nano.	Arbusto suculento	Z8	E24(1)
<i>Euphorbia grandicornis</i> Goebel.	Euphorbiaceae	Eufórbia-grande-cornuda	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	12-2	Nano.	Arbusto suculento	Z9	E4(1), E5(1), E19(grupo), E21(1), E23(2), E24(1), E32(2), E33(grupo)
<i>Euphorbia grandidentata</i> Haw.	Euphorbiaceae	Eufórbia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Micro.	Arbusto	Z8	E12(1)
<i>Euphorbia ingens</i> E. Mey.	Euphorbiaceae	Eufórbia-gigante	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	10-12	Micro.	Arbusto suculento	Z9	E7(2), E9(4), E10(1), E11(3), E12(6), E13(4), E19(1), E21(3), E23(2), E29(1), E32(4), E33(6)
<i>Euphorbia lathyris</i> L.	Euphorbiaceae	Eufórbia	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-6	Nano.	Herbácea	Z6	E26(2)
<i>Euphorbia leucocephala</i> Lotsy.	Euphorbiaceae	Eufórbia-branca	Neotropical	Caducifólio	7-4	11-12	Nano.	Arbusto	Z9	E8(1), E31(4)
<i>Euphorbia marginata</i> Pursh.	Euphorbiaceae		Neártico	Sazonal	5-9	6-7	Terófito	Herbácea	Z4	E26(grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Euphorbia mellifera</i> Ait.	Euphorbiaceae	Alindres; Figueira-do- inferno	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-5	Micro.	Arbusto	Z10	E22(1), E26(6), E28(1), E30(25)
<i>Euphorbia milli</i> Desmoul.	Euphorbiaceae	Mira-mira-não- me-toques	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	E4(1), E5(1), E8, E10, E12, E14(grupo), E19(1), E21(2), E24(2), E26(5), E32(7), E33(3)
<i>Euphorbia milli</i> Desmoul. var. <i>breonii</i> (Nois.) Ursch & Leandri.	Euphorbiaceae	Mira-mira-não- me-toques	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	E30(2)
<i>Euphorbia nerifolia</i> L.	Euphorbiaceae	Eufórbia	Indomalaio; Oceânia	Perenifólio	1-12	3-7	Micro.	Arbusto suculento	Z10	E10(1), E12(2), E13(7), E18(2), E19(4), E21(6), E23(6), E33(3)
<i>Euphorbia piscatoria</i> Ait.	Euphorbiaceae	Figueira-do- inferno	Paleártico	Caducifólio	9-6	4-6	Micro.	Arbusto suculento	Z10	E5(1), E10(1), E19(grupo), E22(3), E23(grupo), E25(1), E30(32), E32(1)
<i>Euphorbia pulcherrima</i> Willd. ex Klotzsch.	Euphorbiaceae	Manhã-de-páscoa	Neotropical	Caducifólio	5-2	10-3	Micro.	Arbusto	Z10	E2(309), E3(grupo), E4(17), E5(grupo), E6(17), E7(2), E8(grupo), E9(2), E10(2), E13(grupo), E17(19), E19(17), E20(13), E21(39), E22(2), E23(5), E24(13), E25(7), E26(6), E27(12), E28(6), E29(10), E30(1), E31(grupo), E33(5)
<i>Euphorbia tirucalli</i> L.	Euphorbiaceae	Eufórbia	Áfricotropical; Indomalaio	Perenifólio	1-12	4-9	Micro.	Arbusto suculento	Z10	E2(1), E5(5), E6(1), E8(grupo), E12(2), E13(grupo), E21(3), E23(3), E29(1), E31(1)
<i>Euphorbia trigona</i> Mill.	Euphorbiaceae	Eufórbia	Africotropical	Perenifólio	1-12	6-8	Micro.	Arbusto suculento	Z10	E4(1), E5(6), E8(1), E9(1), E10(4), E12(3), E13(2), E14(10), E19(4), E32(2), E33(2)
<i>Euryops chrysanthemoides</i> (DC.) R. Nordenstam	Compositae	Estrela-amarela	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z9	E6(4), E8(grupo), E10(2), E19, E27 (grupo), E32(11)
<i>Euryops pectinatus</i> Cass.	Compositae	Estrela-amarela	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z9	E1(6), E4(4), E5(grupo), E10(grupo), E19(7), E22(4), E26(7), E27(5), E28(grupo), E30(2)
<i>Evolvulus pilosus</i> Nutt.	Convolvulaceae		Neártico	Perenifólio	1-12	1-12	Caméfito	Herbácea	Z7	E12(grupo)
<i>Exochorda giraldii</i> Hesse.	Rosaceae	Exocorda	Paleártico	Caducifólio	2 – 11	2 – 5	Micro.	Arbusto	Z6	E26(1)
<i>Fabiana imbricata</i> Ruiz & Pav.	Solanaceae	Fabiana	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-9	Nano	Arbusto	Z8	E10(grupo)
<i>Fagus sylvatica</i> L.	Fagaceae	Faia-europeia	Paleártico	Caducifólio	4-12	4-5	Meso.	Árvore	Z5	E6(5), E9(1), E22(9), E25(1), E26(5), E28(4), E30(17)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Fagus sylvatica</i> L. var. <i>purpurea</i> (Ait.) Schneid.	Fagaceae	Faia-europeia-de-folha-vermelha	Paleártico	Caducifólio	4-12	4-5	Meso.	Árvore	Z5	E22(17), E26(4), E28(5), E30(5)
<i>Farfugium japonicum</i> (L.) Kitam.	Compositae	Patás-de-cavalo; Boinas	Paleártico	Perenifólio	1-12	6-3	Hemi.	Herbácea	Z7	E2, E3, E4, E5, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E16, E19, E20, E22, E24, E26, E27, E28, E30, E32 (grupo)
<i>Fascicularia pitcairniifolia</i> (hort. Berlin ex Verl.) Mez.	Bromeliaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Hemi.	Herbácea	Z8	E12(grupo)
<i>Fatsia japonica</i> (Thunb.) Decne. & Planch.	Araliaceae	Fátsia; Arália	Paleártico	Perenifólio	1-12	11-12	Micro.	Arbusto	Z8	E11(2), E19(1)
<i>Faucaria albidens</i> N.E. Br.	Aizoaceae		Áfricotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Hemi.	Herbácea suculenta	Z9	E12(3)
<i>Faucaria felina</i> (Weston) Schwantes ex Jacobsen	Aizoaceae		Áfricotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Hemi.	Herbácea suculenta	Z9	E12(3)
<i>Faucaria tigrina</i> (Haw.) Schwantes	Aizoaceae		Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea suculenta	Z9	E12(3)
<i>Faucaria tuberculosa</i> (Rolfe) Schwantes	Aizoaceae		Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea suculenta	Z9	E12(3)
<i>Felicia amelloides</i> (L.) Voss.	Compositae	Felícia; Margarida-azul	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z9	E5, E6, E10, E15, E16, E17, E19, E21, E23, E26, E28, E29, E32 (grupo)
<i>Felicia fruticosa</i> (L.) Nichols.	Compositae	Felicia	Áfricotropical	Perenifólio	1 – 12	3-7	Nano.	Arbusto	Z9	E26(grupo)
<i>Felicia heterophylla</i> (Cass.) Grau.	Compositae	Felícia; Margarida-azul	Áfricotropical	Sazonal	3-6	4-6	Terófito	Herbácea	Z9	E26(grupo)
<i>Fernandoa magnifica</i> Seem.	Bignoniaceae	Fernandoa	Áfricotropical	Marcescente	6-5 (1-5)	12-6	Micro.	Árvore	Z10	E18(1)
<i>Ferocactus chrysacanthus</i> (Orcutt) Britt. & Rose	Cactaceae	Ferocacto	Neotropical	Perenifólio	1-12	3-4	Caméfito	Herbácea suculenta	Z10	E5(grupo)
<i>Ferocactus gracilis</i> H.E. Gates ssp. <i>coloratus</i> (Gates) N. P. Taylor	Cactaceae		Neártico	Perenifólio	1-12	3-4	Caméfito	Herbácea suculenta	Z10	E12(1)
<i>Ferocactus latispinus</i> (Haw.) Britt. & Rose	Cactaceae	Ferocacto	Neotropical	Perenifólio	1-12	3-4	Caméfito	Herbácea suculenta	Z10	E5(1)
<i>Ferraria crispa</i> Burm.	Iridaceae	Ferraria	Neotropical	Sazonal	2-5	3-4	Geófito	Herbácea	Z9	E26(grupo)
<i>Festuca donax</i> Lowe	Gramineae (Poaceae)	Palha-carga	Paleártico	Perenifólio	1-12	6-7	Hemi.	Herbácea	Z10	E30(grupo)
<i>Festuca elatior</i> L.	Gramineae	Relva; Grama	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z5	E4, E14, E15, E28 (tapete)
<i>Festuca glauca</i> Vill.	Gramineae	Festuca	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-6	Hemi.	Herbácea	Z3	E8, E11, E12, E19, E21, E23, E27 (grupo)
<i>Ficus aspera</i> Forst. f.	Moraceae	Figueira-palhaço	Oceânia	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Árvore	Z11	E19(1), E24(1), E25(2), E32(1)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Ficus benjamina</i> L.	Moraceae	Figueira-da-india	Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-4	Micro.	Árvore	Z11	E3(1), E6(3), E8(grupo), E9(1), E10(grupo), E11(3), E12(4), E13(11), E19(1), E30(3)
<i>Ficus benjamina</i> L. var. <i>nuda</i> (Miq.) Barrett	Moraceae	Figueira-da-india	Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-4	Meso.	Árvore	Z11	E5(1), E7(2), E9(12), E11(6), E12(3), E13(8), E14(2), E15(4), E21(4), E23(3), E25(1), E29(2), E32(5)
<i>Ficus binnendykii</i> (Miq.) Miq.	Moraceae	Figueira-de-folha-estreita	Indomalaio	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Micro.	Árvore	Z11	E5(1), E8(2), E10(1), E19(1)
<i>Ficus carica</i> L.	Moraceae	Figueira	Paleártico	Caducifólio	4-12	6-7	Micro.	Árvore	Z8	E3(3), E5(1), E12(1), E13(2), E19(1), E20(2), E21(3), E22(2), E23(16), E29(2), E31(16)
<i>Ficus deltoidea</i> Jack	Moraceae		Indomalaio	Perenifólio	1-12	5-8	Micro.	Árvore	Z11	E8(1)
<i>Ficus elastica</i> Roxb. ex Homem	Moraceae	Borracheira	Indomalaio	Perenifólio	1-12	5-8	Micro.	Árvore	Z11	E5(1), E7(1), E9(1), E10(4), E12(4), E13(8), E15(2), E19(2), E20(2), E21(2), E23(3), E24(1), E25(1), E27(1), E28(1)
<i>Ficus lyrata</i> Warb.	Moraceae		Áfricotropical	Perenifólio	1-12	4-6	Micro.	Árvore	Z11	E5(1), E10(2), E13(3), E19(1), E23(3)
<i>Ficus microcarpa</i> L. f.	Moraceae	Figueira-da-india	Indomalaio	Perenifólio	1-12	3-12	Meso.	Árvore	Z11	E6(1), E16(1), E18(1)
<i>Ficus natalensis</i> Hochst. ssp. <i>lepreurii</i> (Miq.) C. Berg.	Moraceae		Áfricotropical	Perenifólio	1-12	4-6	Micro.	Árvore	Z10	E10(1)
<i>Ficus pumila</i> L.	Moraceae	Pastinha	Indomalaio; Paleártico	Perenifólio	1-12	10-12	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z8	E2, E3, E5, E9, E10 E11, E12, E13, E18, E19, E21, E22, E25, E27, E29, E30, E31 (grupo)
<i>Ficus rubiginosa</i> Desf. ex Vent.	Moraceae		Australiano	Perenifólio	1-12	1-4	Micro.	Árvore	Z10	E5(1), E10(2), E14(3)
<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	Umbelliferae	Funcho	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-8	Hemi.	Herbácea	Z5	E5, E10, E11, E12, E23, E32 (grupo)
<i>Fragaria vesca</i> L.	Rosaceae	Morangueiro-selvagem	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-4	Hemi.	Herbácea trepadora	Z4	E22, E30(mancha)
<i>Frangula azorica</i> V. Grubow	Rhamnaceae	Ginjeira-brava; Tintureira	Paleártico	Caducifólio	2-10	5-7	Micro.	Árvore	Z9	E14(3), E19(2), E28(2)
<i>Fraxinus americana</i> L.	Oleaceae	Freixo-americano	Neártico	Caducifólio	5-11	3-4	Meso.	Árvore	Z4	E31(1)
<i>Fraxinus angustifolia</i> Vahl. ssp. <i>syriaca</i> (Boiss.) Yaltirik.	Oleaceae	Freixo	Paleártico	Caducifólio	3-11	2-3	Meso.	Árvore	Z6	E31(2)
<i>Fraxinus excelsior</i> L.	Oleaceae	Freixo	Paleártico	Caducifólio	2-11	1-2	Micro.	Árvore	Z4	E22(1), E27(2), E30(1)
<i>Fraxinus omus</i> L.	Oleaceae	Freixo	Paleártico	Caducifólio	4-1	4-5	Micro.	Árvore	Z6	E26(2), E28(1)
<i>Freesia alba</i> (G. L. Mey.) Gumb.	Iridaceae	Frísia	Áfricotropical	Sazonal	12-4	12-4	Geófita	Herbácea	Z9	E6, E26, E28, E30, E31 (grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Freylinia lanceolata</i> (L. f.) G. Don.	Scrophularia-ceae	Campainhas-de-mel	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	E10(1)
<i>Fuchsia arborescens</i> Sims.	Onagraceae	Fúcsia-arbórea	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z9	E10(1), E13(1), E22(103), E26(1), E30(8), E31(2)
<i>Fuchsia boliviana</i> Carr.	Onagraceae	Mimos; Brincos-de-princesa	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	E22(136), E26(12), E30(grupo), E31(5), E32(9)
<i>Fuchsia magellanica</i> Lam.	Onagraceae	Brincos-de-princesa; Mimos	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z7	E10(grupo), E12(1), E22, E26, E28, E32 (grupo)
<i>Fuchsia triphylla</i> L.	Onagraceae	Brincos-de-princesa; Mimos	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z11	E10, E19, E22, E24, E26 (grupo), E29(4), E30, E31(grupo), E32(7)
<i>Furcraea bedinghausii</i> K. Koch.	Agavaceae	Piteira; Furcreia	Neotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Nano.	Árvore suculenta	Z10	E10(grupo), E26(3), E30(1)
<i>Furcraea foetida</i> (L.) Haw.	Agavaceae	Furcreia	Neotropical	Perenifólio	1-12	9-12	Hemi.	Herbácea suculenta	Z10	E5(2), E9(2), E10(1), E12(8), E19(2), E23, E31(grupo)
<i>Furcraea selloa</i> K. Koch. var. <i>marginata</i> Trel.	Agavaceae	Furcreia; Piteira	Neotropical	Perenifólio	1-12	8-12	Micro.	Árvore suculenta	Z10	E8(2), E10(4), E12(17), E19(2), E21(12), E23(12), E24(1), E26(1), E29(1), E32(2)
<i>Galactites tomentosa</i> Moench.	Compositae	Cardo; Galactite	Paleártico	Sazonal	2-5	2-6	Terófito	Herbácea	Z9	E23, E26, E28(grupo)
<i>Garcinia xanthochymus</i> Hook. f. ex Anderson	Guttiferae	Garcinia; Mangostão	Indomalaio	Perenifólio	1-12	6-7	Micro.	Árvore	Z11	E18(1), E19(1)
<i>Gardenia augusta</i> (L.) Merrill	Rubiaceae	Gardénia	Paleártico; Indomalaio	Perenifólio	1-12	6-8	Nano.	Arbusto	Z10	E6(1), E8(grupo), E12(12), E26(1)
<i>Gasteria bicolor</i> Haw	Liliaceae (Aloeaceae)	Gastéria	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	5-6	Hemi.	Herbácea suculenta	Z9	E32(1)
<i>Gasteria carinata</i> (Mill.) Duval var. <i>verrucosa</i> (Mill.) Van Jarrtsv.	Liliaceae (Aloeaceae)	Gastéria	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	4-5	Hemi.	Herbácea suculenta	Z9	E25(6)
<i>Gasteria pillansii</i> Kensit.	Liliaceae (Aloeaceae)	Gastéria	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	4-7	Hemi.	Herbácea suculenta	Z9	E10(3), E24(2), E31(grupo), E33(5)
<i>Gaura lindheimeri</i> Engelm. & Gray.	Onagraceae		Neártico	Perenifólio	1-12	6-8	Hemi.	Herbácea	Z5	E12(grupo)
<i>Gazania rigens</i> (L.) Gaertn..	Compositae	Gazania	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z9	E1, E2, E3, E5, E6, E9, E10, E11, E14, E17, E19, E21, E23, E27, E29 (grupo)
<i>Genista tenera</i> (Jacq. Ex Murr.) O. Kuntze	Leguminosae (Papilionoideae)	Piomo	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-7	Nano.	Arbusto	Z10	E19(3), E30(1)
<i>Gennaria diphylla</i> (Link) Parl.	Orchidaceae	Genária	Paleártico	Sazonal	12-5	1-4	Geófito	Herbácea	Z10	E26(grupo)
<i>Geranium maderense</i> P. F. Yeo	Geraniaceae	Gerânio-da-madeira	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-6	Nano.	Herbácea	Z10	E5(grupo), E22(grupo), E25(3), E26(4), E27, E28, E29, E30, E31, E32 (grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Geranium palmatum</i> Cav.	Geraniaceae	Gerânio-de- folha- de-anêmona; Pássaras	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-12	Nano.	Herbácea	Z10	E22, E28, E30(grupo)
<i>Geranium robertianum</i> L.	Geraniaceae	Erva-de-são- roberto	Paleártico; Neártico	Perenifólio	1-12	3-9	Hemi.	Herbácea	Z6	E19, E25, E26, E8, E30, E31 (grupo)
<i>Gerbera jamesonii</i> Bol. ex Adam.	Compositae	Gerbera	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z8	E1, E2, E5, E6, E9, E12, E13, E18, E26, E28, E31 (grupo)
<i>Gibbaeum velutinum</i> (L. Bol.) Schwantes	Aizoaceae		Áfricotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Hemi.	Herbácea suculenta	Z9	E12(3)
<i>Ginkgo biloba</i> L.	Ginkgoaceae	Ginco; Árvore - avenca	Paleártico	Caducifólio	4-1	5	Micro.	Árvore	Z4	E5(1), E6(2), E18(3) E19(1), E22(2), E26(3), E27(1), E30(1)
<i>Gladiolus callianthus</i> Marais	Iridaceae	Gladiolo	Áfricotropical	Sazonal	6-11	7-10	Geófita	Herbácea	Z11	E12, E26(grupo)
<i>Gladiolus cardinalis</i> Curtis	Iridaceae	Gladiolo	Áfricotropical	Sazonal	5-10	6-8	Geófita	Herbácea	Z10	E26(grupo)
<i>Gladiolus carneus</i> Delaroche	Iridaceae	Gladiolo	Áfricotropical	Sazonal	2-6	3-5	Geófita	Herbácea	Z10	E26(grupo)
<i>Gladiolus communis</i> L. ssp. <i>byzantinus</i> (Mill.) A. Hamilt.	Iridaceae	Gladiolo	Paleártico	Sazonal	2-7	3-6	Geófita	Herbácea	Z6	E26 (grupo)
<i>Gladiolus italicus</i> Mill.	Iridaceae	Gladiolo-silvestre	Paleártico	Sazonal	3-6	3-6	Geófita	Herbácea	Z6	E5, E26, E31(grupo)
<i>Gladiolus natalensis</i> Hook	Iridaceae	Gladiolos	Áfricotropical	Sazonal	2-7	3-6	Geófita	Herbácea	Z10	E12, E26(grupo)
<i>Gladiolus tristis</i> L.	Iridaceae	Gladiolos	Áfricotropical	Sazonal	12-5	1-3	Geófita	Herbácea	Z10	E26(grupo)
<i>Gleditsia triacanthos</i> L.	Leguminosae (Caesalpinioideae)	Espinheiro-da- virginia	Neártico	Caducifólio	3-11	3-6	Meso.	Árvore	Z3	E20(5), E27(2)
<i>Globularia salicina</i> Lam.	Globulariaceae	Globulária; Malfurada	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-8	Nano.	Arbusto	Z11	E9, E19, E23, E29, E30, E31 (grupo)
<i>Gloriosa superba</i> L.	Liliaceae (Colchicaceae)	Gloriosa	Áfricotropical; Indomalaio	Sazonal	5-7; 11-1	6-7; 12-1	Geófita	Herbácea trepadora	Z10	E8(2), E31(1)
<i>Glottiphyllum fragrans</i> (Salm- Dyck) Schwantes	Aizoaceae		Áfricotropical	Perenifólio	1-12	4-7	Caméfito	Herbácea suculenta	Z9	E19 (grupo)
<i>Glottiphyllum nelii</i> Schwantes	Aizoaceae		Áfricotropical	Perenifólio	1-12	4-6	Caméfito	Herbácea suculenta	Z9	E12(3), E32(3)
<i>Gnidia polystachya</i> Bergius	Thymelaeaceae	Gnidia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	E26(5), E30(7), E31(grupo)
<i>Goniophlebium subauriculatum</i> (Bl.) Presl.	Polypodiaceae	Feto-de- metro; Feto-chorão	Indomalaio; Australiano; Oceânia	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z10	E3, E5, E8, E9, E11, E12, E13, E24, E25, E29, E30, E31 (grupo)
<i>Graptopetalum paraguayense</i> (N. E. Br.) Walth.	Crassulaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	3-6	Caméfito	Herbácea suculenta	Z9	E27, E32(grupo)
<i>Grevillea asplenifolia</i> Knight	Proteaceae	Grevílea-folha-de- feto	Australiano	Perenifólio	1-12	1-7	Micro.	Arbusto	Z8	E10(1)
<i>Grevillea banksii</i> R. Br.	Proteaceae	Grevílea	Australiano	Perenifólio	1-12	3-5	Micro.	Arbusto	Z9	E26(1), E28(2)
<i>Grevillea banksii</i> R. Br. x <i>Grevillea bipinnatifida</i> R. Br.	Proteaceae	Grevílea	Hortícola	Perenifólio	1-12	3-7	Micro.	Arbusto	Z9	E10(2)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Grevillea curviloba</i> McGillivray	Proteaceae	Grevilea	Australiano	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Nano.	Arbusto	Z9	E28(1)
<i>Grevillea juniperina</i> R. Br.	Proteaceae	Grevilea	Australiano	Perenifólio	1-12	11-4	Nano.	Arbusto	Z9	E28(3)
<i>Grevillea lanigera</i> A. M. Cunn. ex R. Br.	Proteaceae	Grevilea	Australiano	Perenifólio	1-12	8-10	Hemi.	Arbusto	Z9	E28(2)
<i>Grevillea robusta</i> A. M. Cunn. Ex. R. Br.	Proteaceae	Grevilea	Australiano	Perenifólio	1-12	4-7	Meso.	Árvore	Z8	E2(1), E3(4), E4(1), E5(1), E6(15), E7(3), E9(3), E11(6), E12(1), E13(5), E14(12), E15(2), E17(1), E18(2), E20(9), E21(1), E23(1), E25(1), E27(1), E29(1), E30(1), E31(1), E32(1), E33(4)
<i>Grevillea rosmarinifolia</i> A. Cunn.	Proteaceae	Grevilea	Australiano	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z8	E8(2), E19(1), E26(3), E28(2)
<i>Grevillea x semperflorens</i> F. E. Briggs ex Mullig	Proteaceae	Grevilea	Hortícola	Perenifólio	1-12	1-7	Micro.	Arbusto	Z8	E10(2)
<i>Greyia radlkoferi</i> Szyszyl.	Greyiaceae	Limpa-garrafas-do-transval	Áfricotropical	Marcescente	5-4 (1-4)	2-5	Micro.	Árvore	Z9	E19(2), E31(1)
<i>Greyia sutherlandii</i> Hook. & Harv.	Greyiaceae	Limpa-garrafas-do-transval	Áfricotropical	Marcescente	5-4 (1-4)	1-5	Micro.	Árvore	Z9	E26(2)
<i>Gunnera manicata</i> Lindl. ex André	Gunneraceae (Haloragidaceae)	Gunera-gigante	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-8	Hemi.	Herbácea	Z7	E10(1), E28(1)
<i>Guzmania lingulata</i> (L.) Mez var. <i>minor</i> (Mez) L. B. Sm.	Bromeliaceae	Gusmânia	Neotropical	Perenifólio	1-12	11-5	Hemi.	Herbácea	Z11	E31(grupo)
<i>Guzmania lingulata</i> Mez	Bromeliaceae	Gusmânia	Neotropical	Perenifólio	1-12	11-5	Hemi.	Herbácea	Z11	E5, E8, E12, E17, E31 (grupo), E32(5)
<i>Guzmania musaica</i> (Lind. & André) Mez.	Bromeliaceae	Gusmânia	Neotropical	Perenifólio	1-12	10-2	Hemi.	Herbácea	Z11	E5, E19(grupo)
<i>Guzmania scherzeriana</i> Mez	Bromeliaceae	Gusmânia	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-11	Hemi.	Herbácea	Z11	E5(grupo)
<i>Gymnocalycium mihanovichii</i> (Fric & Gürke) Britt. & Rose	Cactaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Hemi.	Herbácea suculenta	Z9	E5(grupo)
<i>Gypsophila repens</i> L.	Caryophylla-ceae	Gipsofila	Paleártico	Perenifólio	1-12	12-5	Nano.	Herbácea	Z4	E26(grupo)
<i>Haageocereus decumbens</i> (Vaup.) Backeb.	Cactaceae	Cacto	Neotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Nano.	Arbusto suculento	Z9	E4(2)
<i>Habranthus robustus</i> Herb. ex Sweet.	Amaryllidaceae		Neotropical	Sazonal	6-9	6-8	Geófito	Herbácea	Z10	E26(grupo)
<i>Haemanthus coccineus</i> L.	Amaryllidaceae	Broxa	Áfricotropical	Sazonal	12-6	7-11	Geófito	Herbácea	Z9	E26(grupo)
<i>Hakea victoria</i> J. Drumm.	Proteaceae	Hakea-real	Australiano	Perenifólio	1-12	11-4	Micro.	Arbusto	Z9	E26(1)
<i>Haloragis erecta</i> (Banks ex Murr.) Oken	Halorageaceae		Antártico	Perenifólio	1-12	5-7	Nano.	Herbácea	Z9	E12(grupo)
<i>Hardenbergia comptoniana</i> Benth.	Leguminosae (Papilionoideae)		Australiano	Perenifólio	1-12	1-6	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z9	E10(1)
<i>Haworthia attenuata</i> Haw.	Liliaceae (Aloecaceae)		Áfricotropical	Perenifólio	1-12	4-6	Caméfito	Herbácea suculenta	Z9	E12(5)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Haworthia cymbiformis</i> (Haw.) Duval.	Liliaceae (Aloecaceae)		Áfricotropical	Perenifólio	1-12	4-6	Caméfito	Herbácea suculenta	Z9	E12(grupo)
<i>Hebe salicifolia</i> (Forst. f.) Pennell	Scrophulariaceae	Verónica	Neotropical; Antártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z7	E5(grupo), E19(5), E21(grupo), E22(28)
<i>Hebe speciosa</i> (A. Cunn.) Ckn. & Allan	Scrophulariaceae	Verónica; Hebe	Antártico	Perenifólio	1-12	4-10	Nano.	Arbusto	Z9	E10, E19(grupo), E23(2)
<i>Hebe x andersonii</i> (Lindl. & Paxt.) Ckn.	Scrophulariaceae	Verónica; Hebe	Hortícola	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z9	E22(1)
<i>Hebe x franciscana</i> (Eastw.) Souster.	Scrophulariaceae	Verónica	Hortícola	Perenifólio	1-12	5-12	Nano.	Arbusto	Z8	E11(7), E19, E21 (grupo), E26(2), E27(grupo)
<i>Heberdenia excelsa</i> (Ait.) Banks ex DC	Myrsinaceae	Ademo	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-6	Micro.	Árvore	Z10	E19(1), E28(1), E30(2)
<i>Hechtia dichroantha</i> Donnel Smith	Bromeliaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	7-8	Hemi.	Herbácea suculenta	Z9	E10(1)
<i>Hedera canariensis</i> Willd.	Araliaceae	Hera	Paleártico	Perenifólio	1-12	7-10	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	E10, E12, E13, E22, E25, E31 (grupo)
<i>Hedera helix</i> L.	Araliaceae	Hera	Paleártico	Perenifólio	1-12	9-10	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z5	E1, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E12, E13, E18, E19, E21, E23, E26, E27, E28, E29, E30, E32 (grupo), E33(3)
<i>Hedera maderensis</i> K. Koch ex A. Rutherf. ssp. <i>maderensis</i>	Araliaceae	Hera	Paleártico	Perenifólio	1-12	7-10	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	E22, E26, E28, E30, E31 (grupo)
<i>Hedychium chrysoleucum</i> Hook.	Zingiberaceae	Bananiha Roca-de-Vénus	Índomalaio	Perenifólio	1-12	7-11	Hemi.	Herbácea	Z11	E5(grupo)
<i>Hedychium coronarium</i> Koenig	Zingiberaceae	Conteira; Bananiha	Índomalaio	Perenifólio	1-12	8-10	Hemi.	Herbácea	Z10	E33(grupo)
<i>Hedychium gardnerianum</i> Ker-Gawl.	Zingiberaceae	Roca-de-vénus; Conteira; Bananiha	Paleártico; Índomalaio	Perenifólio	1-12	7-10	Hemi	Herbácea	Z9	E3, E6, E9, E10, E12, E13, E18, E22, E24, E25, E26, E28, E29, E30, E31, E32 (grupo)
<i>Helianthus annuus</i> L.	Compositae	Girassol	Neártico	Sazonal	4-8	4-10	Terófito	Herbácea	Z4	E3, E22(grupo)
<i>Helichrysum bellidioides</i> (Forst. f.) Willd.	Compositae	Perpétua	Antártico	Perenifólio	1-12	5-8	Caméfito	Arbusto	Z7	E12(grupo)
<i>Helichrysum bracteatum</i> (Vent.) Andrews	Compositae	Margarida-de-papel	Australiano	Sazonal	3-10	4-10	Terófito	Herbácea	Z8	E3, E4, E16, E21, E22, E24, E25, E26, E32 (grupo)
<i>Helichrysum devium</i> Johns.	Compositae	Perpétua-de-são-lourenço	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-6	Nano.	Arbusto	Z11	E23, E30 (grupo)
<i>Helichrysum foetidum</i> (L.) Cass.	Compositae	Traqueiro	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	5-10	Terófito	Herbácea	Z9	E19, E22(grupo)
<i>Helichrysum melaleucum</i> Rchb. ex Holl	Compositae	Perpétua-branca	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-8	Nano.	Arbusto	Z10	E22(1), E28(2), E30(8)
<i>Helichrysum obconicum</i> DC.	Compositae	Murrião	Paleártico	Perenifólio	1-12	6-10	Nano.	Arbusto	Z11	E8, E23 (grupo), E28(2)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Helichrysum petiolare</i> Hilliard & B. L. Burt.	Compositae		Áfricotropical	Perenifólio	1-12	8-11	Nano.	Arbusto	Z9	E12(grupo)
<i>Heliconia bihai</i> (L.) L.	Heliconiaceae	Helicónia	Neotropical	Perenifólio	1-12	7-2	Hemi.	Herbácea	Z11	E3, E4, E5, E9, E10, E12, E13, E16, E17, E18, E19, E21, E23(grupo), E24 (2), E25, E29, E32, E33 (grupo)
<i>Heliconia champneiana</i> Griggs	Heliconiaceae	Helicónia	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-3	Hemi.	Herbácea	Z11	E5(1)
<i>Heliconia foreroi</i> Abelo & Morales	Heliconiaceae	Helicónia	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-4	Hemi.	Herbácea	Z11	E5(3)
<i>Heliconia rostrata</i> Ruiz & Pav.	Heliconiaceae	Helicónia	Neotropical	Perenifólio	1-12	7-10	Hemi.	Herbácea	Z11	E5(grupo)
<i>Heliconia schiedeana</i> Klotzsch.	Heliconiaceae	Helicónia	Neotropical	Perenifólio	1-12	7-9	Hemi.	Herbácea	Z11	E10(grupo)
<i>Heliconia stricta</i> Huber.	Heliconiaceae	Helicónia	Neotropical	Perenifólio	1-12	7-10	Hemi.	Herbácea	Z11	E5(grupo)
<i>Heliotropium arborescens</i> L.	Boraginaceae	Heliotrópio	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z9	E12(2), E26(7), E30, E31(grupo)
<i>Helleborus x sternii</i> Turrill.	Ranunculaceae		Hortícola	Perenifólio	1-12	1-6	Hemi.	Herbácea	Z7	E12(9)
<i>Hemerocallis dumortieri</i> E. Morr.	Liliaceae (Hemerocallidaceae)	Hemerocalis; Lírio-dum-dia	Paleártico	Perenifólio	1-12	6-10	Geófita	Herbácea	Z5	E5, E10, E13, E14, E19, E26, E27, E29, E31, E32, E32 (grupo)
<i>Hemerocallis fulva</i> L.	Liliaceae (Hemerocallidaceae)	Hemerocalis; Lírio-dum-dia	Paleártico	Perenifólio	1-12	6-10	Geófita	Herbácea	Z5	E10, E19, E24, E25, E26, E29, E31, E32(grupo)
<i>Heterocentron macrostachium</i> Naud.	Melastomata-ceae	Heterocentro	Neotropical	Perenifólio	1-12	10-4	Nano.	Arbusto	Z10	E19(1), E26, E31 (grupo)
<i>Hibanobambusa tranquillans</i> (Koidz.) Maruyama & H. Okamura	Gramineae	Bambu	Paleártico	Perenifólio	1-12	Não floriu**	Hemi.	Herbácea	Z8	E10 (grupo)
<i>Hibbertia scandens</i> (Willd.) Dryand.	Dilleniaceae	Hibertia	Australiano	Perenifólio	1-12	3-8	Fane.trep.	Arbusto trepador	Z9	E10(1), E12(1), E19(1), E26(12), E31(1)
<i>Hibiscus amottianus</i> A. Gray.	Malvaceae	Hibisco	Oceânia	Perenifólio	1-12	6-10	Micro.	Arbusto	Z10	E19(1)
<i>Hibiscus calyphyllus</i> Cav.	Malvaceae	Hibisco-amarelo	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	5-10	Micro.	Arbusto	Z10	E19(1)
<i>Hibiscus elatus</i> Swartz	Malvaceae	Hibisco-arbóreo	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Árvore	Z10	E18(1), E19(2), E20(1), E21(1), E25(1)
<i>Hibiscus hastatus</i> L. f.	Malvaceae	Cardeais	Oceânia	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Árvore	Z11	E8(2), E19(3), E24(1), E27(1)
<i>Hibiscus mutabilis</i> L.	Malvaceae	Rosa-de-algodão	Paleártico	Perenifólio	1-12	6-11	Micro.	Arbusto	Z8	E4(3), E12(1), E19(13), E24(2), E28(1), E31(2), E32(1)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Hibiscus rosa-sinensis</i> L.	Malvaceae	Cardeais	Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E16, E17(grupo), E18(1), E19(grupo), E21(14), E22(15), E23, E24, E25(grupo), E26(6), E27, E28, E29 (grupo), E30(7), E31(17), E32, E33 (grupo)
<i>Hibiscus schizopetalus</i> (Mast.) Hook.	Malvaceae	Lanterna-japonesa	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	3-11	Micro.	Arbusto	Z10	E5(1), E6(1), E9(1), E12(2), E24(1), E32(1)
<i>Hibiscus syriacus</i> L.	Malvaceae	Cardeal-roxo; Hibisco-da- siria	Paleártico; Indomalaio	Caducifólio	5-11	7-9	Micro.	Arbusto	Z5	E2(6), E3(1), E4(2), E5(1), E6(6), E11(1), E13(grupo), E16(3), E21(3), E22(6), E23(4), E26(1), E27(2), E28(grupo), E29(1), E30(13), E31(1), E32(1)
<i>Hibiscus tiliaceus</i> L.	Malvaceae	Hibisco	Neotropical; Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Árvore	Z10	E19(2), E28(1)
<i>Hippesatrum vittatum</i> (L' Hérit) Herb.	Amaryllidaceae	Raqueis	Neotropical	Sazonal	4-10	4-10	Geófita	Herbácea	Z10	E5, E6, E8, E25, E26, E30, E31(grupo)
<i>Hohenbergia stellata</i> Schultes f.	Bromeliaceae	Bromélia	Neotropical	Perenifólio	1-12	3-8	Hemi.	Herbácea	Z11	E5(grupo)
<i>Hoheria populnea</i> A. Cunn.	Malvaceae		Antártico	Perenifólio	1-12	8-9	Micro.	Árvore	Z9	E26(2)
<i>Holboellia latifolia</i> Wallich.	Lardizabalaceae		Paleártico	Perenifólio	1-12	5-6	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z8	E26(1)
<i>Holmskioldia sanguinea</i> Retz.	Verbenaceae	Chapéus-de-mandarim; Chapéus-chineses	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	E2(1), E4(1), E5(3), E8(2), E9(2), E13(1), E19(11), E23(3), E25(1), E26(3), E27(4), E28(1), E30(1), E31(8), E32(1)
<i>Holmskioldia tettensis</i> Vatke	Verbenaceae	Chapéu-chinês; Chapéu-de-mandarim	Áfricotropical ; Paleártico	Perenifólio	1-12	6-11	Micro.	Arbusto	Z10	E14(9)
<i>Homalocladium platycladum</i> (F. Muell.) L.H. Bail.	Polygonaceae	Homaloclá-dio	Oceânia	Perenifólio	1-12	7-8	Nano.	Arbusto	Z11	E7(1), E10(4), E22(3), E29(grupo)
<i>Hovenia dulcis</i> Thynb.	Rhamnaceae	Hovénia	Paleártico	Caducifólio	3-11	9-10	Micro.	Árvore	Z8	E19(1)
<i>Howea belmoreana</i> (C. Moore & F. Muell.) Becc.	Palmae	Quência	Australiano	Perenifólio	1-12	1-9	Micro	Árvore	Z10	E13(1), E21(5), E24(1), E30(1)
<i>Howea forsteriana</i> (C. Moore & F. Muell.) Becc.	Palmae	Quência	Australiano	Perenifólio	1-12	1-9	Micro.	Árvore	Z10	E4(6), E5(10), E6(3), E8(11), E9(2), E10(32), E12(10), E13(10), E14(6), E18(13), E19(10), E21(10), E23(2), E24(6), E25(2), E27(4), E29(6), E30(3), E33(14)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Hoya camosa</i> (L. f.) R. Br.	Asclepiadaceae	Flor-de-cera	Indomalaio	Perenifólio	1-12	5-10	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z10	E25(1)
<i>Huernia confusa</i> E. Phillips	Asclepiadaceae	Huernia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea suculenta	Z10	E5(1)
<i>Hyacinthoides hispanica</i> (Mill.) Roth.	Liliaceae (Hyacinthaceae)	Campainhas-azuis	Paleártico	Sazonal	2-5	2-4	Geófito	Herbácea	Z5	E26(grupo)
<i>Hyacinthoides non-scripta</i> (L.) Rothm.	Liliaceae (Hyacinthaceae)	Campainha-azul	Paleártico	Sazonal	2-5	2-4	Geófito	Herbácea	Z5	E28(grupo)
<i>Hydrangea arborescens</i> L.	Hydrangeaceae	Hortênsia	Neártico	Caducifólio	3-12	6-9	Nano.	Arbusto	Z6	E28(4)
<i>Hydrangea aspera</i> D. Don.	Hydrangeaceae	Hortênsia	Paleártico; Indomalaio	Caducifólio	3-12	6-9	Micro.	Arbusto	Z7	E26(1), E28(4)
<i>Hydrangea macrophylla</i> (Thunb.) Ser.	Hydrangeaceae	Hortênsia; Novelos	Paleártico	Caducifólio	3-12	5-10	Nano.	Arbusto	Z6	E1, E2, E4, E5, E6, E8, E9, E10, E11, E14, E17, E19, E22, E24, E25, E26, E27, E28, E30, E31, E32, E33 (grupo)
<i>Hydrangea paniculata</i> Sieb.	Hydrangeaceae	Hortênsia	Paleártico	Caducifólio	3-12	6-9	Nano.	Arbusto	Z5	E28(1)
<i>Hydrangea quercifolia</i> Bartr.	Hydrangeaceae	Hortênsias	Neártico	Caducifólio	3-12	6-8	Nano.	Arbusto	Z5	E26(3), E28(3)
<i>Hydrangea serrata</i> (Thunb.)	Hydrangeaceae	Hortênsia	Paleártico	Caducifólio	3-12	5-10	Nano.	Arbusto	Z6	E14(grupo), E28(3)
<i>Hylocereus triangularis</i> (L.) Britt. & Rose	Cactaceae	Rainha-da-noite; Cacto-trepador	Neotropical	Perenifólio	1-12	7-10	Fane. trep.	Arbusto trepador e suculento	Z10	E5(4), E7(1), E8(2), E9(grupo), E10(grupo), E11(3), E12(grupo), E13(6), E21, E23, E31, E29, E32 (grupo)
<i>Hylotelephium spectabile</i> (Boreau) H. Ohba	Crassulaceae		Paleártico	Perenifólio	1-12	8-9	Nano.	Herbácea suculenta	Z5	E26(grupo)
<i>Hymenocallis harrisi</i> Herb.	Amaryllidaceae	Lírio-aranha	Neotropical	Perenifólio	1-12	3-7	Geófito	Herbácea	Z10	E26(grupo)
<i>Hymenocallis littoralis</i> (Jacq.) Salisb.	Amaryllidaceae	Lírio-aranha	Neotropical	Perenifólio	1-12	9-11	Geófito	Herbácea	Z10	E16, E18, E19, E25, E32 (grupo)
<i>Hymenocallis narcissiflora</i> (Jacq.) Macbr.	Amaryllidaceae	Lírio-aranha	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-6	Geófito	Herbácea	Z9	E12(grupo)
<i>Hymenocallis speciosa</i> (Salisb.) Salisb.	Amaryllidaceae	Lírio-aranha	Neotropical	Perenifólio	1-12	11-1	Geófito	Herbácea	Z10	E30(grupo)
<i>Hymenosporum flavum</i> (Hook.) F. Muell.	Pittosporaceae	Himenosporo	Australiano	Perenifólio	1-12	3-8	Micro.	Árvore	Z9	E3(1), E9(1), E10(3), E19(2), E26(4), E31(1)
<i>Hyophorbe verschaffeltii</i> (L. H. Bailey) H. Wendl.	Palmae	Palmeira-fusiforme	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	6-7	Micro.	Árvore	Z12	E3(2)
<i>Hyparrhenia hirta</i> (L.) Stapf	Gramineae	Feno	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-5	Hemi.	Herbácea	Z9	C8, C9, C12, E23 (grupo)
<i>Hypericum canariense</i> L.	Guttiferae	Hiperião-das-canárias	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-11	Micro.	Arbusto	Z11	E26(5)
<i>Hypericum grandifolium</i> Choisy	Guttiferae	Malfurada; Hiperião	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-7	Nano.	Arbusto	Z10	E30(9)
<i>Hypericum lancasteri</i> N. Robson	Guttiferae	Hiperião	Paleártico	Perenifólio	1-12	7-8	Nano.	Arbusto	Z7	E30(grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Hypericum monogynum</i> L.	Guttiferae	Hiperício-da-china	Paleártico; Indomalaio	Perenifólio	1-12	3-8	Micro.	Arbusto	Z9	E5(1), E26(3)
<i>Hypoestes aristata</i> R. Br.	Acanthaceae		Áfricotropical	Perenifólio	1-12	11-2	Nano.	Arbusto	Z9	E26(grupo)
<i>Hypoestes phyllostachya</i> Bak.	Acanthaceae	Hipoestes	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	9-12	Nano.	Arbusto	Z10	E10(3), E29(grupo), E32(grupo)
<i>Iberis amara</i> L.	Cruciferae		Paleártico	Sazonal	3-6	4-6	Terófito	Herbácea	Z7	E26(grupo)
<i>Iberis sempervirens</i> L.	Cruciferae		Paleártico	Perenifólio	1-12	4-6	Caméfito	Herbácea	Z4	E26(grupo)
<i>Iberis umbellata</i> L.	Cruciferae	Iberis	Paleártico	Sazonal	4-6	5-6	Terófito	Herbácea	Z7	E18(grupo)
<i>Ilex aquifolium</i> L.	Aquifoliaceae	Azevinho-comum; Azevinho-inglês	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-6	Micro.	Árvore	Z6	E5(2), E6(3), E13(6), E19(1), E22(5), E24(1), E26(1), E27(1), E28(8), E30(8)
<i>Ilex canariensis</i> Poir.	Aquifoliaceae	Azevinho-da-rocha	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-6	Micro.	Árvore	Z10	E14(2), E19(1), E27(1), E28(1), E30(5)
<i>Ilex perado</i> Ait.	Aquifoliaceae	Perado	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-6	Micro.	Árvore	Z10	E14(11), E19(1), E28(2), E30(9)
<i>Ilex x altaclarensis</i> (hort. ex Loud.) Dallim.	Aquifoliaceae	Azevinho	Hortícola	Perenifólio	1-12	12-8	Micro.	Árvore	Z6	E13(1), E22(2), E26(6), E27(1), E28(8), E30(11)
<i>Illicium anisatum</i> L.	Illiciaceae	Anis-chinês	Paleártico; Indomalaio	Perenifólio	1-12	3-4	Micro.	Arbusto	Z8	E31(1)
<i>Impatiens balsamina</i> L.	Balsaminaceae	Maravilhas	Indomalaio	Sazonal	4-9	6-9	Terófito	Herbácea	Z9	E22, E26(grupo)
<i>Impatiens hawkeri</i> Bull.	Balsaminaceae	Maravilhas	Hortícola	Sazonal	4-9	5-8	Terófito	Herbácea	Z10	E5, E8, E10, E11, E12, E28, E30 (grupo)
<i>Impatiens sodenii</i> Engl. & Warb. ex Engl.	Balsaminaceae	Maravilhas	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Herbácea	Z10	E8, E22, E28, E30 (grupo)
<i>Impatiens walleriana</i> Hook. f.	Balsaminaceae	Maravilhas	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Herbácea	Z9	E1, E2, E5, E6, E8, E7, E9, E10, E11, E12, E13, E17, E18, E21, E22, E23, E24, E25, E27, E28, E29, E30, E31, E32(grupo)
<i>Ipomoea coccinea</i> Scheidw.	Solanaceae	Ipomoea-vermelha	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-7	Micro.	Arbusto	Z10	E10 (1)
<i>Ipomoea cyanea</i> (Lindl.) Green.	Solanaceae	Ipomoea	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z9	E5(1), E12(grupo) E26(2), E31(2)
<i>Ipomoea grandiflora</i> Benth.	Solanaceae	Ipomoea	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-8	Micro.	Arbusto	Z9	E12 (grupo), E19(1)
<i>Ipomoea alba</i> L.	Convolvulaceae	Campainhas	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-10	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z10	E19, E31(grupo)
<i>Ipomoea arborescens</i> (Humb. & Bonpl.) Don	Convolvulaceae	Árvore-glória-da-manhã	Neotropical	Caducifólio	6-11	12-2	Micro.	Arbusto	Z10	E31(1)
<i>Ipomoea batatas</i> (L.) Poir.	Convolvulaceae	Batata-doce	Neotropical; Oceânia	Perenifólio	1-12	6-10	Geófito	Herbácea trepadora	Z9	E8, E12, E19(grupo)
<i>Ipomoea indica</i> (Burm.) Merrill	Convolvulaceae	Campainhas	Neotropical; Áfricotropical; Indomalaio; Oceânia	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z10	E12, E13, E19, E21, E23, E26, E29, E31 (grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Ipomoea lobata</i> (Cerv.) Thell.	Convolvulaceae	Bandeira-espanhola	Neotropical	Sazonal	10-12	10-12	Geófito	Herbácea trepadora	Z10	E26(7)
<i>Ipomoea purpurea</i> (L.) Roth.	Convolvulaceae	Campainhas	Neotropical	Sazonal	1-12	1-12	Terófito	Herbácea trepadora	Z10	E4, E10, E23, E31 (grupo)
<i>Iresine herbstii</i> Hook.	Amaranthaceae	Iresine	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Caméfito	Herbácea	Z10	E1, E2, E3, E4, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E18, E19, E21, E22, E23, E26, E27, E28, E29, E30, E32 (grupo)
<i>Iresine lindenii</i> Van Houtte	Amaranthaceae	Iresine	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Caméfito	Herbácea	Z10	E10(grupo)
<i>Iris ensata</i> Thunb.	Iridaceae	Lírio	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-6	Geófito	Herbácea	Z4	E30(grupo)
<i>Iris foetidissima</i> L.	Iridaceae	Lírio	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-6	Geófito	Herbácea	Z7	E26(grupo)
<i>Iris germanica</i> L.	Iridaceae	Lírio	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-8	Geófito	Herbácea	Z4	E2, E21, E22 E26, E27, E30(grupo)
<i>Iris germanica</i> L. var. <i>florentina</i> (L.) Dykes	Iridaceae	Lírio-branco	Paleártico	Perenifólio	1-12	2-7	Geófito	Herbácea	Z4	E8, E12, E13, E18, E22, E27, E28, E29, E30, E31 (grupo)
<i>Iris japonica</i> Thunb.	Iridaceae	Lírio-do-japão	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-8	Geófito	Herbácea	Z8	E5, E12, E18, E26, E31 (grupo)
<i>Iris laevigata</i> Fisch	Iridaceae	Lírio	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-7	Helófito	Herbácea	Z4	E31(grupo)
<i>Iris lutescens</i> Lam.	Iridaceae	Lírio	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-5	Geófito	Herbácea	Z5	E12(grupo)
<i>Iris orientalis</i> Mill.	Iridaceae	Lírio	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-5	Geófito	Herbácea	Z6	E26(grupo)
<i>Iris pseudacorus</i> L.	Iridaceae	Bandeira-amarela; Lírio-amarelo	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-6	Helófito	Herbácea	Z5	E26, E28, E30(grupo)
<i>Iris unguicularis</i> Poir.	Iridaceae	Lírio	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Geófito	Herbácea	Z7	E10, E26, E31(grupo)
<i>Isatis tinctoria</i> L.	Cruciferae	Pastel	Paleártico	Perenifólio	1-12	12-7	Terófito	Herbácea	Z7	E19 (grupo)
<i>Isoplexis sceptrum</i> (L. f.) Loud.	Scrophulariaceae	Isoplexis; Dedaleira-da-madeira	Paleártico	Perenifólio	1-12	Não floriu**	Nano.	Arbusto	Z10	E22(4), E25(1), E28(2), E30(17)
<i>Itea ilicifolia</i> Oli.	Grossulariaceae (Iteaceae)		Paleártico	Perenifólio	1-12	7-8	Micro.	Arbusto	Z7	E12(1), E26(1)
<i>Ixia maculata</i> L.	Iridaceae	Palhinhas; Amêndoas	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	3-5	Geófito	Herbácea	Z10	E26, E28, E30, E31 (grupo)
<i>Ixia paniculata</i> Delaroche	Iridaceae	Ixia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	3-6	Geófito	Herbácea	Z10	E26(grupo)
<i>Jacaranda mimosifolia</i> D. Don.	Bignoniaceae	Jacarandá	Neotropical	Caducifólio	5-2	4-7; 9-10	Meso.	Árvore	Z9	E2(7), E3(2), E4(1), E5(5), E6(4), E8(2), E9(2), E10(8), E11(3), E12(12), E13(2), E14(26), E16(3), E18(3), E19(1), E20(26), E21(17), E22(1), E24(2), E25(1), E26(2), E27(9), E29(6), E31(9), E32(4), E33(4)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Jasminum azoricum</i> L.	Oleaceae	Jasmineiro-branco	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-11	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z11	E10(grupo), E12(1), E23(17), E26(1), E27(3), E28(2), E31(grupo)
<i>Jasminum humile</i> L.	Oleaceae	Jasmineiro- amarelo	Paleártico; Indomalaio	Perenifólio	1-12	5-7	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z8	E19(1)
<i>Jasminum mesnyi</i> Hance.	Oleaceae	Jasmim-primavera	Paleártico	Perenifólio	1-12	12-6	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z8	E10(2), E11(grupo), E19(grupo), E20(2), E23, E31(grupo)
<i>Jasminum odoratissimum</i> L.	Oleaceae	Jasmineiro- amarelo	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z11	E23(grupo), E25(1), E26(1), E27(grupo), E30(3), E31(1)
<i>Jasminum officinale</i> L. var. <i>grandiflorum</i> (L.) Kob.	Oleaceae	Jasmineiro	Paleártico	Perenifólio	1-12	11-6	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z6	E31(2)
<i>Jasminum polyanthum</i> Franch.	Oleaceae	Jasmineiro; Jasmim-dos- poetas	Paleártico	Perenifólio	1-12	2-6	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z8	E6(grupo), E8(2), E10(grupo), E11(2), E12(1), E14(133), E19(2), E26, E31 (grupo)
<i>Jasminum sambac</i> (L.) Ait.	Oleaceae	Jasmim-da-arábia	Indomalaio	Perenifólio	1-12	3-7	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	E8(2), E12(3)
<i>Jatropha curcas</i> L.	Euphorbiaceae	Jatrofa	Neotropical;	Caducifólio	5-1	6-7	Micro.	Árvore	Z10	E5(1), E19(1)
<i>Jatropha integerrima</i> Jacq.	Euphorbiaceae	Jatrofa	Neotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Nano.	Árvore	Z10	E12(1)
<i>Jatropha podagrica</i> Hook.	Euphorbiaceae	Jatrofa	Neotropical	Perenifólio	1-12	12-2	Nano.	Arbusto suculento	Z10	E10(1), E12(1)
<i>Joannesia princeps</i> Vell	Euphorbiaceae	Purga-de-cavalo; Cutieira	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-5	Micro.	Árvore	Z12	E13(1)
<i>Jubaea spectabilis</i> H.B.K.	Palmae	Palmeira-do-vinho- do-chile; Palmeira-do-mel	Neotropical	Perenifólio	1-12	7-8	Micro.	Árvore	Z8	E29(2)
<i>Juglans nigra</i> L.	Juglandaceae	Nogueira-negra	Neártico	Caducifólio	5-12	5-6	Meso.	Árvore	Z4	E26(5), E30(7)
<i>Juglans regia</i> L.	Juglandaceae	Nogueira	Paleártico	Caducifólio	5-12	4-6	Meso.	Árvore	Z4	E26 (1)
<i>Juniperus cedrus</i> Webb. & Berthel. ssp. <i>maderensis</i> (Menezes) Rivas Mart. & al.	Cupressaceae	Cedro-da- madeira	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-3	Micro.	Árvore	Z10	E11(1), E14(11), E19(13), E20(4), E22(6), E26(7), E28(3), E30(130)
<i>Juniperus chinensis</i> L.	Cupressaceae	Cedro-da -china	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-3	Micro.	Árvore	Z4	E22(14), E25(1), E30(76), E32(1)
<i>Juniperus communis</i> L.	Cupressaceae	Cedro	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-3	Micro.	Árvore	Z2	E5(2), E6(2), E30(6)
<i>Juniperus excelsa</i> Bieb.	Cupressaceae	Cedro	Paleártico	Perenifólio	1-12	2-3	Micro.	Árvore	Z6	E12 (1)
<i>Juniperus horizontalis</i> Moench.	Cupressaceae		Neártico	Perenifólio	1-12	1-3	Nano.	Arbusto	Z4	E11(grupo)
<i>Juniperus phoenicea</i> L.	Cupressaceae	Zimbreiro	Paleártico	Perenifólio	1-12	12-2	Micro.	Árvore	Z9	E19(2)
<i>Juniperus squamata</i> Buch.- Ham. ex D. Don	Cupressaceae		Paleártico	Perenifólio	1-12	1-3	Nano.	Arbusto	Z4	E11(9), E28(3)
<i>Juniperus virginiana</i> L.	Cupressaceae	Zimbri-da-virginia	Neártico	Perenifólio	1-12	3-4	Micro.	Árvore	Z2	E25(1), E28(21)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Justicia adhatoda</i> L.	Acanthaceae		Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	E19(2), E32(1)
<i>Justicia brandegeana</i> Wssh.	Acanthaceae	Beloperone	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	E10(4), E12, E14 (grupo), E25(2), E26(6), E32(6)
<i>Justicia camea</i> Lindl.	Acanthaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	5-10	Nano.	Arbusto	Z12	E10(17), E12(1), E14(grupo), E18(12), E19(1), E22(4), E26(grupo), E29(1), E32(15)
<i>Justicia rizzinii</i> Wssh.	Acanthaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	12-6	Nano.	Arbusto	Z11	E5(1), E26(8), E30(1)
<i>Kalanchoe ambolensis</i> Humbert	Crassulaceae		Áfricotropical	Perenifólio	1-12	12-3	Nano.	Arbusto suculento	Z11	E12(3)
<i>Kalanchoe beharensis</i> Drake.	Crassulaceae	Arbusto-de-feltro	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	12-3	Micro.	Arbusto suculento	Z11	E10(6), E12(23), E32(3)
<i>Kalanchoe blossfeldiana</i> Poelln.	Crassulaceae	Calanchoé	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto suculento	Z11	E2, E3, E6, E8, E9, E10, E13, E19, E23, E26, E29, E31, E32, E33 (grupo)
<i>Kalanchoe daigremontiana</i> Hamet & Perrier	Crassulaceae	Calanchoé	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	12-5	Nano.	Arbusto suculento	Z11	E2, E3, E12, E13, E29, E30, E33 (grupo)
<i>Kalanchoe delagonensis</i> Ecklon & Zeyh.	Crassulaceae	Calanchoé	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	12-9	Nano.	Arbusto suculento	Z11	E2, E3, E5, E10, E12, E13, E21, E27, E29, E31, E32 (grupo)
<i>Kalanchoe fedtschenkoi</i> Hamet & Perrier	Crassulaceae	Calanchoé	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-8	Caméfito	Arbusto suculento	Z11	E10, E12, E14, E19, E21, E23, E24, E26, E29, E31, E32, E33 (grupo)
<i>Kalanchoe flammea</i> Stapf.	Crassulaceae	Calanchoé	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Nano.	Arbusto suculento	Z11	E12(3)
<i>Kalanchoe gastonis-bonnierii</i> Hamet. & Perrier	Crassulaceae	Calanchoé	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	11-3	Nano.	Arbusto suculento	Z11	E31, E32 (grupo)
<i>Kalanchoe hildbrandtii</i> Baill	Crassulaceae	Calanchoé	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Nano.	Arbusto suculento	Z11	E12(3)
<i>Kalanchoe mamorata</i> Bak.	Crassulaceae	Calanchoé	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	11-2	Nano.	Arbusto suculento	Z11	E12(2), E31(grupo)
<i>Kalanchoe mamieriana</i> H. Jacobsen	Crassulaceae	Calanchoé	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Nano.	Arbusto suculento	Z11	E12(3)
<i>Kalanchoe millottii</i> Hamet & Perrier	Crassulaceae	Calanchoé	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Caméfito	Arbusto suculento	Z11	E12(3)
<i>Kalanchoe orygalis</i> Bak.	Crassulaceae	Calanchoé	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	5-6	Nano.	Arbusto suculento	Z11	E13(1)
<i>Kalanchoe pinnata</i> (Lam.) Pers.	Crassulaceae	Calanchoé	Neotropical; Áfricotropical; Indomalaio; Oceânia	Perenifólio	1-12	2-5	Nano.	Arbusto suculento	Z11	E10, E12, E26 (grupo)
<i>Kalanchoe pubescens</i> R. Br. ex Oliver	Crassulaceae	Calanchoé	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	2-5	Caméfito	Herbácea suculenta	Z11	E19, E33 (grupo)
<i>Kalanchoe thyrsiflora</i> Harv.	Crassulaceae	Calanchoé	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	12-2	Nano.	Arbusto suculento	Z11	E10(4), E12(grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Kalanchoe tomentosa</i> Bak.	Crassulaceae	Planta-panda	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-3	Nano.	Arbusto suculento	Z11	E10(grupo)
<i>Kalmia angustifolia</i> L.	Ericaceae		Neártico	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Nano.	Arbusto	Z2	E28(2)
<i>Kennedia macrophylla</i> (Meissn.) Benth.	Leguminosae (Papilionoideae)		Australiano	Perenifólio	1-12	4-6	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	E26(2)
<i>Kigelia africana</i> (Lam.) Benth.	Bignoniaceae	Árvore-das- salsichas	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	5-10	Micro.	Árvore	Z10	E9(2), E10(1), E12(1), E18(3), E19(1), E20(1), E21(1), E23(4), E25(1), E29(2)
<i>Kleinia amaniensis</i> (Engl.) A. Berger	Compositae		Áfricotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Caméfito	Herbácea suculenta	Z10	E12(3)
<i>Kleinia grantii</i> (Oliv. & Hiem.) Hook.	Compositae		Áfricotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Caméfito	Herbácea suculenta	Z10	E12(3)
<i>Kleinia petraea</i> (R. E. Fries)	Compositae		Áfricotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Caméfito	Herbácea suculenta	Z10	E12(5)
<i>Kniphofia ensifolia</i> Bak.	Liliaceae (Aloecaceae)	Foguetes	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	5-7	Hemi.	Herbácea	Z9	E26, E31(grupo)
<i>Kniphofia uvaria</i> (L.) Oken.	Liliaceae (Aloecaceae)	Foguetes	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	6-8	Hemi.	Herbácea	Z9	E19, E23, E26(grupo), E27(1), E30(grupo)
<i>Kniphofia x praecox</i> Bak.	Liliaceae (Aloecaceae)	Foguetes	Hortícola	Perenifólio	1-12	11-2	Hemi.	Herbácea	Z9	E4(1), E5, E19, E22, E25, E26, E32, E33 (grupo)
<i>Koelreuteria bipinnata</i> Franch.	Sapindaceae		Paleártico	Caducifólio	5-2	8-10	Micro.	Árvore	Z8	E26(1), E31(3)
<i>Koelreuteria paniculata</i> Laxm.	Sapindaceae		Paleártico	Caducifólio	5-2	7-9	Micro.	Árvore	Z4	E28(2)
<i>Kohleria eriantha</i> (Benth.) Hanst.	Gesneriaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z11	E5, E10, E12, E22 (grupo), E26(2), E28, E30 (grupo)
<i>Kunzea ericoides</i> (A. Rich) J. Thomson	Myrtaceae		Australiano; Antártico	Perenifólio	1-12	6-7	Micro.	Arbusto	Z8	E10(6)
<i>Lablab purpureus</i> (L.) Sweet	Leguminosae (Papilionoideae)		Áfricotropical	Perenifólio	1-12	3-7	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z9	E12, E23(grupo)
<i>Lagerstroemia indica</i> L.	Lythraceae	Laguerestrémia; Flor-de-merenda; Suspiros	Paleártico; Indomalaio	Caducifólio	3-11	7-9	Micro.	Árvore	Z7	E3(1), E5(4), E6(2), E7(5), E8(1), E9(4), E12((3), E13(13), E14(11), E16(1), E17(3), E18(2), E19(3), E21(34), E22(5), E23(2), E24(4), E25(3), E26(7), E27(3), E29(3), E30(1), E31(4), E32(3), E33(5)
<i>Lagunaria patersonii</i> (Anderss) G. Don.	Malvaceae	Lagunária	Australiano	Perenifólio	1-12	5-7	Micro.	Árvore	Z10	E19(1), E21(1), E26(1), E29(2)
<i>Lamium galeobdolon</i> (L.) L.	Labiatae	Arcanjo-amarelo	Paleártico	Perenifólio	1-12	10-12	Hemi.	Herbácea	Z4	E14, E22, E28 (grupo)
<i>Lampranthus aurantiacus</i> (DC.) Swantes	Aizoaceae	Lamprantos; Chorão	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	4-12	Fane. trep.	Arbusto trepador e suculento	Z11	E2, E8, E12, E19, E22, E29 (grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Lampranthus aureus</i> (L.) N. E. Br.	Aizoaceae	Lamprantos; Chorão	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	4-12	Fane. trep.	Arbusto trepador e suculento	Z11	E14, E23(grupo)
<i>Lampranthus blandus</i> (Haw.) Schwantes	Aizoaceae	Lamprantos; Chorão	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	3-9	Fane. trep.	Arbusto trepador e suculento	Z11	E4, E10, E13(grupo)
<i>Lampranthus comptonii</i> (L. Bol.) N. E. Br.	Aizoaceae	Lamprantos- branco; Chorão	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	3-8	Fane. trep.	Arbusto trepador e suculento	Z11	E10, E12, E24 (grupo)
<i>Lampranthus deltoides</i> (L.) Glen.	Aizoaceae (Mesembryan- themaceae)	Osculária	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	3-8	Fane. trep.	Arbusto trepador e suculento	Z11	E12(grupo)
<i>Lampranthus multiradiatus</i> (Jacq.) N. E. Br.	Aizoaceae (Mesembryan- themaceae)	Lamprantos; Chorão	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Arbusto trepador e suculento	Z11	E5, E9, E17, E23 E26, E32(grupo)
<i>Lampranthus roseus</i> (Willd.) Schwantes	Aizoaceae (Mesembryan- themaceae)	Lamprantos; Chorão	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	4-12	Fane. trep.	Arbusto trepador e suculento	Z11	E19, E30 (grupo)
<i>Lampranthus spectabilis</i> (Haw.) N.E. Br.	Aizoaceae (Mesembryan- themaceae)	Lamprantos; Chorão	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Arbusto trepador e suculento	Z11	E8, E11, E19, E23 E26, E29, E31(grupo)
<i>Lantana camara</i> L.	Verbenaceae	Lantana	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	E2(1), E5, E8, E9 (grupo), E10(6), E12(3), E15, E19 (grupo), E20(7), E21(grupo), E22(9), E23(grupo), E26(4), E27(1), E29(grupo), E31(4)
<i>Lantana montevidensis</i> (Spreng.) Briq.	Verbenaceae	Lantana	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	E8(3), E10(2), E12(1), E15, E19(grupo), E27(3), E29, E31 (grupo)
<i>Lathyrus odoratus</i> L.	Leguminosae (Papilionoi-deae)	Ervilheira-de- cheiro	Paleártico	Sazonal	3-8	4-8	Terófito	Herbácea trepadora	Z4	E26(20)
<i>Laurus nobilis</i> L.	Lauraceae	Loureiro	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-6	Micro.	Árvore	Z7	E12(1)
<i>Laurus novocanariensis</i> Rivas Mart. & al.	Lauraceae	Loureiro	Paleártico	Perenifólio	1-12	11-3	Meso.	Árvore	Z10	E5(7), E6(10), E7(1), E11(3), E13(1), E14(11), E19(5), E20(5), E21(1), E22(16), E25(4), E26(134), E27(2), E28(78), E29(3), E30(121), E31(31)
<i>Lavandula angustifolia</i> Mill.	Labiatae	Alfazema; Lavanda	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z6	E11, E12, E19, E30 (grupo)
<i>Lavandula dentata</i> L.	Labiatae	Alfazema; Lavanda	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z8	E5, E12, E15, E17, E23, E26, E30, E32 (grupo)
<i>Lavandula dentata</i> L. var. <i>candicans</i> Battand.	Labiatae	Alfazema; Lavanda	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z8	E10, E21(grupo)
<i>Lavandula lanata</i> Boiss.	Labiatae	Alfazema	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z8	E5(grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Lavandula pinnata</i> L. f.	Labiatae	Alfazema; Lavanda	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z11	E19, E23(grupo), E25(1), E26(5), E28, E30, E32 (grupo)
<i>Lavandula stoechas</i> L.	Labiatae	Rosmaninho; Lavanda	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z7	E8, E16, E17(grupo)
<i>Lavatera trimestris</i> L.	Malvaceae	Lavatera	Paleártico	Sazonal	4-10	6-9	Terófito	Herbácea	Z8	E26(grupo)
<i>Lemna minor</i> L.	Lemnaceae	Pastinha; Lentilha-de-água	Indomalaio; Australiano	Perenifólio	1-12	6-10	Hidrófito	Herbácea	Z4	E22, E30, E31 (mancha)
<i>Leonotis leonurus</i> (L.) R. Br.	Labiatae	Rabos-de-leão; Orelhas-de-leão	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	3-11	Nano.	Arbusto	Z9	E10(9), E11(9), E12(2), E19(10), E30, E31(grupo)
<i>Leptospermum petersonii</i> Bail.	Myrtaceae	Leptospermo	Australiano	Perenifólio	1-12	4-10	Micro.	Arbusto	Z9	E26(2), E28(1)
<i>Leptospermum scoparium</i> Forst. & Forst. f.	Myrtaceae	Leptospermo; Urze-de-jardim	Australiano; Antártico	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z8	E2(grupo), E5(3), E8(2), E10(13), E11(grupo), E14(9), E19(2), E22(4), E23(2), E26(7), E28(4), E29(2), E30(grupo), E31(10)
<i>Leucadendron argenteum</i> (L.) R. Br.	Proteaceae	Árvore-de- prata	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	11-1	Micro.	Árvore	Z9	E12(1), E26(3), E30(9)
<i>Leucadendron conicum</i> (Lam.) I. Williams	Proteaceae	Leucadendro	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	10-2	Micro.	Arbusto	Z9	E30(1)
<i>Leucadendron eucalyptifolium</i> H. Buek ex Meisn.	Proteaceae	Leucadendro	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	12-2	Micro.	Arbusto	Z9	E30(10)
<i>Leucadendron laeureolum</i> (Lam.) Fourc.	Proteaceae	Leucadendro	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	11-5	Micro.	Arbusto	Z9	E30(1)
<i>Leucadendron salicifolium</i> (Salisb.) I. Williams	Proteaceae	Leucadendro	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	11-2	Nano.	Arbusto.	Z9	E30(2)
<i>Leucadendron salignum</i> Bergius x <i>L. laeureolum</i> (Lam.) Fourc.	Proteaceae	Safari-sunset	Hortícola	Perenifólio	1-12	11-2	Micro.	Arbusto	Z9	E5(1), E13(1), E19(1) E22(1), E26(2), E30(36)
<i>Leucadendron xanthoconus</i> (Kuntze) Schum.	Proteaceae	Leucadendro	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	3-6	Micro.	Arbusto	Z9	E26(1)
<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) De Wit.	Leguminosae (Mimosoideae)	Aroma-branco; Leucena	Neártico	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z9	E4(1), E8, E9, E12, (grupo), E19(1), E21(6), E23, E29, E31, E32 (grupo)
<i>Leucanthemum x superbum</i> (J. Ingram) Bergmans ex Kent	Compositae	Estrelas; Margarida-grande	Hortícola	Perenifólio	1-12	5-8	Nano.	Herbácea	Z5	E3, E5, E6, E8, E10, E12, E13, E18, E19, E21, E22, E28, E29, E30, E32, E33 (grupo)
<i>Leucojum vernum</i> L. var. <i>vagneri</i> Stapf.	Amaryllidaceae		Paleártico	Sazonal	11-4	11-3	Geófito	Herbácea	Z5	E26, E31(grupo)
<i>Leucospermum conocarpodendron</i> L. ssp. <i>viridum</i> Rourke	Proteaceae	Proteia- - almofada-de- alfinetes	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	11-5	Micro.	Arbusto	Z9	E30(2)
<i>Leucospermum cordifolium</i> (Salisb. ex Knight) Fourc.	Proteaceae	Proteia- almofada- de- alfinetes	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	12-8	Micro.	Arbusto	Z9	E30(6)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Leucospermum glabrum</i> E. Phillips.	Proteaceae	Proteia - almofada-de- alfinetes	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	11-3	Micro.	Arbusto	Z9	E30(5)
<i>Leucospermum patersonii</i> E. Phillips	Proteaceae	Proteia - almofada-de- alfinetes	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	3-5	Micro.	Arbusto	Z9	E26(2)
<i>Leucospermum praemorsum</i> (Meisn.) E. Phillips.	Proteaceae	Proteia - almofada-de- alfinetes	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-4	Micro.	Arbusto	Z9	E30(1)
<i>Leucospermum reflexum</i> H. Buek ex Meisn. var. <i>luteum</i> Rourke	Proteaceae	Proteia - almofada-de- alfinetes	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	11-7	Micro.	Arbusto	Z9	E30(1)
<i>Leucospermum reflexum</i> H. Buek ex Meisn.	Proteaceae	Proteia - almofada-de- alfinetes	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	11-5	Micro.	Arbusto	Z9	E26(1), E30(3)
<i>Leucospermum royenifolium</i> (Salisb. ex Knight) Stapf	Proteaceae	Proteia-almofada- de-alfinetes	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	12-7	Micro.	Arbusto	Z9	E30(1)
<i>Leycesteria formosa</i> Wallich	Caprifoliaceae		Paleártico	Caducifólio	4-12	5-7	Micro.	Arbusto	Z7	E30(1)
<i>Ligustrum lucidum</i> Ait. f.	Oleaceae	Ligustro; Alfinheiro	Paleártico	Perenifólio	1-12	6-9	Micro.	Árvore	Z7	E1(1), E3(6), E9(10), E11(grupo), E12(1), E13(10), E17(2), E18(1), E19(1), E21(2), E22(17), E24(sebe), E25(3 + sebe), E26(23), E27(1 + sebe), E29(20 + sebe), E30(1), E31(10), E32(2), E33(sebe)
<i>Ligustrum obtusifolium</i> Sieb. & Zucc.	Oleaceae	Ligustro; Alfinheiro	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-6; 11-12	Micro.	Arbusto	Z3	E2, E18, E19, E21, E24, E29 (grupo)
<i>Ligustrum ovalifolium</i> Hassk.	Oleaceae	Ligustro	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-7	Nano.	Arbusto	Z5	E3(grupo), E5(3), E7(1), E11(1), E13(grupo), E20(1), E22, E23(grupo), E24(1), E27, E30 (grupo)
<i>Ligustrum sinense</i> Lour.	Oleaceae	Ligustro-da-china; Alfenheiro; Alfena	Paleártico	Perenifólio	1-12	6-8	Micro.	Arbusto	Z7	E19(1), E24(2)
<i>Lilium candidum</i> L.	Liliaceae	Açucena-branca; Açucena-de- nossa-senhora	Paleártico	Sazonal	2-7	4-6	Geófita	Herbácea	Z6	E3, E4, E6, E12, E22, E26, E30(grupo)
<i>Lilium lancifolium</i> Thunb.	Liliaceae	Lírio	Paleártico	Sazonal	3-10	5-9	Geófita	Herbácea	Z6	E30(grupo)
<i>Limonium fruticans</i> (Webb) Kuntze	Plumbaginaceae	Limónio	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z11	E26(7), E31(5)
<i>Limonium sinuatum</i> (L.) Mill.	Plumbaginaceae	Limónio; Cuidados-eternos	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-11	Nano.	Herbácea	Z9	E5(grupo), E32(9)
<i>Liquidambar styraciflua</i> L.	Hamamelidaceae	Liquidambar	Neártico	Caducifólio	4-11	4-6	Meso.	Árvore	Z5	E22(3), E26(3), E28(3)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Liriodendron tulipifera</i> L.	Magnoliaceae	Tulipeiro-arbóreo	Neártico	Caducifólio	4-11	4-6	Meso.	Árvore	Z4	E5(3), E6(1), E10(1), E22(2), E26(4), E28(3), E30(1)
<i>Litchi chinensis</i> Sonn.	Sapindaceae	Lichia	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-6	Micro.	Árvore	Z10	E19(1), E25(1)
<i>Livistona australis</i> (R. Br.) Mart.	Palmae	Palmeira-de-leque	Australiano	Perenifólio	1-12	4-5	Meso.	Árvore	Z9	E12(3), E13(1), E19(8), E22(2), E26(1), E31(1)
<i>Livistona chinensis</i> (Jacq.) R. Br. ex Mart.	Palmae	Palmeira-de-leque	Paleártico	Perenifólio	1-12	2-5	Meso.	Árvore	Z9	E3(14), E5(13), E6(2), E7(3), E8(3), E9(3), E10(20), E12(13), E13(1), E18(5), E19(4), E21(7), E23(5), E25(2), E26(2), E27(2), E29(15), E30(2), E31(1), E32(27), E33(3)
<i>Lobelia erinus</i> L.	Campanulaceae	Lobélia	Áfrotropical	Sazonal	4-9	4-12	Terófito	Herbácea	Z9	E8, E18, E21, E26, E28, E31 (grupo)
<i>Lobelia laxiflora</i> HBK.	Campanulaceae	Lobélia	Neártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z9	E12, E22 (grupo), E29(4)
<i>Lobularia maritima</i> (L.) Desv.	Cruciferae	Lobulária	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z8	E5, E8, E13, E17, E18, E23, E26, E27, E31, E32 (grupo)
<i>Lonchocarpus sericeus</i> (Poir.) Kunth ex DC.	Leguminosae (Papilionoideae)	Loncocarpus	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-1	Meso.	Árvore	Z10	E18(1), E19(1), E21(1), E23(1), E29(1), E31(1)
<i>Lonicera caprifolium</i> L.	Caprifoliaceae	Madressilva-italiana	Paleártico	Perenifólio	1-12	6-8	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z5	E8(1)
<i>Lonicera hildebrandiana</i> Collett & Hemsl	Caprifoliaceae	Madressilva-gigante	Paleártico; Indomalaio	Perenifólio	1-12	4-8	Fane.trep.	Arbusto trepador	Z9	E5(1), E19(1), E31(1)
<i>Lonicera japonica</i> Thunb.	Caprifoliaceae	Madressilva	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z4	E5(grupo), E10(grupo), E12(6), E17(2), E19(1), E22(grupo), E25(1), E26(1), E28, E29, E30 (grupo)
<i>Loropetalum chinense</i> (R. Br.) Oliv.	Hamamelida-ceae		Paleártico; Indomalaio	Perenifólio	1-12	12-2	Micro.	Arbusto	Z9	E31(1)
<i>Lotus corniculatus</i> L. ssp. <i>hirsutus</i> (W.D.J. Koch) Rothm.	Leguminosae (Papilionoideae)	Lótus	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-7	Nano.	Herbácea	Z5	E12(grupo)
<i>Lotus glaucus</i> Aiton	Leguminosae (Papilionoideae)	Trevina	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-5	Caméfito	Herbácea	Z11	E19(grupo)
<i>Lotus uliginosus</i> Schkuhr	Leguminosae (Papilionoideae)	Lótus	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-8	Hemi.	Herbácea	Z6	E30(grupo)
<i>Luehea grandiflora</i> Mart.	Tiliaceae	Açoita-cavalo	Neotropical	Caducifólio	6-2	12-2	Micro.	Árvore	Z11	E31(1)
<i>Lunaria annua</i> L.	Cruciferae	Hóstias; Moedas	Paleártico	Sazonal	2-7	3-6	Terófito	Herbácea	Z8	E22, E26, E28(grupo)
<i>Lundia cordata</i> (Vell.) A. DC.	Bignoniaceae	Lundia	Neotropical	Perenifólio	1-12	12-3	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z11	E8(1)
<i>Lupinus luteus</i> L.	Leguminosae (Papilionoideae)	Tremoceiro	Paleártico	Sazonal	12-5	2-5	Terófito	Herbácea	Z6	E26 (grupo)
<i>Luzula maxima</i> (Rich.) DC.	Juncaceae	Luzula	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-5	Hemi.	Herbácea	Z6	E30(grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Luzula seubertii</i> Lowe	Juncaceae	Luzula	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-6	Hemi.	Herbácea	Z10	E28(1)
<i>Lychnis coronaria</i> (L.) Desr.	Caryophyllaceae	Licnis	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-8	Nano.	Herbácea	Z4	E22, E26, E31(grupo)
<i>Lychnis flos-jovis</i> (L.) Desr.	Caryophyllaceae	Licnis	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-8	Nano.	Herbácea	Z5	E22, E26(grupo)
<i>Lycianthes rantonnettii</i> Carr.	Solanaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z9	E6(2), E10(4), E19(1), E31(grupo)
<i>Lycopersicon esculentum</i> Mill.	Solanaceae	Tomateiro	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-8	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z9	E3(grupo)
<i>Lysimachia nummularia</i> L.	Primulaceae	Lisimáquia	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-11	Hemi.	Herbácea	Z4	E8, E16, E18, E22, E28 (grupo)
<i>Macadamia integrifolia</i> Maid. & Betch.	Proteaceae	Macadâmia	Australiano	Perenifólio	1-12	2-5	Micro.	Árvore	Z9	E5(4), E18(1), E23(1)
<i>Macfadyena unguis-cati</i> (L.) A. Gentry	Bignoniaceae	Bignónia-unha-de- gato	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-5	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z9	E5(1), E8(1), E11(1), E19(2), E26(1), E31(2)
<i>Mackaya bella</i> Harv.	Acanthaceae	Macaia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-7	Micro.	Arbusto	Z10	E10(1), E12(1), E32(1)
<i>Maclura pomifera</i> (Raf.) C. K. Schneid.	Moraceae		Neártico	Caducifólio	3-12	6-8	Micro.	Árvore	Z7	E19(1)
<i>Macrozamia communis</i> L. Jonhson	Zamiaceae	Macrozamia	Australiano	Perenifólio	1-12	6-10	Nano.	Árvore	Z9	E30(1)
<i>Macrozamia moorei</i> F. Muell.	Zamiaceae	Macrozamia	Australiano	Perenifólio	1-12	6-10	Micro.	Árvore	Z9	E30(1)
<i>Magnolia coco</i> (Lour.) DC.	Magnoliaceae	Magnólia	Indomalaio	Perenifólio	1-12	7-8	Nano.	Arbusto	Z9	E26(1)
<i>Magnolia denudata</i> Desr.	Magnoliaceae	Magnólia	Indomalaio; Paleártico	Caducifólio	2-11	12-2; 6	Micro.	Árvore	Z6	E26(1)
<i>Magnolia grandiflora</i> L.	Magnoliaceae	Magnólia	Neártico	Perenifólio	1-12	5-8	Micro.	Árvore	Z6	E1(2), E2(2), E3(2), E5(1), E6(5), E7(1), E9(3), E10(5), E11(3), E12(2), E13(4), E14(6), E18(3), E19(3), E20(8), E21(13), E22(2), E23(7), E24(1), E25(2), E26(19), E27(1), E28(2), E29(14), E30(3), E31(1), E32(6), E33(1)
<i>Magnolia liliflora</i> Desr.	Magnoliaceae	Magnólia	Paleártico	Caducifólio	2-11	12-3	Micro.	Arbusto	Z6	E26(3)
<i>Magnolia macrophylla</i> Michx.	Magnoliaceae	Magnólia-de – folhas-grandes	Neártico	Caducifólio	4-11	5-6	Micro.	Árvore	Z6	E26(2)
<i>Magnolia stellata</i> (Sieb. & Zucc.) Maxim.	Magnoliaceae	Magnólia-estrela	Paleártico	Caducifólio	2-11	11-3	Micro.	Arbusto	Z4	E22(1), E26(2)
<i>Magnolia x soulangiana</i> Soul. –Bod.	Magnoliaceae	Magnólia	Hortícola	Caducifólio	3-12	12-4	Micro.	Árvore	Z5	E6(1), E18(4), E19(2), E22(19), E26(26), E27(6), E28(2), E29(1), E30(4), E31(1), E32(1)
<i>Magnolia x thompsoniana</i> (Loud.) Vos.	Magnoliaceae	Magnólia	Hortícola	Caducifólio	3-12	3-6	Micro.	Árvore	Z5	E26(1)
<i>Mahonia aquifolium</i> (Pursh) Nutt	Berberidaceae	Maónia	Neártico	Perenifólio	1-12	1-3	Nano.	Arbusto	Z5	E26(1)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Mahonia bealei</i> (Fort.) Carr.	Berberidaceae	Maónia	Paleártico	Perenifólio	1-12	12-2	Nano.	Arbusto	Z6	E26(1)
<i>Mahonia japonica</i> (Thunb.) DC.	Berberidaceae	Maónia	Paleártico; Indomalaio	Perenifólio	1-12	12-2	Micro.	Arbusto	Z6	E11(1), E26(1), E30(2)
<i>Mahonia lomariifolia</i> Takeda	Berberidaceae	Maónia	Paleártico; Indomalaio	Perenifólio	1-12	12-2	Micro.	Arbusto	Z7	E26(2)
<i>Mahonia x media</i> C. Brickell	Berberidaceae	Maónia	Hortícola	Perenifólio	1-12	3-4	Nano.	Arbusto	Z6	E14(22), E26(1)
<i>Malcomia maritima</i> (L.) R. Br.	Cruciferae		Paleártico	Sazonal	2-5	2-5	Terófito	Herbácea	Z8	E26(grupo)
<i>Malpighia glabra</i> L.	Malpighiaceae	Acerola; Cereja-das- antilhas	Neotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Nano.	Arbusto	Z10	E19(1)
<i>Malus floribunda</i> Van Houtte	Rosaceae	Macieira-do-japão	Paleártico	Caducifólio	2-12	2-5	Micro.	Árvore	Z4	E19(1), E28(1)
<i>Malus pumila</i> Mill.	Rosaceae	Pereiro	Paleártico	Caducifólio	4-11	4-5	Micro.	Árvore	Z3	E22(1), E26(3), E31(1)
<i>Malus sylvestris</i> (L.) Mill.	Rosaceae	Pereiro	Paleártico	Caducifólio	4-11	4-11	Micro.	Árvore	Z3	E5(1)
<i>Malva sylvestris</i> L.	Malvaceae	Malva-silvestre; Malva-do-caminho	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-8	Nano.	Herbácea	Z5	E8, E23(grupo)
<i>Malvaviscus arboreus</i> Cav.	Malvaceae	Malvavisco	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z9	E12(1), E13(grupo), E19(10), E24(2), E26(1), E28(1), E29(8), E30(1), E31(1)
<i>Malvaviscus arboreus</i> Cav. var. <i>mexicanus</i> Schdl.	Malvaceae	Malvavisco	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z9	E10(15)
<i>Malvaviscus penduliflorus</i> DC.	Malvaceae	Malvavisco	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	E31(1)
<i>Mammillaria fittkaui</i> Glass & Foster	Cactaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	4-8	Hemi.	Herbácea suculenta	Z9	E12(9)
<i>Mammillaria sempervivi</i> DC.	Cactaceae	Mamilária	Neotropical	Perenifólio	1-12	7-11	Hemi.	Herbácea suculenta	Z9	E5(grupo), E12(2)
<i>Mandevilla boliviensis</i> (Hook. f.) Woodson.	Apocynaceae	Dipladénia-branca	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	E5(1), E8(1), E11(3), E12(3), E14(9), E19(1)
<i>Mandevilla laxa</i> (Ruiz & Pav.) Woodson.	Apocynaceae	Jasmim-chileno	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-9	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	E31(3)
<i>Mandevilla sanderi</i> (Hemsl.) Woodson.	Apocynaceae	Dipladénia	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	E8(1), E12(2), E14(12)
<i>Mandevilla splendens</i> (Hook. f.) Woodson.	Apocynaceae	Dipladénia	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	E5(1), E19(1), E26(2)
<i>Mandevilla x amoena</i> hort.	Apocynaceae	Dipladénia	Hortícola	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	E10(3)
<i>Mangifera indica</i> L.	Anacardiaceae	Mangueiro	Indomalaio	Perenifólio	1-12	9-6	Micro.	Árvore	Z11	E3(1), E5(36), E6(1), E9(1), E10(3), E12(5), E13(8), E19(1), E21(3), E23(4), E24(3), E27(1), E29(3), E32(6), E33(1)
<i>Manihot esculenta</i> Crantz.	Euphorbiaceae	Mandioca	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-8	Micro.	Arbusto	Z10	E19(2)
<i>Maranta arundinacea</i> L.	Marantaceae	Araruta	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-6	Hemi.	Herbácea	Z11	E31 (grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Maranta leuconeura</i> E. Morr.	Marantaceae	Maranta	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-6	Hemi.	Herbácea	Z11	E10(1), E32(grupo)
<i>Maranta leuconeura</i> E. Morr. var. <i>kerchoviana</i> E. Morr.	Marantaceae	Maranta	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-6	Hemi.	Herbácea	Z11	E25(grupo)
<i>Marcetella maderensis</i> (Bornm.) Svent.	Rosaceae	Marcetela	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-6	Nano.	Arbusto	Z10	E19(3), E23(1), E25(1), E28(1)
<i>Markamia lutea</i> (Benth.) Schum.	Bignoniaceae	Marcâmia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Meso.	Árvore	Z11	E1(1), E6(4), E9(2), E10(1), E15(3), E16(1), E17(2), E18(3), E19(3), E20(13), E21(1), E25(1), E29(2), E31(1), E32(1)
<i>Matthiola incana</i> (L.) R. Br.	Cruciferae	Goivos	Paleártico	Sazonal	1-7	3-7	Terófito	Herbácea	Z6	E4, E10, E18, E21, E23, E26, E29, E32 (grupo)
<i>Matthiola maderensis</i> Lowe	Cruciferae	Goivo-da-rocha	Paleártico	Sazonal	2-8	4-7	Terófito	Herbácea	Z10	E8, E19, E23, E28 (grupo)
<i>Maytenus umbellata</i> (R. Br.) Mabb.	Celastraceae	Buxo-da-rocha	Paleártico	Perenifólio	1-12	8-9	Micro.	Arbusto	Z11	E5(2), E7(1), E19(3), E23(2), E28(1), E30(3), E31(grupo)
<i>Medinilla magnifica</i> Lindl.	Melastomataceae	Medinila	Indomalaio	Perenifólio	1-12	6-9	Nano.	Arbusto	Z11	E12(6), E27(1)
<i>Medinilla myriantha</i> Merr.	Melastomataceae	Medinila	Indomalaio	Perenifólio	1-12	6-10	Nano.	Arbusto	Z11	E19(1)
<i>Melaleuca argentea</i> W. Fitzg.	Myrtaceae	Melaleuca	Australiano; Oceânia	Perenifólio	1-12	Não floriu**	Micro.	Árvore	Z9	E31(1)
<i>Melaleuca armaris</i> (Sol. ex Gaertn.) Sm.	Myrtaceae	Melaleuca	Australiano	Perenifólio	1-12	3-5	Micro.	Árvore	Z9	E5(4), E8(3), E19(37), E23(44), E27(2)
<i>Melaleuca bracteata</i> F. Meull.	Myrtaceae	Melaleuca	Australiano	Perenifólio	1-12	2-4	Micro.	Árvore	Z9	E26(1)
<i>Melaleuca diosmifolia</i> Andrews	Myrtaceae	Melaleuca	Australiano	Perenifólio	1-12	4-8	Micro.	Arbusto	Z9	E19(1)
<i>Melaleuca ericifolia</i> Sm.	Myrtaceae	Melaleuca	Australiano	Perenifólio	1-12	11-4	Micro.	Árvore	Z9	E26(3)
<i>Melaleuca hypericifolia</i> Sm.	Myrtaceae	Melaleuca	Australiano	Perenifólio	1-12	4-9	Micro.	Arbusto	Z9	E5(1), E19(2), E26(1), E31(2)
<i>Melaleuca leucadendra</i> (L.) L.	Myrtaceae	Melaleuca	Australiano; Oceânia; Indomalaio	Perenifólio	1-12	2-5	Meso.	Árvore	Z9	E33(1)
<i>Melaleuca linarifolia</i> Sm.	Myrtaceae	Melaleuca	Australiano	Perenifólio	1-12	4-7	Micro.	Árvore	Z9	E10(2), E26(1)
<i>Melaleuca quinquenervia</i> (Cav.) S.T. Blake	Myrtaceae	Melaleuca	Australiano; Oceânia	Perenifólio	1-12	11-4	Micro.	Árvore	Z9	E31(1)
<i>Melaleuca viridiflora</i> Sol. ex Gaertn.	Myrtaceae	Melaleuca	Australiano; Oceânia	Perenifólio	1-12	11-8	Micro.	Árvore	Z10	E26(4)
<i>Melanoselinum decipiens</i> (Schrad. & Wendl.) Hoffm.	Umbelliferae	Aipo-de-gado	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-6	Nano.	Herbácea	Z10	E22(grupo), E25(1), E28, E30(grupo)
<i>Melia azederach</i> L.	Meliaceae	Amargoseira; Mélia; Conteira; Lilás-da-índia	Paleártico; Indomalaio	Caducifólio	4-1	4-6	Micro.	Árvore	Z10	E6(2), E10(3), E19(23), E20(1), E23(1), E25(1), E27(2), E29(1)
<i>Melianthus major</i> L.	Meliantaceae		Áfricotropical	Perenifólio	1-12	3-5	Micro.	Arbusto	Z9	E3(1), E12(4), E19(7), E31(grupo), E32(1)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Melissa officinalis</i> L.	Labiatae	Erva-cidreira	Paleártico	Perenifólio	1-12	6-8	Nano.	Herbácea	Z4	E5, E10(grupo)
<i>Melocactus matanzanus</i> Léon	Cactaceae	Cacto	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-11	Caméfito	Herbácea suculenta	Z12	E5(grupo)
<i>Mentha aquatica</i> L.	Labiatae	Hortelã	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Herbácea	Z6	E6(grupo)
<i>Mentha spicata</i> L.	Labiatae	Hortelã-dos- jardins; Hortelã-de-leite	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Herbácea	Z3	E5, E8, E10, E13, E24, E29 (grupo)
<i>Mentha x piperita</i> L.	Labiatae	Hortelã-pimenta	Hortícola	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Herbácea	Z3	E13(grupo)
<i>Mesembryanthemum crystalinum</i> L.	Aizoaceae	Barrilha; Erva-gelada;	Áfricotropical	Sazonal	10-7	3-6	Terófito	Herbácea trepadora e suculenta	Z9	E8, E23(grupo)
<i>Mesembryanthemum nodiflorum</i> L.	Aizoaceae	Barrilha	Áfricotropical	Sazonal	10-7	3-6	Terófito	Herbácea trepadora e suculenta	Z9	E8, E23(grupo)
<i>Metasequoia glyptostroboides</i> Hu & Cheng	Cupressaceae	Metassequoia	Paleártico	Caducifólio	4-11	4-5	Micro.	Árvore	Z5	E26(1)
<i>Metrosideros excelsa</i> Sol. ex Gaertn.	Myrtaceae	Metrosidero	Antártico	Perenifólio	1-12	6-7	Meso.	Árvore	Z10	E5(1), E6(4), E8(1), E11(6 + sebe), E15(2), E19(5), E20(1), E22(2), E23(24 + sebe), E26(6), E30(2)
<i>Michelia doltsopa</i> Buch. - Ham. ex DC	Magnoliaceae		Paleártico	Perenifólio	1-12	1-3	Micro.	Árvore	Z9	E26(12)
<i>Michelia figo</i> (Lour.) Spreng	Magnoliaceae	Carocha	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-8	Micro.	Árvore	Z9	E22(1), E26(2), E28(1), E30(5), E31(1)
<i>Microlepidia platyphylla</i> (D. Don) J. Sm.	Dennstaedtiaceae	Feto	Paleártico; Indomalaio	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z10	E22(5)
<i>Mimosa pudica</i> L.	Leguminosae (Mimosoideae)	Sensitiva	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	E29(6), E32(1)
<i>Mirabilis jalapa</i> L.	Nyctaginaceae	Maravilha-do-peru	Neotropical	Sazonal	3-10	5-11	Geófito	Herbácea	Z8	E2(2), E9(grupo), E13(3), E23(grupo), E27(4), E26(1), E29(grupo)
<i>Miscanthus sinensis</i> Anderss. var. <i>condensatus</i>	Gramineae		Paleártico	Perenifólio	1-12	6-8	Hemi.	Herbácea	Z4	E5(grupo)
<i>Miscanthus sinensis</i> Anderss.	Gramineae		Paleártico	Perenifólio	1-12	6-8	Hemi.	Herbácea	Z4	E10, E26(grupo)
<i>Monizia edulis</i> Lowe	Umbelliferae	Cenoura-da-rocha; Nozelha	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-5	Nano.	Herbácea	Z10	E19(3), E22(3), E25(1), E28(2), E32(1)
<i>Monstera deliciosa</i> Liebm.	Araceae	Fruto-delicioso; Costela-de-adão	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z10	E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E16(grupo) E18(2), E19(1), E21(20), E22, E24, E25, E26, E27, E29, (grupo), E30(5), E31, E32, E33(grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Montanoa bipinnatifida</i> (Kunth) K. Kock	Compositae	Malmequer- arbóreo	Neotropical	Perenifólio	1-12	11-5	Micro.	Arbusto	Z10	E5(1), E10(1), E12(3), E18(1), E19(8), E22(3), E25(3), E26(4), E27(1), E28(3), E30(grupo), E31(2)
<i>Moraea polystachya</i> (Thunb.) Ker-Gawl.	Iridaceae		Áfricotropical	Perenifólio	1-12	11-3	Geófito	Herbácea	Z9	E26, E31(grupo)
<i>Morus alba</i> L.	Moraceae	Amoreira	Paleártico	Caducifólio	3-12	4-5	Micro.	Árvore	Z5	E19(2)
<i>Morus nigra</i> L.	Moraceae	Amoreira	Paleártico	Caducifólio	3-12	4-5	Micro.	Árvore	Z6	E3(3), E5(1), E8(1), E12(1), E25(1), E31(1)
<i>Muehlenbeckia complexa</i> (Cunn.) Meissn.	Polygonaceae	Trepadeira-de- aramé	Antártico	Perenifólio	1-12	7-9	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z8	E26, E31 (grupo)
<i>Murraya paniculata</i> (L.) Jack.	Rutaceae	Jasmim-laranja; Falsa-murta	Indomalaio; Australiano	Perenifólio	1-12	9-12	Micro.	Arbusto	Z10	E12(2)
<i>Musa acuminata</i> Colla	Musaceae	Bananeira	Indomalaio; Australiano	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	E8, E9, E11, E12, E13, E19, E23 (grupo)
<i>Musa acuminata</i> L. A. Colla ssp. <i>zebrina</i> (L. B. van Houtte) R. E. Nasution	Musaceae	Bananeira-zebrina	Indomalaio; Australiano	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	E14, E19 (grupo)
<i>Musa textilis</i> Née	Musaceae	Bananeira-de- manila	Indomalaio	Perenifólio	1-12	3-10	Hemi.	Herbácea	Z10	E19(grupo)
<i>Musa velutina</i> Wendl. & Drude.	Musaceae	Bananeira-de- jardim	Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z9	E5, E10, E12, E18, E19, E32, E33 (grupo)
<i>Musa x paradisiaca</i> L.	Musaceae	Bananeira-de- prata	Hortícola	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	E3, E5, E6, E8, E9, E10, E11, E13, E16, E18, E19, E24, E25, E29, E32 (grupo)
<i>Musschia aurea</i> (L. f.) Dumort.	Campanulaceae	Múchia-dourada	Paleártico	Perenifólio	1-12	6-8	Caméfito	Herbácea	Z11	E19(1), E32(1)
<i>Musschia wollastonii</i> Lowe	Campanulaceae	Múchia-de- wollaston	Paleártico	Perenifólio	1-12	Não floriu**	Nano.	Arbusto	Z10	E22(14), E28(2), E30(7)
<i>Myoporum tenuifolium</i> Forst. f.	Myoporaceae	Miopóro	Australiano	Perenifólio	1-12	2-5	Micro.	Árvore	Z9	E5(2), E23(grupo), E27(1)
<i>Myosotis alpestris</i> F. W. Schmidt	Boraginaceae	Miosotis	Paleártico; Neártico	Perenifólio	1-12	2-6	Caméfito	Herbácea	Z4	E26(grupo)
<i>Myrciaria cauliflora</i> (DC.) O. Berg.	Myrtaceae	Jaboticaba	Neotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Micro.	Árvore	Z10	E19(1)
<i>Myrica faya</i> Ait.	Myricaceae	Faia-das-ilhas; Samouco	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-5	Micro.	Árvore	Z9	E6(1), E14(13), E19(grupo), E20(8), E22(5), E23(>150), E25(1), E26(9), E28(1), E30(60)
<i>Myriocarpa longipes</i> Liebm.	Urticaceae	Miriocarpa	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-6	Micro.	Árvore	Z11	E26(1)
<i>Myrtus communis</i> L.	Myrtaceae	Murta	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-7; 10-11	Micro.	Arbusto	Z8	E2(1), E3(1), E5(4), E6(1), E7(2), E18(1), E23(4), E25(1), E26(2), E27(1), E31(2)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Nandina domestica</i> Thunb.	Berberidaceae	Nandina	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-9	Nano.	Arbusto	Z5	E10(3), E14(52), E26(3), E32(2)
<i>Narcissus bulbocodium</i> L.	Amaryllidaceae	Narciso	Paleártico	Sazonal	11-5	12-3	Geófito	Herbácea	Z6	E26(grupo)
<i>Narcissus pseudonarcissus</i> L.	Amaryllidaceae	Junquinhos	Paleártico	Sazonal	11-5	12-3	Geófito	Herbácea	Z6	E26, E30, E31(grupo)
<i>Narcissus tazetta</i> L.	Amaryllidaceae	Junquinhos	Paleártico	Sazonal	11-5	12-3	Geófito	Herbácea	Z8	E1, E2, E4, E5, E22 E26, E28, E30, E31(grupo)
<i>Nasturtium officinale</i> R. Br.	Cruciferae	Agrião	Paleártico	Perenifólio	1-12	2-10	Helófito	Herbácea	Z6	E23, E29 (grupo)
<i>Nemesia strumosa</i> Benth. in Hook.	Scrophulariaceae	Nemésia	Áfricotropical	Sazonal	3-8	3-8	Terófito	Herbácea	Z9	E21, E28 (grupo)
<i>Neobuxbaumia euphorbioides</i> (Haw.) F. Buxb.	Cactaceae	Cacto	Neotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Nano.	Arbusto suculento	Z9	E12 (grupo)
<i>Neodypsis decaryi</i> Jumelle	Palmae	Palmeira- triangular	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	6-7	Micro.	Árvore	Z11	E10(1), E11(4), E12(2), E19(1), E30(1)
<i>Neomarica caerulea</i> (Ker-Gawl.) Sprague	Iridaceae	Neomárica	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-10	Geófito	Herbácea	Z10	E12(1), E31(grupo)
<i>Neoregelia carolinae</i> (Beer) L. B.	Bromeliaceae	Bromélia	Neotropical	Perenifólio	1-12	11-2	Hemi.	Herbácea	Z10	E1(2), E2, E5, E12, E19, E20, E22, E29 (grupo), E32(7)
<i>Neoregelia compacta</i> (Mez) L. B. Smith	Bromeliaceae	Bromélia	Neotropical	Perenifólio	1-12	12-1	Hemi.	Herbácea	Z10	E30(grupo)
<i>Neoregelia concentrica</i> (Vell.) L. B. Sm.	Bromeliaceae	Bromélia	Neotropical	Perenifólio	1-12	11-1	Hemi.	Herbácea	Z10	E5, E29(grupo)
<i>Neoregelia johannis</i> (Carrière) L. B. Smith.	Bromeliaceae	Bromélia-ninho-de- passarinho	Neotropical	Perenifólio	1-12	8-1	Hemi.	Herbácea	Z10	E19, E21, E25, E29, E32(grupo)
<i>Neoregelia mamorata</i> (Baker) L. B. Smith.	Bromeliaceae	Bromélia-ninho-de- passarinho	Neotropical	Perenifólio	1-12	11-1	Hemi.	Herbácea	Z10	E19, E29(grupo)
<i>Nepenthes maxima</i> Reinw. ex Nees	Nepenthaceae	Nepentes	Oceânia	Perenifólio	1-12	8-9	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z11	E5(2)
<i>Nepeta x faassenii</i> Bergmans ex Stearn.	Labiatae	Hortelã-de-gato	Hortícola	Perenifólio	1-12	6-9	Nano.	Herbácea	Z3	E19, E26(grupo)
<i>Nephrolepis cordifolia</i> (L.) Presl.	Oleandraceae	Feto	Neotropical; Áfricotropical; Indomalaio; Oceânia; Australiano	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z10	E1, E2, E3, E4, E5, E6, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E18, E19, E22, E24, E25, E27, E28, E29, E30, E31, E32, E33 (grupo),
<i>Nephrolepis exaltata</i> (L.) Schott.	Oleandraceae	Feto	Neotropical; Áfricotropical; Indomalaio; Oceânia; Australiano	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z10	E5, E6, E12, E30 (grupo)
<i>Nerine angustifolia</i> Baker	Amaryllidaceae	Nerine	Áfricotropical	Sazonal	1-10	11-12	Geófito	Herbácea	Z11	E26(grupo)
<i>Nerine bowdenii</i> Will. Wats.	Amaryllidaceae	Nerine	Áfricotropical	Sazonal	1-7	7-12	Geófito	Herbácea	Z8	E31(grupo)
<i>Nerine samiensis</i> Herb.	Amaryllidaceae	Nerine	Áfricotropical	Sazonal	1-10	11-12	Geófito	Herbácea	Z11	E26, E31(grupo)
<i>Nerine undulata</i> Herb.	Amaryllidaceae	Nerine	Áfricotropical	Sazonal	7-10	11-6	Geófito	Herbácea	Z11	E26(grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Nerium oleander</i> L.	Apocynaceae	Sevadilha; Loendro	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-11	Micro.	Arbusto	Z9	E2(79), E3(3), E4(1), E5(23), E6(24), E7(10), E8(grupo), E9(21), E10(grupo), E11(8), E12(grupo), E13(20), E16(15), E17(4), E18(3), E19(grupo), E20(7), E21(61), E22(15), E23(grupo), E24(3), E25(2), E26(2), E27(5), E28(1), E29(5), E30(6), E31(9), E32(2), E33(grupo)
<i>Nicandra physaloides</i> (L.) Gaertn.	Solanaceae	Nicandra	Neotropical	Sazonal	9-6	9-5	Terófito	Herbácea	Z8	E23, E27(grupo)
<i>Nicotiana glauca</i> Grah.	Solanaceae	Tabaqueira-azul; Charuto-do-rei	Neotropical	Perenifólio	1-12	3-9	Micro.	Arbusto	Z8	E8, E9, E21, E23, E29 E32 (grupo)
<i>Nidularium fulgens</i> Lem.	Bromeliaceae	Bromélia	Neotropical	Perenifólio	1-12	2-7	Hemi.	Herbácea	Z10	E19(grupo), E32(1)
<i>Nidularium procerum</i> Lindm.	Bromeliaceae	Bromélia	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-6	Hemi.	Herbácea	Z10	E12(grupo)
<i>Niphidium crassifolium</i> (L.) Lellinger	Polypodiaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z10	E5(2), E19(grupo)
<i>Nolina longifolia</i> (Schult.) Hemsl.	Agavaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	6-7	Nano.	Árvore	Z10	E31(1)
<i>Nolina recurvata</i> (Lem.) Hemsl.	Agavaceae	Nolina; Pata-de-elefante	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-8; 10-12	Micro.	Árvore	Z9	E4(1), E5(5), E7(1), E8(2), E9(1), E11(3), E12(14), E13(18), E14(6), E17(1), E18(7), E19(10), E21(3), E22(1), E23(2), E25(3), E26(1), E27(1), E29(6), E30(>100), E31(1), E32(2), E33(4)
<i>Notholaena marantae</i> (L.) Desv. ssp. <i>subcordata</i> (Cav.) G. Kunkel	Adiantaceae	Queilantes	Paleártico	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z10	E19(1)
<i>Nothoscordum gracile</i> (Ait.) Stearn.	Liliaceae (Alliaceae)	Alinhos	Neotropical	Sazonal	1-4	1-3	Geófito	Herbácea	Z7	E10, E12, E22, E26, E30 (grupo)
<i>Nymphaea alba</i> L.	Nymphaeaceae	Nenúfar-branco	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-8	Helófito	Herbácea	Z6	E5, E6, E14, E26 (grupo)
<i>Nymphaea capensis</i> Thunb.	Nymphaeaceae	Nenúfar-azul-do- cabo	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	7-9	Helófito	Herbácea	Z9	E26, E31, E33(grupo)
<i>Nymphoides peltata</i> (S. G. Gmel.) Kuntze	Menyanthaceae		Paleártico	Perenifólio	1-12	7-9	Hidrófito	Herbácea	Z6	E31(grupo)
<i>Ochna serrulata</i> (Hochst.) Walp.	Ochnaceae	Planta-do-rato- mickey	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	2-4	Nano.	Arbusto	Z9	E1(1), E2(7), E3(1), E7(1), E11(5), E12(grupo), E13(10), E18(1), E25(4), E26(3), E27(14), E29(2), E30(1), E32(1)
<i>Ocimum basilicum</i> L.	Labiatae	Manjerição-grande	Indomalaio	Sazonal	4-9	5-9	Terófito	Herbácea	Z10	E10, E12, E13, E31(grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Ocotea foetens</i> (Aiton) Baill.	Lauraceae	Til	Paleártico	Perenifólio	1-12	10-3; 6-7	Meso.	Árvore	Z10	E2(3), E3(2), E4(1), E6(26), E7(5), E9(1), E10(18), E11(22), E12(1), E13(3), E14(16), E15(6), E18(4), E19(33), E20(14), E21(10), E22(47), E23(13), E25(7), E26(14), E27(2), E28(2), E29(2), E30(109), E31(2), E32(9)
<i>Odontonema strictum</i> (Nees) Kuntze	Acanthaceae	Odontonema; Ramo-de-fogo	Neotropical	Perenifólio	1-12	8-12	Nano.	Arbusto	Z10	E3(1), E4(1), E5(grupo), E6(4), E8(1), E9(1), E10(23), E12(grupo), E13(grupo), E17(8), E18(1), E19(3), E26(7), E27(3), E30(1), E31, E32 (grupo)
<i>Oenanthe divaricata</i> (R. Br.) Mabb.	Umbelliferae	Aipo-preto; Salsa-brava	Paleártico	Perenifólio	1-12	6-8	Hemi.	Herbácea	Z10	E28(2)
<i>Oenothera fruticosa</i> L.	Onagraceae	Oenotera	Neártico	Sazonal	1-10	3-9	Terófito	Herbáceda	Z4	E18, E29, E32(grupo)
<i>Olea europaea</i> L.	Oleaceae	Oliveira	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-6	Micro.	Árvore	Z8	E7(2), E30(8)
<i>Olea maderensis</i> (Lowe) Rivas Mart. & Del Arco	Oleaceae	Oliveira-brava; Oliveira-da-rocha; Zambujeiro	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-6	Micro.	Árvore	Z11	E12(4), E19(2), E29(1)
<i>Oncidium lanceanum</i> Lindley	Orchidaceae	Orquídea-de-cheiro	Neotropical	Perenifólio	1-12	3-5	Epífita	Herbácea	Z11	E25(grupo)
<i>Oncidium phalaenopsis</i> Linden & Reichb. f.	Orchidaceae	Oncidio	Neotropical	Perenifólio	1-12	10-12	Epífita	Herbácea	Z11	E5(grupo)
<i>Oncidium sphacelatum</i> Lindley	Orchidaceae	Oncidio	Neotropical	Perenifólio	1-12	10-12	Epífita	Herbácea	Z11	E5(1), E10(1)
<i>Oncoba spinosa</i> Forssk.	Flacourtiaceae	Oncoba	Paleártico	Perenifólio	1-12	8-9	Micro.	Arbusto	Z10	E26(2)
<i>Ophiopogon jaburan</i> (Kunth) Lodd	Liliaceae (Convallariaceae)	Relva-do-japão	Paleártico	Perenifólio	1-12	7-9	Hemi.	Herbácea	Z7	E19, E29, E30, E31(grupo)
<i>Ophiopogon japonicus</i> (L. f.) Ker-Gawl	Liliaceae (Convallariaceae)	Relva-do-japão	Paleártico	Perenifólio	1-12	7-9	Hemi.	Herbácea	Z8	E2, E5, E10, E11, E12, E13, E14, E18, E19, E22, E25, E27, E28, E29, E30, E31(mancha),
<i>Ophiopogon planiscapus</i> Nak.	Liliaceae (Convallariaceae)	Relva-preta-do-japão	Paleártico	Perenifólio	1-12	7-9	Hemi.	Herbácea	Z6	E12, E19(grupo)
<i>Opuntia brasiliensis</i> (Willd.) Haw.	Cactaceae	Tabaibeira-do-brasil	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-8	Micro.	Árvore suculenta	Z9	E7(1), E10(grupo), E13(2)
<i>Opuntia compressa</i> (Salisb.) Macbr.	Cactaceae	Tabaibeira; Cacto	Neártico	Perenifólio	1-12	5-8	Nano.	Arbusto suculento	Z8	E8(3), E31(grupo), E32(1)
<i>Opuntia cylindrica</i> (Lam.) DC.	Cactaceae	Cacto-redondo	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-7	Micro.	Arbusto suculento	Z9	E5(10), E10(1), E12(2), E13(6), E23(1)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Opuntia ficus-indica</i> (L.) Mill.	Cactaceae	Tabaibeira	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-7	Micro.	Arbusto suculento	Z9	E21(11), E23, E29, E31 (grupo), E32(1)
<i>Opuntia leucotricha</i> DC.	Cactaceae	Cacto; Tabaibeira	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-7	Nano.	Arbusto suculento	Z9	E5(3), E21(1)
<i>Opuntia macrocentra</i> Engelm.	Cactaceae	Tabaibeira	Neártico	Perenifólio	1-12	5-6	Nano.	Arbusto suculento	Z9	E12(2)
<i>Opuntia microdasys</i> (Lehm.) Pfeiff. var. <i>albispina</i>	Cactaceae	Cacto	Neártico	Perenifólio	1-12	5-7	Nano.	Arbusto suculento	Z8	E8(1), E10(grupo), E14(6), E23(1)
<i>Opuntia monacantha</i> (Willd.) Haw. f. <i>variegata</i>	Cactaceae	Cacto	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-7	Nano.	Arbusto suculento	Z9	E5(4), E23(2), E33(1)
<i>Opuntia robusta</i> Wendl. & Pfeiff.	Cactaceae	Cacto; Tabaibeira	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-7	Nano.	Arbusto suculento	Z9	E5(2), E10(grupo), E23(3), E33(1)
<i>Opuntia subulata</i> (Muehlenph.) Engelm.	Cactaceae	Cacto	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-7	Micro.	Arbusto suculento	Z9	E5(1)
<i>Opuntia tuna</i> (L.) Mill.	Cactaceae	Tabaibeira	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-9	Micro.	Arbusto suculento	Z9	E20(grupo), E21(1), E23(grupo)
<i>Opuntia tunicata</i> (Lehm.) Link & Otto.	Cactaceae	Cacto	Neártico	Perenifólio	1-12	5-7	Caméfito	Herbácea suculenta	Z9	E19(1)
<i>Oreopteris limbosperma</i> (All.) Holub	Thelypteridaceae	Feto	Paleártico	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z7	E12(grupo)
<i>Origanum majorana</i> L.	Labiatae	Manjerona	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-9	Nano.	Herbácea	Z7	E8, E12, E13 (grupo)
<i>Origanum vulgare</i> L.	Labiatae	Orégão	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-9	Nano.	Herbácea	Z5	E13, E29(grupo)
<i>Ornithogalum narbonense</i> L.	Liliaceae (Hyacinthaceae)		Paleártico	Sazonal	10-5	1-2	Geófito	Herbácea	Z7	E26(grupo)
<i>Ornithogalum thyrsoides</i> Jacq.	Liliaceae (Hyacinthaceae)	Torrões-de-açúcar	Áfricotropical	Sazonal	10-6	5-6	Geófito	Herbácea	Z9	E5, E8, E19, E26 (grupo)
<i>Orontium aquaticum</i> L.	Araceae		Neártico	Perenifólio	1-12	6-9	Helófito	Herbácea	Z7	E30(grupo)
<i>Osmanthus heterophyllus</i> (G. Don) P. Green	Oleaceae	Falso-azevinho	Paleártico; Indomalaio	Perenifólio	1-12	4-5	Micro.	Arbusto	Z7	E19(1)
<i>Osmunda regalis</i> L.	Osmundaceae	Feto-real	Paleártico; Neártico	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z3	E12(2)
<i>Osteospermum barberiae</i> (Harv.) Norl.	Compositae	Estrelas-do- cabo	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Caméfito	Arbusto	Z10	E2, E4, E6, E8, E14, E19, E20, E21, E22, E23, E26, E27, E28, E29, E30, E31 (grupo)
<i>Osteospermum ecklonis</i> (DC.) Norl.	Compositae	Estrelas-do- cabo	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Caméfito	Arbusto	Z10	E8, E9, E14, E19, E20, E21, E22, E23 E26, E28, E29, E30, E31 (grupo)
<i>Othonna capensis</i> L. H. Bail.	Compositae		Áfricotropical	Perenifólio	1-12	6-9	Caméfito	Herbácea suculenta	Z9	E12(5)
<i>Oxalis bowiei</i> Lindl.	Oxalidaceae	Trevo	Áfricotropical	Sazonal	6-11	8-10	Geófito	Herbácea	Z9	E29(grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Oxalis latifolia</i> HBK.	Oxalidaceae	Trevo	Neotropical	Sazonal	10-5	12-4	Geófita	Herbácea	Z9	E2, E5, E9, E12, E25, E26, E27 (grupo)
<i>Oxalis pes-caprae</i> L.	Oxalidaceae	Azedas; Trevo	Áfricotropical	Sazonal	10-5	12-4	Geófita	Herbácea	Z9	E5, E21, E22, E26, E28, E30, E31(grupo)
<i>Oxalis purpurea</i> L.	Oxalidaceae	Azedas; Trevo-vermelho	Áfricotropical	Sazonal	10-5	12-4	Geófita	Herbácea	Z9	E26, E28 (grupo)
<i>Oxalis vulcanicola</i> J. D. Sm.	Oxalidaceae	Trevo-dourado	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Geófita	Herbácea	Z8	E30(grupo)
<i>Pachira insignis</i> (Sw.) Savigny	Bombacaceae	Paquira	Neotropical	Perenifólio	1-12	7-8	Micro.	Árvore	Z10	E5(2), E19(2), E31(1)
<i>Pachycereus marginatus</i> (DC.) Britt. & Hunt.	Cactaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	7-8	Micro.	Arbusto suculento	Z9	E8(1)
<i>Pachycereus pringlei</i> (S. Wats.)	Cactaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Nano.	Arbusto suculento	Z9	E5(1)
<i>Pachycereus schottii</i> (Engelm.) D. Hunt.	Cactaceae	Cacto	Neártico	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Nano.	Arbusto suculento	Z9	E23(3)
<i>Pachypodium lamerei</i> Drake	Apocynaceae	Paquipódio	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	8-9	Micro.	Árvore suculenta	Z9	E5(1), E8(1), E10(5), E12(5)
<i>Pachystachys coccinea</i> (Aubl.) Nees.	Acanthaceae	Guarda-do-cardeal	Neotropical	Perenifólio	1-12	11-4	Nano.	Arbusto	Z12	E26(1)
<i>Pamianthe peruviana</i> Stapf	Amaryllidaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	10-12	Geófita	Herbácea	Z10	E3(3), E26(grupo)
<i>Pandanus utilis</i> Bory	Pandanaceae	Pândano	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	9-3	Micro.	Árvore	Z10	E5(1), E8(3), E14(4), E18(1), E19(2), E25(1), E29(2), E30(2)
<i>Pandorea jasminoides</i> (Lindl.) Schum.	Bignoniaceae	Bignónia	Australiano	Perenifólio	1-12	4-11	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z9	E10(1), E12(grupo), E14 (24)
<i>Papaver nudicaule</i> L.	Papaveraceae	Papoila-da-islândia	Paleártico; Neártico	Sazonal	2-7	3-7	Terófita	Herbácea	Z2	E26, E31(grupo)
<i>Papaver rhoeas</i> L.	Papaveraceae	Papoila	Paleártico	Sazonal	4-8	5-8	Terófita	Herbácea	Z5	E19, E25(grupo)
<i>Papaver somniferum</i> L.	Papaveraceae	Papoila-do-ópio	Paleártico	Sazonal	4-7	5-7	Terófita	Herbácea	Z7	E24, E26, E31(grupo)
<i>Paphiopedilum insigne</i> (Wallich ex Lindl.) Pfitz.	Orchidaceae	Sapatinho	Indomalaio	Perenifólio	1-12	11-4	Hemi.	Herbácea	Z10	E5, E25, E30(grupo)
<i>Parietaria judaica</i> L.	Urticaceae	Alfavaca; Alfavaca-de-cobra	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-9	Nano.	Arbusto	Z8	E8, E25, E29, E30 (grupo)
<i>Parthenocissus quinquefolia</i> (L.) Planch.	Vitaceae	Vinha-virgem	Neártico	Caducifólio	4-12	5-7	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z3	E5, E11(grupo)
<i>Parthenocissus tricuspidata</i> Planchon	Vitaceae	Vinha-virgem	Paleártico	Caducifólio	4-12	5-6	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z4	E6, E9, E11(grupo), E12(2), E14(grupo), E22(grupo), E26(1)
<i>Paspalum dilatatum</i> Poir.	Gramineae	Erva-rija; Erva-do-governo	Neotropical	Perenifólio	1-12	3-9	Hemi.	Herbácea	Z8	E3, E4, E5, E9, E13, E19, E20, E23, E26, E27, E29, E31, E33 (tapete)
<i>Passiflora amethystina</i> Mikan.	Passifloraceae	Maracujá; Flor-da-paixão	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-7	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	E12(3)
<i>Passiflora caerulea</i> L.	Passifloraceae	Maracujá; Flor-da-paixão	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-7	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z8	E12(1)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Passiflora coccinea</i> Aubl.	Passifloraceae	Maracujá-de-flor-vermelha	Neotropical	Perenifólio	1-12	11-5	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	E26(1)
<i>Passiflora edulis</i> Sims	Passifloraceae	Maracujá-roxo; Flor-da-paixão	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-11	Fane.trep.	Arbusto trepador	Z10	E3(grupo), E4(1), E5(1), E11, E12 (grupo), E13(4), E24(1), E29(1), E30(3), E31(3), E33(2)
<i>Passiflora mollissima</i> (HBK.) L. H. Bail.	Passifloraceae	Maracujá-banana	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z8	E19(1), E22(1), E28(grupo), E30(4)
<i>Passiflora sanguinolenta</i> Mast. & Linden	Passifloraceae	Maracujá	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-7	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	E10(1)
<i>Passiflora subpeltata</i> Ortega	Passifloraceae	Maracujá-branco	Neotropical	Perenifólio	1-12	7-9	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	E9(grupo)
<i>Passiflora x alato-caerulea</i> (P. alata x P. caerulea)	Passifloraceae	Maracujá; Flor-da-paixão	Hortícola	Perenifólio	1-12	5-7	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z9	E12(2)
<i>Passiflora x caerulea-racemosa</i> (P. caerulea x P. racemosa)	Passifloraceae	Maracujá; Flor-da-paixão	Hortícola	Perenifólio	1-12	3-6	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z9	E12(grupo)
<i>Paulownia tomentosa</i> (Thunb.) Steud.	Scrophularia-ceae	Paulônia	Paleártico	Caducifólio	6-11	4-6	Micro.	Árvore	Z5	E26(4)
<i>Pelargonium citronellum</i> J. J. A. van der Walt	Geraniaceae	Malva-limão	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	3-11	Nano.	Arbusto	Z10	E30(grupo)
<i>Pelargonium cucullatum</i> (L.) L'Hérit	Geraniaceae	Malvas	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	4-9	Nano.	Arbusto	Z10	E2, E4, E26(grupo), E33(1)
<i>Pelargonium cucullatum</i> (L.) L'Hérit. ssp. <i>tabulare</i> Volschenk	Geraniaceae	Malva	Africotropical	Perenifólio	1-12	4-9	Nano.	Arbusto	Z10	E24(2)
<i>Pelargonium graveolens</i> L' Hérit	Geraniaceae	Malva	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	3-6	Nano.	Arbusto	Z10	E8, E10, E30(grupo)
<i>Pelargonium inquinans</i> (L.) L'Hérit	Geraniaceae	Malva-vermelha	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	E5, E23, E29(grupo)
<i>Pelargonium odoratissimum</i> (L.) L'Hérit	Geraniaceae	Malvas	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	4-8	Nano.	Arbusto	Z10	E10(grupo)
<i>Pelargonium peltatum</i> (L.) L'Hérit.	Geraniaceae	Malva	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z10	E2, E3, E5, E6, E8, E9, E11, E12, E19, E21, E22, E23, E24, E26, E27, E29, E31, E33(grupo)
<i>Pelargonium quercifolium</i> (L.) L'Hérit.	Geraniaceae	Malva	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	2-8	Nano.	Arbusto	Z10	E5, E10, E12, E13, E26(grupo)
<i>Pelargonium tomentosum</i> Jacq.	Geraniaceae	Malva	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	5-6	Caméfito	Arbusto	Z10	E10, E31(grupo)
<i>Pelargonium vitifolium</i> (L.) L'Hérit.	Geraniaceae	Malvas	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	E28(grupo)
<i>Pelargonium x hortorum</i> L. H. Bail.	Geraniaceae	Malvas	Hortícola	Perenifólio	1-12	4-7	Nano.	Herbácea	Z10	E7, E8, E16, E17, E18, E21, E30, E32 (grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Pelargonium zonale</i> (L.) L'Hérit	Geraniaceae	Malva	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	E1, E2, E5, E6, E11, E12, E13, E19, E20, E22, E23, E26, E28, E31, E33 (grupo)
<i>Pellaea rotundifolia</i> (Forst.f.) Hook.	Adiantaceae		Australiano; Antártico	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z9	E19(grupo)
<i>Pennisetum clandestinum</i> Hochst. ex Chiov.	Gramineae	Relva	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z9	E10 (tapete)
<i>Pennisetum purpureum</i> Schum.	Gramineae		Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	E10, E23(grupo)
<i>Pennisetum villosum</i> R. Br. ex Fresen.	Gramineae		Áfricotropical	Sazonal	10-12	10-12	Hemi.	Herbácea	Z8	E31(grupo)
<i>Penstemon barbatus</i> (Cav.) Roth.	Scrophulariaceae		Neártico	Perenifólio	1-12	7-11	Nano.	Herbácea	Z3	E25, E26(grupo)
<i>Pentas lanceolata</i> (Forssk.) Deflers.	Rubiaceae	Pentas	Áfricotropical; Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	E5(2), E10, E12, E19 (grupo), E26(6)
<i>Peperomia argyreia</i> Morr.	Piperaceae	Conchinhas	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Caméfito	Herbácea	Z11	E31(grupo)
<i>Peperomia glabella</i> (Sw.) A. Dietr.	Piperaceae	Peperómia	Neotropical	Perenifólio	1-12	7-10	Caméfito	Herbácea	Z11	E9(grupo), E30(1)
<i>Peperomia magnoliifolia</i> (Jacq.) Dietr.	Piperaceae	Peperómia	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-10	Caméfito	Herbácea	Z11	E10 (grupo), E12(1)
<i>Pericallis aurita</i> (L' Hérit.) B. Nord.	Compositae	Erva-de- coelho	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-7	Nano.	Arbusto	Z10	E28(2), E30(grupo), E32(1)
<i>Pericallis x hybrida</i> R. Nordenstam	Compositae	Cinerária	Hortícola	Sazonal	1-7	3-6	Terófito	Herbácea	Z10	E6, E7, E18, E22, E24, E25, E26, E27, E29 (grupo)
<i>Persea americana</i> Mill.	Lauraceae	Abacateiro	Neotropical	Perenifólio	1-12	11-5	Micro.	Árvore	Z10	E1(2), E3(6), E4(2), E6(2), E9(7), E10(6), E11(1), E12(1), E13(4), E17(1), E19(1), E21(3), E22(4), E23(1), E27(1), E31(6)
<i>Persea indica</i> (L.) Spreng.	Lauraceae	Vinhático	Paleártico	Perenifólio	1-12	7-9	Meso.	Árvore	Z10	E6(2), E14(11), E22(7), E26(4), E29(2), E30(5)
<i>Petasites fragrans</i> (Vill.) Presl.	Compositae	Sombreiro	Paleártico	Perenifólio	1-12	2-5	Hemi.	Herbácea	Z7	E14, E26(grupo)
<i>Petrea volubilis</i> L.	Verbenaceae	Estrela-azul; Viuvinha	Neotropical	Perenifólio	1-12	3-12	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	E5(6), E10(1), E12(2), E18(1), E26(1), E31(grupo)
<i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) A. W. Hill.	Umbelliferae	Salsa	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Herbácea	Z5	E10, E12, E24, E30, E31 (grupo)
<i>Petunia x hybrida</i> hort. Vilm.- Andr.	Solanaceae	Petúnia	Hortícola	Sazonal	2-11	2-11	Terófito	Herbácea	Z9	E5, E8, C9, E12, E13, E18, E23, E25, E31 (grupo)
<i>Peucedanum lowei</i> (Coss.) Menezes	Umbelliferae	Imperatória; Peucedano	Paleártico	Perenifólio	1-12	7-10	Hemi.	Herbácea	Z10	E22(12), E30(13)
<i>Phaedranassa camili</i> Bak.	Amaryllidaceae		Neotropical	Sazonal	3-6	3-6	Geófito	Herbácea	Z8	E12(2)
<i>Phalaenopsis amabilis</i> (L.) Blume	Orchidaceae	Falanópsia	Indomalaio; Oceânia; Australiano	Perenifólio	1-12	1-12	Epífita	Herbácea	Z11	E5, E25 (grupo)
<i>Phalaenopsis schilleriana</i>	Orchidaceae	Falanópsia	Indomalaio	Perenifólio	1-12	10-6	Epífita	Herbácea	Z11	E5, E25 (grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
Reichb. f.										
<i>Phalaenopsis stuartiana</i> Reichb. f.	Orchidaceae	Falanópsia	Indomalaio	Perenifólio	1-12	10-6	Epífita	Herbácea	Z11	E12(grupo)
<i>Phalaris arundinacea</i> L.	Gramineae		Paleártico; Neártico; Neotropical	Perenifólio	1-12	7-11	Hemi.	Herbácea	Z4	E22(grupo)
<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	Leguminosae (Papilionoideae)	Feijoeiro	Neotropical	Sazonal	4-8	5-6	Terófito	Herbácea trepadora	Z7	E3(grupo)
<i>Philadelphus coronarius</i> L.	Hydrangeaceae (Philadelphaceae)		Paleártico	Caducifólio	3-12	4-7	Micro.	Arbusto	Z5	E10(1), E22(7)
<i>Philodendron bipinnatifidum</i> Endl.	Araceae	Filodendro	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-7	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	E9(grupo), E10(5), E11(7), E12(2), E13(1), E18(4), E29(1), E31(1), E32(3)
<i>Philodendron callosum</i> K. Krause	Araceae	Filodendro	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-7	Hemi.	Herbácea	Z12	E30(grupo)
<i>Philodendron erubescens</i> K. Koch & Augustin	Araceae	Filodendro	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-6	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z11	E5(13), E6(4), E10(grupo), E12(21), E13(grupo), E18(3), E24(1), E25(6), E30(grupo), E31(1), E33(grupo)
<i>Philodendron fendlerii</i> K. Krause	Araceae	Filodendro	Neotropical	Perenifólio	1-12	3-4	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z11	E25(2)
<i>Philodendron imbe</i> Schott	Araceae	Filodendro	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-6	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z12	E5(1)
<i>Philodendron lacerum</i> (Jacq.) Schott.	Araceae	Filodendro	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-6	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z11	E7(2)
<i>Philodendron mayoi</i> E. G. Gonç.	Araceae	Filodendro	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-6	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z11	E10(1)
<i>Philodendron pinnatifidum</i> Schott.	Araceae	Filodendro	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-6	Hemi.	Arbusto	Z11	E10(grupo), E12(6), E25(2), E30(1), E33(1)
<i>Philodendron quinquelobum</i> K. Krause	Araceae	Filodendro	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-6	Fane. trep.	Herbácea	Z12	E12(1)
<i>Philodendron scandens</i> K. Koch & Sello ssp. <i>oxycardium</i> (Schott) Bunting	Araceae	Filodendro	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-6	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z11	E18(1)
<i>Philodendron undulatum</i> Engl.	Araceae	Filodendro	Neotropical	Perenifólio	1-12	3-4	Nano.	Arbusto	Z11	E12(1), E23(1)
<i>Phlebodium aureum</i> (L.) J. Sm.	Polypodiaceae	Polipódio-dourado	Neártico; Neotropical	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z10	E2, E5, E6, E7, E10, E12, E13, E22, E24, E25, E26, E27, E29, E30, E31, E32 (grupo)
<i>Phlomis fruticosa</i> L.	Labiatae		Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z7	E19(3), E26(8), E30(1)
<i>Phlox drummondii</i> Hook	Polemoniaceae	Floxe	Neártico	Sazonal	2-7	3-6	Terófito	Herbácea	Z6	E6 (grupo)
<i>Phlox paniculata</i> L.	Polemoniaceae		Neártico	Perenifólio	1-12	7-10	Nano.	Herbácea	Z4	E9, E26(grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Phoenix canariensis</i> Chabaud.	Palmae	Palmeira-das-canárias	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-3	Meso.	Árvore	Z11	E2(5), E3(12), E4(1), E5(7), E6(17), E7(11), E8(32), E9(44), 10(3), E11(9), E12(55), E13(30), E14(5), E15(3), E16(1), E17(1), E18(10), E19(4), E20(44), E21(58), E22(12), E23(118), E24(1), E25(4), E26(6), E27(19), E29(60), E30(8), E31(20), E32(13), E33(3)
<i>Phoenix dactylifera</i> L.	Palmae	Tamareira	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-3	Meso.	Árvore	Z11	E5(6), E6(2), E7(1), E9(8), E11(2), E12(7), E15(1), E19(4), E23(38), E25(1), E26(2), E29(2), E30(1), E31(3), E32(2)
<i>Phoenix reclinata</i> Jacq.	Palmae	Tamareira-do-senegal	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	5-7	Micro.	Árvore	Z11	E5(20), E7(2), E9(2), E10(2), E13(1), E18(1), E21(3), E23(2), E26(1), E27(7), E28(1), E29(25), E30(2), E31(6)
<i>Phoenix roebelinii</i> O' Brien.	Palmae	Palmeira-anã	Indomalaio	Perenifólio	1-12	5-7	Micro.	Árvore	Z11	E5(6), E6(2), E8(2), E9(2), E10(32), E11(3), E12(4), E13(1), E15(2), E16(1), E17(2), E18(2), E19(13), E21(3), E23(6), E24(1), E25(3), E27(1), E29(5), E30(5), E32(1)
<i>Phormium colensoi</i> Hook. f.	Agavaceae	Espadana	Antártico	Perenifólio	1-12	6-7	Hemi.	Herbácea	Z8	E26(5)
<i>Phormium tenax</i> Forst. & Forst. f.	Agavaceae	Espadana	Antártico	Perenifólio	1-12	6-8	Hemi.	Herbácea	Z8	E5(grupo), E10(5), E11(grupo), E14(grupo), E16(1), E19(2), E22(1), E23(13), E25(1), E26(4), E27(grupo), E29(1), E30(grupo), E31(1)
<i>Photinia serratifolia</i> (Desf.) Kalkman	Rosaceae	Fotinia	Paleártico; Indomalaio	Perenifólio	1-12	4-6	Micro.	Árvore	Z7	E31(1)
<i>Photinia x fraseri</i> Dress	Rosaceae	Fotinia	Hortícola	Perenifólio	1-12	4-6	Micro.	Arbusto	Z8	E6(1), E11(4), E19(1), E30(2)
<i>Phragmipedium shlimii</i> (Lind. & Rchb. f.) Rolfe.	Orchidaceae	Sapatinho-da-américa	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z11	E25(grupo)
<i>Phyllanthus arbuscula</i> (Sw.) J. F. Gmel.	Euphorbiaceae	Filanto	Neotropical	Perenifólio	1-12	7-9	Micro.	Arbusto	Z12	E7(1), E18(1), E26(1)
<i>Phyllanthus tenellus</i> Roxb.	Euphorbiaceae	Quebra-pedra	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Herbácea	Z11	E3, E6, E10, E12, E13, E18, E19, E21, E24, E25, E29, E30, E33 (grupo)
<i>Phyllis nobla</i> L.	Rubiaceae	Cabreira	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-8	Nano.	Arbusto	Z9	E12(2), E19(2), E22, E30(grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Phyllocladus trichomanoides</i> D. Don.	Phyllocladaceae		Antártico	Perenifólio	1-12	6-8	Micro.	Árvore	Z9	E26(1)
<i>Phyllostachys aurea</i> (Carr.) A. & C. Riv.	Gramineae	Bambu	Paleártico	Perenifólio	1-12	Não floriu**	Hemi.	Herbácea	Z6	E5, E6, E9, E10, E11, E12, E19, E23, E27, E30, E33 (grupo)
<i>Phyllostachys bambusoides</i> Sieb. & Zucc.	Gramineae	Bambu	Paleártico	Perenifólio	1-12	Não floriu**	Hemi.	Herbácea	Z8	E10, E13, E18, E25, E29, E30, E31 (grupo)
<i>Phyllostachys edulis</i> (Carr.) Houz.	Gramineae	Bambu	Paleártico	Perenifólio	1-12	Não floriu**	Hemi.	Herbácea	Z8	E10(grupo)
<i>Phyllostachys nigra</i> (Lodd. Ex Lindl.) Munro	Gramineae	Bambu-negro	Paleártico	Perenifólio	1-12	Não floriu**	Hemi.	Herbácea	Z5	E5, E10, E19, E29, E31 (grupo)
<i>Physalis peruviana</i> L.	Solanaceae	Tomateiro-inglês; Tomate-de-capuz	Neotropical	Perenifólio	1-12	3-10	Nano.	Herbácea	Z8	E26(grupo)
<i>Phytolacca dioica</i> (L.) Moq.	Phytolaccaceae	Bela-sombra	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-9	Meso.	Árvore	Z11	E4(1), E5(1), E7(1), E9(1), E10(1), E13(5), E18(1), E20(9), E21(1), E23(1), E25(1), E28(1), E32(1)
<i>Picconia excelsa</i> (Ait.) DC.	Oleaceae	Pau-branco	Paleártico	Perenifólio	1-12	2-5	Micro.	Árvore	Z10	E6(1), E11(6), E14(6), E18(1), E19(6), E20(4), E22(3), E23(1), E25(1), E26(9), E28(2), E30(14), E32(1)
<i>Picea abies</i> (L.) Karst.	Pinaceae	Espruce-da-noruega	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-5	Micro.	Árvore	Z4	E26(3)
<i>Picea pungens</i> Engelm.	Pinaceae	Abeto-azul; Abeto-do-colorado	Neártico	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Micro.	Árvore	Z2	E28(2), E30(2)
<i>Pieris floribunda</i> (Pursh ex Sims) Benth. & Hook	Ericaceae	Pieris	Neártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z5	E30(3)
<i>Pieris japonica</i> (Thunb.) D. Don ex G. Don.	Ericaceae	Piéris	Paleártico; Indomalaio	Perenifólio	1-12	3-5	Nano.	Arbusto	Z4	E22(3)
<i>Pilea cadierei</i> Gagnep. & Guillaum.	Urticaceae	Planta-do-alumínio	Indomalaio	Perenifólio	1-12	10-12	Hemi.	Herbácea	Z11	E2, E5, E7, E10, E12, E16, E17, E18, E24, E27, E28, E32 (grupo),
<i>Pilea microphylla</i> (L.) Liebm.	Urticaceae	Arrozinho	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	E1, E2, E3, E7, E8, E9, E10, E14, E17, E18, E21, E24, E25, E27, E28, E32 (grupo)
<i>Pilea peperomioides</i> Diels.	Urticaceae		Paleártico	Perenifólio	1-12	5-7	Nano.	Herbácea	Z10	E12 (grupo)
<i>Pilea ummularifolia</i> (Sw.) Wedd.	Urticaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	6-10	Hemi.	Herbácea	Z10	E10, E25, E30(grupo)
<i>Pimenta racemosa</i> (P. Miller) J. W. Moore	Myrtaceae	Árvore-do-cravinho	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-8	Micro.	Árvore	Z10	E29(2)
<i>Pimpinella anisum</i> L.	Umbelliferae	Anis; Erva-doce	Paleártico	Sazonal	3-9	6-8	Terófito	Herbácea	Z6	C28(grupo), E30(6)
<i>Pinus canariensis</i> C. Sm.	Pinaceae	Pinheiro-das-canárias	Paleártico	Perenifólio	1-12	2-4	Meso.	Árvore	Z10	E5(11), E11(1), E19(4), E26(2), E28(1), E31(1)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitoceográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Pinus halepensis</i> Mill.	Pinaceae	Pinheiro-de-alepo	Paleártico	Perenifólio	1-12	2-4	Micro.	Árvore	Z7	E11(1), E24(1), E31(43)
<i>Pinus patula</i> Schiede ex Schdl. & Cham.	Pinaceae	Pinheiro-patula	Neártico	Perenifólio	1-12	2-4	Meso.	Árvore	Z9	E26(2)
<i>Pinus pinaster</i> Ait.	Pinaceae	Pinheiro-marítimo	Paleártico	Perenifólio	1-12	2-4	Meso.	Árvore	Z8	E5(1), E6(1), E19(3), E22(1), E26(>100), E28(8), E30(27)
<i>Pinus pinea</i> L.	Pinaceae	Pinheiro-manso	Paleártico	Perenifólio	1-12	2-4	Meso.	Árvore	Z8	E26(3), E28(1)
<i>Pinus radiata</i> D. Don	Pinaceae	Pinheiro-de-monterrei	Neártico	Perenifólio	1-12	2-4	Meso.	Árvore	Z8	E22(1), E26(>100)
<i>Pistia stratiotes</i> L.	Araceae	Alface-de-água	Neotropical; Áfricotropical; Indomalaio; Oceânia; Australiano	Perenifólio	1-12	1-12	Hidrófita	Herbácea	Z10	E5, E12, E13, E14, E23, E25, E30 (grupo)
<i>Pithecoctenium crucigerum</i> (L.) A. Gentry	Bignoniaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	3-6	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	E10(3)
<i>Pittosporum coriaceum</i> Dryand. ex Ainton	Pittosporaceae	Mocano	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-7	Micro.	Árvore	Z10	E26(1), E28(8), E30(8)
<i>Pittosporum dallii</i> Cheesem.	Pittosporaceae		Antártico	Perenifólio	1-12	1-6	Micro.	Arbusto	Z9	E31(6)
<i>Pittosporum eugenioides</i> A. Cunn.	Pittosporaceae	Pitóspero	Antártico	Perenifólio	1-12	3-4	Micro.	Árvore	Z9	E19(1), E26(2)
<i>Pittosporum phylliraeoides</i> DC.	Pittosporaceae	Pitóspero-chorão; Incenseiro-chorão;	Australiano	Perenifólio	1-12	4-5	Micro.	Árvore	Z9	E12(1)
<i>Pittosporum tenuifolium</i> Banks & Sol.	Pittosporaceae	Pitóspero	Antártico	Perenifólio	1-12	4-5	Micro.	Árvore	Z9	E10(1), E19(1), E22(1), E26(6)
<i>Pittosporum tobira</i> Ait.	Pittosporaceae	Tobira; Faia-da-holanda	Paleártico	Perenifólio	1-12	2-5; 7-8	Micro.	Árvore	Z9	E5(2), E10(grupo), E11(grupo), E12(1), E15(grupo), E19(3), E24(1), E25(1), E26(7), E31(1), E32(3)
<i>Pittosporum undulatum</i> Vent.	Pittosporaceae	Incenseiro	Australiano	Perenifólio	1-12	2-4; 6-7	Micro.	Árvore	Z9	E2(1), E3(3), E5(2), E6(16), E9(4), E12(1), E13(4), E21(1), E22(10), E26(34), E23(1), E25(1), E28(>200), E29(3), E31(59)
<i>Plantago lanceolata</i> L.	Plantaginaceae	Tanchagem	Paleártico	Perenifólio	1-12	6-7	Hemi.	Herbácea	Z6	E30(grupo)
<i>Plantago maderensis</i> Decne.	Plantaginaceae	Plantago-da-madeira	Paleártico	Perenifólio	1-12	2-5	Nano.	Arbusto	Z10	E19(grupo), E23(1), E25(1), E30(grupo)
<i>Plantago major</i> L.	Plantaginaceae	Plantago-maior	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-8	Hemi.	Herbácea	Z6	E10, E12, E13, E19, E22 (grupo)
<i>Plantago malato-belizii</i> Lawalrée	Plantaginaceae	Tanchagem- de-malato-beliz	Paleártico	Perenifólio	1-12	6-7	Hemi.	Herbácea	Z10	E30(grupo)
<i>Platanus x acerifolia</i> (Ait.) Willd.	Platanaceae	Plátano	Hortícola	Caducifólio	4-11	4-5	Meso.	Árvore	Z7	E6(5), E14(2), E15(10), E21(1), E22(43), E26(153), E31(4), E32(1)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Platycerium bifurcatum</i> (Cav.) C. Chr.	Polypodiaceae	Feto-de-corno- de- veado	Indomalaio; Oceânia; Australiano	Perenifólio	1-12	-----	Epífita	Herbácea	Z9	E5(7), E6(grupo), E11(1), E12(6), E13(3), E19(2), E24(1), E25(2), E30(4), E31(grupo)
<i>Platycerium superbum</i> De Joncheere & Hennipman	Polypodiaceae	Feto-de-corno- de- veado	Australiano	Perenifólio	1-12	-----	Epífita	Herblácea	Z10	E12(1)
<i>Platycladus orientalis</i> (L. f.) Franco	Cupressaceae	Tuia-oriental	Neártico	Perenifólio	1-12	1-3	Micro.	Árvore	Z6	E5(1), E7(1), E12(2), E13(3), E26(1), E28(2), E30(8), E32(1)
<i>Plectostachys serphyllifolia</i> (A. Bergerr) Hilliard & B. L. Burt.	Compositae		Áfricotropical	Perenifólio	1-12	3-6	Nano.	Arbusto	Z9	E10, E12 (grupo)
<i>Plectranthus argentatus</i> S. T. Blake	Labiatae	Plectranto	Australiano	Perenifólio	1-12	3-8	Nano.	Arbusto	Z10	E3(1), E10(3), E12, E22(grupo)
<i>Plectranthus barbatus</i> Andrews	Labiatae	Falso-boldo; Boldo-da-terra	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	E3(1), E8(grupo), E12(grupo), E18(3), E20(4), E21(2), E24(2), E29(1). E30(14), E31, E32(grupo)
<i>Plectranthus ciliatus</i> E. May.	Labiatae	Plectranto	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	10-12	Nano.	Herbácea	Z10	E26(grupo)
<i>Plectranthus ecklonii</i> Benth.	Labiatae	Plectranto	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	8-12	Nano.	Arbusto	Z10	E26(3), E30(5), C31(3), E32(2)
<i>Plectranthus forsteri</i> Benth.	Labiatae	Plectranto	Australiano; Oceânia	Perenifólio	1-12	6-11	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z10	E3, E4, E5, E8, E10, E11, E12, E16, E23, E27, E29 (grupo)
<i>Plectranthus fruticosus</i> L' Hérit.	Labiatae	Plectranto	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	6-7	Nano.	Arbusto	Z9	E10(3)
<i>Plectranthus oertendahlii</i> T. C. E. Fries.	Labiatae	Plectranto	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	6-12	Caméfito	Herbácea	Z10	E27, E31 (grupo)
<i>Plectranthus saccatus</i> Benth.	Labiatae	Plectranto	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	4-7	Nano.	Arbusto	Z10	E10, E12(grupo)
<i>Plectranthus thyrsoideus</i> (Bak.) B. Mathew	Labiatae	Plectranto	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	10-1	Nano.	Arbusto	Z10	E28(1), E31(24)
<i>Pleioblastus variegatus</i> (Sieb. Ex Miq.) Mak.	Gramineae	Bambu-variegado	Hortícola	Perenifólio	1-12	Não floriu**	Hemi.	Herbácea	Z7	E10(grupo)
<i>Plumbago auriculata</i> Lam.	Plumbaginaceae	Plumbago	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z9	E2, E5, E6, E7, E8, E10, E11, E12, E13, E14, E19, E23, E26, E29, E31(grupo)
<i>Plumeria alba</i> L.	Apocynaceae	Pluméria-branca	Neotropical	Caducifólio	5-2	6-11	Micro.	Árvore	Z10	E16(1), E17(1), E21(2)
<i>Plumeria rubra</i> L. (Poir.) Woodson	Apocynaceae	Planta-dos- dentes	Neotropical	Caducifólio	5-2	6-2	Micro.	Árvore	Z10	E8(1), E17(1), E21(1), E29(1)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Plumeria rubra</i> L. var. <i>acutifolia</i> (Poir.) Woodson.	Apocynaceae	Planta-dos-dentes	Neotropical	Caducifólio	5-1	6-12	Micro.	Árvore	Z10	E3(2), E4(1), E5(6), E6(2), E7(2), E8(2), E9(3), E10(2), E11(9), E12(6), E13(14), E14(12), E16(1), E17(1), E18(9), E19(3), E21(3), E23(7), E24(2), E25(5), E27(1), E29(2), E31(5), E32(3), E33(2)
<i>Podocarpus elatus</i> R. Br. ex Mirb.	Podocarpaceae	Podocarpos	Australiano	Perenifólio	1-12	Não floriu**	Micro.	Árvore	Z9	E29(1)
<i>Podocarpus elongatus</i> (Ait.) L'Hérit.	Podocarpaceae	Podocarpo	Áfrotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu**	Micro.	Árvore	Z10	E26(2)
<i>Podocarpus salignus</i> D. Don.	Podocarpaceae	Podocarpo	Neotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu**	Micro.	Árvore	Z8	E9(1), E10(6), E12(1), E26(1)
<i>Podocarpus totara</i> G. Benn. ex D. Don	Podocarpaceae	Podocarpos	Antártico	Perenifólio	1-12	Não floriu**	Micro.	Árvore	Z9	E31(2)
<i>Podranea ricasoliana</i> (Tanf.) Sprague.	Bignoniaceae	Ricassoliana	Áfrotropical	Perenifólio	1-12	4-10	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z9	E9, E10, E11, E12, E13, E20 (grupo)
<i>Polianthes tuberosa</i> L.	Agavaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	7-9	Geófita	Herbácea	Z9	E26 (grupo)
<i>Polyandrococos caudescens</i> (Mart.) Barb. Rodr.	Palmae	Palmito-amargoso	Neotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Micro.	Árvore	Z10	E19(1)
<i>Polygala myrtifolia</i> L.	Polygalaceae	Polígala	Áfrotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z9	E8(3), E10(9), E12(2), E19(1), E26(2), E27(1), E28(5), E30(6)
<i>Polygonum amplexicaule</i> D. Don	Polygonaceae		Paleártico	Perenifólio	1-12	7-9	Nano.	Herbácea	Z5	E26(grupo)
<i>Polygonum aubertii</i> L. Henry	Polygonaceae	Manto-de-noiva	Paleártico	Caducifólio	6-2	7-2	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z4	E19(1)
<i>Polygonum capitatum</i> Buch. -Ham. ex D. Don	Polygonaceae	Polígono-de-jardim	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z8	E2, E4, E5, E6, E9, E10, E12, E22, E25, E29, E30 (grupo)
<i>Polygonum runcinatum</i> (Buch- Ham) D. Don	Polygonaceae		Indomalaio	Perenifólio	1-12	4-7	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z12	E12(1)
<i>Polypodium macaronesicum</i> A. E. Bobrov.	Polypodiaceae	Polipódio	Paleártico	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z10	E5, E22, E26, E27, E30, E31 (grupo)
<i>Polyscias cumingiana</i> (C. Prest) Fernandez-Vilar	Araliaceae		Indomalaio	Perenifólio	1-12	Não floriu**	Micro.	Árbusto	Z11	E18 (1)
<i>Polyscias guilfoylei</i> (Bull) L. H. Bail	Araliaceae	Poliscias	Indomalaio	Perenifólio	1-12	Não floriu**	Micro.	Arbusto	Z11	E13(4)
<i>Polyscias scutellaria</i> (Burm. f.) Fosb.	Araliaceae		Indomalaio; Oceânia	Perenifólio	1-12	Não floriu**	Micro.	Arbustoo	Z11	E12(3), E19(1)
<i>Pontederia cordata</i> L.	Pontederiaceae	Pontederia	Neártico; Neotropical	Perenifólio	1-12	5-10	Helófita	Herbácea	Z10	E30, E31(grupo)
<i>Populus alba</i> L.	Salicaceae	Choupo-branco	Paleártico	Caducifólio	4-12	3-4	Micro.	Árvore	Z3	E5(4)
<i>Populus heterophylla</i> L.	Salicaceae	Choupo	Neártico	Caducifólio	2-11	2-3	Micro.	Árvore	Z4	E22(1)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Populus nigra</i> L.	Salicaceae	Choupo-negro; Álamo	Paleártico	Caducifólio	4-12	3-4	Micro.	Árvore	Z2	E20(10), E30(2)
<i>Portulaca grandiflora</i> Hook.	Portulacaceae	Portulaca	Neotropical	Sazonal	4-11	6-11	Terófito	Herbácea	Z10	E3 (grupo)
<i>Portulaca oleracea</i> L.	Portulacaceae	Beldroega	Indomalaio	Sazonal	6-11	7-10	Terófito	Herbácea	Z9	E4, E29(grupo)
<i>Portulacaria afra</i> Jacq.	Portulacaceae	Portulacária	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu**	Nano.	Arbusto suculento	Z9	E2(4), E5(1), E8(grupo), E10(4), E12(grupo), E13(3), E19(2), E23(3), E31(grupo)
<i>Pouteria sapota</i> (Jacq.) Moore & Stearn	Sapotaceae	Sapota	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-8	Micro.	Árvore	Z10	E6(1), E19(1), E32(1)
<i>Primula malacoides</i> Franch.	Primulaceae	Primerose	Paleártico	Perenifólio	1-12	12-4	Caméfito	Herbácea	Z8	E26(grupo)
<i>Primula vulgaris</i> Huds.	Primulaceae	Primerose; Primaveras	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-6	Caméfito	Herbácea	Z6	E22, E26, E30(grupo)
<i>Protea aurea</i> (Burm. f.) Rourke ssp. <i>aurea</i>	Proteaceae	Protea-peteca	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	11-1; 6-7	Micro.	Arbusto	Z9	E30(3)
<i>Protea compacta</i> R. Br.	Proteaceae	Protea	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	11-1	Micro.	Arbusto	Z9	E30(4)
<i>Protea cynaroides</i> (L.) L.	Proteaceae	Protea-real	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	10-5	Nano.	Arbusto	Z9	E26(5), E30(>50)
<i>Protea eximia</i> (Salisb. ex Knight) Fourc.	Proteaceae	Protea	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	11-2	Micro.	Arbusto	Z9	E30(2)
<i>Protea grandiceps</i> Tratt.	Proteaceae	Protea-vermelha; Protea-princesa	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	11-2	Nano.	Arbusto	Z9	E30(1)
<i>Protea laurifolia</i> Thunb.	Proteaceae	Protea-de-folha- cinzenta	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	10-2	Micro.	Arbusto	Z9	E30(3)
<i>Protea lepidocarpodendron</i> (L.) L.	Proteaceae	Protea-negra	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	11-2	Nano.	Arbusto	Z9	E30(1)
<i>Protea magnifica</i> Link x <i>P.</i> <i>burchelli</i> Stapf.	Proteaceae	Protea	Hortícola	Perenifólio	1-12	10-5	Micro.	Arbusto	Z9	E26(6), E30(2)
<i>Protea magnifica</i> Link.	Proteaceae	Protea-rainha	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	10-5	Nano.	Arbusto	Z9	E26(1), E30(2)
<i>Protea mundi</i> Klotzsch.	Proteaceae	Protea-floresta	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	10-7	Micro.	Arbusto	Z9	E30(4)
<i>Protea neriifolia</i> R. Br.	Proteaceae	Protea-de-folha – estreita; Protea- folha-de-loendro	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	11-2	Nano.	Arbusto	Z9	E5(16), E19(1), E22(6), E26(2), E30(21)
<i>Protea repens</i> (L.) L.	Proteaceae	Protea-comum	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	6-12	Micro.	Arbusto	Z9	E30(6)
<i>Protea susannae</i> Phillips. x <i>P.</i> <i>neriifolia</i> R. Br.	Proteaceae	Protea	Hortícola	Perenifólio	1-12	10-3	Micr.	Arbusto	Z9	E26(6)
<i>Prunella grandiflora</i> (L.) Scholler	Labiatae	Erva-férrea	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-9	Nano.	Herbácea	Z5	E30(grupo)
<i>Prunella vulgaris</i> L.	Labiatae	Erva-férrea	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-9	Caméfito	Herbácea	Z3	E22, E30 (grupo)
<i>Prunus avium</i> L.	Rosaceae	Cerejeira	Paleártico	Caducifólio	4-1	4-5	Micro.	Árvore	Z3	E26(11)
<i>Prunus campanulata</i> Maxim.	Rosaceae	Ameixeira-da- formosa	Paleártico; Indomalaio	Caducifólio	3-11	2	Micro.	Árvore	Z7	E26(1)
<i>Prunus cerasifera</i> Ehrh.	Rosaceae	Ameixeira-de- jardim	Paleártico	Caducifólio	3-11	2-3	Micro.	Árvore	Z4	E20(1), E22(9), E26(11), E28(3)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb.	Rosaceae	Amendoeira	Paleártico	Caducifólio	3-12	2-3	Micro.	Árvore	Z6	E19(1)
<i>Prunus hixa</i> Willd.	Rosaceae	Ginjira-brava; Azereiro	Paleártico	Perenifólio	1-12	6-8	Meso.	Árvore	Z10	E14(19), E19(5), E22(4), E26(1), E28(3)
<i>Prunus laurocerasus</i> L.	Rosaceae	Loureiro-inglês; Loureiro-cerejo	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-4	Micro.	Árvore	Z7	E11(1), E22(1), E26(5)
<i>Prunus persica</i> (L.) Batsch.	Rosaceae	Pessegueiro	Paleártico	Caducifólio	3-11	2-6	Micro.	Árvore	Z5	E3(1), E5(2), E22(1), E31(2)
<i>Prunus serrulata</i> Lindl.	Rosaceae	Cerejeira-oriental	Paleártico	Caducifólio	4-1	4-6	Micro.	Árvore	Z5	E22(1), E26(6)
<i>Prunus x domestica</i> L.	Rosaceae	Ameixieira	Hortícola	Caducifólio	4-11	3-4	Micro.	Árvore	Z5	E3(5), E5(1), E22(1) E26(3), E30(1)
<i>Pseudognoxys chenopodioides</i> (Kunth.) Cabr.	Compositae	Malmequer- trepador	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	E10(grupo)
<i>Pseudosasa japonica</i> (Sieb. & Steud.) Mak. ex Nak.	Gramineae	Bambu	Paleártico	Perenifólio	1-12	Não floriu**	Hemi.	Herbácea	Z6	E10, E22(grupo)
<i>Pseudotsuga menziesii</i> (Mrb.) Franco	Pinaceae	Pseudotsuga; Abeto-de-douglas	Neártico	Perenifólio	1-12	1-2	Micro.	Árvore	Z4	E30(9)
<i>Psidium guajava</i> L.	Myrtaceae	Goiabeira	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-7	Micro.	Árvore	Z10	E3(2), E5(2), E6(1), E8(2), E9(1), E10(2), E11(1), E19(7), E21(6), E23(3), E30(1), E31(4), E33(1)
<i>Psidium littorale</i> Raddi	Myrtaceae	Araçazeiro; Araçaleiro	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-7	Micro.	Árvore	Z10	E3(2), E5(3), E6(5), E11(2), E13(2), E19(2), E27(6), E31(3), E32(1)
<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn.	Dennstaedtia-ceae	Feiteira	Paleártico; Neártico	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z4	E5, E8, E9, E13, E19, E22, E23, E26, E28, E31 (grupo)
<i>Pteris cretica</i> L.	Pteridaceae		Paleártico; Áfricotropical; Indomalaio	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z10	E30(grupo)
<i>Pteris incompleta</i> Cav.	Pteridaceae	Feto-de-palma	Paleártico	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z9	E30(grupo)
<i>Pteris tremula</i> R. Br.	Pteridaceae	Feto	Australiano; Antártico; Oceânia; Áfricotropical	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z10	E5, E6, E11, E12, E19, E23, E26, E27, E29, E31 (grupo)
<i>Pteris vittata</i> L.	Pteridaceae	Feto	Paleártico; Indomalaio; Australiano; Oceânia	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z9	E1, E2, E5, E6, E8, E9, E10, E11, E12 E13, E19, E21, E22, E23, E24, E25, E27, E29, E30, E31, E32, E33 (grupo)
<i>Ptychosperma macarthurii</i> (Wendl.) Nichols.	Palmae	Palmeira-de- macarthur	Australiano; Oceânia	Perenifólio	1-12	6-8	Micro.	Árvore	Z11	E21(1)
<i>Punica granatum</i> L.	Punicaceae	Romãzeira	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-7	Micro.	Árvore	Z9	E4(1), E5(1), E6(5), E10(4), E11(1), E12(6), E13(3), E18(3), E19(5), E20(3), E21(2), E22(3), E23(3), E24(2), E25(8), E26(1),

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
										E27(2), E28(1), E29(4), E30(1), E31(1), E32(1)
<i>Pycnostachys urticifolia</i> Hook.	Labiatae		Áfricotropical	Perenifólio	1-12	10-3	Nano.	Arbusto	Z10	E19(2), E26(2), E30(4), E32(1)
<i>Pyracantha angustifolia</i> (Franch.) Schneid.	Rosaceae	Perinhos; Sarça-ardente	Paleártico	Perenifólio	1-12	2-7	Micro.	Arbusto	Z7	E5(13), E6(1), E7(1), E8(2), E9(3), E10(1), E12(1), E13(1), E19(1), E20(grupo), E22(5), E23(1) E26(grupo), E28(6), E29(4), E31(6), E32(1)
<i>Pyracantha coccinea</i> Roem.	Rosaceae	Perinhos; Sarça-ardente	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-5	Micro.	Arbusto	Z6	E5(8), E22(1) E26(13), E28(grupo), E29(2), E31(1)
<i>Pyracantha crenulata</i> (D. Don) Roem.	Rosaceae	Perinhos; Sarça-ardente	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-6	Micro.	Arbusto	Z7	E26(2)
<i>Pyrostegia venusta</i> (Ker- Gawl.) Miers	Bignoniaceae	Gaitinhas	Neotropical	Perenifólio	1-12	11-5	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	E2 (grupo), E4(2), E5(1), E6(grupo), E7(1), C8(1), E9(grupo), E10(4), E11, E12, E13, E19(grupo), E21(7), E24(1), E26(1), E29(3), E31, E33 (grupo)
<i>Pyrus communis</i> L.	Rosaceae	Pereira	Paleártico	Caducifólio	4-11	4-6	Micro.	Árvore	Z4	E26(3)
<i>Quercus ilex</i> L.	Fagaceae	Azinhiera	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-5	Meso.	Árvore	Z7	E19(1), E21(1), E22(1), E25(1), E26(>50), E28(1), E29(2), E30(2), E31(57)
<i>Quercus robur</i> L.	Fagaceae	Carvalho	Paleártico	Caducifólio	2-11	3-5	Meso.	Árvore	Z6	E5(1), E6(8), E11(1), E19(1), E22(20) E26(24), E28(19), E30(16), E31(2)
<i>Quercus rubra</i> L.	Fagaceae	Carvalho- vermelho- americano	Neártico	Caducifólio	4-11	4-5	Meso.	Árvore	Z3	E5(1), E6(8), E19(1), E22(12), E26(13), E28(9), E30(31)
<i>Quercus suber</i> L.	Fagaceae	Sobreiro	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-4	Micro.	Árvore	Z8	E3(1), E5(4), E26(2)
<i>Quercus x crenata</i> Lam.	Fagaceae	Carvalho	Paleártico	Marcescente	5-4 (3-4)	3-4	Meso.	Árvore	Z6	E5(1), E26(1)
<i>Quisqualis indica</i> L.	Combretaceae	Quisqualis; Jasmineiro-da- índia	Áfricotropical; Indomalaio	Caducifólio	4-12	6-11	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	E31(1)
<i>Radermachera sinica</i> (Hance) Hemsl.	Bignoniaceae	Árvore-serpente; Boneca-da-china	Indomalaio	Perenifólio	1-12	6-9	Micro.	Árvore	Z10	E10(2), E19(1) E26(22), E30(3)
<i>Ranunculus cortusifolius</i> Willd. var. <i>major</i> Lowe	Ranunculaceae	Ranúnculo; Doiradinha	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-6	Hemi.	Herbácea	Z10	E22, E28, E30 (grupo)
<i>Raphanus raphanistrum</i> L. ssp. <i>raphanistrum</i>	Cruciferae	Saramago	Paleártico	Sazonal	10-5	11-3	Terófito	Herbácea	Z6	E23(grupo)
<i>Rapistrum rugosum</i> (L.) All.	Cruciferae	Rinchão	Paleártico	Sazonal	1-8	3-6	Terófito	Herbácea	Z6	E23(grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Ravenala madagascariensis</i> Sonn.	Strelitziaceae	Ravenala; Árvore-do-viajante	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	2-10	Micro.	Árvore	Z11	E5(2), E8(2), E11(1), E19(2), E29(1)
<i>Ravenea rivularis</i> Jum & Perier	Palmae	Palma-augusta	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Micro.	Árvore	Z11	E10(3)
<i>Reinwardtia indica</i> Dumort.	Linaceae		Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z9	E5(4), E10(5), E12(2)
<i>Rhamnus glandulosa</i> Ait.	Rhamnaceae	Sanguinho	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-5	Micro.	Árvore	Z10	E19(1), E22(5), E30(5)
<i>Rhaphidophora decursiva</i> (Wallich) Schott.	Araceae		Indomalaio	Perenifólio	1-12	5-6	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	E18(1)
<i>Rhaphiolepis indica</i> (L.) Lindl.	Rosaceae		Paleártico	Perenifólio	1-12	4-6	Nano.	Arbusto	Z8	E31(1)
<i>Rhaphiolepis umbellata</i> (Thunb.) Mak.	Rosaceae		Paleártico	Perenifólio	1-12	10-6	Nano.	Arbusto	Z8	E5(4), E9(1), E10(3), E22(1), E24(2), E26(1), E30(3), E31(5)
<i>Rhapis excelsa</i> (Thunb.) Henry.	Palmae	Palmeira-de-hong-kong; Pameira-de-senhora	Paleártico	Perenifólio	1-12	6-9	Micro.	Arbusto	Z10	E5(3), E8(2), E11(4), E12(2), E19(3), E25(1), E29(1), E32(2)
<i>Rhipsalis goebeliana</i> Backeb.	Cactaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	6-7	Epífita	Herbácea suculenta	Z10	E10(1)
<i>Rhododendron arboreum</i> Sm.	Ericaceae	Rododendro	Indomalaio; Paleártico	Perenifólio	1-12	2-5	Micro.	Árvore	Z7	E22(1), E26(5), E28(4), E30(13)
<i>Rhododendron augustini</i> Hemsl.	Ericaceae	Rododendro	Paleártico	Perenifólio	1-12	2-3	Nano.	Arbusto	Z6	E28(1)
<i>Rhododendron catawbiense</i> Michx.	Ericaceae	Rododendro	Neártico	Perenifólio	1-12	12-5	Micro.	Arbusto	Z5	E30(5)
<i>Rhododendron indicum</i> (L.) Sweet	Ericaceae	Azálea	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z6	E26, E30 (grupo)
<i>Rhododendron molle</i> (Bl.) G. Don.	Ericaceae	Azálea	Paleártico	Caducifólio	5-12	5-6	Nano.	Arbusto	Z7	E26(3), E30(grupo)
<i>Rhododendron mucronatum</i> G. Don.	Ericaceae	Azálea-japonesa	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z5	E2(22), E5(grupo), E6(grupo), E7(3), E8(grupo), E10(20), E11, E12(grupo), E13(13), E19, E22(grupo), E24(3), E25, E26, E27, E28, E29, E30, E31, E32 (grupo), E33(3)
<i>Rhododendron ponticum</i> L.	Ericaceae	Rododendro; Loendro	Paleártico	Perenifólio	1-12	11-6	Micro.	Árbusto	Z6	E22(4), E26(22), E30(18)
<i>Rhombophyllum dolabriforme</i> (L.) Schwantes	Aizoaceae		Áfricotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Caméfito	Herbácea suculenta	Z11	E12 (3)
<i>Rhombophyllum neli</i> Schwantes	Aizoaceae		Áfricotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Caméfito	Herbácea suculenta	Z10	E12(3)
<i>Rhus coriaria</i> L.	Anacardiaceae	Sumagre	Paleártico	Caducifólio	4-1	7-8	Nano.	Arbusto	Z9	E19(2)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Ricinus communis</i> L.	Euphorbiaceae	Ricino; Carrapateira	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z9	E12(8), E13(1), E19, E20(grupo), E23(grupo)
<i>Rivina humilis</i> L.	Phytolaccaceae	Planta-vermelha	Neártico; Neotropical	Perenifólio	1-12	5-10	Nano.	Herbácea	Z9	E3(grupo), E6(1), E10(2), E13(8), E24(grupo)
<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Leguminosae (Papilionoideae)	Robinia	Neártico	Caducifólio	3-12	3-6	Meso.	Árvore	Z3	E5(6), E6(1), E9(2), E13(1), E22(4) E26(1), E27(2), E28(2), E31(grupo)
<i>Robinia viscosa</i> Vent.	Leguminosae (Papilionoideae)	Robinia	Neártico	Caducifólio	3-12	3-6	Micro.	Árvore	Z5	E11(1)
<i>Robinia x ambigua</i> Poir.	Leguminosae (Papilionoideae)	Robinia	Hortícola	Caducifólio	3-12	4-5	Micro.	Árvore	Z3	E26(3)
<i>Rohdea japonica</i> (Thunb.) Roth	Liliaceae		Paleártico	Perenifólio	1-12	5-6	Hemi.	Herbácea	Z7	E10(2)
<i>Roldana petasites</i> (Sims) H. Robinson & Bretell.	Compositae	Senécio	Neotropical	Perenifólio	1-12	12-4; 6-8	Micro.	Arbusto	Z9	E5, E10, E11, E12, E21, E22, E26, E28, E29, E30, E31 (grupo),
<i>Romulea columnae</i> Seb. & Mauri	Iridaceae		Paleártico	Sazonal	2-6	3-5	Geófito	Herbácea	Z8	E26(grupo)
<i>Rondeletia amoena</i> (Planch.) Hemsl.	Rubiaceae	Rondeletia	Neotropical	Perenifólio	1-12	12-4	Micro.	Arbusto	Z10	E19(1)
<i>Rosa banksiae</i> Ait.	Rosaceae	Roseira	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z7	E6, E10(grupo), E12(1), E26(2), E31(grupo)
<i>Rosa chinensis</i> Jacq. f. <i>mutabilis</i> (Correv.) Rehd.	Rosaceae	Roseira	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z7	E10(3)
<i>Rosa gallica</i> L.	Rosaceae	Roseira	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-8	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z5	E26(1)
<i>Rosa laevigata</i> Michx.	Rosaceae	Roseira	Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z7	E5(1), E6(grupo), E10(grupo), E12(grupo), E13(1), E26(grupo), E29(1), E31(grupo)
<i>Rosa mandonii</i> Desegl.	Rosaceae	Roseira	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-7	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	E19(1)
<i>Rosa x damascena</i> Mill.	Rosaceae	Rosa-de-damasco	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-8	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z4	E22(grupo), E32(1)
<i>Rosa x damascena</i> Mill. var. <i>semperflorens</i> (DuRoi) Rowley	Rosaceae	Rosa-de-quatro- estações	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z4	E3(1), E10(grupo), E13(3), E17(4), E26(40), E30(3), E32(1)
<i>Rosmarinus officinalis</i> L.	Labiatae	Alecrim	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z6	E1(grupo), E3(1), E5(5), E6(1), E10(grupo), E11(3), E12(5), E13(2), E19(grupo), E22(2), E23(3), E26(2), E27(4), E30(1), E31(3), E32(3), E33(2)
<i>Roystonea regia</i> (H.B.K.) Cook	Palmae	Palmeira-real	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-6	Micro.	Árvore	Z11	E8(1), E13(1)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Rudbeckia fulgida</i> Ait.	Compositae	Margarida-amarela; Susana-de-olhos-negros	Neártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Herbácea	Z3	E6, E7, E16, E17, E18, E21, E22, E29, E32 (grupo)
<i>Rudbeckia hirta</i> L.	Compositae	Margarida-amarela; Susana-de-olhos-negros	Neártico	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Herbácea	Z3	E7(grupo)
<i>Rudbeckia lacinata</i> L.	Compositae	Rudebéquia	Neártico	Perenifólio	1-12	5-10	Nano.	Herbácea	Z3	E3(grupo)
<i>Ruellia graecizans</i> Backer	Acanthaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	8-12	Nano.	Arbusto	Z10	E5, E25(grupo)
<i>Ruellia makoyana</i> hort. Makoy ex Closon	Acanthaceae	Ruélia	Neotropical	Perenifólio	1-12	9-12	Nano.	Herbácea	Z10	E10, E13, E19(grupo)
<i>Ruellia tweediana</i> Grisebach	Acanthaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	1-6	Nano.	Arbusto	Z10	E12(5)
<i>Rumex conglomeratus</i> Murray	Polygonaceae	Labça	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-7	Helófita	Herbácea	Z6	E23(grupo)
<i>Rumex maderensis</i> Lowe	Polygonaceae	Azedas	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-8	Nano.	Herbácea	Z10	E19(grupo)
<i>Rumohra adiantiformis</i> (Forst. f.) Ching.	Dryopterida-ceae	Feto-real	Áfricotropical; Australiano; Oceânia; Antártico; Neotropical	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z10	E5, E19, E25, E26, E28 (grupo)
<i>Ruscus aculeatus</i> L.	Liliaceae (Asparagaceae)	Gilbardeira	Paleártico	Perenifólio	1-12	11-12	Hemi.	Herbácea	Z7	E20(8), E22, E29 (grupo)
<i>Ruscus hypophyllum</i> L.	Liliaceae (Asparagaceae)	Ruscos	Paleártico	Perenifólio	1-12	11-12	Nano.	Herbácea	Z8	E5, E7, E9, E10, E13, E18, E19, E22, E24, E28, E32, E33 (grupo)
<i>Ruscus streptophyllus</i> P. F. Yeo	Liliaceae	Alegre-campo-anão	Paleártico	Perenifólio	1-12	10-1	Caméfita	Herbácea	Z10	C12(1), E30(grupo)
<i>Russelia equisetiformis</i> Scdl. & Cham.	Scrophulariaceae	Russélia ; Lágrimas-de-amor	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z9	E5, E10, E11, E12, E14, E19, E23, E25, E29 (grupo)
<i>Ruta chapelensis</i> L.	Rutaceae	Arruda	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-9	Nano.	Arbusto	Z8	E13(1), E19(grupo), E29(1)
<i>Sabal palmetto</i> (Walt.) Lodd. ex Schult. & Schult. f.	Palmae	Palmeira-da-carolina	Neártico	Perenifólio	1-12	6-8	Micro.	Árvore	Z8	E10(3), E12(1), E19(1), E30(3)
<i>Saccharum officinarum</i> L.	Gramineae	Cana-sacarina; Cana-de-açúcar	Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-3	Hemi.	Herbácea	Z9	E10, E11, E13, E19, E20, E25, E30 (grupo)
<i>Sagittaria lancifolia</i> L.	Alismataceae	Sagitária	Neártico; Neotropical	Perenifólio	1-12	5-10	Helófita	Herbácea	Z9	E30(grupo)
<i>Saintpaulia ionantha</i> Wendl.	Gesneriaceae	Violeta-do-cabo; Violeta-africana	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	10-2	Hemi.	Herbácea	Z11	E5(grupo)
<i>Salix babylonica</i> L.	Salicaceae	Salgueiro-chorão	Paleártico	Marcescente	1-12 (12-3)	3-5	Micro.	Árvore	Z4	E19(4), E22(2), E23(1), E28(1), E33(1)
<i>Salix canariensis</i> C. Sm. ex Link	Salicaceae	Seixo; Seixeiro	Paleártico	Caducifólio	2-12	1-2	Micro.	Árvore	Z11	E14(grupo), E19(2), E22(2), E23(grupo), E25(1), E26(1), E28(1), E30(5), E31(1)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Salix x rubens</i> Schrank.	Salicaceae	Vimeiro	Hortícola	Marcescente	1-12 (12-3)	3-5	Micro.	Arbusto	Z4	E14(grupo), E19(1), E23(1), E30(1)
<i>Salvia africana-lutea</i> L.	Labiatae	Sálvia-amarela	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	4-7	Nano.	Arbusto	Z9	E10(1)
<i>Salvia broussonetii</i> Benth.	Labiatae	Sálvia	Paleártico	Perenifólio	1-12	10-11	Nano.	Arbusto	Z11	E26(2)
<i>Salvia canariensis</i> L.	Labiatae	Sálvia-das-canárias	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-8	Nano.	Arbusto	Z11	E26(2), E31(1)
<i>Salvia chamaedryoides</i> Cav.	Labiatae	Sálvia-azul	Neártico	Perenifólio	1-12	5-8	Nano.	Arbusto	Z8	E10 (grupo)
<i>Salvia coccinea</i> Juss. ex Murray	Labiatae	Sálvia	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Herbácea	Z8	E10, E16, E17, E21, E26, E29, E31(grupo)
<i>Salvia confertiflora</i> Pohl.	Labiatae	Sálvia	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-9	Nano.	Herbácea	Z9	E12(1)
<i>Salvia discolor</i> Kunth.	Labiatae	Sálvia	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-9	Nano.	Herbácea	Z9	E12(grupo)
<i>Salvia elegans</i> Vahl.	Labiatae	Sálvia	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Herbácea	Z8	E12, E19, E26(grupo)
<i>Salvia guaranitica</i> St.-Hil. ex Benth.	Labiatae	Sálvia	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z9	E3, E10, E12, E19, E21, E24, E26, E27, E31 (grupo)
<i>Salvia involucrata</i> Cav.	Labiatae	Sálvia-rosa	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z9	E19(1), E22(6), E26(grupo), E30(1)
<i>Salvia leucantha</i> Cav.	Labiatae	Sálvia -branca	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z9	E5, E8, E10, E12 (grupo), E18(1), E19, E22, E26, E31(grupo)
<i>Salvia microphylla</i> Kunth.	Labiatae	Sálvia; Rapazinhos	Neártico; Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z9	E3, E12, E26(grupo)
<i>Salvia officinalis</i> L.	Labiatae	Salva	Paleártico	Perenifólio	1-12	6-8	Nano.	Herbácea	Z5	E5, E13, E14, E24 (grupo)
<i>Salvia sessei</i> Benth.	Labiatae	Sálvia	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z9	E4(1), E19(2), E22(1), E26(6), E30(1)
<i>Salvia splendens</i> Sell ex Roem. & Scult.	Labiatae	Camarões; Sálvias	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Herbácea	Z10	E1, E3, E4, E6, E7, E8, E9, E14, E16, E17, E18, E19, E21, E22, E24, E26, E28, E29, E30, E32, E33 (grupo)
<i>Sambucus ebulus</i> L.	Caprifoliaceae	Engos	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-5	Nano.	Herbácea	Z5	E22(grupo)
<i>Sambucus lanceolata</i> R. Br. In Buch.	Caprifoliaceae	Sabugueiro-da-madeira	Paleártico	Perenifólio	1-12 (12-3)	4-5	Micro.	Árvore	Z10	E19(1), E22(6), E25(1), E28(3), E30(2), E32(1)
<i>Sambucus nigra</i> L.	Caprifoliaceae	Sabugueiro	Paleártico	Caducifólio	3-12	5-6	Micro.	Árvore	Z5	E3(1), E27(2)
<i>Samolus valerandii</i> L.	Primulaceae		Paleártico	Perenifólio	1-12	5-9	Hemi.	Herbácea	Z6	E29 (grupo)
<i>Sansevieria splendens</i> Stapf.	Agavaceae	Língua-de-sogra	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	8-11	Hemi.	Herbácea	Z10	E10(grupo)
<i>Sansevieria trifasciata</i> Prain. var. <i>laurentii</i> (De Wild.) N. E. Br.	Agavaceae	Língua-de-sogra	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	8-11	Hemi.	Herbácea	Z10	E2, E3, E5, E7, E8, E10, E11, E12, E13, E16, E17, E18, E21, E27, E28, E31, E32 (grupo)
<i>Sansevieria trifasciata</i> Prain.	Agavaceae	Língua-de-sogra	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	8-11	Hemi.	Herbácea	Z10	E2, E3, E5, E8, E9, E10, E12, E13, E23, E27 (grupo)
<i>Santolina chamaecyparissus</i> L.	Compositae	Santolina	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-8	Caméfito	Arbusto	Z7	E8, E15, E19, E23 E26(grupo)
<i>Santolina pinnata</i> Viv. ssp.	Compositae	Santolina	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-8	Nano.	Arbusto	Z7	E10 (grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>neapolitana</i> (Jordan & Fourr.) Guinea.										
<i>Sapindus saponaria</i> L.	Sapindaceae	Árvore-do-sabão	Neártico; Neotropical	Caducifólio	5-1	7-8	Micro.	Árvore	Z8	E12(1)
<i>Sapium sebiferum</i> (L.) Roxb.	Euphorbiaceae	Árvore-do-sebo- da-china	Paleártico	Caducifólio	3-12	7-8	Micro.	Árvore	Z8	E31(1)
<i>Saponaria officinalis</i> L.	Caryophylla-ceae	Saponária	Paleártico	Perenifólio	1-12	6-9	Hemi.	Herbácea	Z5	E26, E31(grupo)
<i>Sasa palmata</i> (Burb.) Camus	Gramineae	Bambu	Paleártico	Perenifólio	1-12	Não floriu**	Hemi.	Herbácea	Z7	E11(grupo)
<i>Satureja varia</i> (Benth) W. & B. ex Briq. ssp. <i>thymoides</i> (Sol. ex Lowe) var. <i>cacuminicola</i> (Pérez) A. Hansen & Sunding.	Labiatae	Hissopo	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-10	Caméfito	Arbusto	Z10	E19(grupo)
<i>Saurauia nepaulensis</i> DC.	Actinidiaceae		Indomalaio	Caducifólio	3-12	4-8	Micro.	Árvore	Z9	E26(6)
<i>Saxifraga maderensis</i> Don.	Saxifragaceae	Saxifraga-da- madeira	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-6	Hemi.	Herbácea	Z10	E30(grupo)
<i>Saxifraga stolonifera</i> Meerb.	Saxifragaceae	Saxifraga	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-4	Hemi.	Herbácea	Z5	E22, E25(grupo)
<i>Scabiosa atropurpurea</i> L.	Dipsacaceae		Áfricotropical	Perenifólio	1-12	6-9	Hemi.	Herbácea	Z7	E13 (grupo)
<i>Scadoxus multiflorus</i> (Martyn) Raf. ssp. <i>katherinae</i> (Baker) Friis & Nordal	Amaryllidaceae		Áfricotropical	Sazonal	6-12	3-6	Geófito	Herbácea	Z10	E12 (grupo), C19(2)
<i>Scadoxus puniceus</i> (L.) Friis & Nordal.	Amaryllidaceae	Broxas	Áfricotropical	Sazonal	4-10	11-5	Geófito	Herbácea	Z10	E25, E26, E32(grupo)
<i>Scaevola aemula</i> R. Br.	Goodeniaceae		Australiano	Perenifólio	1-12	4-9	Hemi.	Herbácea	Z9	E19, E22 (grupo)
<i>Schefflera actinophylla</i> (Endl.) Harms	Araliaceae	Brassaia	Australiano; Oceânia	Perenifólio	1-12	8-10	Meso.	Árvore	Z10	E4(2), E5(1), E6(1), E7(2), E8(2), E10(8), E12(2), E13(6), E18(3), E20(1), E21(1), E25(2), E30(1)
<i>Schefflera arboricola</i> (Hayata)	Araliaceae	Cheflera	Indomalaio	Perenifólio	1-12	2-4; 7-8	Micro.	Arbusto	Z10	E3(3), E4(2), E5(2), E7(2), E8(grupo), E9(1), E10(8), E11(grupo), E12(7), E13(27), E19(3), E22(2), E24(3), E29(2), E32(3)
<i>Schefflera elegantissima</i> (Veitch ex Mast.) Lowry & Frodin	Araliaceae	Falsa-arália	Oceânia	Perenifólio	1-12	11-2	Micro.	Arbusto	Z10	E10(3), E12(25), E13(1), E30(12)
<i>Schefflera pueckleri</i> (K. Koch) Frodin.	Araliaceae	Cheflera	Indomalaio	Perenifólio	1-12	5-6	Micro.	Árvore	Z10	E10(3), E11(2)
<i>Schinus molle</i> L. non hort. ex Engl.	Anacardiaceae	Pimenteira- bastarda; Pimenteira-da- índia	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Meso.	Árvore	Z9	E3(4), E5(2), E6(8), E9(1), E10(9), E11(1), E12(5), E13(1), E14(13), E19(11), E21(13), E23(1), E28(3), E29(1), E31(1), E32(1)
<i>Schinus terebinthifolius</i> Raddi.	Anacardiaceae	Pimenteira-do- brasil	Neotropical	Perenifólio	1-12	8-10	Micro.	Árvore	Z10	E5(3), E9(3), E11(2), E12(12), E19(5), E20(16), E23(9)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Schlumbergera x buckleyi</i> (T. Moore)	Cactaceae	Cacto-do-natal	Hortícola	Perenifólio	1-12	11-2	Epífita	Herbácea suculenta	Z9	E5(grupo)
<i>Schoenoplectus validus</i> (Vahl) Löve	Cyperaceae		Neártico	Perenifólio	1-12	5-7	Helófita	Herbácea	Z7	E12(grupo)
<i>Schotia brachypetala</i> Sonder.	Leguminosae (Caesalpinioideae)	Scóttia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	2-8	Micro.	Árvore	Z9	E5(2), E9(4), E10(1), E11(2), E12(1), E19(7), E21(3), E25(2), E26(2), E27(1), E29(2), E32(1)
<i>Schotia latifolia</i> Jacq.	Leguminosae (Caesalpinioideae)	Scóttia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	6-7	Micro.	Árvore	Z9	E24(1), E31(1)
<i>Scilla amoena</i> L.	Liliaceae (Hyacinthaceae)	Cila	Paleártico	Sazonal	2-7	3-4	Geófita	Herbácea	Z7	E5(grupo)
<i>Scilla maderensis</i> Mnzs.	Liliaceae	Cila-da-madeira	Paleártico	Sazonal	9-6	10-2	Geófita	Herbácea	Z11	E12, E19, E25, E26, E28 (grupo), E30(1), E31(grupo), E32(11)
<i>Scilla peruviana</i> L.	Liliaceae	Cila	Paleártico	Sazonal	4-7	4-6	Geófita	Herbácea	Z6	E26 (grupo)
<i>Scilla siberica</i> Haw.	Liliaceae	Cila	Paleártico	Sazonal	3-6	3-5	Geófita	Herbácea	Z3	E26 (grupo)
<i>Scrophularia hirta</i> Lowe	Scrophulariaceae	Escrofulária	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-7	Nano.	Herbácea	Z10	E30(grupo)
<i>Sechium edule</i> (Jacq.) Sw.	Cucurbitaceae	Pepinela; Caiota; Chuchu	Neotropical	Perenifólio	1-12	7-9	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z10	E3(1), E30(2)
<i>Sedum adolphii</i> Hamet.	Crassulaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	3-5	Caméfita	Arbusto suculento	Z8	E31(grupo)
<i>Sedum alboroseum</i> Baker	Crassulaceae		Paleártico	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Nano.	Arbusto suculento	Z8	E12(grupo)
<i>Sedum aytacianum</i> J. Metzger	Crassulaceae	Arrozinho	Paleártico	Perenifólio	1-12	6-7	Caméfita	Herbácea suculenta	Z7	E10(grupo)
<i>Sedum dendroideum</i> Moc. & Sessé ex DC	Crassulaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Caméfita	Arbusto suculento	Z8	E12(5)
<i>Sedum lucidum</i> R.T. Clausen.	Crassulaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	5-6	Caméfita	Arbusto suculento	Z9	E12(3)
<i>Sedum morganianum</i> Walth.	Crassulaceae	Bananinhas	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-9	Nano.	Herbácea suculenta	Z9	E5(1), E12(4)
<i>Sedum pachyphyllum</i> Rose	Crassulaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	1-4	Caméfita	Arbusto suculento	Z8	E5(grupo), E12(5), E32, E33(grupo)
<i>Sedum praealtum</i> A. DC.	Crassulaceae	Ensaio-gigante	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-8	Nano.	Arbusto suculento	Z9	E26(1)
<i>Sedum reflexum</i> L.	Crassulaceae		Paleártico	Perenifólio	1-12	3-7	Caméfita	Herbácea suculenta	Z7	E12(5), E32(grupo)
<i>Sedum rubrotinctum</i> R. T. Clausen	Crassulaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	12-2	Caméfita	Arbusto suculento	Z9	E33(grupo)
<i>Selaginella denticulata</i> (L.) Spring.	Selaginellaceae	Selaginela	Paleártico	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z9	E25(mancha)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitoceográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Selaginella kraussiana</i> (Kunze) A. Braun.	Sellaginellaceae	Selaginela	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z9	E22, E30 (mancha)
<i>Selenicereus anthonyanus</i> (Alexander) D. Hunt.	Cactaceae	Cacto-da-lua	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-7	Fane. trep.	Herbácea suculenta	Z9	E31(grupo)
<i>Selenicereus grandiflorus</i> (L.) Britton & Rose	Cactaceae	Rainha-da-noite	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-7	Fane. trep.	Herbácea suculenta	Z9	E5(2), E31(grupo)
<i>Semele androgyna</i> (L.) Kunth.	Liliaceae	Alegre-campo	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-5	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	E3(2), E7(1), E19(1), E22(16), E25(1), E26(grupo), E28(23), E30(18), E31(grupo), E32(1)
<i>Senecio articulatus</i> (L. f.) Schult-Bip	Compositae	Senécio	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	9-11	Hemi.	Herbácea suculenta	Z9	E12(grupo)
<i>Senecio cineraria</i> DC.	Compositae	Senécio	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-8	Nano.	Arbusto	Z8	E3, E7, E10, E12, E13, E14, E21, E23, E26, E27, E32(grupo)
<i>Senecio ficoides</i> (L.) Schult.-Bip	Compositae		Áfricotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Nano.	Arbusto suculento	Z9	E12(3)
<i>Senecio glastifolius</i> L. f.	Compositae	Senécio-cor-rosa	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	3-6	Nano.	Arbusto	Z9	E22, E28(grupo)
<i>Senecio haworthii</i> (Sw.) Steud.	Compositae		Áfricotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Caméfito	Arbusto suculento	Z9	E12(3)
<i>Senecio macroglossus</i> DC.	Compositae		Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z10	E28(2)
<i>Senecio serpens</i> G. Rowley	Compositae	Bálsamo-camudo; Bálsamo-de-canudo	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Caméfito	Arbusto suculento	Z9	E2, E10, E12, E19, E24, E26, E29, E31, E33 (grupo)
<i>Senecio spiculosus</i> (Sheph.) G. Rowley	Compositae		Áfricotropical	Perenifólio	1-12	4-6	Nano.	Herbácea suculenta	Z9	E12(3)
<i>Senecio tamoides</i> DC.	Compositae	Senécio	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	10-6	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z9	E8(4), E10(grupo), E12(1), E26(grupo)
<i>Senna bicapsularis</i> (L.) Roxb.	Leguminosae (Caesalpinioideae)	Cássia	Áfricotropical; Neotropical; Oceânia; Australiano	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	E12(grupo)
<i>Senna corymbosa</i> (Lamk.) Irwin & Barneby	Leguminosae (Caesalpinioideae)	Cássia-corimbosa	Neotropical	Perenifólio	1-12	7-11	Nano.	Arbusto	Z9	E4(1), E11(2), E19(4), E23(33), E25(1), E29(4)
<i>Senna didymobotrya</i> (Fres.) Irwin & Barneby.	Leguminosae (Caesalpinioideae)	Planta-das-pipocas; Cássia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	E5(5), E8(1), E10(4), E12(1), E14(7), E18(1), E19(8), E21(3), E24(1), E29(1), E32(2)
<i>Senna occidentalis</i> (L.) Link.	Leguminosae (Caesalpinioideae)	Cássia-café; Sena-café	Áfricotropical; Indomalaio; Australiano; Oceânia	Perenifólio	1-12	6-12	Micro.	Arbusto	Z10	E18(1), E23(2)
<i>Senna pendula</i> (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Irwin &	Leguminosae (Caesalpinioideae)	Chuva-de-ouro; Cássia	Neotropical; Neártico	Perenifólio	1-12	10-1	Micro.	Arbusto	Z9	E1(8), E2(2), E5(3), E6(2), E13(1), E19(9), E20(5),

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
Barbey var. <i>glabrata</i> (Vogel) Irwin & Barney										E21(26), E27(1), E29(1), E31(2)
<i>Senna spectabilis</i> (DC.) Irwin & Barney	Leguminosae (Caesalpinioideae)	Cássia- espectacular	Neotropical	Caducifólio	3-12	7-11	Micro.	Árvore	Z10	E4(2), E10(1), E19(2), E25(1)
<i>Senna x floribunda</i> (Cav.) Irwin & Barney	Leguminosae (Caesalpinioideae)	Cássia	Australiano	Perenifólio	1-12	6-8	Micro.	Arbusto	Z10	E29(1)
<i>Sequoia sempervirens</i> (D. Don) Endl	Cupressaceae	Sequóia	Neártico	Perenifólio	1-12	12-3	Macro.	Árvore	Z8	E5(1), E19(1), E22(3), E26(4), E28(9), E29(1), E30(7), E32(2)
<i>Serissa foetida</i> (L. f.) Lam.	Rubiaceae	Serissa	Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z9	E29(grupo), E32(1)
<i>Sesbania punicea</i> (Cav.) Benth.	Leguminosae (Papilionoideae)	Sesbania	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-9	Micro.	Arbusto	Z9	E19(8), E24(1)
<i>Sibthorbia peregrina</i> L.	Scrophulariaceae	Hera-terrestre; Erva-redonda	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-8	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z10	E22, E25, E26, E28, E30 (grupo)
<i>Sideritis candicans</i> Ait. var. <i>candicans</i>	Labiatae	Selvageira; Erva-branca	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-7	Nano.	Arbusto	Z10	E28(1)
<i>Sideroxylon mirmulans</i> R. Brown in Buch	Sapotaceae	Marmulano	Paleártico	Perenifólio	1-12	8-1	Micro.	Árvore	Z10	E6(1), E14(29), E19(29), E23(1), E28(2), E30(1), E31(2)
<i>Sisyrinchium striatum</i> Sm.	Iridaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	5-8	Geófita	Herbácea	Z8	E10, 26, E31(grupo)
<i>Smilax pendulina</i> Lowe	Liliaceae	Alegria-campo-de- cachorro; Salsaparrilha	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-5	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	E19(2)
<i>Sobralia leucoxantha</i> Reichb. f.	Orchidaceae	Orquídea-de-cana; Sobralia	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-9	Hemi.	Herbácea	Z11	E5(grupo)
<i>Sobralia macrantha</i> Lindl.	Orchidaceae	Orquídea-de-cana; Sobralia	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-10	Hemi.	Herbácea	Z11	E4(2), E7(1), E10, E12, E19, E30, E31, E32 (grupo)
<i>Solandra grandiflora</i> Sw.	Solanaceae	Solandra	Neotropical	Perenifólio	1-12	3-5	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	E31(1)
<i>Solandra longiflora</i> Tussac.	Solanaceae	Solandra	Neotropical	Perenifólio	1-12	2-5	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	E6(2)
<i>Solandra maxima</i> (Sessé & Moc.) P. Green	Solanaceae	Solandra	Neotropical	Perenifólio	1-12	12-7	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	E5(2), E10(4), E12, E19(grupo), E24(2), E27(6), E32(1)
<i>Solanum aviculare</i> Forst. f.	Solanaceae		Australiano	Perenifólio	1-12	5-6	Nano.	Arbusto	Z9	E31(1)
<i>Solanum crispum</i> Ruiz & Pav.	Solanaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	7-9	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z8	E32(1)
<i>Solanum jasminoides</i> Paxt.	Solanaceae	Jasmim-bastardo	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z9	E5(7), E6(2), E12(grupo), E19(2), E26(1)
<i>Solanum mauritanum</i> Scop.	Solanaceae	Tabaqueira	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	E5(2), E12(1), E22(grupo), E26(36), E28(grupo), E30(1), E31(grupo)
<i>Solanum muricatum</i> Ait.	Solanaceae	Pêra-melão	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Herbácea	Z9	E8, E19(grupo)
<i>Solanum pseudocapsicum</i> L.	Solanaceae	Pimenta-brava	Neotropical	Perenifólio	1-12	7-8; 12-1	Nano.	Arbusto	Z9	E22(3), E31(12)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO Biológico	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Solanum seaforthianum</i> Andrews	Solanaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	5-11	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	E5(1), E13(1), E25(1)
<i>Solanum wendlandii</i> Hook. f.	Solanaceae	Coração-de- estudante	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-8	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	E24(1), E26(1)
<i>Solanum wrightii</i> Benth.	Solanaceae	Árvore-da-batata	Neotropical	Perenifólio	1-12	3-11	Micro.	Árvore	Z10	E19(2)
<i>Soleirolia soleirolii</i> Gaudich	Urticaceae	Soleirolia	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-6	Hemi.	Herbácea trepadora	Z9	E22(grupo)
<i>Solenostemon scutellarioides</i> (L.) Codd.	Labiatae	Cóleos; Basófiás	Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	E2, E5, E10, E11, E18, E21, E22, E27, E29, E31, E32 (grupo)
<i>Sollya heterophylla</i> Lindl.	Pittosporaceae		Australiano	Perenifólio	1-12	5-7	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z9	E19(1)
<i>Sonchus fruticosus</i> L.fil.	Compositae	Leituga; Língua-de vaca; Serralha-da-rocha	Paleártico	Perenifólio	1-12	6-8	Nano.	Arbusto	Z10	E3(1), E19(2), E22(2), E25(1), E26(3), E27(2), E28(2), E30(18)
<i>Sonchus pinnatus</i> Ait.	Compositae	Leituga	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-7	Nano.	Arbusto	Z10	E22(1), E23(1), E28(3), E30(10), E31(1)
<i>Sonchus ustulatus</i> Lowe ssp. <i>maderensis</i> Aldridge	Compositae	Leituga	Paleártico	Perenifólio	1-12	7-10	Caméfito	Herbácea	Z10	E19(grupo), E25(1), E32(1)
<i>Sophora japonica</i> L.	Leguminosae (Papilionoideae)	Acácia-do-japão; Sófora-do-japão	Paleártico	Caducifólio	4-12	7-9	Micro.	Árvore	Z5	E9(1), E10(10), E18(2), E20(1), E26(2), E30(1), E31(1)
<i>Sophora secundiflora</i> (Ortega) Lagasca ex DC	Leguminosae (Papilionoideae)		Neártico	Caducifólio	1-3; 7-12	6-8	Micro.	Árvore	Z8	E31(1)
<i>Sparaxis fragrans</i> (Jacq.) Ker- Gawl. ssp. <i>grandiflora</i> (Delaroche) Goldbl.	Iridaceae		Áfricotropical	Sazonal	2-6	3-5	Geófita	Herbácea	Z9	E26(grupo)
<i>Sparmannia africana</i> L. f.	Tiliaceae	Esparmânia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	12-8	Micro.	Arbusto	Z10	E10(2), E26(4)
<i>Spathiphyllum ortgiesii</i> Reg.	Araceae	Lírio-da-paz; Bandeira-branca; Espatifilo	Neotropical	Perenifólio	1-12	Não floriu**	Hemi.	Herbácea	Z10	E10(1), E12(2)
<i>Spathiphyllum walisii</i> Reg.	Araceae	Lírio-da-paz; Bandeira-branca; Espatifilo	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z11	E5, E8, E9, E10, E12, E19, E31, E32(grupo)
<i>Spathodea campanulata</i> Beauv.	Bignoniaceae	Chama-da- floresta; Tulipeiro-africano	Áfricotropical	Caducifólio	1-12 (Variação individual)	1-12	Micro.	Árvore	Z11	E2(7), E5(2), E6(2), E7(1), E8(12), E9(3), E10(1), E11(4), E12(4), E13(2), E14(16), E15(3), E18(1), E19(7), E20(1), E21(16), E23(3), E24(2), E25(1), E27(1), E29(3), E30(1), E31(2), E32(1), E33(1)
<i>Spiraea cantoniensis</i> Lour.	Rosaceae	Grinalda-de-noiva	Paleártico	Marcescente	3-2 (11-2)	2-9	Nano.	Arbusto	Z6	E6(12), E7(4), E9(2), E10(1), E19(1), E22(5), E26(7), E27(3), E28(3), E29(2), E31(grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Spiraea nipponica</i> Maxim.	Rosaceae	Grinalda-de-noiva	Paleártico	Caducifólio	9-4	4-6	Nano.	Arbusto	Z5	E14(26)
<i>Sprekelia formosissima</i> (L.) Herb.	Amaryllidaceae	Lírio-dos- aztecas	Neotropical	Sazonal	6-8	6-8	Geófita	Herbácea	Z9	E26(grupo)
<i>Stachys byzantina</i> K. Koch	Labiatae	Orelha-de-gato	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-7	Caméfito	Herbácea	Z5	E2, E4, E11, E12, E22 (grupo),
<i>Stachys ocymastrum</i> (L.) Briq.	Labiatae		Paleártico	Sazonal	12-5	1-4	Terófito	Herbácea	Z5	E23(grupo)
<i>Stangeria eriopus</i> (Kunze) Baillon	Stangeriaceae	Cica	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	6-10	Caméfito	Arbusto	Z9	E30(1)
<i>Stanhopea costaricensis</i> Reichb. f.	Orchidaceae	Orquídea-passarinho; Passarinhos	Neotropical	Perenifólio	1-12	7-10	Epífita	Herbácea	Z10	E25(grupo)
<i>Stenocarpus sinuatus</i> Endl.	Proteaceae	Árvore-da- roda- do-fogo	Australiano	Perenifólio	1-12	9-10	Micro.	Árvore	Z9	E15(3), E19(1), E24(2), E26(2), E30(4), E32(1)
<i>Stenotaphrum secundatum</i> (Walter) Kuntze	Gramineae	Relva; Relva-de-correr	Neotropical; Áfricotropical; Oceânia	Perenifólio	1-12	3-11	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z9	E1, E2, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E16, E17, E18, E19, E20, E21, E23, E24, E25, E26, E27, E28, E29, E31, E32, E33 (tapete)
<i>Stephanotis floribunda</i> (R. Br.) Brongn.	Asclepiadaceae	Jasmim-de- madagáscar; Flor-de-noiva	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	4-8	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	E5(2), E11(1), E12(7)
<i>Stipa tenuissima</i> Trin.	Gramineae		Neártico	Perenifólio	1-12	6-9	Hemi.	Herbácea	Z8	E10 (mancha)
<i>Stokesia laevis</i> (Hill) Greene	Compositae		Neártico	Perenifólio	1-12	12-1	Nano.	Herbácea	Z7	E19(grupo)
<i>Strelitzia nicolai</i> Reg. & Körn.	Strelitziaceae	Estrelícia-gigante	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	E5(grupo), E6(1), E7(3), E9(grupo), E10(5), E11(7), E12(grupo), E13(7), E18(1), E19(7), E21(grupo), E24(1), E25(2), E26(2), E28(1), E29, E30, E31(grupo), E32(1)
<i>Strelitzia reginae</i> Banks ex Dryand	Strelitziaceae	Estrelícia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E12, E13, E14, E16, E18, E19, E20, E21, E22, E23, E24, E25, E26, E27, E28, E29, E30, E31, E32, E33 (grupo)
<i>Strelitzia reginae</i> Banks ex Dryand var. <i>parvifolia</i> (Aiton) Anon.	Strelitziaceae	Estrelícia; Ave-do-paraíso	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	E5, E19 (grupo)
<i>Strelitzia reginae</i> Banks ex Dryand var. <i>junceae</i> (Ker-Gawl.) H. E. Moore	Strelitziaceae	Estrelícia; Ave-do-paraíso	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z10	E5, E19(grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLOGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLOGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Streptosolen jamesonii</i> (Benth.) Miers.	Solanaceae	Rapaziada	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z9	E5(2), E6(1), E8(2), E10(grupo), E14(grupo), E19(4), E22(1), E26(7), E28(3), E31(1), E32(1)
<i>Strobilanthes kunthianus</i> T. Anders ex Benth.	Acanthaceae		Indomalaio	Perenifólio	1-12	3-5	Nano.	Arbusto	Z11	E5(4), E12(1), E19(1), E26(4), E31(grupo)
<i>Stromanthe sanguinea</i> (Hook.) Sonder.	Marantaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	6-7	Hemi.	Herbácea	Z10	E5, C9(grupo)
<i>Strongylodon macrobotrys</i> A. Gray.	Leguminosae (Papilionoideae)	Vinha-de-jade	Indomalaio	Perenifólio	1-12	3-6	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z11	E5(1), E12(1)
<i>Styrax officinalis</i> L.	Styracaceae		Paleártico	Caducifólio	4-12	5-8	Micro.	Arbusto	Z6	E26(1)
<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassm.	Palmae	Coqueiro-de- jardim; Palmeira-rainha	Neotropical	Perenifólio	1-12	4-7	Micro.	Árvore	Z10	E2(4), E5(13), E6(1), E7(4), E10(8), E11(2), E12(3), E17(1), E18(4), E19(9), E20(1), E21(4), E23(7), E24(1), E25(1), E29(10), E30(3), E31(1), E32(1), E33(1)
<i>Synadenium grantii</i> Hook. f.	Euphorbiaceae	Sinadénio	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	8-11	Micro.	Arbusto suculento	Z10	E2(1), E8(1), E10(3), E12(1), E13(grupo), E18(4), E22(1), E23(1), E29(1), E30(1), E31(2)
<i>Syncarpia glomulifera</i> (Sm.) Nied.	Myrtaceae	Turpentine	Australiano	Perenifólio	1-12	3-5	Meso.	Árvore	Z9	E5(1), E26(3)
<i>Syngonium erythrophyllum</i> Birdsey & G. S. Bunting.	Araceae	Singónio	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-7	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z10	E33(6)
<i>Syngonium hoffmannii</i> Schott.	Araceae	Singónio	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-7	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z11	E5, E13 (grupo)
<i>Syngonium podophyllum</i> Shott.	Araceae	Singónio	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-7	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z11	E5, E10, E12, E19, E27, E29 (grupo)
<i>Syngonium wendlandii</i> Schott.	Araceae	Singónio	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-7	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z11	E5, E13, E18, E27 (grupo)
<i>Syringa josikaea</i> Jacq. f. ex Rchb.	Oleaceae	Lilás	Paleártico	Caducifólio	4-12	Não floriu*	Micro.	Arbusto	Z5	E28(1)
<i>Syringa vulgaris</i> L.	Oleaceae	Lilás	Paleártico	Caducifólio	4-12	Não floriu*	Micro.	Arbusto	Z5	E28(3)
<i>Syringa x hyacinthiflora</i> (Lemoine) Rehh.	Oleaceae	Lilás	Hortícola	Caducifólio	4-12	Não floriu*	Micro	Arbusto	Z4	E28(1)
<i>Syzygium jambos</i> (L.) Alston.	Myrtaceae	Jambeiro	Indomalaio	Perenifólio	1-12	3-7	Micro.	Árvore	Z10	E5(5), E13(1), E19(3), E20(1), E21(4), E22(1), E24(1), E25(2), E26(1), E27(1), E30(4)
<i>Syzygium malaccense</i> (L.) Merril & Perry	Myrtaceae	Jambeiro	Indomalaio; Australiano	Perenifólio	1-12	4-6	Micro.	Árvore	Z10	E19(1), E21(1), E25(1)
<i>Syzygium oleosum</i> (F. Muell) B. Hyland.	Myrtaceae		Australiano	Perenifólio	1-12	7-11	Micro.	Árvore	Z10	E26(1)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Syzygium paniculatum</i> Gaertn.	Myrtaceae		Australiano	Perenifólio	1-12	5-11	Micro.	Árvore	Z10	E10(grupo), E26(4), E31(1)
<i>Tabebuia chrysantha</i> (Jacq.) Nichols.	Bignoniaceae	Tabebuia	Neotropical	Caducifólio	6-3	Não floriu*	Micro.	Árvore	Z11	E19(1)
<i>Tabebuia heterophylla</i> (D. C.) Britton	Bignoniaceae	Tabebuia	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-8	Micro.	Árvore	Z10	E5(1), E24(1)
<i>Tabebuia impetiginosa</i> (DC.) Standley	Bignoniaceae	Tabebuia	Neotropical	Caducifólio	4-1	12-2	Micro.	Árvore	Z9	E25(1)
<i>Tabebuia pallida</i> (Lindl.) Mers.	Bignoniaceae	Tabebuia	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-10	Micro.	Árvore	Z11	E19(3)
<i>Tagetes patula</i> L.	Compositae	Cravos-de-burro	Neotropical	Sazonal	1-9	3-8	Terófito	Herbácea	Z9	E1, E2, E3, E4, E8, E9, E13, E16, E17, E18, E20, E21, E22, E23, E24, E28, E29, E31 (grupo)
<i>Tamarindus indica</i> L.	Leguminosae	Tamarindo	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	7-8	Micro.	Árvore	Z11	E5(1), E19(3)
<i>Tamarix gallica</i> L.	Tamaricaceae	Tamargueira	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-5	Micro.	Arbusto	Z5	E14(39), E23(grupo)
<i>Tamus edulis</i> Lowe	Dioscoreaceae	Norça	Paleártico	Sazonal	10-6	12-2	Geófito	Herbácea trepadora	Z10	E25(1)
<i>Tanacetum argenteum</i> (Lam.) Willd.	Compositae		Paleártico	Perenifólio	1-12	4-11	Caméfito	Herbácea	Z5	E26(grupo)
<i>Tanacetum parthenium</i> (L.) Schultz-Bip.	Compositae	Artemija; Alfinetes-de-senhora	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Caméfito	Herbácea	Z6	E8, E14, E22, E26, E31, E32(grupo)
<i>Taxodium distichum</i> (L.) Rich.	Taxodiaceae	Taxódio	Neártico	Caducifólio	4-12	4	Meso.	Árvore	Z6	E31(1)
<i>Taxus baccata</i> L.	Taxaceae	Teixo	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-4	Micro.	Árvore	Z5	E19(1), E22(4), E26(3), E28(5), E30(12)
<i>Tecoma stans</i> (L.) Juss. ex HBK.	Bignoniaceae	Estenolóbio	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	E4(1), E9(1), E10(2), E12(3), E13(1), E19(8), E21(7), E25(2), E31(1), E33(1)
<i>Tecomanthe dendrophila</i> (Bl.) Schum.	Bignoniaceae	Tecomante	Oceânia	Perenifólio	1-12	4-7	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	E12(1), E25(1), E32(1)
<i>Tecomaria capensis</i> (Thunb.) Spach.	Bignoniaceae	Camarões	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	E3(grupo), E4(sebe), E9(grupo), E10(6), E12(grupo), E13(grupo), E14(5), E19(2), E22, E23, E26, E27, E28(grupo), E30(5), E31(2)
<i>Teline maderensis</i> Webb et Berth. var. <i>maderensis</i>	Leguminosae (Papilionoideae)	Piomo	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-8	Micro.	Arbusto	Z10	E19(grupo), E26(3), E22(grupo), E25(1), E27(grupo), E28(2), E30(grupo)
<i>Telopea speciosissima</i> (Sm.) R. Br.	Proteaceae	Telopea; "Waratah"	Australiano	Perenifólio	1-12	2-5	Nano.	Arbusto	Z9	E26(7)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Terminalia bellirica</i> (Gaertn.) Roxb.	Combretaceae	Amendoeira-da-índia	Indomalaio	Caducifólio	6-1	Não floriu*	Micro.	Árvore	Z10	E19(1), E31(1)
<i>Tetradenia riparia</i> (Hochst.) Codd.	Labiatae	Iboza (Moschosma)	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	12-6	Nano.	Arbusto	Z10	E5(5), E6(2), E9, E12, E19(grupo), E26(11), E27(15), E29(1), E31(grupo)
<i>Tetragonia tetragonoides</i> (Pallas) O. Ktze.	Aizoaceae	Espinafre; Espinafre-da-nova-zelândia	Antártico; Australiano	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea trepadora e suculenta	Z8	E13, E19, E30(grupo)
<i>Tetrapanax papyrifer</i> (Hook.) K. Kock.	Araliaceae	Arália-do-papel	Indomalaio	Perenifólio	1-12	8-1	Micro.	Arbusto	Z8	E5(5), E12(8), E22(3), E25(1), E26(1)
<i>Tetrastigma voinerianum</i> (Pierre ex Nichols. & Mottet) Gagnep	Vitaceae	Vinha-virgem	Indomalaio	Perenifólio	1-12	4-5	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	E10(5)
<i>Teucrium abutiloides</i> L' Hérít.	Labiatae	Abrotona -amarela	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-8	Nano.	Arbusto	Z10	E22(18), E28(3), E30(8), E31(grupo)
<i>Teucrium betonicum</i> L' Hérít	Labiatae	Erva-branca; Abrotona	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-8	Nano.	Arbusto	Z10	E25(1), E28(4), E30(10), E32(1)
<i>Teucrium fruticans</i> L.	Labiatae		Paleártico	Perenifólio	1-12	12-5	Nano.	Arbusto	Z8	E6(1), E10(1), E23(8), E26(10), E31(7)
<i>Thespesia populnea</i> (L.) Sol.	Malvaceae		Áfricotropical; Indomalaio; Oceânia; Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Árvore	Z11	E19(1)
<i>Thevetia peruviana</i> (Pers.) Schum.	Apocynaceae	Tevétia	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-7	Micro.	Arbusto	Z10	E10(20), E19(1)
<i>Thryptomene saxicola</i> (Hook) Schauer	Myrtaceae		Australiano	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z9	E10(grupo), E28(2)
<i>Thuja occidentalis</i> L.	Cupressaceae	Tuia-ocidental; Tuia-do-canadá	Neártico	Perenifólio	1-12	5-8	Micro.	Árvore	Z4	E11(1), E12(1), E20(3), E25(1), E28(1), E30(23), E31(2)
<i>Thuja plicata</i> D. Don.	Cupressaceae	Tuia-gigante	Neártico	Perenifólio	1-12	1-3	Micro.	Árvore	Z6	E26(2), E30(5)
<i>Thunbergia battiscombei</i> Turrill.	Acanthaceae	Tumbérgia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	5-7; 12-1	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z11	E26(1)
<i>Thunbergia coccinea</i> Wallich.	Acanthaceae	Tumbérgia	Indomalaio	Perenifólio	1-12	11-4	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	E19(3), E31(1)
<i>Thunbergia erecta</i> (Benth.) Anderson	Acanthaceae	Tumbérgia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z10	E10(grupo), E31(8), E32(grupo)
<i>Thunbergia grandiflora</i> (Roxb. ex Rottl.) Roxb.	Acanthaceae	Tumbérgia	Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	E5(2), E10(3), E12(2), E19(3), E26(1), E31(1)
<i>Thunbergia gregorii</i> S. Moore	Acanthaceae	Tumbérgia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z10	E10, E26(grupo), E27(1)
<i>Thunbergia mysorensis</i> Anderson ex Bedd.	Acanthaceae	Tumbérgia	Indomalaio	Perenifólio	1-12	2-11	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z10	E5(1), E31(1)
<i>Thymus vulgaris</i> L.	Labiatae	Segurelha; Cheiros	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-6	Nano.	Arbusto	Z7	E5, E10, E13, E26 (grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Tibouchina grandifolia</i> Cogn.	Melastomataceae	Aranhas; Tibouchina	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	E5(4), E6(3), E7(1), E8(2), E10(8), E12(5), E22(3), E24(2), E26(5), E27(3), E28(3), E29(1), E30(4)
<i>Tibouchina urvilleana</i> (DC) Cogn.	Melastomataceae	Aranhas	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z10	E1(7), E3(1), E5(8), E10(7), E11(2), E12(5), E13(3), E18(1), E19(10), E20(3), E21(2), E22(16), E26(6), E27(3), E28(3), E30(20), E32(1)
<i>Tilia cordata</i> Mill.	Tiliaceae	Tília-de-folhas- pequenas	Paleártico	Caducifólio	4-11	5-6	Micro.	Árvore	Z3	E26(1), E30(1)
<i>Tilia tomentosa</i> Moench.	Tiliaceae	Tília-prateada	Paleártico	Caducifólio	4-11	5-7	Meso.	Árvore	Z6	E22(4), E25(1), E26(1)
<i>Tilia x vulgaris</i> Hayne.	Tiliaceae	Tília-comum	Hortícola	Caducifólio	4-12	6-7	Micro.	Árvore	Z3	E6(1), E28(1), E30(1)
<i>Tillandsia cyanea</i> Lindl. ex K. Koch.	Bromeliaceae	Tilândsia-azul	Neotropical	Perenifólio	1-12	8-2	Hemi.	Herbácea	Z10	E5, E19, E25 (grupo), E32(1)
<i>Tillandsia lindenii</i> Reg.	Bromeliaceae	Tilandsia	Neotropical	Perenifólio	1-12	11-6	Hemi.	Herbácea	Z10	E12(grupo), E26(1)
<i>Tillandsia tenuifolia</i> L.	Bromeliaceae	Erva-da-fortuna; Planta-do-ar	Neotropical	Perenifólio	1-12	3-6	Epífita	Herbácea	Z9	E5, E19(grupo) E26(2), E31(10)
<i>Tillandsia usneoides</i> (L.) L.	Bromeliaceae	Tilandsia	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-10	Epífita	Herbácea	Z8	E5(7), E19(grupo)
<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	Leguminosae (Papilionoideae)	Tipuana	Neotropical	Marcescente	5-4 (3-4)	4-7	Meso.	Árvore	Z9	E1(1), E4(1), E5(1), E6(36), E7(2), E8(1), E9(6), E10(3), E14(30), E15(8), E16(2), E17(2), E18(3), E19(27), E20(42), E21(21), E23(21), E25(2), E27(11), E31(1)
<i>Tithonia diversifolia</i> (Hemsl.) A. Gray.	Compositae	Girassol-mexicano	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Micro.	Arbusto	Z9	E5(1), E19(grupo) E26(3), E28(6), E29(16)
<i>Tolmiea menziesii</i> Torr. & A. Gray	Saxifragaceae		Neártico	Perenifólio	1-12	4-7	Hemi.	Herbácea	Z7	E30(grupo)
<i>Tolpis succulenta</i> (Dryand. in Ait.) Lowe	Compositae	Visco	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-9	Hemi.	Herbácea	Z10	E30(grupo)
<i>Trachelium caeruleum</i> L.	Campanulaceae	Traquélio	Paleártico	Perenifólio	1-12	6-8	Nano.	Herbácea	Z9	E12, E19, E28, E29, E31 (grupo)
<i>Trachelospermum jasminoides</i> (Lindl.) Lem.	Apocynaceae	Jasmim-de-estrela	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-11	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z8	E2(2), E5(1), E8(1), E10(grupo), E11(10), E12(grupo), E13(7), E25(3), E26(4), E30(grupo), E31(2), E32(2)
<i>Trachycarpus fortunei</i> (Hook.) H. A. Wendl.	Palmae	Palmeira-de- moinho-de-vento	Paleártico	Perenifólio	1-12	5-6	Micro.	Árvore	Z8	E5(4), E6(2), E7(1), E10(4), E11(8), 12(1), E26(1), E30(16)
<i>Tradescantia cerinthoides</i> Kunth.	Commelinaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	2-10	Hemi.	Herbácea trepadora	Z7	E26, E27, E31(grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Tradescantia fluminensis</i> Vell. Conc.	Commelinaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	4-6	Hemi.	Herbácea trepadora	Z9	E4, E10, E12, E19, E28, E29, E30, E31, E32 (grupo)
<i>Tradescantia pallida</i> (Rose) D. Hunt.	Commelinaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea trepadora	Z8	E2, E6, E7, E9, E10, E11, E13, E16, E18, E19, E21, E23, E25, E28, E29, E32 (grupo)
<i>Tradescantia spathacea</i> Sw.	Commelinaceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	10-2	Hemi.	Herbácea	Z9	E4 (1), E9, E10, E12, E13, E18(grupo), E19(1), E21(grupo), E33(1)
<i>Tradescantia zebrina</i> hort. ex. Bosse	Commelinaceae	Zebrina	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z9	E3, E5, E7, E10, E11, E12, E13, E16, E18, E19, E21, E23, E24, E25, E27, E28, E29, E30, E31 (grupo)
<i>Trifolium repens</i> L.	Leguminosae	Trevo	Paleártico	Perenifólio	1-12	2-10	Hemi.	Herbácea	Z4	E9, E19, E21(grupo)
<i>Tritonia crocata</i> (L.) Ker-Gaul.	Iridaceae	Palhinhas-vermelhas	Áfricotropical	Sazonal	2-6	3-5	Geófita	Herbácea	Z9	E26(grupo)
<i>Trochetiopsis ebenus</i> Q.C.B. Cronk	Sterculiaceae	Ébano-de-santa-helena	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	7-5	Nano.	Arbusto	Z10	E10(1), E12(1), E26(1)
<i>Tropaeolum majus</i> L.	Tropaeolaceae	Chagas	Neotropical	Sazonal	1-10	2-9	Terófita	Herbácea	Z8	E5, E14, E22, E26, E28, E31 (grupo)
<i>Tulbaghia fragrans</i> L.	Liliaceae (Alliaceae)	Tulbáguia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	1-8	Geófita	Herbácea	Z8	E26(grupo)
<i>Tulbaghia violacea</i> Harv.	Liliaceae (Alliaceae)	Tulbáguia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	11-6	Geófita	Herbácea	Z8	E10, E12(grupo)
<i>Typha angustifolia</i> L.	Typhaceae		Paleártico; Neártico	Perenifólio	1-12	6-9	Helófita	Herbácea	Z3	E30(grupo)
<i>Ulmus glabra</i> Huds.	Ulmaceae	Ulmeiro	Paleártico	Caducifólio	3-12	4	Micro.	Árvore	Z3	E30(3)
<i>Ulmus procera</i> Salisb.	Ulmaceae	Ulmeiro	Paleártico	Caducifólio	3-12	4	Meso.	Árvore	Z4	E28(4)
<i>Umbilicus rupestris</i> (Salisb.) Dandly	Crassulaceae	Inhame-de-lagartixa	Paleártico	Perenifólio	1-12	4-6	Hemi.	Herbácea	Z7	E22, E26, E30, E31 (grupo)
<i>Uncinia uncinata</i> (L. f.) Kukenthal	Cyperaceae		Antártico	Perenifólio	1-12	8-9	Hemi.	Herbácea	Z8	E30(grupo)
<i>Vaccinium padifolium</i> J. E. Sm. ex R. S. R.	Ericaceae	Uveira-da-serra	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-6	Micro.	Arbusto	Z9	E14(27), E19(3), E28(1), E30(8)
<i>Vanda tricolor</i> Lindley	Orchidaceae	Vanda-tricolor	Indomalaio	Perenifólio	1-12	3-5	Epífita	Herbácea	Z12	E5(grupo)
<i>Veltheimia bracteata</i> Bak.	Liliaceae (Hyacinthaceae)	Velteimia	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	12-4	Geófita	Herbácea	Z9	E26(grupo)
<i>Verbena bonariensis</i> L.	Verbenaceae	Jarvão; Urgeão	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-12	Nano.	Herbácea	Z7	E5, E26(grupo)
<i>Verbena peruviana</i> (L.) Britt.	Verbenaceae	Verbena	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-9	Caméfito	Herbácea	Z9	E26(grupo)
<i>Verbena rigida</i> Spreng.	Verbenaceae	Verbena-rija	Neotropical	Perenifólio	1-12	5-9	Caméfito	Herbácea	Z8	E13, E19, E26(grupo)
<i>Verbena x hybrida</i> Groenl. & Ruempl.	Verbenaceae	Verbena	Hortícola	Perenifólio	1-12	1-12	Caméfito	Herbácea	Z9	E8, E15, E18, E19, E21, E23 (grupo)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Viburnum opulus</i> L.	Caprifoliaceae	Viburno; Noveleiro	Paleártico	Caducifólio	4-11	4-8	Micro.	Arbusto	Z3	E14(32), E26(2)
<i>Viburnum suspensum</i> Lindl.	Caprifoliaceae	Viburno	Indomalaio	Perenifólio	1-12	1-2	Micro.	Arbusto	Z9	E10(6)
<i>Viburnum tinus</i> L.	Caprifoliaceae	Viburno	Paleártico	Perenifólio	1-12	10-4; 7-8	Micro.	Arbusto	Z7	E6(10), E7(1), E8(grupo), E11(3), E14(34), E22(5), E26(4), E27(4), E29(3), E32(2)
<i>Vicia sativa</i> L.	Leguminosae (Papilionoideae)	Ervilhaca	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-6	Terófito	Herbácea trepadora	Z6	E26, E28, E30(grupo)
<i>Vicia sepium</i> L.	Leguminosae (Papilionoideae)	Ervilhaca-brava	Paleártico	Perenifólio	1-12	3-6	Terófito.	Herbácea trepadora	Z6	E26(grupo)
<i>Vinca major</i> L.	Apocynaceae	Pervinca	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea trepadora	Z7	E5, E10, E14, E22 E26, E28 (grupo)
<i>Vinca minor</i> L.	Apocynaceae	Pervinca-menor	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea trepadora	Z4	E14 (grupo)
<i>Viola odorata</i> L.	Violaceae	Violeta-de-cheiro	Paleártico	Perenifólio	1-12	10-7	Hemi.	Herbácea	Z6	E31(grupo)
<i>Viola riviniana</i> Rchb.	Violaceae	Violeta	Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z5	E2, E14, E22, E26, E28, E30, E31 (grupo)
<i>Viola x witrockiana</i> Gams.	Violaceae	Amores-perfeitos	Hortícola	Perenifólio	1-12	3-8	Hemi.	Herbácea	Z5	E6, E14, E24, E25, E26, E29, E31(grupo)
<i>Visnea mocanera</i> L. f.	Theaceae	Mocano	Paleártico	Perenifólio	1-12	11-2	Micro.	Árvore	Z10	E19(1), E25(1), E28(1)
<i>Vitex agnus-castus</i> L.	Verbenaceae	Árvore-da- castidade	Paleártico	Caducifólio	5-12	7-11	Micro.	Arbusto	Z7	E10(1), E26(4), E31(2)
<i>Vitis vinifera</i> L.	Vitaceae	Vinha-púrpura	Paleártico	Caducifólio	3-12	4-6	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z6	E5, E6, E12, E23 (grupo),
<i>Vriesea ensiformis</i> (Vell.) Beer.	Bromeliaceae	Bromélia	Neotropical	Perenifólio	1-12	11-2	Hemi.	Herbácea	Z11	E5 (grupo)
<i>Vriesea splendens</i> (Brongn.) Lem.	Bromeliaceae	Espada-de-fogo	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-2	Hemi.	Herbácea	Z11	E5(grupo), E9(3), E12(2)
<i>Wachendorfia thyrsiflora</i> Burm.	Haemodoraceae		Áfricotropical	Perenifólio	1-12	5-6	Geófito	Herbácea	Z10	E26(4)
<i>Wallichia caryotoides</i> Roxb.	Palmae		Indomalaio	Perenifólio	1-12	7-8	Hemi.	Arbusto	Z9	E29(1)
<i>Washingtonia filifera</i> (Lind. ex André) H. A. Wendl	Palmae	Palmeira-de-leque- da- califórnia	Neártico	Perenifólio	1-12	5-8	Micro.	Árvore	Z9	E4(2), E5(5), E6(1), E7(2), E8(13), E9(6), E10(17), E11(2), E12(2), E13(6), E15(2), E18(2), E19(14), E20(6), E21(1), E23(8), E24(1), E25(3), E29(13), E30(2), E31(2), E33(2)
<i>Washingtonia robusta</i> Wendl.	Palmae	Palmeira-de-leque- mexicana	Neártico	Perenifólio	1-12	4-6	Micro.	Árvore	Z10	E8(6), E10(4), E12((3), E13(1), E15(1), E23(1), E25(1), E26(1), E29(5), E30(17), E33(1)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Watsonia borbonica</i> (Pourr.) Goldbl.	Iridaceae	Hastes-de-são-josé	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	3-7	Geófito	Herbácea	Z10	E26, E30(grupo)
<i>Watsonia borbonica</i> (Pourr.) Goldbl. <i>ssp. ardernei</i> (Sander) Goldbl.	Iridaceae	Hastes-de-são-josé	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	3-7	Geófito	Herbácea	Z10	E22, E26, E30, E31 (grupo)
<i>Watsonia tabularis</i> Mathews & L. Bol.	Iridaceae	Hastes-de-são-josé	Áfricotropical	Perenifólio	1-12	3-7	Geófito	Herbácea	Z10	E26(grupo)
<i>Wedelia trilobata</i> (L.) Hitchc.	Compositae	Vedélia	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-12	Fane. trep.	Herbácea	Z11	E3, E4, E7, E10, E11, E18, E20, E23, E25, E27, E32 (grupo)
<i>Weigela florida</i> (Bunge) A. D.C.	Caprifoliaceae	Pessegueiro-de-jardim; Veigela	Paleártico	Caducifólio	3-12	4-7	Micro.	Arbusto	Z5	E19(1), E22(1), E26(1), E30(12)
<i>Westringia fruticosa</i> (Willd.) Druce	Labiatae		Australiano	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z9	E10(5)
<i>Westringia raleighii</i> Boiv.	Labiatae		Australiano	Perenifólio	1-12	1-12	Nano.	Arbusto	Z9	E10(1)
<i>Wigandia caracasana</i> HBK.	Hydrophyllaceae	Vigândia	Neotropical	Perenifólio	1-12	1-5	Micro.	Arbusto	Z10	E5(grupo), E12(1), E19(grupo), E26(2), E29(3), E31(grupo)
<i>Wisteria floribunda</i> (Willd.) DC	Leguminosae (Papilionoi-deae)	Glicinia-do-japão	Paleártico	Caducifólio	2-12	3-6	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z5	E5(2), E26(2), E30(2)
<i>Wisteria sinensis</i> (Sims) Sweet.	Leguminosae (Papilionoi-deae)	Lilases; Glicinia	Paleártico	Caducifólio	2-12	2-5; 7-8	Fane. trep.	Arbusto trepador	Z5	E2(2), E4(3), E5(3), E6(grupo), E7(2), E8(1), E10(grupo), E11(7), E12(7), E13(1), E24(1), E25(1), E26(11), E27(3), E29(5), E30(4), E31(grupo), E32(1)
<i>Woodwardia radicans</i> (L.) Sm.	Blechnaceae	Feto-de-botão	Paleártico	Perenifólio	1-12	-----	Hemi.	Herbácea	Z8	E5, E11, E12, E13, E19, E22, E26, E29, E30, E32 (grupo)
<i>Xanthorrhoea australis</i> R. Br.	Liliaceae (Xanthorrhoeaceae)	Árvore-relva (Grass tree)	Australiano	Perenifólio	1-12	2-5	Nano.	Árvore	Z9	E30(1)
<i>Xanthorrhoea johnsonii</i> A. Lee	Liliaceae (Xanthorrhoeaceae)	Árvore-relva (Grass Tree)	Australiano	Perenifólio	1-12	3-5	Nano.	Árvore	Z9	E30(2)
<i>Xanthorrhoea quadrangulata</i> F. Muell	Liliaceae (Xanthorrhoeaceae)	Árvore-relva (Grass tree)	Australiano	Perenifólio	1-12	2-5	Nano.	Árvore	Z9	E26(2)
<i>Xanthosoma violaceum</i> Schott	Araceae		Neotropical	Perenifólio	1-12	7-8	Geófito	Herbácea	Z11	E12 (grupo)
<i>Yucca elata</i> Engelm.	Agavaceae		Neártico	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Nano.	Arbusto	Z9	E5(1), E12(2)
<i>Yucca elephantipes</i> Reg.	Agavaceae	luca-gigante	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-10	Micro.	Arbusto	Z10	E10(3), E11(3), E12(2), E13(4), E18(1), E19(7), E21(11), E25(1), E29(1), E30(19), E31(grupo), E32(2)

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	NOME VULGAR	ORIGEM (Impérios Fitogeográficos)	REGIME FENOLÓGICO	FOLHEAÇÃO (Meses)	FLORAÇÃO (Meses)	TIPO BIOLÓGICO	PORTE	ÍNDICE DE RUSTICIDADE	CANTEIRO
<i>Yucca faxoniana</i> (Trelease) Sargent	Agavaceae	Nolina	Neotropical; Neártico	Perenifólio	1-12	Não floriu**	Micro.	Árvore	Z10	E21(1)
<i>Yucca gloriosa</i> L.	Agavaceae	luca	Neártico	Perenifólio	1-12	6-11	Micro.	Arbusto	Z7	E5(5), E6(3), E8(4), E9(11), E10(4), E12(grupo), E13(grupo), E14(20), E19(21), E21(44), E23(9), E24(1) E26(9), E27(1), E28(grupo), E29(4), E30(17), E31(grupo), E32(4), E33(7)
<i>Yucca rostrata</i> Engelm. Ex Trel.	Agavaceae	luca	Neártico	Perenifólio	1-12	5-7	Micro.	Arbusto	Z8	E12(1), E30(1)
<i>Yucca whipplei</i> Torr.	Agavaceae	luca	Neártico	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Micro.	Arbusto	Z8	E12(4)
<i>Yushania anceps</i> (Mittford) Yi.	Gramineae	Bambu	Paleártico	Perenifólio	1-12	Não floriu**	Hemi.	Herbácea	Z9	E5, E6, E11, E13, E21, E22, E28, E29, E31 (grupo),
<i>Zamia furfuracea</i> L. f. in Aiton	Zamiaceae	Zamia	Neotropical	Perenifólio	1-12	6-11	Hemi.	Arbusto	Z10	E11(3), E12(1), E19(1), E25(1), E30(4)
<i>Zantedeschia aethiopica</i> (L.) Spreng.	Araceae	Jarros	Áfricotropical	Sazonal	10-7	11-5	Geófita	Herbácea	Z8	E3, E5, E6, E9, E10, E12, E14, E22, E26, E28, E29, E30, E31 (grupo)
<i>Zea mays</i> L.	Gramineae	Milho	Neártico	Sazonal	3-8	6-7	Terófita	Herbácea	Z7	E3 (grupo)
<i>Zinnia elegans</i> Jacq.	Compositae	Zinia	Neotropical	Sazonal	6-10	6-8	Terófita	Herbácea	Z8	E2(2), E13, E26 (grupo)
<i>Ziziphus jujuba</i> Mill.	Rhamnaceae	Jujuba-chinesa	Paleártico	Caducifólio	3-11	Não floriu*	Micro.	Árvore	Z7	E19(1)
<i>Ziziphus mauritiana</i> Lam.	Rhamnaceae	Jujuba-indiana	Indomalaio	Perenifólio	1-12	Não floriu*	Micro.	Árvore	Z10	E19(1)
<i>Zoysia japonica</i> Steud.	Gramineae		Paleártico	Perenifólio	1-12	1-12	Hemi.	Herbácea	Z7	E10 (tapete)
<i>Zygopetalum mackayi</i> Hook.	Orchidaceae	Orquídea	Neotropical	Perenifólio	1-12	10-12	Epífita	Herbácea	Z10	E25(1)
<i>Zygostycos tripartitus</i> Humbert	Cucurbitaceae		Áfricotropical	Perenifólio	1-12	6-9	Fane. trep.	Herbácea trepadora	Z10	E12(1)

Legenda:

- Plantas que não floriram no período em estudo (Janeiro 2002 – Janeiro 2005): * plantas novas; ** plantas que nunca floriram por falta de aclimação;
- Plantas marcescentes (plantas semiperenifólias e semcaducifólias): 3-2 (**3-4**) – folhas todo o ano mas com renovação significativa em Março e Abril.

Anexo 35

ÍNDICE DE FREQUÊNCIA ESPECÍFICA

<i>Taxon</i>	Espaços Verdes em que ocorre	Espaços Verdes (%)	Classe
<i>Abelia graebneriana</i> Rehd.	1	3	Muito Rara
<i>Abelmoschus moschatus</i> Medik.	1	3	Muito Rara
<i>Abies alba</i> Mill.	1	3	Muito Rara
<i>Abies nordmanniana</i> (Steven) Spach.	1	3	Muito Rara
<i>Abutilon arboreum</i> Sweet.	1	3	Muito Rara
<i>Abutilon x milleri</i> hort.	1	3	Muito Rara
<i>Acacia farnesiana</i> (L.) Willd.	1	3	Muito Rara
<i>Acacia linifolia</i> (Vent.) Willd.	1	3	Muito Rara
<i>Acacia pravissima</i> F. Muell.	1	3	Muito Rara
<i>Acacia salicina</i> Lindl.	1	3	Muito Rara
<i>Acacia verticillata</i> (L'Hérit.) Willd.	1	3	Muito Rara
<i>Acalypha reptans</i> Sw.	1	3	Muito Rara
<i>Acoelorrhaphe wrightii</i> (Griseb. & H. A. Wendl.) H. A. Wendl. ex Becc.	1	3	Muito Rara
<i>Acokanthera oblongifolia</i> (Hochst.) Codd.	1	3	Muito Rara
<i>Adansonia digitata</i> L.	1	3	Muito Rara
<i>Adenium obesum</i> (Forssk.) Roem. & Schult.	1	3	Muito Rara
<i>Adiantum aneitense</i> Carr.	1	3	Muito Rara
<i>Adromischus cristatus</i> (Haw.) Lem.	1	3	Muito Rara
<i>Adromischus cristatus</i> (Haw.) Lem. ssp. <i>Clavifolius</i> (Haw.) Toelken.	1	3	Muito Rara
<i>Aechmea distichantha</i> Lem.	1	3	Muito Rara
<i>Aechmea fulgens</i> Brongn.	1	3	Muito Rara
<i>Aechmea luddemanniana</i> (K. Koch) Mez.	1	3	Muito Rara
<i>Aechmea recurvata</i> (Klotzsch) L.B. Sm.	1	3	Muito Rara
<i>Aechmea rubens</i> (L. B. Smith) L. B. Smith	1	3	Muito Rara
<i>Aechmea weilbachii</i> Didr.	1	3	Muito Rara
<i>Aeonium balsamiferum</i> Webb & Berth.	1	3	Muito Rara
<i>Aeonium glandulosum</i> (Aiton) Webb & Berthel	1	3	Muito Rara
<i>Aeonium haworthii</i> Salm-Dyck ex Webb & Berth.	1	3	Muito Rara
<i>Aeonium lindleyi</i> Webb & Berth.	1	3	Muito Rara
<i>Aeonium manriqueorum</i> Bolle.	1	3	Muito Rara
<i>Aeonium simsii</i> (Sweet) Steran.	1	3	Muito Rara
<i>Aeonium x bollei</i> Kunkell	1	3	Muito Rara
<i>Aeschynanthus lobbianus</i> Hook.	1	3	Muito Rara
<i>Agave atrovirens</i> Salm-Dyck	1	3	Muito Rara
<i>Agave celsii</i> Hook var. <i>albicans</i> (Jacobi) Gent.	1	3	Muito Rara
<i>Agave chiapensis</i> Jacobi	1	3	Muito Rara
<i>Agave decipiens</i> Bak.	1	3	Muito Rara
<i>Agave filifera</i> Salm-Dyck	1	3	Muito Rara
<i>Agave schidigera</i> Lem.	1	3	Muito Rara
<i>Aichryson x domesticum</i> Praeger	1	3	Muito Rara
<i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle	1	3	Muito Rara
<i>Albertya magna</i> E. Meyer	1	3	Muito Rara
<i>Albuca humilis</i> Bak.	1	3	Muito Rara
<i>Allium giganteum</i> Reg.	1	3	Muito Rara
<i>Allocastrum verticillata</i> (Lam.) L. A. S. Johnson	1	3	Muito Rara
<i>Alocasia sanderiana</i> Bull.	1	3	Muito Rara
<i>Alocasia wentii</i> Engl. & K. Krause	1	3	Muito Rara
<i>Aloe branddraaiensis</i> Groenewald	1	3	Muito Rara
<i>Aloe broomii</i> Schön.	1	3	Muito Rara
<i>Aloe bulbifera</i> H. Perrier	1	3	Muito Rara
<i>Aloe comosa</i> Marloth & A. Berger	1	3	Muito Rara
<i>Aloe doei</i> Lavranos	1	3	Muito Rara
<i>Aloe juvenna</i> Brandham & S. Carter.	1	3	Muito Rara
<i>Aloe pluridens</i> Haw.	1	3	Muito Rara
<i>Aloe rauhii</i> G. Reynolds	1	3	Muito Rara
<i>Aloe squarrosa</i> Bak.	1	3	Muito Rara
<i>Aloe striatula</i> Haw.	1	3	Muito Rara
<i>Aloe tomentosa</i> Defflers.	1	3	Muito Rara
<i>Aloe trichosantha</i> Berg. ssp. <i>trichosantha</i> A. Berg.	1	3	Muito Rara
<i>Aloe vaombe</i> Decorse & Poiss.	1	3	Muito Rara
<i>Aloe variegata</i> L.	1	3	Muito Rara
<i>Aloinopsis orpenii</i> (N. E. Br.) L. Bol.	1	3	Muito Rara
<i>Alonsoa warszewiczii</i> Reg.	1	3	Muito Rara
<i>Alpinia calcarata</i> (Haw.) Roscoe.	1	3	Muito Rara
<i>Alstroemeria haemantha</i> Ruiz & Pav.	1	3	Muito Rara
<i>Alstroemeria pelegina</i> L.	1	3	Muito Rara
<i>Amaranthus hypocondriacus</i> L.	1	3	Muito Rara
<i>Anagallis arvensis</i> L.	1	3	Muito Rara
<i>Andryala glandulosa</i> Lam. ssp. <i>glandulosa</i>	1	3	Muito Rara
<i>Anemia dregeana</i> Kunze	1	3	Muito Rara

<i>Taxon</i>	<i>Espaços Verdes em que ocorre</i>	<i>Espaços Verdes (%)</i>	<i>Classe</i>
<i>Annona muricata</i> L.	1	3	Muito Rara
<i>Anomatheca laxa</i> (Thunb.) Goldbl.	1	3	Muito Rara
<i>Anthurium bonplandii</i> Bunting.	1	3	Muito Rara
<i>Anthurium pentaphyllum</i> (Aubl.) G. Don.	1	3	Muito Rara
<i>Antidesma buniis</i> (L.) Spreng.	1	3	Muito Rara
<i>Apium graveolens</i> L.	1	3	Muito Rara
<i>Aporocactus flagelliformis</i> (L.) Lem.	1	3	Muito Rara
<i>Araucaria angustifolia</i> (Bertol.) Kuntze.	1	3	Muito Rara
<i>Araucaria araucana</i> (Molina) K. Koch.	1	3	Muito Rara
<i>Arbutus menziesii</i> Pursh.	1	3	Muito Rara
<i>Arbutus x andrachnoides</i> Link.	1	3	Muito Rara
<i>Archontophoenix alexandrae</i> (Muell.) Wendl. & Drude	1	3	Muito Rara
<i>Arctium minus</i> Bernh.	1	3	Muito Rara
<i>Ardisia crenata</i> Sims.	1	3	Muito Rara
<i>Areca catechu</i> L.	1	3	Muito Rara
<i>Argyranthemum pinnatifidum</i> (L. f.) Lowe ssp. <i>succulentum</i> (Lowe) Humphr.	1	3	Muito Rara
<i>Arisarum vulgare</i> Targ-Tozz.	1	3	Muito Rara
<i>Aristea ecklonii</i> Bak.	1	3	Muito Rara
<i>Aristea major</i> Andrews	1	3	Muito Rara
<i>Aristea platycaulis</i> Bak.	1	3	Muito Rara
<i>Aristolochia grandiflora</i> Sw.	1	3	Muito Rara
<i>Armeria maritima</i> (Mill.) Willd.	1	3	Muito Rara
<i>Asparagus officinalis</i> L.	1	3	Muito Rara
<i>Asphodelus albus</i> Mill.	1	3	Muito Rara
<i>Asplenium bulbiferum</i> Forst. f.	1	3	Muito Rara
<i>Asplenium onopteris</i> L.	1	3	Muito Rara
<i>Astelia grandis</i> Hook. f. ex Kirk	1	3	Muito Rara
<i>Aster ericoides</i> L.	1	3	Muito Rara
<i>Astilboides tabularis</i> (Hemsl.) Engl.	1	3	Muito Rara
<i>Athyrium filix-femina</i> (L.) Roth.	1	3	Muito Rara
<i>Aurinia saxatilis</i> (L.) Desv.	1	3	Muito Rara
<i>Averrhoa carambola</i> L.	1	3	Muito Rara
<i>Azorina vidalii</i> (H. Wats.) Feer.	1	3	Muito Rara
<i>Babiana plicata</i> Ker-Gawl.	1	3	Muito Rara
<i>Bambusa multiplex</i> (Lour.) Rausch.	1	3	Muito Rara
<i>Banksia ericifolia</i> L. f.	1	3	Muito Rara
<i>Banksia grandis</i> Willd.	1	3	Muito Rara
<i>Banksia serrata</i> L. Saw.	1	3	Muito Rara
<i>Bassia scoparia</i> (L.) A. J. Scott f. <i>trichophylla</i> (Schmeiss) Schinz & Thell.	1	3	Muito Rara
<i>Bauhinia aculeata</i> L.	1	3	Muito Rara
<i>Bauhinia malabarica</i> Roxb.	1	3	Muito Rara
<i>Bauhinia purpurea</i> L. non hort.	1	3	Muito Rara
<i>Beaumontia grandiflora</i> Wallich.	1	3	Muito Rara
<i>Begonia bowerae</i> Ziesenh.	1	3	Muito Rara
<i>Begonia coccinea</i> Hook.	1	3	Muito Rara
<i>Begonia imperialis</i> Lem.	1	3	Muito Rara
<i>Begonia maculata</i> Raddi	1	3	Muito Rara
<i>Begonia pseudolubbersii</i> Brade.	1	3	Muito Rara
<i>Begonia rex</i> Putzeys	1	3	Muito Rara
<i>Begonia venosa</i> Skan ex Hook. f.	1	3	Muito Rara
<i>Bencomia caudata</i> (Aiton.) Webb & Berthel.	1	3	Muito Rara
<i>Berberis heterophylla</i> Juss.	1	3	Muito Rara
<i>Berberis thunbergii</i> DC	1	3	Muito Rara
<i>Bergeranthus vespertinus</i> (A. Berger) Schwantes	1	3	Muito Rara
<i>Beta procumbens</i> C. Sm. ex Hornem.	1	3	Muito Rara
<i>Bijlia cana</i> N. E. Br.	1	3	Muito Rara
<i>Billbergia amoena</i> (Lodd.) Lindl.	1	3	Muito Rara
<i>Billbergia euphemiae</i> E. Morr. var. <i>purpurea</i> M. B. Fost.	1	3	Muito Rara
<i>Billbergia viridiflora</i> H. Wendl.	1	3	Muito Rara
<i>Billbergia zebrina</i> (Herb.) Lindl.	1	3	Muito Rara
<i>Bischofia javanica</i> Blume.	1	3	Muito Rara
<i>Bismarchia nobilis</i> Hildebr. & H. Wendl.	1	3	Muito Rara
<i>Bixa orellana</i> L.	1	3	Muito Rara
<i>Bletilla striata</i> (Thunb.) Rchb. f.	1	3	Muito Rara
<i>Boehmeria nivea</i> (L.) Gaudich.	1	3	Muito Rara
<i>Bolusanthus speciosus</i> (Bol.) Harms.	1	3	Muito Rara
<i>Bomarea carderi</i> Masters	1	3	Muito Rara
<i>Bougainvillea x buttiana</i> Holtt. & Standl.	1	3	Muito Rara
<i>Bouvardia ternifolia</i> (Cav.) Schldl.	1	3	Muito Rara
<i>Brachychiton gregorii</i> F. Muell.	1	3	Muito Rara
<i>Brassavola cucullata</i> (L.) R. Br.	1	3	Muito Rara
<i>Brassica oleracea</i> L.	1	3	Muito Rara
<i>Bromelia balansae</i> Mez	1	3	Muito Rara

<i>Taxon</i>	Espaços Verdes em que ocorre	Espaços Verdes (%)	Classe
<i>Brosimum alicastrum</i> Swartz	1	3	Muito Rara
<i>Brugmansia x insignis</i> (Barb. Rodr.) Lockw.	1	3	Muito Rara
<i>Brunfelsia americana</i> L.	1	3	Muito Rara
<i>Burchelia bubalina</i> (L.f.) Sims.	1	3	Muito Rara
<i>Butea monosperma</i> (Lamb.) Taub.	1	3	Muito Rara
<i>Caesalpinia echinata</i> Lam.	1	3	Muito Rara
<i>Caesalpinia spinosa</i> (Molina) Kuntze.	1	3	Muito Rara
<i>Calathea argyrea</i> Kôrn	1	3	Muito Rara
<i>Calathea crocata</i> E. Morr. & Joriss.	1	3	Muito Rara
<i>Calathea lancifolia</i> Boom	1	3	Muito Rara
<i>Calathea picturata</i> (Linden) Koch. & Linden	1	3	Muito Rara
<i>Calathea tigrina</i> Hort.	1	3	Muito Rara
<i>Calliandra portoricensis</i> (Jacq.) Benth.	1	3	Muito Rara
<i>Calliandra surinamensis</i> Benth.	1	3	Muito Rara
<i>Callicoma serratifolia</i> Andrews	1	3	Muito Rara
<i>Callisia repens</i> L.	1	3	Muito Rara
<i>Callistemon paludosus</i> F. Muell.	1	3	Muito Rara
<i>Callistemon phoeniceus</i> Lindl.	1	3	Muito Rara
<i>Callitriche palustris</i> L.	1	3	Muito Rara
<i>Callitris rhomboidea</i> R. Br. ex Rich.	1	3	Muito Rara
<i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull.	1	3	Muito Rara
<i>Calocedrus decurrens</i> (Torr.) Florin.	1	3	Muito Rara
<i>Caltha palustris</i> L.	1	3	Muito Rara
<i>Camellia granthamiana</i> Sealy.	1	3	Muito Rara
<i>Camellia saluenensis</i> Stapf ex Bean.	1	3	Muito Rara
<i>Canarina canariensis</i> (L.) Kuntze.	1	3	Muito Rara
<i>Canistrum aurantiacum</i> H. E. Moore	1	3	Muito Rara
<i>Canna iridiflora</i> Ruiz & Pav.	1	3	Muito Rara
<i>Cantua buxifolia</i> Juss. ex Lam.	1	3	Muito Rara
<i>Capparis spinosa</i> L.	1	3	Muito Rara
<i>Caralluma burchardii</i> N.E. Br.	1	3	Muito Rara
<i>Carduus squarrosus</i> (DC.) Lowe	1	3	Muito Rara
<i>Carex fraseri</i> Andreus	1	3	Muito Rara
<i>Carex oshimensis</i> Nak.	1	3	Muito Rara
<i>Carruanthus ringens</i> (L.) Boom.	1	3	Muito Rara
<i>Caryota maxima</i> Bl.	1	3	Muito Rara
<i>Caryota urens</i> L.	1	3	Muito Rara
<i>Casimiroa edulis</i> Llave & Lex.	1	3	Muito Rara
<i>Casimiroa sapota</i> Oerst.	1	3	Muito Rara
<i>Cassia ferruginea</i> (Schräd.) Schräd ex DC.	1	3	Muito Rara
<i>Catalpa bignonioides</i> Walter	1	3	Muito Rara
<i>Cattleya mossiae</i> Hook.	1	3	Muito Rara
<i>Cattleya trianae</i> Linden & Reichb. f.	1	3	Muito Rara
<i>Cattleya wameri</i> T. Moore	1	3	Muito Rara
<i>Ceanothus impressus</i> Trel x <i>C. papillosus</i> Torr. & A. Gray.	1	3	Muito Rara
<i>Cedronella canariensis</i> (L.) W. & B.	1	3	Muito Rara
<i>Celastrus scandens</i> L.	1	3	Muito Rara
<i>Centaurea cineraria</i> L.	1	3	Muito Rara
<i>Centradenia inaequalis</i> G. Don.	1	3	Muito Rara
<i>Cephalocereus column-trajani</i> (Karw. Ex Pfeiff.) Schum.	1	3	Muito Rara
<i>Cephalocereus senilis</i> (Haw.) Schum.	1	3	Muito Rara
<i>Cephalotaxus harringtoniana</i> (Forbes) Koch.	1	3	Muito Rara
<i>Cerastigma plumbaginoides</i> Bunge.	1	3	Muito Rara
<i>Chamaedorea erumpens</i> H. E. Moore.	1	3	Muito Rara
<i>Chamaerops humilis</i> L. var. <i>arborescens</i> (Pers.) Steud.	1	3	Muito Rara
<i>Chrysanthemum segetum</i> L.	1	3	Muito Rara
<i>Cissus antarctica</i> Vent.	1	3	Muito Rara
<i>Cistus monspeliensis</i> L.	1	3	Muito Rara
<i>Cistus salvifolius</i> L.	1	3	Muito Rara
<i>Citrus bergamia</i> Risso & Poit.	1	3	Muito Rara
<i>Citrus nobilis</i> Lour.	1	3	Muito Rara
<i>Citrus x paradisi</i> Macfad.	1	3	Muito Rara
<i>Cleistocactus winteri</i> D. Hunt.	1	3	Muito Rara
<i>Clematis armandii</i> Franch.	1	3	Muito Rara
<i>Clematis florida</i> Thunb.	1	3	Muito Rara
<i>Clematis grandiflora</i> DC.	1	3	Muito Rara
<i>Clematis grevillei</i> DC.	1	3	Muito Rara
<i>Cleome hassleriana</i> Chodat.	1	3	Muito Rara
<i>Clerodendrum philippinum</i> Schauer	1	3	Muito Rara
<i>Clerodendrum speciosissimum</i> Van Geert	1	3	Muito Rara
<i>Clerodendrum x speciosum</i> Dombr.	1	3	Muito Rara
<i>Clianthus puniceus</i> (G. Don) Sol. ex Lindl.	1	3	Muito Rara
<i>Clinopodium ascendens</i> (Jord.) Samp.	1	3	Muito Rara

<i>Taxon</i>	Espaços Verdes em que ocorre	Espaços Verdes (%)	Classe
<i>Cocculus laurifolius</i> DC.	1	3	Muito Rara
<i>Cocos nucifera</i> L.	1	3	Muito Rara
<i>Coelogyne cristata</i> Lindl. var. <i>hololeuca</i> Rchb. f.	1	3	Muito Rara
<i>Coelogyne dayana</i> Reichb. f.	1	3	Muito Rara
<i>Coelogyne mooreana</i> hort. ex Rolfe x <i>C. beccarii</i> Rchb. f.	1	3	Muito Rara
<i>Colletia hystrix</i> Clos.	1	3	Muito Rara
<i>Colletia paradoxa</i> (Spreng) Escal.	1	3	Muito Rara
<i>Combretum microphyllum</i> Klotzsch	1	3	Muito Rara
<i>Combretum paniculatum</i> Vent.	1	3	Muito Rara
<i>Convolvulus canariensis</i> L.	1	3	Muito Rara
<i>Convolvulus floridus</i> L. f.	1	3	Muito Rara
<i>Coprosma x kirkii</i> Chesem.	1	3	Muito Rara
<i>Cordia myxa</i> L. non Forssk.	1	3	Muito Rara
<i>Cornus capitata</i> Wallich.	1	3	Muito Rara
<i>Cornus florida</i> L.	1	3	Muito Rara
<i>Cornus kousa</i> (Buerger ex Miq.) Hance	1	3	Muito Rara
<i>Cornus nuttallii</i> Aud.	1	3	Muito Rara
<i>Cornus sanguinea</i> L.	1	3	Muito Rara
<i>Corylus avellana</i> L.	1	3	Muito Rara
<i>Costus barbatus</i> Mass	1	3	Muito Rara
<i>Cotoneaster dammeri</i> Schneid.	1	3	Muito Rara
<i>Cotoneaster franchetii</i> Bois.	1	3	Muito Rara
<i>Cotoneaster lacteus</i> W. W. Sm.	1	3	Muito Rara
<i>Crassula arborescens</i> (Mill.) Willd.	1	3	Muito Rara
<i>Crassula brevifolia</i> Harv.	1	3	Muito Rara
<i>Crassula deltoidea</i> Thunb.	1	3	Muito Rara
<i>Crassula elegans</i> Schönl. & Bak.	1	3	Muito Rara
<i>Crassula muscosa</i> L.	1	3	Muito Rara
<i>Crassula sarmentosa</i> Harv.	1	3	Muito Rara
<i>Crithmum maritimum</i> L.	1	3	Muito Rara
<i>Cupressus sempervirens</i> L. f. <i>horizontalis</i> (Mill.) Voss.	1	3	Muito Rara
<i>Curcuma longa</i> L.	1	3	Muito Rara
<i>Curcuma petiolata</i> Roxb.	1	3	Muito Rara
<i>Cyanotis somaliensis</i> C. B. Clarke.	1	3	Muito Rara
<i>Cyathea dealbata</i> (Forst. f.) Sw.	1	3	Muito Rara
<i>Cyathea leichhardtiana</i> (F. Muell.)	1	3	Muito Rara
<i>Cycas thouarsii</i> R. Br. ex Gaudich	1	3	Muito Rara
<i>Cyclamen persicum</i> Mill.	1	3	Muito Rara
<i>Cylindrophylloides comptonii</i> L. Bol.	1	3	Muito Rara
<i>Cynara scolymus</i> L.	1	3	Muito Rara
<i>Cyphostema juttae</i> (Dienter & Gilg) Descoings.	1	3	Muito Rara
<i>Cyrtanthus elatus</i> (Jacq.) Traub.	1	3	Muito Rara
<i>Cyrtanthus obliquus</i> (L. f.) Ait.	1	3	Muito Rara
<i>Cytisus striatus</i> (Hill) Rothm.	1	3	Muito Rara
<i>Daboecia cantabrica</i> (Huds.) K. Koch.	1	3	Muito Rara
<i>Darmera peltata</i> Voss.	1	3	Muito Rara
<i>Dasylium longissimum</i> Lem.	1	3	Muito Rara
<i>Datura metel</i> L.	1	3	Muito Rara
<i>Davallia fejeensis</i> Hook.	1	3	Muito Rara
<i>Davallia mariesii</i> Moore ex Bak.	1	3	Muito Rara
<i>Davidia involucreata</i> Bail.	1	3	Muito Rara
<i>Delphinium x belladonna</i> hort. ex Bergmans	1	3	Muito Rara
<i>Dendrobium fimbriatum</i> Hook.	1	3	Muito Rara
<i>Desmodium elegans</i> DC.	1	3	Muito Rara
<i>Deutzia gracilis</i> Sieb. & Zucc.	1	3	Muito Rara
<i>Deutzia scabra</i> Thunb.	1	3	Muito Rara
<i>Dianthus chinensis</i> L.	1	3	Muito Rara
<i>Dichroa febrifuga</i> Lour.	1	3	Muito Rara
<i>Dierama pulcherrimum</i> (Hook. f.) Bak.	1	3	Muito Rara
<i>Dietes robinsoniana</i> (F. Muell.) Klatt.	1	3	Muito Rara
<i>Digitalis purpurea</i> L.	1	3	Muito Rara
<i>Dioscorea elephantipes</i> (L' Hérít) Engl.	1	3	Muito Rara
<i>Diosma ericoides</i> L.	1	3	Muito Rara
<i>Diospyros virginiana</i> L.	1	3	Muito Rara
<i>Diplazium assimile</i> (Endl.) Bedd	1	3	Muito Rara
<i>Dombeya rotundifolia</i> (Hochst.) Planch.	1	3	Muito Rara
<i>Doodia caudata</i> (Cav.) R. Br.	1	3	Muito Rara
<i>Doryanthes excelsa</i> Corr.	1	3	Muito Rara
<i>Drimys winteri</i> Forst & Forst. f.	1	3	Muito Rara
<i>Drosanthemum barwickii</i> L. Bolus	1	3	Muito Rara
<i>Dryopteris affinis</i> (Lowe) Fraser-Jenk.	1	3	Muito Rara
<i>Dyckia brevifolia</i> Bak.	1	3	Muito Rara
<i>Dyckia minarum</i> Mez.	1	3	Muito Rara

<i>Taxon</i>	Espaços Verdes em que ocorre	Espaços Verdes (%)	Classe
<i>Echeveria agavoides</i> Lem.	1	3	Muito Rara
<i>Echeveria albicans</i> Walth.	1	3	Muito Rara
<i>Echeveria pilosa</i> Purpus.	1	3	Muito Rara
<i>Echeveria sanchez-mejoradae</i> Walth.	1	3	Muito Rara
<i>Echeveria secunda</i> W. B. Booth. var. <i>glauca</i> (Bak.) Otto.	1	3	Muito Rara
<i>Echinopsis backebergii</i> Werderm ex Backeb.	1	3	Muito Rara
<i>Echinopsis macrogona</i> (Salm-Dyck) Friedrich & Rowley	1	3	Muito Rara
<i>Echinopsis spachiana</i> (Lem.) Friedrich & G. Rowley	1	3	Muito Rara
<i>Echium simplex</i> DC.	1	3	Muito Rara
<i>Elaeagnus angustifolia</i> L.	1	3	Muito Rara
<i>Encephalartos altensteinii</i> Lehm x <i>E. arenarius</i> R. A. Dyer.	1	3	Muito Rara
<i>Encephalartos altensteinii</i> Lehm x <i>E. latifrons</i> Lehm.	1	3	Muito Rara
<i>Encephalartos altensteinii</i> Lehm x <i>E. lehmannii</i> Lehm.	1	3	Muito Rara
<i>Encephalartos altensteinii</i> Lehm x <i>E. longifolius</i> (Jacq.) Lehm.	1	3	Muito Rara
<i>Encephalartos altensteinii</i> Lehm. x <i>E. trispinosus</i> (Hook) R. A. Dyer	1	3	Muito Rara
<i>Encephalartos altensteinii</i> Lehm. x <i>E. villosus</i> Lem.	1	3	Muito Rara
<i>Encephalartos altensteinii</i> Lehm. x <i>E. princeps</i> R. A. Dyer.	1	3	Muito Rara
<i>Encephalartos arenarius</i> R. A. Dyer.	1	3	Muito Rara
<i>Encephalartos arenarius</i> R. A. Dyer. x <i>E. horridus</i> (Jacq.) Lehm.	1	3	Muito Rara
<i>Encephalartos arenarius</i> R. A. Dyer. x <i>E. trispinosus</i> (Hook) R. A. Dyer	1	3	Muito Rara
<i>Encephalartos arenarius</i> R. A. Dyer. X <i>E. lehmannii</i> Lehm.	1	3	Muito Rara
<i>Encephalartos caffer</i> (Thunb.) Lehm.	1	3	Muito Rara
<i>Encephalartos chimanimaniensis</i> R. A. Dyer & Verd.	1	3	Muito Rara
<i>Encephalartos cupidus</i> R. A. Dyer	1	3	Muito Rara
<i>Encephalartos cycadifolius</i> (Jacq.) Lehm.	1	3	Muito Rara
<i>Encephalartos dolomiticus</i> Lavranos & Goode	1	3	Muito Rara
<i>Encephalartos dyerianus</i> Lavranos & Goode	1	3	Muito Rara
<i>Encephalartos eugene-maraisii</i> I. Verd.	1	3	Muito Rara
<i>Encephalartos ferox</i> G. Bertol.	1	3	Muito Rara
<i>Encephalartos ferox</i> G. Bertol. x <i>E. natalensis</i> R. A. Dyer & Verd.	1	3	Muito Rara
<i>Encephalartos friderici-guilielmii</i> Lhem.	1	3	Muito Rara
<i>Encephalartos ghellinckii</i> Lem.	1	3	Muito Rara
<i>Encephalartos heenanii</i> R. A. Dyer	1	3	Muito Rara
<i>Encephalartos horridus</i> (Jacq.) Lehm.	1	3	Muito Rara
<i>Encephalartos horridus</i> (Jacq.) Lehm. X <i>E. longifolius</i> (Jacq.) Lehm.	1	3	Muito Rara
<i>Encephalartos inopinus</i> R. A. Dyer	1	3	Muito Rara
<i>Encephalartos laevifolius</i> Stapf & Burtt-Davy	1	3	Muito Rara
<i>Encephalartos lanatus</i> Stapf & Burtt-Davy	1	3	Muito Rara
<i>Encephalartos latifrons</i> Lehm.	1	3	Muito Rara
<i>Encephalartos latifrons</i> Lehm. x <i>E. longifolius</i> (Jacq.) Lehm.	1	3	Muito Rara
<i>Encephalartos latifrons</i> Lehm. x <i>E. trispinosus</i> (Hook) R. A. Dyer	1	3	Muito Rara
<i>Encephalartos lebomboensis</i> I. Verd.	1	3	Muito Rara
<i>Encephalartos lehmannii</i> Lehm. X <i>E. longifolius</i> (Jacq.) Lehm.	1	3	Muito Rara
<i>Encephalartos lehmannii</i> Lehm. x <i>E. trispinosus</i> (Hook) R. A. Dyer	1	3	Muito Rara
<i>Encephalartos longifolius</i> (Jacq.) Lehm.	1	3	Muito Rara
<i>Encephalartos longifolius</i> (Jacq.) Lehm. x <i>E. trispinosus</i> (Hook) R. A. Dyer	1	3	Muito Rara
<i>Encephalartos manikensis</i> (Gilliland) Gilliland	1	3	Muito Rara
<i>Encephalartos middelburgensis</i> Robertse, Vorster & Van der Westhuizen	1	3	Muito Rara
<i>Encephalartos munchii</i> R. A. Dyer & I. Verd.	1	3	Muito Rara
<i>Encephalartos natalensis</i> R. A. Dyer & Verd.	1	3	Muito Rara
<i>Encephalartos ngoyanus</i> I. Verd.	1	3	Muito Rara
<i>Encephalartos paucidentatus</i> Stapf & Burtt Davy	1	3	Muito Rara
<i>Encephalartos princeps</i> R. A. Dyer	1	3	Muito Rara
<i>Encephalartos senticosus</i> Vorster	1	3	Muito Rara
<i>Encephalartos trispinosus</i> (Hook) R. A. Dyer	1	3	Muito Rara
<i>Encephalartos umbeluziensis</i> R. A. Dyer	1	3	Muito Rara
<i>Encephalartos woodii</i> Sander x <i>E. natalensis</i> R. A. Dyer & Verd.	1	3	Muito Rara
<i>Ephedra fragilis</i> Desf.	1	3	Muito Rara
<i>Epidendrum falcatum</i> Lindley	1	3	Muito Rara
<i>Epilobium obscurum</i> Schreber	1	3	Muito Rara
<i>Epiphyllum crenatum</i> (Lindl.) G. Don ex Loud.	1	3	Muito Rara
<i>Epiphyllum laui</i> M. Kimmach	1	3	Muito Rara
<i>Erica australis</i> L.	1	3	Muito Rara
<i>Erica cinerea</i> L.	1	3	Muito Rara
<i>Erica erigena</i> R. Ross.	1	3	Muito Rara
<i>Erica lusitanica</i> Rudolphi.	1	3	Muito Rara
<i>Erica tetralix</i> L.	1	3	Muito Rara
<i>Erica vagans</i> L.	1	3	Muito Rara
<i>Erica x darleyensis</i> Bean.	1	3	Muito Rara
<i>Erythrina americana</i> Mill.	1	3	Muito Rara
<i>Erythrina atitlanensis</i> Krukoff & Barneby	1	3	Muito Rara
<i>Erythrina falcata</i> Lour.	1	3	Muito Rara
<i>Erythrina livingstoniana</i> Bak.	1	3	Muito Rara

<i>Taxon</i>	Espaços Verdes em que ocorre	Espaços Verdes (%)	Classe
<i>Eucalyptus calophylla</i> R. Br. ex Lindl.	1	3	Muito Rara
<i>Eucalyptus camaldulensis</i> Dehnh.	1	3	Muito Rara
<i>Eucalyptus creba</i> F. J. Muell.	1	3	Muito Rara
<i>Eucalyptus kruseana</i> F. Mueller	1	3	Muito Rara
<i>Eucalyptus orbifolia</i> F. Muell.	1	3	Muito Rara
<i>Eucalyptus pruinosa</i> Schaner	1	3	Muito Rara
<i>Eucalyptus pyriformis</i> Turcz.	1	3	Muito Rara
<i>Eugenia brasiliensis</i> Lam.	1	3	Muito Rara
<i>Euonymus fortunei</i> (Turcz.) Hand. -Mazz	1	3	Muito Rara
<i>Euphorbia echinus</i> Hook. f. & Coss.	1	3	Muito Rara
<i>Euphorbia grandidens</i> Haw.	1	3	Muito Rara
<i>Euphorbia lathyris</i> L.	1	3	Muito Rara
<i>Euphorbia marginata</i> Pursh.	1	3	Muito Rara
<i>Evolvulus pilosus</i> Nutt.	1	3	Muito Rara
<i>Exochorda giraldii</i> Hesse.	1	3	Muito Rara
<i>Fabiana imbricata</i> Ruiz & Pav.	1	3	Muito Rara
<i>Fascicularia pitcairniifolia</i> (hort. Berlin ex Verl.) Mez.	1	3	Muito Rara
<i>Faucaria albidens</i> N.E. Br.	1	3	Muito Rara
<i>Faucaria felina</i> (Weston) Schwantes ex Jacobsen	1	3	Muito Rara
<i>Faucaria tigrina</i> (Haw.) Schwantes	1	3	Muito Rara
<i>Faucaria tuberculosa</i> (Rolfe) Schwantes	1	3	Muito Rara
<i>Felicia fruticosa</i> (L.) Nichols.	1	3	Muito Rara
<i>Felicia heterophylla</i> (Cass.) Grau.	1	3	Muito Rara
<i>Fernandoa magnifica</i> Seem.	1	3	Muito Rara
<i>Ferocactus chrysacanthus</i> (Orcutt) Britt. & Rose	1	3	Muito Rara
<i>Ferocactus gracilis</i> ssp. <i>coloratus</i> (Gates) N. P. Taylor	1	3	Muito Rara
<i>Ferocactus latispinus</i> (Haw.) Britt. & Rose	1	3	Muito Rara
<i>Ferraria crispa</i> Burm.	1	3	Muito Rara
<i>Festuca donax</i> Lowe	1	3	Muito Rara
<i>Ficus deltoidea</i> Jack	1	3	Muito Rara
<i>Ficus natalensis</i> Hochst. ssp. <i>leprieurii</i> (Miq.) C. Berg.	1	3	Muito Rara
<i>Fraxinus americana</i> L.	1	3	Muito Rara
<i>Fraxinus angustifolia</i> Vahl. ssp. <i>syriaca</i> (Boiss.) Yaltirik.	1	3	Muito Rara
<i>Freylinia lanceolata</i> (L. f.) G. Don.	1	3	Muito Rara
<i>Gasteria bicolor</i> Haw	1	3	Muito Rara
<i>Gasteria carinata</i> (Mill.) Duval var. <i>verrucosa</i> (Mill.) Van Jarrnsv.	1	3	Muito Rara
<i>Gaura lindheimeri</i> Engelm. & Gray.	1	3	Muito Rara
<i>Gennaria diphylla</i> (Link) Parl.	1	3	Muito Rara
<i>Gibbaeum velutinum</i> (L. Bol.) Schwantes	1	3	Muito Rara
<i>Gladiolus cardinalis</i> Curtis	1	3	Muito Rara
<i>Gladiolus carneus</i> Delaroche	1	3	Muito Rara
<i>Gladiolus communis</i> L. ssp. <i>byzantinus</i> (Mill.) A. Hamilt.	1	3	Muito Rara
<i>Gladiolus tristis</i> L.	1	3	Muito Rara
<i>Glottiphyllum fragrans</i> (Salm-Dyck) Schwantes	1	3	Muito Rara
<i>Grevillea asplenifolia</i> Knight	1	3	Muito Rara
<i>Grevillea banksii</i> R. Br. x <i>Grevillea bipinnatifida</i> R. Br.	1	3	Muito Rara
<i>Grevillea curviloba</i> McGillivray	1	3	Muito Rara
<i>Grevillea juniperina</i> R. Br.	1	3	Muito Rara
<i>Grevillea lanigera</i> A. M. Cunn. ex R. Br.	1	3	Muito Rara
<i>Grevillea x semperflorens</i> F. E. Briggs ex Mullig	1	3	Muito Rara
<i>Greyia sutherlandii</i> Hook. & Harv.	1	3	Muito Rara
<i>Guzmania lingulata</i> (L.) Mez var. <i>minor</i> (Mez) L. B. Sm.	1	3	Muito Rara
<i>Guzmania scherzeriana</i> Mez	1	3	Muito Rara
<i>Gymnocalycium mihanovichii</i> (Fric & Gürke) Britt. & Rose	1	3	Muito Rara
<i>Gypsophila repens</i> L.	1	3	Muito Rara
<i>Haageocereus decumbens</i> (Vaup.) Backeb.	1	3	Muito Rara
<i>Habranthus robustus</i> Herb. ex Sweet.	1	3	Muito Rara
<i>Haemanthus coccineus</i> L.	1	3	Muito Rara
<i>Hakea victoria</i> J. Drumm.	1	3	Muito Rara
<i>Haloragis erecta</i> (Banks ex Murr.) Oken	1	3	Muito Rara
<i>Hardenbergia comptoniana</i> Benth.	1	3	Muito Rara
<i>Haworthia attenuata</i> Haw.	1	3	Muito Rara
<i>Haworthia cymbiformis</i> (Haw.) Duval.	1	3	Muito Rara
<i>Hebe x andersonii</i> (Lindl. & Paxt.) Ckn.	1	3	Muito Rara
<i>Hechtia dichroantha</i> Donnel Smith	1	3	Muito Rara
<i>Hedychium chrysoleucum</i> Hook.	1	3	Muito Rara
<i>Hedychium coronarium</i> Koenig	1	3	Muito Rara
<i>Helichrysum bellidioides</i> (Forst. f.) Willd.	1	3	Muito Rara
<i>Helichrysum petiolare</i> Hilliard & B. L. Burt.	1	3	Muito Rara
<i>Heliconia champneiana</i> Griggs	1	3	Muito Rara
<i>Heliconia foreroi</i> Abelo & Morales	1	3	Muito Rara
<i>Heliconia rostrata</i> Ruiz & Pav.	1	3	Muito Rara
<i>Heliconia schiedeana</i> Klotzsch.	1	3	Muito Rara

<i>Taxon</i>	Espaços Verdes em que ocorre	Espaços Verdes (%)	Classe
<i>Heliconia stricta</i> Huber.	1	3	Muito Rara
<i>Helleborus x sternii</i> Turrill.	1	3	Muito Rara
<i>Hibanobambusa tranquillans</i> (Koidz.) Maruyama & H. Okamura	1	3	Muito Rara
<i>Hibiscus amottianus</i> A. Gray.	1	3	Muito Rara
<i>Hibiscus calyphyllus</i> Cav.	1	3	Muito Rara
<i>Hohenbergia stellata</i> Schultes f.	1	3	Muito Rara
<i>Hoheria populnea</i> A. Cunn.	1	3	Muito Rara
<i>Holboellia latifolia</i> Wallich.	1	3	Muito Rara
<i>Holmskioldia tettensis</i> Vatke	1	3	Muito Rara
<i>Hovenia dulcis</i> Thynb.	1	3	Muito Rara
<i>Hoya camosa</i> (L. f.) R. Br.	1	3	Muito Rara
<i>Huernia confusa</i> E. Phillips	1	3	Muito Rara
<i>Hyacinthoides hispanica</i> (Mill.) Roth.	1	3	Muito Rara
<i>Hyacinthoides non-scripta</i> (L.) Rothm.	1	3	Muito Rara
<i>Hydrangea arborescens</i> L.	1	3	Muito Rara
<i>Hydrangea paniculata</i> Sieb.	1	3	Muito Rara
<i>Hylotelephium spectabile</i> (Boreau) H. Ohba	1	3	Muito Rara
<i>Hymenocallis harrisiana</i> Herb.	1	3	Muito Rara
<i>Hymenocallis narcissiflora</i> (Jacq.) Macbr.	1	3	Muito Rara
<i>Hymenocallis speciosa</i> (Salisb.) Salisb.	1	3	Muito Rara
<i>Hyophorbe verschafteltii</i> (L. H. Bailey) H. Wendl.	1	3	Muito Rara
<i>Hypericum canariense</i> L.	1	3	Muito Rara
<i>Hypericum grandifolium</i> Choisy	1	3	Muito Rara
<i>Hypericum lancasteri</i> N. Robson	1	3	Muito Rara
<i>Hypoestes aristata</i> R. Br.	1	3	Muito Rara
<i>Iberis amara</i> L.	1	3	Muito Rara
<i>Iberis sempervirens</i> L.	1	3	Muito Rara
<i>Iberis umbellata</i> L.	1	3	Muito Rara
<i>Illicium anisatum</i> L.	1	3	Muito Rara
<i>Ipomoea coccinea</i> Scheidw.	1	3	Muito Rara
<i>Ipomoea arborescens</i> (Humb. & Bonpl.) Don	1	3	Muito Rara
<i>Ipomoea lobata</i> (Cerv.) Thell.	1	3	Muito Rara
<i>Iresine lindenii</i> Van Houtte	1	3	Muito Rara
<i>Iris ensata</i> Thunb.	1	3	Muito Rara
<i>Iris foetidissima</i> L.	1	3	Muito Rara
<i>Iris laevigata</i> Fisch	1	3	Muito Rara
<i>Iris lutescens</i> Lam.	1	3	Muito Rara
<i>Iris orientalis</i> Mill.	1	3	Muito Rara
<i>Isactis tinctoria</i> L.	1	3	Muito Rara
<i>Ixia paniculata</i> Delaroché	1	3	Muito Rara
<i>Jasminum humile</i> L.	1	3	Muito Rara
<i>Jasminum officinale</i> L. var. <i>grandiflorum</i> (L.) Kob.	1	3	Muito Rara
<i>Jatropha integerrima</i> Jacq.	1	3	Muito Rara
<i>Joannesia princeps</i> Vell	1	3	Muito Rara
<i>Jubaea spectabilis</i> H.B.K.	1	3	Muito Rara
<i>Juglans regia</i> L.	1	3	Muito Rara
<i>Juniperus excelsa</i> Bieb.	1	3	Muito Rara
<i>Juniperus horizontalis</i> Moench.	1	3	Muito Rara
<i>Juniperus phoenicea</i> L.	1	3	Muito Rara
<i>Kalanchoe ambolensis</i> Humbert	1	3	Muito Rara
<i>Kalanchoe flammea</i> Stapf.	1	3	Muito Rara
<i>Kalanchoe hildbrandtii</i> Baill	1	3	Muito Rara
<i>Kalanchoe mamieriana</i> H. Jacobsen	1	3	Muito Rara
<i>Kalanchoe millottii</i> Harmet & Perrier	1	3	Muito Rara
<i>Kalanchoe orygalis</i> Bak.	1	3	Muito Rara
<i>Kalanchoe tomentosa</i> Bak.	1	3	Muito Rara
<i>Kalmia angustifolia</i> L.	1	3	Muito Rara
<i>Kennedia macrophylla</i> (Meissn.) Benth.	1	3	Muito Rara
<i>Kleinia amaniensis</i> (Engl.) A. Berger	1	3	Muito Rara
<i>Kleinia grantii</i> (Oliv. & Hiern.) Hook.	1	3	Muito Rara
<i>Kleinia petraea</i> (R. E. Fries)	1	3	Muito Rara
<i>Koeleruteria paniculata</i> Laxm.	1	3	Muito Rara
<i>Kunzea ericoides</i> (A. Rich) J. Thomson	1	3	Muito Rara
<i>Lampranthus deltoides</i> (L.) Glen.	1	3	Muito Rara
<i>Lathyrus odoratus</i> L.	1	3	Muito Rara
<i>Laurus nobilis</i> L.	1	3	Muito Rara
<i>Lavandula lanata</i> Boiss.	1	3	Muito Rara
<i>Lavatera trimestris</i> L.	1	3	Muito Rara
<i>Leucadendron conicum</i> (Lam.) I. Williams	1	3	Muito Rara
<i>Leucadendron eucalyptifolium</i> H. Buek ex Meisn.	1	3	Muito Rara
<i>Leucadendron laureolum</i> (Lam.) Fourc.	1	3	Muito Rara
<i>Leucadendron salicifolium</i> (Salisb.) I. Williams	1	3	Muito Rara
<i>Leucadendron xanthoconus</i> (Kuntze) Schum.	1	3	Muito Rara

<i>Taxon</i>	Espaços Verdes em que ocorre	Espaços Verdes (%)	Classe
<i>Leucospermum conocarpodendron</i> L. ssp. <i>viridum</i> Rourke	1	3	Muito Rara
<i>Leucospermum cordifolium</i> (Salisb. ex Knight) Fourc.	1	3	Muito Rara
<i>Leucospermum glabrum</i> E. Phillips.	1	3	Muito Rara
<i>Leucospermum patersonii</i> E. Phillips	1	3	Muito Rara
<i>Leucospermum praemorsum</i> (Meisn.) E. Phillips.	1	3	Muito Rara
<i>Leucospermum reflexum</i> H. Buek ex Meisn. var. <i>luteum</i> Rourke	1	3	Muito Rara
<i>Leucospermum royenifolium</i> (Salisb. ex Knight) Stapf	1	3	Muito Rara
<i>Leycesteria formosa</i> Wallich	1	3	Muito Rara
<i>Lilium lancifolium</i> Thunb.	1	3	Muito Rara
<i>Lonicera caprifolium</i> L.	1	3	Muito Rara
<i>Loropetalum chinense</i> (R. Br.) Oliv.	1	3	Muito Rara
<i>Lotus corniculatus</i> L. ssp. <i>hirsutus</i> (W.D.J. Koch) Rothm.	1	3	Muito Rara
<i>Lotus glaucus</i> Aiton	1	3	Muito Rara
<i>Lotus uliginosus</i> Schkuhr	1	3	Muito Rara
<i>Luehea grandiflora</i> Mart.	1	3	Muito Rara
<i>Lundia cordata</i> (Vell.) A. DC.	1	3	Muito Rara
<i>Lupinus luteus</i> L.	1	3	Muito Rara
<i>Luzula maxima</i> (Rich.) DC.	1	3	Muito Rara
<i>Luzula seubertii</i> Lowe	1	3	Muito Rara
<i>Lycopersicon esculentum</i> Mill.	1	3	Muito Rara
<i>Mackaya bella</i> Harv.	1	3	Muito Rara
<i>Maclura pomifera</i> (Raf.) C. K. Schneid.	1	3	Muito Rara
<i>Macrozamia communis</i> L. Jonhson	1	3	Muito Rara
<i>Macrozamia moorei</i> F. Muell.	1	3	Muito Rara
<i>Magnolia coco</i> (Lour.) DC.	1	3	Muito Rara
<i>Magnolia denudata</i> Desr.	1	3	Muito Rara
<i>Magnolia liliflora</i> Desr.	1	3	Muito Rara
<i>Magnolia macrophylla</i> Michx.	1	3	Muito Rara
<i>Magnolia x thompsoniana</i> (Loud.) Vos.	1	3	Muito Rara
<i>Mahonia aquifolium</i> (Pursh) Nutt.	1	3	Muito Rara
<i>Mahonia bealei</i> (Fort.) Carr.	1	3	Muito Rara
<i>Mahonia lomariifolia</i> Takeda	1	3	Muito Rara
<i>Malcomia maritima</i> (L.) R. Br.	1	3	Muito Rara
<i>Malpighia glabra</i> L.	1	3	Muito Rara
<i>Malus sylvestris</i> (L.) Mill.	1	3	Muito Rara
<i>Malvaviscus arboreus</i> Cav. var. <i>mexicanus</i> Schdl.	1	3	Muito Rara
<i>Malvaviscus penduliflorus</i> DC.	1	3	Muito Rara
<i>Mammillaria fittkaui</i> Glass & Foster	1	3	Muito Rara
<i>Mandevilla laxa</i> (Ruiz & Pav.) Woodson	1	3	Muito Rara
<i>Mandevilla x amoena</i> hort.	1	3	Muito Rara
<i>Manihot esculenta</i> Crantz.	1	3	Muito Rara
<i>Maranta arundinacea</i> L.	1	3	Muito Rara
<i>Maranta leuconeura</i> E. Morr. var. <i>kerchoviana</i> E. Morr.	1	3	Muito Rara
<i>Medinilla myriantha</i> Merr.	1	3	Muito Rara
<i>Melaleuca argentea</i> W. Fitzg.	1	3	Muito Rara
<i>Melaleuca bracteata</i> F. Meull.	1	3	Muito Rara
<i>Melaleuca diosmifolia</i> Andrews	1	3	Muito Rara
<i>Melaleuca ericifolia</i> Sm.	1	3	Muito Rara
<i>Melaleuca leucadendra</i> (L.) L.	1	3	Muito Rara
<i>Melaleuca quinquenervia</i> (Cav.) S.T. Blake	1	3	Muito Rara
<i>Melaleuca viridiflora</i> Sol. ex. Gaertn.	1	3	Muito Rara
<i>Melocactus matanzanus</i> Léon	1	3	Muito Rara
<i>Mentha aquatica</i> L.	1	3	Muito Rara
<i>Mentha x piperita</i> L.	1	3	Muito Rara
<i>Metasequoia glyptostroboides</i> Hu & Cheng	1	3	Muito Rara
<i>Michelia doltsopa</i> Buch. – Ham. ex DC	1	3	Muito Rara
<i>Microlepidia platyphylla</i> (D. Don) J. Sm.	1	3	Muito Rara
<i>Miscanthus sinensis</i> Anderss. var. <i>condensatus</i>	1	3	Muito Rara
<i>Morus alba</i> L.	1	3	Muito Rara
<i>Murraya paniculata</i> (L.) Jack.	1	3	Muito Rara
<i>Musa textilis</i> Née	1	3	Muito Rara
<i>Myosotis alpestris</i> F. W. Schmidt	1	3	Muito Rara
<i>Myrciaria cauliflora</i> (DC.) O. Berg.	1	3	Muito Rara
<i>Myriocarpa longipes</i> Liebm.	1	3	Muito Rara
<i>Narcissus bulbocodium</i> L.	1	3	Muito Rara
<i>Neobuxbaumia euphorbioides</i> (Haw.) F. Buxb.	1	3	Muito Rara
<i>Neoregelia compacta</i> (Mez) L. B. Smith	1	3	Muito Rara
<i>Nepenthes maxima</i> Reinw. ex Nees	1	3	Muito Rara
<i>Nerine angustifolia</i> Baker	1	3	Muito Rara
<i>Nerine bowdenii</i> Will. Wats.	1	3	Muito Rara
<i>Nerine undulata</i> Herb.	1	3	Muito Rara
<i>Nidularium procerum</i> Lindm.	1	3	Muito Rara
<i>Nolina longifolia</i> (Schult.) Hemsl.	1	3	Muito Rara

<i>Taxon</i>	Espaços Verdes em que ocorre	Espaços Verdes (%)	Classe
<i>Nolina stricta</i> (Lem.) Cif. & Giac.	1	3	Muito Rara
<i>Notholaena marantae</i> (L.) Desv. ssp. <i>subcordata</i> (Cav.) G. Kunkel	1	3	Muito Rara
<i>Nymphoides peltata</i> (S. G. Gmel.) Kuntze	1	3	Muito Rara
<i>Oenanthe divaricata</i> (R. Br.) Mabb.	1	3	Muito Rara
<i>Oncidium lanceanum</i> Lindley	1	3	Muito Rara
<i>Oncidium phalaenopsis</i> Linden & Reichb. f.	1	3	Muito Rara
<i>Oncoba spinosa</i> Forssk.	1	3	Muito Rara
<i>Opuntia macrocentra</i> Engelm.	1	3	Muito Rara
<i>Opuntia subulata</i> (Muehlenph.) Engelm.	1	3	Muito Rara
<i>Opuntia tunicata</i> (Lehm.) Link & Otto.	1	3	Muito Rara
<i>Oreopteris limbosperma</i> (All.) Holub	1	3	Muito Rara
<i>Ornithogalum narbonense</i> L.	1	3	Muito Rara
<i>Orontium aquaticum</i> L.	1	3	Muito Rara
<i>Osmanthus heterophyllus</i> (G. Don) P. Green	1	3	Muito Rara
<i>Osmunda regalis</i> L.	1	3	Muito Rara
<i>Othonna capensis</i> L. H. Bail.	1	3	Muito Rara
<i>Oxalis bowiei</i> Lindl.	1	3	Muito Rara
<i>Oxalis lobata</i> Sims.	1	3	Muito Rara
<i>Pachycereus marginatus</i> (DC.) Britt. & Hunt.	1	3	Muito Rara
<i>Pachycereus pringlei</i> (S. Wats.)	1	3	Muito Rara
<i>Pachycereus schottii</i> (Engelm.) D. Hunt.	1	3	Muito Rara
<i>Pachystachys coccinea</i> (Aubl.) Nees.	1	3	Muito Rara
<i>Passiflora amethystina</i> Mikan.	1	3	Muito Rara
<i>Passiflora caerulea</i> L.	1	3	Muito Rara
<i>Passiflora coccinea</i> Aubl.	1	3	Muito Rara
<i>Passiflora sanguinolenta</i> Mast. & Linden	1		Muito Rara
<i>Passiflora subpeltata</i> Ortega	1	3	Muito Rara
<i>Passiflora x alata-caerulea</i> (<i>P. alata</i> x <i>P. caerulea</i>)	1	3	Muito Rara
<i>Passiflora x caerulea-racemosa</i> (<i>P. caerulea</i> x <i>P. racemosa</i>)	1	3	Muito Rara
<i>Paulownia tomentosa</i> (Thunb.) Steud.	1	3	Muito Rara
<i>Pelargonium citronellum</i> J. J. A. van der Walt	1	3	Muito Rara
<i>Pelargonium cucullatum</i> (L.) L'Hérit. ssp. <i>tabulare</i> Volschenk	1	3	Muito Rara
<i>Pelargonium odoratissimum</i> (L.) L'Hérit	1	3	Muito Rara
<i>Pelargonium vitifolium</i> (L.) L'Hérit.	1	3	Muito Rara
<i>Pellaea rotundifolia</i> (Forst.f.) Hook.	1	3	Muito Rara
<i>Pennisetum clandestinum</i> Hochst. ex Chiov.	1	3	Muito Rara
<i>Pennisetum villosum</i> R. Br. ex Fresen.	1	3	Muito Rara
<i>Peperomia argyreia</i> Morr.	1	3	Muito Rara
<i>Phaedranassa camilioli</i> Bak.	1	3	Muito Rara
<i>Phalaenopsis stuartiana</i> Reichb. f.	1	3	Muito Rara
<i>Phalaris arundinacea</i> L.	1	3	Muito Rara
<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	1	3	Muito Rara
<i>Philodendron callosum</i> K. Krause	1	3	Muito Rara
<i>Philodendron fendleri</i> K. Krause	1	3	Muito Rara
<i>Philodendron imbe</i> Schott	1	3	Muito Rara
<i>Philodendron lacerum</i> (Jacq.) Schott.	1	3	Muito Rara
<i>Philodendron mayoi</i> E. G. Gonç.	1	3	Muito Rara
<i>Philodendron quinquelobum</i> K. Krause	1	3	Muito Rara
<i>Philodendron scandens</i> K. Koch & Sello ssp. <i>oxycardium</i> (Schott) Bunting	1	3	Muito Rara
<i>Phlox drummondii</i> Hook	1	3	Muito Rara
<i>Phormium colensoi</i> Hook. f.	1	3	Muito Rara
<i>Photinia serratifolia</i> (Desf.) Kalkman	1	3	Muito Rara
<i>Phragmipedium shlimii</i> (Lind. & Rchb. f.) Rolfe.	1	3	Muito Rara
<i>Phyllocladus trichomanoides</i> D. Don.	1	3	Muito Rara
<i>Phyllostachys edulis</i> (Carr.) Houz.	1	3	Muito Rara
<i>Physalis peruviana</i> L.	1	3	Muito Rara
<i>Picea abies</i> (L.) Karst.	1	3	Muito Rara
<i>Pieris floribunda</i> (Pursh ex Sims) Benth. & Hook	1	3	Muito Rara
<i>Pieris japonica</i> (Thunb.) D. Don ex G. Don.	1	3	Muito Rara
<i>Pilea peperomioides</i> Diels.	1	3	Muito Rara
<i>Pimenta racemosa</i> (P. Miller) J. W. Moore	1	3	Muito Rara
<i>Pinus patula</i> Schiede ex Schdl. & Cham.	1	3	Muito Rara
<i>Pithecoctenium crucigerum</i> (L.) A. Gentry	1	3	Muito Rara
<i>Pittosporum dallii</i> Cheesem.	1	3	Muito Rara
<i>Pittosporum phillyraeoides</i> DC.	1	3	Muito Rara
<i>Plantago lanceolata</i> L.	1	3	Muito Rara
<i>Plantago malato-belizii</i> Lawalrée	1	3	Muito Rara
<i>Platynerium superbum</i> De Joncheere & Hennipman	1	3	Muito Rara
<i>Plectranthus ciliatus</i> E. May.	1	3	Muito Rara
<i>Plectranthus fruticosus</i> L' Hérit.	1	3	Muito Rara
<i>Pleioblastus variegatus</i> (Sieb. Ex Miq.) Mak.	1	3	Muito Rara
<i>Podocarpus elatus</i> R. Br. ex Mirb.	1	3	Muito Rara
<i>Podocarpus elongatus</i> (Ait.) L'Hérit.	1	3	Muito Rara

<i>Taxon</i>	Espaços Verdes em que ocorre	Espaços Verdes (%)	Classe
<i>Podocarpus totara</i> G. Benn. ex D. Don	1	3	Muito Rara
<i>Polianthes tuberosa</i> L.	1	3	Muito Rara
<i>Polyandrococos caudescens</i> (Mart.) Barb. Rodr.	1	3	Muito Rara
<i>Polygonum amplexicaule</i> D. Don	1	3	Muito Rara
<i>Polygonum aubertii</i> L. Henry	1	3	Muito Rara
<i>Polygonum runcinatum</i> (Buch-Ham) D. Don	1	3	Muito Rara
<i>Polyscias cumingiana</i> (C. Prest) Fernandez-Vilar	1	3	Muito Rara
<i>Polyscias guilfoylei</i> (Bull.) L. H. Bail	1	3	Muito Rara
<i>Populus alba</i> L.	1	3	Muito Rara
<i>Populus heterophylla</i> L.	1	3	Muito Rara
<i>Portulaca grandiflora</i> Hook.	1	3	Muito Rara
<i>Primula malacoides</i> Franch.	1	3	Muito Rara
<i>Protea aurea</i> (Burm. f.) Rourke ssp. <i>aurea</i>	1	3	Muito Rara
<i>Protea compacta</i> R. Br.	1	3	Muito Rara
<i>Protea eximia</i> (Salisb. ex Knight) Fourc.	1	3	Muito Rara
<i>Protea grandiceps</i> Tratt.	1	3	Muito Rara
<i>Protea laurifolia</i> Thunb.	1	3	Muito Rara
<i>Protea lepidocarpodendron</i> (L.) L.	1	3	Muito Rara
<i>Protea mundi</i> Klotzsch.	1	3	Muito Rara
<i>Protea repens</i> (L.) L.	1	3	Muito Rara
<i>Protea susannae</i> Phillips. x <i>P. nerifolia</i> R. Br.	1	3	Muito Rara
<i>Prunella grandiflora</i> (L.) Scholler	1	3	Muito Rara
<i>Prunus avium</i> L.	1	3	Muito Rara
<i>Prunus campanulata</i> Maxim.	1	3	Muito Rara
<i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb.	1	3	Muito Rara
<i>Pseudogynoxys chenopodioides</i> (Kunth.) Cabr.	1	3	Muito Rara
<i>Pseudotsuga menziesii</i> (Mirb.) Franco	1	3	Muito Rara
<i>Pteris cretica</i> L.	1	3	Muito Rara
<i>Pteris incompleta</i> Cav.	1	3	Muito Rara
<i>Ptychosperma macarthurii</i> (Wendl.) Nichols.	1	3	Muito Rara
<i>Pyracantha crenulata</i> (D. Don) Roem.	1	3	Muito Rara
<i>Pyrus communis</i> L.	1	3	Muito Rara
<i>Quisqualis indica</i> L.	1	3	Muito Rara
<i>Raphanus raphanistrum</i> L. ssp. <i>raphanistrum</i>	1	3	Muito Rara
<i>Rapistrum rugosum</i> (L.) All.	1	3	Muito Rara
<i>Ravenea rivularis</i> Jum & Perrier	1	3	Muito Rara
<i>Rhaphidophora decursiva</i> (Wallich) Schott.	1	3	Muito Rara
<i>Rhaphiolepis indica</i> (L.) Lindl.	1	3	Muito Rara
<i>Rhipsalis goebeliana</i> Backeb.	1	3	Muito Rara
<i>Rhododendron augustini</i> Hemsl.	1	3	Muito Rara
<i>Rhododendron catawbiense</i> Michx.	1	3	Muito Rara
<i>Rhombophyllum dolabriforme</i> (L.) Schwantes	1	3	Muito Rara
<i>Rhombophyllum nelii</i> Schwantes	1	3	Muito Rara
<i>Rhus coriaria</i> L.	1	3	Muito Rara
<i>Robinia viscosa</i> Vent.	1	3	Muito Rara
<i>Robinia x ambigua</i> Poir.	1	3	Muito Rara
<i>Rohdea japonica</i> (Thunb.) Roth	1	3	Muito Rara
<i>Romulea columnae</i> Seb. & Mauri	1	3	Muito Rara
<i>Rondeletia amoena</i> (Planch.) Hemsl.	1	3	Muito Rara
<i>Rosa chinensis</i> Jacq.f. <i>mutabilis</i> (Correv.) Rehd.	1	3	Muito Rara
<i>Rosa gallica</i> L.	1	3	Muito Rara
<i>Rosa mandonii</i> Desegl.	1	3	Muito Rara
<i>Rudbeckia hirta</i> L.	1	3	Muito Rara
<i>Rudbeckia laciniata</i> L.	1	3	Muito Rara
<i>Ruellia tweediana</i> Grisebach	1	3	Muito Rara
<i>Rumex conglomeratus</i> Murray	1	3	Muito Rara
<i>Rumex maderensis</i> Lowe	1	3	Muito Rara
<i>Sagittaria lancifolia</i> L.	1	3	Muito Rara
<i>Saintpaulia ionantha</i> Wendl.	1	3	Muito Rara
<i>Salvia africana-lutea</i> L.	1	3	Muito Rara
<i>Salvia broussonetii</i> Benth.	1	3	Muito Rara
<i>Salvia chamaedryoides</i> Cav.	1	3	Muito Rara
<i>Salvia confertiflora</i> Pohl.	1	3	Muito Rara
<i>Salvia discolor</i> Kunth.	1	3	Muito Rara
<i>Sambucus ebulus</i> L.	1	3	Muito Rara
<i>Samolus valerandii</i> L.	1	3	Muito Rara
<i>Sansevieria splendens</i> Stapf	1	3	Muito Rara
<i>Santolina pinnata</i> Viv. ssp. <i>neapolitana</i> (Jordan & Fourr.) Guinea.	1	3	Muito Rara
<i>Sapindus saponaria</i> L.	1	3	Muito Rara
<i>Sapium sebiferum</i> (L.) Roxb.	1	3	Muito Rara
<i>Sasa palmata</i> (Burb.) Camus	1	3	Muito Rara
<i>Satureja varia</i> (Benth) W. & B. ex Briq. ssp. <i>thymoides</i> (Sol. ex Lowe) var. <i>cacuminicola</i> (Pérez) A. Hansen & Sunding.	1	3	Muito Rara

<i>Taxon</i>	Espaços Verdes em que ocorre	Espaços Verdes (%)	Classe
<i>Saurauia nepaulensis</i> DC.	1	3	Muito Rara
<i>Saxifraga maderensis</i> Don.	1	3	Muito Rara
<i>Scabiosa atropurpurea</i> L.	1	3	Muito Rara
<i>Schlumbergera x buckleyi</i> (T. Moore)	1	3	Muito Rara
<i>Schoenoplectus validus</i> (Vahl) Löve	1	3	Muito Rara
<i>Scilla amoena</i> L.	1	3	Muito Rara
<i>Scilla peruviana</i> L.	1	3	Muito Rara
<i>Scilla siberica</i> Haw.	1	3	Muito Rara
<i>Scrophularia hirta</i> Lowe	1	3	Muito Rara
<i>Sedum adolphii</i> Hamet.	1	3	Muito Rara
<i>Sedum alboroseum</i> Baker	1	3	Muito Rara
<i>Sedum aytacianum</i> J. Metzger	1	3	Muito Rara
<i>Sedum dendroideum</i> Moc. & Sessé ex DC	1	3	Muito Rara
<i>Sedum lucidum</i> R.T. Clausen.	1	3	Muito Rara
<i>Sedum praealtum</i> A. DC.	1	3	Muito Rara
<i>Sedum rubrotinctum</i> R. T. Clausen	1	3	Muito Rara
<i>Selaginella denticulata</i> (L.) Spring.	1	3	Muito Rara
<i>Selenicereus anthonyanus</i> (Alexander) D. Hunt.	1	3	Muito Rara
<i>Senecio articulatus</i> (L. f.) Schultz-Bip	1	3	Muito Rara
<i>Senecio ficoides</i> (L.) Schultz.-Bip	1	3	Muito Rara
<i>Senecio haworthii</i> (Sw.) Steud.	1	3	Muito Rara
<i>Senecio macroglossus</i> DC.	1	3	Muito Rara
<i>Senecio spiculosus</i> (Sheph.) G. Rowley	1	3	Muito Rara
<i>Senna bicapsularis</i> (L.) Roxb.	1	3	Muito Rara
<i>Senna x floribunda</i> (Cav.) Irwin & Barneby	1	3	Muito Rara
<i>Sideritis candicans</i> Ait. var. <i>candicans</i>	1	3	Muito Rara
<i>Smilax pendulina</i> Lowe	1	3	Muito Rara
<i>Sobralia leucoxantha</i> Reichb. f.	1	3	Muito Rara
<i>Solandra grandiflora</i> Sw.	1	3	Muito Rara
<i>Solandra longiflora</i> Tussac.	1	3	Muito Rara
<i>Solanum aviculare</i> Forst. f.	1	3	Muito Rara
<i>Solanum crispum</i> Ruiz & Pav.	1	3	Muito Rara
<i>Solanum wrightii</i> Benth.	1	3	Muito Rara
<i>Soleirolia soleirolii</i> Gaudich	1	3	Muito Rara
<i>Sollya heterophylla</i> Lindl.	1	3	Muito Rara
<i>Sophora secundiflora</i> (Ortega) Lagasca ex DC	1	3	Muito Rara
<i>Sparaxis fragrans</i> (Jacq.) Ker-Gawl. ssp. <i>grandiflora</i> (Delaroche) Goldbl.	1	3	Muito Rara
<i>Spiraea nipponica</i> Maxim.	1	3	Muito Rara
<i>Sprekelia formosissima</i> (L.) Herb.	1	3	Muito Rara
<i>Stachys ocymastrum</i> (L.) Briq.	1	3	Muito Rara
<i>Stangeria eriopus</i> (Kunze) Baillon	1	3	Muito Rara
<i>Stanhopea costaricensis</i> Reichb. f.	1	3	Muito Rara
<i>Stipa tenuissima</i> Trin.	1	3	Muito Rara
<i>Stokesia laevis</i> (Hill) Greene	1	3	Muito Rara
<i>Styrax officinalis</i> L.	1	3	Muito Rara
<i>Syngonium erythrophyllum</i> Birdsey & G. S. Bunting)	1	3	Muito Rara
<i>Syringa josikaea</i> Jacq. f. ex Rchb.	1	3	Muito Rara
<i>Syringa vulgaris</i> L.	1	3	Muito Rara
<i>Syringa x hyacinthiflora</i> (Lemoine) Rehh.	1	3	Muito Rara
<i>Syzygium oleosum</i> (F. Muell) B. Hyland.	1	3	Muito Rara
<i>Tabebuia chrysantha</i> (Jacq.) Nichols.	1	3	Muito Rara
<i>Tabebuia impetiginosa</i> (DC.) Standley	1	3	Muito Rara
<i>Tabebuia pallida</i> (Lindl.) Mers.	1	3	Muito Rara
<i>Tamus edulis</i> Lowe	1	3	Muito Rara
<i>Tanacetum argenteum</i> (Lam.) Willd.	1	3	Muito Rara
<i>Taxodium distichum</i> (L.) Rich.	1	3	Muito Rara
<i>Telopea speciosissima</i> (Sm.) R. Br.	1	3	Muito Rara
<i>Tetrastigma voinierianum</i> (Pierre ex Nichols. & Mottet) Gagnep	1	3	Muito Rara
<i>Thespesia populnea</i> (L.) Sol.	1	3	Muito Rara
<i>Thunbergia battiscombei</i> Turrill.	1	3	Muito Rara
<i>Tolmiea menziesii</i> Torr. & A. Gray var. <i>Taffs Gold</i>	1	3	Muito Rara
<i>Tolpis succulenta</i> (Dryand. in Ait.) Lowe	1	3	Muito Rara
<i>Tritonia crocata</i> (L.) Ker-Gaul.	1	3	Muito Rara
<i>Tulbaghia fragrans</i> L.	1	3	Muito Rara
<i>Typha angustifolia</i> L.	1	3	Muito Rara
<i>Ulmus glabra</i> Huds.	1	3	Muito Rara
<i>Ulmus procera</i> Salisb.	1	3	Muito Rara
<i>Uncinia uncinata</i> (L. f.) Kuenthal	1	3	Muito Rara
<i>Vanda tricolor</i> Lindley	1	3	Muito Rara
<i>Velltheimia bracteata</i> Bak.	1	3	Muito Rara
<i>Verbena peruviana</i> (L.) Britt.	1	3	Muito Rara
<i>Viburnum suspensum</i> Lindl.	1	3	Muito Rara
<i>Vicia sepium</i> L.	1	3	Muito Rara

<i>Taxon</i>	Espaços Verdes em que ocorre	Espaços Verdes (%)	Classe
<i>Vinca minor</i> L.	1	3	Muito Rara
<i>Viola odorata</i> L.	1	3	Muito Rara
<i>Vriesea ensiformis</i> (Vell.) Beer.	1	3	Muito Rara
<i>Wachendorfia thyrsiflora</i> Burm.	1	3	Muito Rara
<i>Wallichia caryotoides</i> Roxb.	1	3	Muito Rara
<i>Watsonia tabularis</i> Mathews & L. Bol.	1	3	Muito Rara
<i>Westringia fruticosa</i> (Willd.) Druce	1	3	Muito Rara
<i>Westringia raleighii</i> Boiv.	1	3	Muito Rara
<i>Xanthorrhoea australis</i> R. Br.	1	3	Muito Rara
<i>Xanthorrhoea johnsonii</i> A. Lee	1	3	Muito Rara
<i>Xanthorrhoea quadrangulata</i> F. Muell	1	3	Muito Rara
<i>Xanthosoma violaceum</i> Schott	1	3	Muito Rara
<i>Yucca whipplei</i> Torr.	1	3	Muito Rara
<i>Zea mays</i> L.	1	3	Muito Rara
<i>Ziziphus jujuba</i> Mill.	1	3	Muito Rara
<i>Ziziphus mauritiana</i> Lam.	1	3	Muito Rara
<i>Zoysia japonica</i> Steud.	1	3	Muito Rara
<i>Zygopetalum mackayi</i> Hook.	1	3	Muito Rara
<i>Zygositycos tripartitus</i> Humbert	1	3	Muito Rara
<i>Abutilon megapotamicum</i> (Spreng.) St.-Hil. & Naudin.	2	6	Muito Rara
<i>Acacia baileyana</i> F. Muell.	2	6	Muito Rara
<i>Acacia podalyriifolia</i> G. Don.	2	6	Muito Rara
<i>Acacia retinodes</i> Schldtl.	2	6	Muito Rara
<i>Acalypha hispida</i> Burm.	2	6	Muito Rara
<i>Acer negundo</i> L.	2	6	Muito Rara
<i>Acer platanoides</i> L.	2	6	Muito Rara
<i>Achyranthes sicula</i> (L.) All.	2	6	Muito Rara
<i>Acorus gramineus</i> Ait.	2	6	Muito Rara
<i>Adiantum formosum</i> R. Br.	2	6	Muito Rara
<i>Aeonium castello-paivae</i> Bolle.	2	6	Muito Rara
<i>Aesculus hippocastanum</i> L.	2	6	Muito Rara
<i>Aesculus x carnea</i> Hayne	2	6	Muito Rara
<i>Agave sisalana</i> Perring.	2	6	Muito Rara
<i>Agave victoriae-reginae</i> T. Moore	2	6	Muito Rara
<i>Ageratina ligustrina</i> (DC.) R. King & H. Robinson	2	6	Muito Rara
<i>Albizia lophantha</i> Benth.	2	6	Muito Rara
<i>Albizia saman</i> F. Muell.	2	6	Muito Rara
<i>Aleurites moluccana</i> (L.) Willd	2	6	Muito Rara
<i>Aloe aristata</i> Haw.	2	6	Muito Rara
<i>Aloe candelabrum</i> Berger.	2	6	Muito Rara
<i>Aloe pretoriensis</i> Pole Evans	2	6	Muito Rara
<i>Aloe striata</i> Haw.	2	6	Muito Rara
<i>Amaranthus caudatus</i> L.	2	6	Muito Rara
<i>Ananas nanus</i> (L.B. Sm.) L.B. Sm.	2	6	Muito Rara
<i>Anemone x hybrida</i> Paxt.	2	6	Muito Rara
<i>Anigozanthos flavidus</i> DC.	2	6	Muito Rara
<i>Anisodonteia capensis</i> (L.) Bates	2	6	Muito Rara
<i>Aphelandra squarrosa</i> Nees.	2	6	Muito Rara
<i>Aponogeton distachyos</i> L.	2	6	Muito Rara
<i>Arctotis fastuosa</i> Jacq.	2	6	Muito Rara
<i>Aristea woodii</i> N. E. Br.	2	6	Muito Rara
<i>Aristolochia gigantea</i> Mart. & Zucc.	2	6	Muito Rara
<i>Artocarpus heterophyllus</i> Lam.	2	6	Muito Rara
<i>Arum italicum</i> Mill.ssp. <i>canariense</i> (Webb & Berthel.) P. C. Boyce	2	6	Muito Rara
<i>Asparagus falcatus</i> L.	2	6	Muito Rara
<i>Asparagus macowanii</i> Baker	2	6	Muito Rara
<i>Aster amellus</i> L.	2	6	Muito Rara
<i>Aster squamatus</i> (Spreng.) Hieron.	2	6	Muito Rara
<i>Babiana stricta</i> (Ait.) Ker-Gaul.	2	6	Muito Rara
<i>Banksia integrifolia</i> L. f.	2	6	Muito Rara
<i>Bartlettina sordida</i> (Less.) R. King & H. Robinson	2	6	Muito Rara
<i>Beaufortia sparsa</i> R. Br.	2	6	Muito Rara
<i>Begonia manicata</i> Brongn. ex. Cels.	2	6	Muito Rara
<i>Begonia olsoniae</i> L. B. Sm. & Schubert.	2	6	Muito Rara
<i>Begonia serratifolia</i> Irmsch.	2	6	Muito Rara
<i>Betula pendula</i> Roth.	2	6	Muito Rara
<i>Billbergia x windii</i> hort. Makoy ex E. Morr.	2	6	Muito Rara
<i>Blechnum spicant</i> (L.) Roth.	2	6	Muito Rara
<i>Brachychiton discolor</i> F. Muell.	2	6	Muito Rara
<i>Brahea dulcis</i> (Kunth) Mart.	2	6	Muito Rara
<i>Buddleja madagascariensis</i> Lam.	2	6	Muito Rara
<i>Bulbine latifolia</i> (L.f.) Haw	2	6	Muito Rara
<i>Bulbinella hookeri</i> (Hook. f.) Cheesem.	2	6	Muito Rara

<i>Taxon</i>	Espaços Verdes em que ocorre	Espaços Verdes (%)	Classe
<i>Caesalpinia pulcherrima</i> (L.) Sw.	2	6	Muito Rara
<i>Calathea zebrina</i> (Sims) Lindl.	2	6	Muito Rara
<i>Callistemon formosus</i> S. T. Blake	2	6	Muito Rara
<i>Callistemon linearis</i> DC.	2	6	Muito Rara
<i>Callistemon salignus</i> (Sm.) DC.	2	6	Muito Rara
<i>Calycanthus occidentalis</i> Hook. & Arn.	2	6	Muito Rara
<i>Camellia reticulata</i> Lindl.	2	6	Muito Rara
<i>Camellia sasanqua</i> Thunb.	2	6	Muito Rara
<i>Camellia sinensis</i> (L.) Kuntze	2	6	Muito Rara
<i>Campsis x tagliabuana</i> (Vis.) Rehd.	2	6	Muito Rara
<i>Canistrum lindenii</i> (Regel) Mez	2	6	Muito Rara
<i>Carissa macrocarpa</i> (Ecklon) A. DC.	2	6	Muito Rara
<i>Cassia javanica</i> L.	2	6	Muito Rara
<i>Ceanothus arboreus</i> Greene.	2	6	Muito Rara
<i>Ceratozamia mexicana</i> Brongn.	2	6	Muito Rara
<i>Cestrum diurnum</i> L. non Weston	2	6	Muito Rara
<i>Cestrum elegans</i> (Brongn.) Schidl.	2	6	Muito Rara
<i>Cestrum fasciculatum</i> (Schidl.) Miers.	2	6	Muito Rara
<i>Chamaecyparis nootkatensis</i> (D. Don) Spach.	2	6	Muito Rara
<i>Chamaecyparis thyoides</i> (L.) BSP.	2	6	Muito Rara
<i>Chamaelaucium uncinatum</i> Schauer.	2	6	Muito Rara
<i>Cleistocactus straussi</i> (Heese) Backeb.)	2	6	Muito Rara
<i>Clerodendrum ugandense</i> Prain.	2	6	Muito Rara
<i>Convolvulus althaeoides</i> L.	2	6	Muito Rara
<i>Corylus maxima</i> Mill.	2	6	Muito Rara
<i>Cotyledon macrantha</i> De Smet	2	6	Muito Rara
<i>Crassula coccinea</i> L.	2	6	Muito Rara
<i>Crassula perfoliata</i> L. var. <i>falcata</i> (Wendl.) Toelken.	2	6	Muito Rara
<i>Crassula perforata</i> Thunb.	2	6	Muito Rara
<i>Crataegus laevigata</i> (Poir.) DC	2	6	Muito Rara
<i>Crinum asiaticum</i> L.	2	6	Muito Rara
<i>Cucurbita moschata</i> (Duchesne ex Lam.) Duchesne ex Poir.	2	6	Muito Rara
<i>Culcita macrocarpa</i> C. Presl.	2	6	Muito Rara
<i>Curculigo latifolia</i> Dryand.	2	6	Muito Rara
<i>Cydonia oblonga</i> Mill.	2	6	Muito Rara
<i>Cymbidium lowianum</i> (Reichb. f.) Reichb. f.	2	6	Muito Rara
<i>Dendrobium nobile</i> Lindley	2	6	Muito Rara
<i>Dianella caerulea</i> Sims.	2	6	Muito Rara
<i>Dianthus caryophyllus</i> L.	2	6	Muito Rara
<i>Dicliptera suberecta</i> (Andre) Bremek	2	6	Muito Rara
<i>Dietes grandiflora</i> N. E. Br.	2	6	Muito Rara
<i>Diospyros kaki</i> L. f.	2	6	Muito Rara
<i>Dodonaea viscosa</i> (L.) Jacq.	2	6	Muito Rara
<i>Dovyalis caffra</i> (Hook. f. & Harv.) Hook. F.	2	6	Muito Rara
<i>Echinopsis terscheckii</i> (Parmentier ex Pfeiff.) Friedrich & Rowley	2	6	Muito Rara
<i>Elaeagnus umbellata</i> Thunb.	2	6	Muito Rara
<i>Encephalartos altensteinii</i> Lehm	2	6	Muito Rara
<i>Encephalartos horridus</i> (Jacq.) Lehm. x <i>E. lehmannii</i> Lehm.	2	6	Muito Rara
<i>Encephalartos villosus</i> Lem.	2	6	Muito Rara
<i>Enterolobium cyclocarpa</i> (Jacq.) Griseb.	2	6	Muito Rara
<i>Erica carnea</i> L.	2	6	Muito Rara
<i>Erica ciliaris</i> L.	2	6	Muito Rara
<i>Erythrina caffra</i> Thunb.	2	3	Muito Rara
<i>Escallonia rosea</i> Griseb.	2	6	Muito Rara
<i>Eschscholzia californica</i> Cham.	2	6	Muito Rara
<i>Etlingera elatior</i> (Jack) Rosemary M. Sm.	2	6	Muito Rara
<i>Eucalyptus robusta</i> Sm.	2	6	Muito Rara
<i>Eucomis bicolor</i> Bak.	2	6	Muito Rara
<i>Eucomis comosa</i> (Houtt.) Wehrh.	2	6	Muito Rara
<i>Euphorbia candelabrum</i> Kotschy	2	6	Muito Rara
<i>Euphorbia leucocephala</i> Lotsy.	2	6	Muito Rara
<i>Euphorbia milli</i> var. <i>breonii</i> (Nois.) Ursch & Leandri.	2	6	Muito Rara
<i>Fatsia japonica</i> (Thunb.) Decne. & Planch.	2	6	Muito Rara
<i>Fragaria vesca</i> L.	2	6	Muito Rara
<i>Fraxinus ornus</i> L.	2	6	Muito Rara
<i>Garcinia xanthochymus</i> Hook. f. ex Anderson	2	6	Muito Rara
<i>Genista tenera</i> (Jacq. Ex Murr.) O. Kuntze	2	6	Muito Rara
<i>Gladiolus callianthus</i> Marais	2	6	Muito Rara
<i>Gladiolus natalensis</i> Hook	2	6	Muito Rara
<i>Gleditsia triacanthos</i> L.	2	6	Muito Rara
<i>Gloriosa superba</i> L.	2	6	Muito Rara
<i>Glottiphyllum neli</i> Schwantes	2	6	Muito Rara
<i>Graptopetalum paraguayense</i> (N. E. Br.) Walth.	2	6	Muito Rara

<i>Taxon</i>	<i>Espaços Verdes em que ocorre</i>	<i>Espaços Verdes (%)</i>	<i>Classe</i>
<i>Grevillea banksii</i> R. Br.	2	6	Muito Rara
<i>Greyia radlkoferi</i> Szyszyl.	2	6	Muito Rara
<i>Gunnera manicata</i> Lindl. ex André	2	6	Muito Rara
<i>Guzmania musaica</i> (Lind. & André) Mez.	2	6	Muito Rara
<i>Helianthus annuus</i> L.	2	6	Muito Rara
<i>Helichrysum devium</i> Johns.	2	6	Muito Rara
<i>Helichrysum foetidum</i> (L.) Cass.	2	6	Muito Rara
<i>Hibiscus tiliaceus</i> L.	2	6	Muito Rara
<i>Hydrangea aspera</i> D. Don.	2	6	Muito Rara
<i>Hydrangea quercifolia</i> Bartr.	2	6	Muito Rara
<i>Hydrangea serrata</i> (Thunb.)	2	6	Muito Rara
<i>Hypericum monogynum</i> L.	2	6	Muito Rara
<i>Impatiens balsamina</i> L.	2	6	Muito Rara
<i>Ipomoea grandiflora</i> Benth.	2	6	Muito Rara
<i>Ipomoea alba</i> L.	2	6	Muito Rara
<i>Itea ilicifolia</i> Oli.	2	6	Muito Rara
<i>Jasminum sambac</i> (L.) Ait.	2	6	Muito Rara
<i>Jatropha curcas</i> L.	2	3	Muito Rara
<i>Jatropha podagrica</i> Hook.	2	6	Muito Rara
<i>Juglans nigra</i> L.	2	6	Muito Rara
<i>Juniperus squamata</i> Buch.-Ham. ex D. Don	2	6	Muito Rara
<i>Juniperus virginiana</i> L.	2	6	Muito Rara
<i>Justicia adhatoda</i> L.	2	6	Muito Rara
<i>Kalanchoe gastonis-bonnierei</i> Hamet. & Perrier	2	6	Muito Rara
<i>Kalanchoe marmorata</i> Bak.	2	6	Muito Rara
<i>Kalanchoe pubescens</i> R. Br. ex Oliver	2	6	Muito Rara
<i>Kalanchoe thyrsiflora</i> Harv.	2	6	Muito Rara
<i>Kniphofia ensifolia</i> Bak.	2	6	Muito Rara
<i>Koeleria bipinnata</i> Franch.	2	6	Muito Rara
<i>Lablab purpureus</i> (L.) Sweet	2	6	Muito Rara
<i>Lampranthus aureus</i> (L.) N. E. Br.	2	6	Muito Rara
<i>Lampranthus roseus</i> (Willd.) Schwantes	2	6	Muito Rara
<i>Lavandula dentata</i> L. var. <i>candicans</i> Battand.	2	6	Muito Rara
<i>Leptospermum petersonii</i> Bail.	2	6	Muito Rara
<i>Leucospermum vernum</i> L. var. <i>vagneri</i> Stapf.	2	6	Muito Rara
<i>Leucospermum reflexum</i> H. Buek ex Meisn.	2	6	Muito Rara
<i>Ligustrum sinense</i> Lour.	2	6	Muito Rara
<i>Limonium fruticans</i> (Webb) Kuntze	2	6	Muito Rara
<i>Limonium sinuatum</i> (L.) Mill.	2	6	Muito Rara
<i>Litchi chinensis</i> Sonn.	2	6	Muito Rara
<i>Lychnis flos-jovis</i> (L.) Desr.	2	6	Muito Rara
<i>Magnolia stellata</i> (Sieb. & Zucc.) Maxim.	2	6	Muito Rara
<i>Mahonia x media</i> C. Brickell	2	6	Muito Rara
<i>Malus floribunda</i> Van Houtte	2	6	Muito Rara
<i>Malva sylvestris</i> L.	2	6	Muito Rara
<i>Mammillaria sempervivi</i> DC.	2	6	Muito Rara
<i>Maranta leuconeura</i> E. Morr.	2	6	Muito Rara
<i>Medinilla magnifica</i> Lindl.	2	6	Muito Rara
<i>Melaleuca linariifolia</i> Sm.	2	6	Muito Rara
<i>Melissa officinalis</i> L.	2	6	Muito Rara
<i>Mesembryanthemum crystallinum</i> L.	2	6	Muito Rara
<i>Mesembryanthemum nodiflorum</i> L.	2	6	Muito Rara
<i>Mimosa pudica</i> L.	2	6	Muito Rara
<i>Miscanthus sinensis</i> Anderss.	2	6	Muito Rara
<i>Moraea polystachya</i> (Thunb.) Ker-Gawl.	2	6	Muito Rara
<i>Muehlenbeckia complexa</i> (Cunn.) Meisn.	2	6	Muito Rara
<i>Musa acuminata</i> L. A. Colla ssp. <i>zebrina</i> (L. B. van Houtte) R. E. Nasution	2	6	Muito Rara
<i>Musschia aurea</i> (L. f.) Dumort.	2	6	Muito Rara
<i>Nasturtium officinale</i> R. Br.	2	6	Muito Rara
<i>Nemesia strumosa</i> Benth. in Hook.	2	6	Muito Rara
<i>Neomarica caerulea</i> (Ker-Gawl.) Sprague	2	6	Muito Rara
<i>Neoregelia concentrica</i> (Vell.) L. B. Sm.	2	6	Muito Rara
<i>Neoregelia marmorata</i> (Baker) L. B. Smith.	2	6	Muito Rara
<i>Nepeta x faassenii</i> Bergmans ex Stearn.	2	6	Muito Rara
<i>Nerine sarniensis</i> Herb.	2	6	Muito Rara
<i>Nicandra physaloides</i> (L.) Gaertn.	2	6	Muito Rara
<i>Nidularium fulgens</i> Lem.	2	6	Muito Rara
<i>Nipidium crassifolium</i> (L.) Lellinger	2	6	Muito Rara
<i>Olea europaea</i> L.	2	6	Muito Rara
<i>Oncidium sphacelatum</i> Lindley	2	6	Muito Rara
<i>Ophiopogon planiscapus</i> Nak.	2	6	Muito Rara
<i>Origanum vulgare</i> L.	2	6	Muito Rara
<i>Oxalis purpurea</i> L.	2	6	Muito Rara

<i>Taxon</i>	Espaços Verdes em que ocorre	Espaços Verdes (%)	Classe
<i>Pamianthe peruviana</i> Stapf	2	6	Muito Rara
<i>Pandorea jasminoides</i> (Lindl.) Schum.	2	6	Muito Rara
<i>Papaver nudicaule</i> L.	2	6	Muito Rara
<i>Papaver rhoeas</i> L.	2	6	Muito Rara
<i>Parthenocissus quinquefolia</i> (L.) Planch.	2	6	Muito Rara
<i>Pelargonium tomentosum</i> Jacq.	2	6	Muito Rara
<i>Pennisetum purpureum</i> Schum.	2	6	Muito Rara
<i>Penstemon barbatus</i> (Cav.) Roth.	2	6	Muito Rara
<i>Peperomia glabella</i> (Sw.) A. Dietr.	2	6	Muito Rara
<i>Peperomia magnoliifolia</i> (Jacq.) Dietr.	2	6	Muito Rara
<i>Petasites fragrans</i> (Vill.) Presl.	2	6	Muito Rara
<i>Peucedanum lowei</i> (Coss.) Menezes	2	6	Muito Rara
<i>Phalaenopsis amabilis</i> (L.) Blume	2	6	Muito Rara
<i>Phalaenopsis schilleriana</i> Reichb. f.	2	6	Muito Rara
<i>Philadelphus coronarius</i> L.	2	6	Muito Rara
<i>Philodendron undulatum</i> Engl.	2	6	Muito Rara
<i>Phlox paniculata</i> L.	2	6	Muito Rara
<i>Picea pungens</i> Engelm.	2	6	Muito Rara
<i>Pimpinella anisum</i> L.	2	6	Muito Rara
<i>Pinus pinea</i> L.	2	6	Muito Rara
<i>Pinus radiata</i> D. Don	2	6	Muito Rara
<i>Pittosporum eugenioides</i> A. Cunn.	2	6	Muito Rara
<i>Plectostachys serphyllifolia</i> (A. Bergerr) Hilliard & B. L. Burtt.	2	6	Muito Rara
<i>Plectranthus oertendahlii</i> T. C. E. Fries.	2	6	Muito Rara
<i>Plectranthus saccatus</i> Benth.	2	6	Muito Rara
<i>Plectranthus thyrsoideus</i> (Bak.) B. Mathew	2	6	Muito Rara
<i>Polyscias scutellaria</i> (Burm. f.) Fosb.	2	6	Muito Rara
<i>Pontederia cordata</i> L.	2	6	Muito Rara
<i>Populus nigra</i> L.	2	6	Muito Rara
<i>Portulaca oleracea</i> L.	2	6	Muito Rara
<i>Protea cynaroides</i> (L.) L.	2	6	Muito Rara
<i>Protea magnifica</i> Link x <i>P. burchellii</i> Stapf.	2	6	Muito Rara
<i>Protea magnifica</i> Link.	2	6	Muito Rara
<i>Prunella vulgaris</i> L.	2	6	Muito Rara
<i>Prunus serrulata</i> Lindl.	2	6	Muito Rara
<i>Pseudosasa japonica</i> (Sieb. & Steud.) Mak. ex Nak.	2	6	Muito Rara
<i>Quercus x crenata</i> Lam.	2	6	Muito Rara
<i>Rhododendron indicum</i> (L.) Sweet	2	6	Muito Rara
<i>Rhododendron molle</i> (Bl.) G. Don.	2	6	Muito Rara
<i>Rosa x damascena</i> Mill.	2	6	Muito Rara
<i>Roystonea regia</i> (H.B.K.) Cook	2	6	Muito Rara
<i>Ruellia graecizans</i> Backer	2	6	Muito Rara
<i>Ruscus streptophyllus</i> P. F. Yeo	2	6	Muito Rara
<i>Salvia canariensis</i> L.	2	6	Muito Rara
<i>Sambucus nigra</i> L.	2	6	Muito Rara
<i>Saponaria officinalis</i> L.	2	6	Muito Rara
<i>Saxifraga stolonifera</i> Meerb.	2	6	Muito Rara
<i>Scadoxus multiflorus</i> (Martyn) Raf. ssp. <i>katherinae</i> (Baker) Friis & Nordal	2	6	Muito Rara
<i>Scaevola aemula</i> R. Br.	2	6	Muito Rara
<i>Schefflera pueckleri</i> (K. Koch) Frodin.	2	6	Muito Rara
<i>Schotia latifolia</i> Jacq.	2	6	Muito Rara
<i>Sechium edule</i> (Jacq.) Sw.	2	6	Muito Rara
<i>Sedum morganianum</i> Walth.	2	6	Muito Rara
<i>Sedum reflexum</i> L.	2	6	Muito Rara
<i>Selaginella kraussiana</i> (Kunze) A. Braun.	2	6	Muito Rara
<i>Selenicereus grandiflorus</i> (L.) Britton & Rose	2	6	Muito Rara
<i>Senecio glastifolius</i> L. f.	2	6	Muito Rara
<i>Senna occidentalis</i> (L.) Link.	2	6	Muito Rara
<i>Serissa foetida</i> (L. f.) Lam.	2	6	Muito Rara
<i>Sesbania punicea</i> (Cav.) Benth.	2	6	Muito Rara
<i>Solanum muricatum</i> Ait.	2	6	Muito Rara
<i>Solanum pseudocapsicum</i> L.	2	6	Muito Rara
<i>Solanum wendlandii</i> Hook. f.	2	6	Muito Rara
<i>Sparmannia africana</i> L. f.	2	6	Muito Rara
<i>Spathiphyllum ortgiesii</i> Reg.	2	6	Muito Rara
<i>Strelitzia reginae</i> Banks ex Dryand var. <i>juncea</i> (Ker-Gawl.) H. E. Moore	2	6	Muito Rara
<i>Strelitzia reginae</i> Banks ex Dryand var. <i>parvifolia</i> (Aiton) Anon.	2	6	Muito Rara
<i>Stromanthe sanguinea</i> (Hook.) Sonder.	2	6	Muito Rara
<i>Strongylodon macrobotrys</i> A. Gray.	2	6	Muito Rara
<i>Syncarpia glomulifera</i> (Sm.) Nied.	2	6	Muito Rara
<i>Syngonium hofmannii</i> Schott.	2	6	Muito Rara
<i>Tabebuia heterophylla</i> (D. C.) Britton	2	6	Muito Rara
<i>Tamarindus indica</i> L.	2	6	Muito Rara

<i>Taxon</i>	Espaços Verdes em que ocorre	Espaços Verdes (%)	Classe
<i>Tamarix gallica</i> L.	2	6	Muito Rara
<i>Terminalia bellirica</i> (Gaertn.) Roxb.	2	6	Muito Rara
<i>Thevetia peruviana</i> (Pers.) Schum.	2	6	Muito Rara
<i>Thryptomene saxicola</i> (Hook) Schauer	2	6	Muito Rara
<i>Thuja plicata</i> D. Don.	2	6	Muito Rara
<i>Thunbergia coccinea</i> Wallich.	2	6	Muito Rara
<i>Thunbergia mysorensis</i> Anderson ex Bedd.	2	6	Muito Rara
<i>Tilia cordata</i> Mill.	2	6	Muito Rara
<i>Tillandsia lindenii</i> Reg.	2	6	Muito Rara
<i>Tillandsia usneoides</i> (L.) L.	2	6	Muito Rara
<i>Tulbaghia violacea</i> Harv.	2	6	Muito Rara
<i>Verbena bonariensis</i> L.	2	6	Muito Rara
<i>Viburnum opulus</i> L.	2	6	Muito Rara
<i>Watsonia borbonica</i> (Pourr.) Goldbl.	2	6	Muito Rara
<i>Yucca elata</i> Engelm.	2	6	Muito Rara
<i>Yucca rostrata</i> Engelm. Ex Trel.	2	6	Muito Rara
<i>Adiantum hispidulum</i> Swartz	3	9	Muito Rara
<i>Adiantum reniforme</i> L. ssp. <i>reniforme</i>	3	9	Muito Rara
<i>Aechmea caudata</i> var. <i>caudata</i> Lindman	3	9	Muito Rara
<i>Aechmea gamosepala</i> Witm.	3	9	Muito Rara
<i>Aeonium decorum</i> Webb ex Bolle	3	9	Muito Rara
<i>Agapanthus campanulatus</i> F. M. Leighton	3	9	Muito Rara
<i>Agave macroacantha</i> Zucc.	3	9	Muito Rara
<i>Ajuga reptans</i> L.	3	9	Muito Rara
<i>Alocasia macrorrhiza</i> (L.) G. Don.	3	9	Muito Rara
<i>Aloe marlothi</i> A. Berger.	3	9	Muito Rara
<i>Aloe pratensis</i> Bak.	3	9	Muito Rara
<i>Ananas bracteatus</i> (Lindl.) Schult. var. <i>tricolor</i> (Bertoni) L.B.	3	9	Muito Rara
<i>Anthurium coriaceum</i> G. Don	3	9	Muito Rara
<i>Anthurium scherzerianum</i> Schott.	3	9	Muito Rara
<i>Argyranthemum gracile</i> Schultz-Bip	3	9	Muito Rara
<i>Arthropodium cirratum</i> (Forst. f.) R. Br.	3	9	Muito Rara
<i>Arundo donax</i> L. var. <i>versicolor</i> (Mill.) Stokes	3	9	Muito Rara
<i>Asclepias physocarpa</i> (E. Mey.) Schltr.	3	9	Muito Rara
<i>Asparagus scoparius</i> Lowe	3	9	Muito Rara
<i>Asplenium anceps</i> Lowe ex Hook. & Grev.	3	9	Muito Rara
<i>Atriplex halimus</i> L.	3	9	Muito Rara
<i>Babiana rubrocyanea</i> (Jacq.) Ker-Gawl.	3	9	Muito Rara
<i>Begonia aconitifolia</i> A. DC.	3	9	Muito Rara
<i>Berberis maderensis</i> Lowe	3	9	Muito Rara
<i>Bidens ferulifolia</i> (Jacq.) DC.	3	9	Muito Rara
<i>Billbergia nutans</i> H. Wendl.	3	9	Muito Rara
<i>Billbergia pyramidalis</i> (Sims.) Lindl.	3	9	Muito Rara
<i>Brugmansia sanguinea</i> (Ruiz & Pav.) D. Don.	3	9	Muito Rara
<i>Buxus sempervirens</i> L. var. <i>arborescens</i>	3	9	Muito Rara
<i>Calathea louseae</i> Gagnep.	3	9	Muito Rara
<i>Calceolaria tomentosa</i> Ruiz & Pav.	3	9	Muito Rara
<i>Campsis radicans</i> (L.) Seem.	3	9	Muito Rara
<i>Carlina salicifolia</i> (L.f.) Cav.	3	9	Muito Rara
<i>Cephalophyllum alstonii</i> Marloth.	3	9	Muito Rara
<i>Cereus jamacaru</i> DC.	3	9	Muito Rara
<i>Cereus validus</i> Haw.	3	9	Muito Rara
<i>Cestrum parqui</i> L'Hérit	3	9	Muito Rara
<i>Chamaecyparis obtusa</i> (Sieb. & Zucc.) Endl.	3	9	Muito Rara
<i>Choisya ternata</i> HBK.	3	9	Muito Rara
<i>Clematis aristata</i> R. Br.	3	9	Muito Rara
<i>Coccoloba uvifera</i> (L.) L.	3	9	Muito Rara
<i>Convolvulus massonii</i> Dietr.	3	9	Muito Rara
<i>Coreopsis auricula</i> L.	3	9	Muito Rara
<i>Cotoneaster horizontalis</i> Decne.	3	9	Muito Rara
<i>Cuphea micropetala</i> HBK.	3	9	Muito Rara
<i>Cyathea medullaris</i> (Forst. f.) Sw.	3	9	Muito Rara
<i>Dasyllirion acrotrichum</i> (Schiede) Zucc.	3	9	Muito Rara
<i>Delphinium elatum</i> L.	3	9	Muito Rara
<i>Delphinium grandiflorum</i> L.	3	9	Muito Rara
<i>Dendranthema pacificum</i> (Nak.) Kitam	3	9	Muito Rara
<i>Dioon edule</i> Lindley	3	9	Muito Rara
<i>Diplazium caudatum</i> (Cav.) Jermy	3	9	Muito Rara
<i>Distictis buccinatoria</i> (DC.) A. Gentry.	3	9	Muito Rara
<i>Dracaena reflexa</i> (Decne.) Lam.	3	9	Muito Rara
<i>Drimiopsis maculata</i> Lindl. & Paxt.	3	9	Muito Rara
<i>Drosanthemum floribundum</i> (Haw.) Schwantes	3	9	Muito Rara
<i>Echeveria pulvinata</i> Rose	3	9	Muito Rara

<i>Taxon</i>	Espaços Verdes em que ocorre	Espaços Verdes (%)	Classe
<i>Echeveria secunda</i> W. B. Booth.	3	9	Muito Rara
<i>Echium plantaginum</i> L.	3	9	Muito Rara
<i>Elaeagnus pungens</i> Thunb.	3	9	Muito Rara
<i>Eranthemum pulchellum</i> André	3	9	Muito Rara
<i>Eucalyptus citriodora</i> Hook.	3	9	Muito Rara
<i>Eucalyptus gunni</i> Hook.	3	9	Muito Rara
<i>Ficus microcarpa</i> L. f.	3	9	Muito Rara
<i>Ficus rubiginosa</i> Desf. ex Vent.	3	9	Muito Rara
<i>Frangula azorica</i> V. Grubow	3	9	Muito Rara
<i>Fraxinus excelsior</i> L.	3	9	Muito Rara
<i>Furcraea bedinghausii</i> K. Koch.	3	9	Muito Rara
<i>Galactites tomentosa</i> Moench.	3	9	Muito Rara
<i>Geranium palmatum</i> Cav.	3	9	Muito Rara
<i>Gladiolus italicus</i> Mill.	3	9	Muito Rara
<i>Gnidia polystachya</i> Bergius	3	9	Muito Rara
<i>Hebe speciosa</i> (A. Cunn.) Ckn. & Allan	3	9	Muito Rara
<i>Heberdenia excelsa</i> (Ait.) Banks ex DC	3	9	Muito Rara
<i>Helichrysum melaleucum</i> Rchb. ex Holl	3	9	Muito Rara
<i>Helichrysum obconicum</i> DC.	3	9	Muito Rara
<i>Heterocentron macrostachium</i> Naud.	3	9	Muito Rara
<i>Hypoestes phyllostachya</i> Bak.	3	9	Muito Rara
<i>Ipomoea batatas</i> (L.) Poir.	3	9	Muito Rara
<i>Iris pseudacorus</i> L.	3	9	Muito Rara
<i>Iris unguicularis</i> Poir.	3	9	Muito Rara
<i>Juniperus communis</i> L.	3	9	Muito Rara
<i>Justicia rizzinii</i> Wassh.	3	9	Muito Rara
<i>Kalanchoe beharensis</i> Drake.	3	9	Muito Rara
<i>Kalanchoe pinnata</i> (Lam.) Pers.	3	9	Muito Rara
<i>Lamium galeobdolon</i> (L.) L.	3	9	Muito Rara
<i>Lampranthus blandus</i> (Haw.) Schwantes	3	9	Muito Rara
<i>Lampranthus comptonii</i> (L. Bol.) N. E. Br.	3	9	Muito Rara
<i>Lavandula stoechas</i> L.	3	9	Muito Rara
<i>Lemna minor</i> L.	3	9	Muito Rara
<i>Leucadendron argenteum</i> (L.) R. Br.	3	9	Muito Rara
<i>Liquidambar styraciflua</i> L.	3	9	Muito Rara
<i>Lobelia laxiflora</i> HBK.	3	9	Muito Rara
<i>Lonicera hildebrandiana</i> Collett & Hemsl	3	9	Muito Rara
<i>Lunaria annua</i> L.	3	3	Muito Rara
<i>Lychnis coronaria</i> (L.) Desr.	3	9	Muito Rara
<i>Macadamia integrifolia</i> Maid. & Betch.	3	9	Muito Rara
<i>Mahonia japonica</i> (Thunb.) DC.	3	9	Muito Rara
<i>Mandevilla sanderi</i> (Hemsl.) Woodson.	3	9	Muito Rara
<i>Mandevilla splendens</i> (Hook. f.) Woodson	3	9	Muito Rara
<i>Musschia wollastonii</i> Lowe	3	9	Muito Rara
<i>Myoporum tenuifolium</i> Forst. f.	3	6	Muito Rara
<i>Narcissus pseudonarcissus</i> L.	3	9	Muito Rara
<i>Nymphaea capensis</i> Thunb.	3	9	Muito Rara
<i>Oenothera fruticosa</i> L.	3	9	Muito Rara
<i>Olea maderensis</i> (Lowe) Rivas Mart. & Del Arco	3	9	Muito Rara
<i>Opuntia brasiliensis</i> (Willd.) Haw.	3	9	Muito Rara
<i>Opuntia compressa</i> (Salisb.) Macbr.	3	9	Muito Rara
<i>Opuntia monacantha</i> (Willd.) Haw. f. <i>variegata</i>	3	9	Muito Rara
<i>Opuntia tuna</i> (L.) Mill.	3	9	Muito Rara
<i>Origanum majorana</i> L.	3	9	Muito Rara
<i>Pachira insignis</i> (Sw.) Savigny	3	9	Muito Rara
<i>Papaver somniferum</i> L.	3	9	Muito Rara
<i>Paphiopedilum insigne</i> (Wallich ex Lindl.) Pfitz.	3	9	Muito Rara
<i>Pelargonium graveolens</i> L' Hérít	3	9	Muito Rara
<i>Pelargonium inquinans</i> (L.) L' Hérít	3	9	Muito Rara
<i>Pericallis aurita</i> (L' Hérít.) B. Nord.	3	9	Muito Rara
<i>Phlomis fruticosa</i> L.	3	9	Muito Rara
<i>Phyllanthus arbuscula</i> (Sw.) J. F. Gmel.	3	9	Muito Rara
<i>Pilea ummularifolia</i> (Sw.) Wedd.	3	9	Muito Rara
<i>Pinus halepensis</i> Mill.	3	9	Muito Rara
<i>Pittosporum coriaceum</i> Dryand. ex Ainton	3	9	Muito Rara
<i>Plumeria alba</i> L.	3	9	Muito Rara
<i>Pouteria sapota</i> (Jacq.) Moore & Steam	3	9	Muito Rara
<i>Primula vulgaris</i> Huds.	3	9	Muito Rara
<i>Prunus laurocerasus</i> L.	3	9	Muito Rara
<i>Quercus suber</i> L.	3	9	Muito Rara
<i>Ranunculus cortusifolius</i> Willd. var. <i>major</i> Lowe	3	9	Muito Rara
<i>Reinwardtia indica</i> Dumort.	3	9	Muito Rara
<i>Rhamnus glandulosa</i> Ait.	3	9	Muito Rara

<i>Taxon</i>	Espaços Verdes em que ocorre	Espaços Verdes (%)	Classe
<i>Rhododendron ponticum</i> L.	3	9	Muito Rara
<i>Ruellia makoyana</i> hort. Makoy ex Closon	3	9	Muito Rara
<i>Ruscus aculeatus</i> L.	3	9	Muito Rara
<i>Ruta chapelensis</i> L.	3	9	Muito Rara
<i>Salvia elegans</i> Vahl.	3	9	Muito Rara
<i>Salvia microphylla</i> Kunth.	3	9	Muito Rara
<i>Scadoxus puniceus</i> (L.) Friis & Nordal.	3	9	Muito Rara
<i>Sisyrinchium striatum</i> Sm.	3	9	Muito Rara
<i>Solanum seaforthianum</i> Andrews	3	9	Muito Rara
<i>Sonchus ustulatus</i> Lowe ssp. <i>maderensis</i> Aldridge	3	9	Muito Rara
<i>Stephanotis floribunda</i> (R. Br.) Brongn.	3	9	Muito Rara
<i>Syzygium malaccense</i> (L.) Merril & Perry	3	9	Muito Rara
<i>Syzygium paniculatum</i> Gaertn.	3	9	Muito Rara
<i>Tecomanthe dendrophila</i> (Bl.) Schum.	3	9	Muito Rara
<i>Tetragonia tetragonioides</i> (Pallas) O. Ktze.	3	9	Muito Rara
<i>Thunbergia erecta</i> (Benth.) Anderson	3	9	Muito Rara
<i>Thunbergia gregorii</i> S. Moore	3	9	Muito Rara
<i>Tilia tomentosa</i> Moench.	3	9	Muito Rara
<i>Tilia x vulgaris</i> Hayne.	3	9	Muito Rara
<i>Tradescantia cerinthoides</i> Kunth.	3	9	Muito Rara
<i>Trifolium repens</i> L.	3	9	Muito Rara
<i>Trochetopsis ebenus</i> Q.C.B. Cronk	3	9	Muito Rara
<i>Verbena rigida</i> Spreng.	3	9	Muito Rara
<i>Vicia sativa</i> L.	3	9	Muito Rara
<i>Visnea mocanera</i> L. f.	3	9	Muito Rara
<i>Vriesea splendens</i> (Brongn.) Lem.	3	9	Muito Rara
<i>Wisteria floribunda</i> (Willd.) DC	3	9	Muito Rara
<i>Zinnia elegans</i> Jacq.	3	9	Muito Rara
<i>Acacia dealbata</i> Link.	4	12	Rara
<i>Acacia longifolia</i> (Andrews) Willd.	4	12	Rara
<i>Acalypha godseffiana</i> hort. Sander ex Mast.	4	12	Rara
<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	4	12	Rara
<i>Achillea millefolium</i> L.	4	12	Rara
<i>Adiantum radianum</i> C. Presl.	4	12	Rara
<i>Agonis flexuosa</i> (Willd.) Sweet.	4	12	Rara
<i>Allium triquetrum</i> L.	4	12	Rara
<i>Aloysia triphylla</i> (L'Hérit) Britt.	4	12	Rara
<i>Aquilegia alpina</i> L.	4	12	Rara
<i>Araujia sericifera</i> Brot.	4	12	Rara
<i>Argyranthemum haematomma</i> (Lowe) Lowe	4	12	Rara
<i>Asclepias fruticosa</i> L.	4	12	Rara
<i>Bauhinia galpinii</i>	4	12	Rara
<i>Bauhinia x blakeana</i> Dunn.	4	12	Rara
<i>Bituminaria bituminosa</i> (L.) C. H. Stirt.	4	12	Rara
<i>Blechnum gibbum</i> (Labill.) Mett.	4	12	Rara
<i>Brachychiton populneus</i> R. Br.	4	12	Rara
<i>Brahea armata</i> S. Wats.	4	12	Rara
<i>Callisia fragrans</i> (Lindl.) Wood.	4	12	Rara
<i>Calodendrum capense</i> (L. f.) Thunb.	4	12	Rara
<i>Calycanthus floridus</i> L.	4	12	Rara
<i>Caryota mitis</i> Lour.	4	12	Rara
<i>Castanea sativa</i> Mill.	4	12	Rara
<i>Cedrus libani</i> A. Rich. ssp. <i>atlantica</i> (Endl.) Battand. & Trabut	4	12	Rara
<i>Celosia argentea</i> L.	4	12	Rara
<i>Centratherum muticum</i> (Humb., Bonpl. & Kunth) Less.	4	12	Rara
<i>Cestrum nocturnum</i> L.	4	12	Rara
<i>Chamaedorea costaricana</i> Oerst	4	12	Rara
<i>Clerodendrum thomsoniae</i> Balf. f.	4	12	Rara
<i>Coelogyne cristata</i> Lindl.	4	12	Rara
<i>Convolvulus cneorum</i> L.	4	12	Rara
<i>Cordyline indivisa</i> (Forst.) Steud.	4	12	Rara
<i>Coronilla valentina</i> L. ssp. <i>glauca</i> (L.) Battand.	4	12	Rara
<i>Crassula tetragona</i> L.	4	12	Rara
<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	4	12	Rara
<i>Cupressus funebris</i> Endl.	4	12	Rara
<i>Dahlia imperialis</i> Roetzl. ex Ortgies.	4	12	Rara
<i>Dais cotinifolia</i> L.	4	12	Rara
<i>Dasyliion serratifolium</i> Karw. ex Schult. F.	4	12	Rara
<i>Delairea odorata</i> Lem.	4	12	Rara
<i>Dieffenbachia seguine</i> (Jacq.) Schott.	4	12	Rara
<i>Echeveria elegans</i> Rose.	4	12	Rara
<i>Erica arborea</i> L.	4	12	Rara
<i>Eriocephalus africanus</i> L.	4	12	Rara

Taxon	Espaços Verdes em que ocorre	Espaços Verdes (%)	Classe
<i>Erysimum bicolor</i> (Homem.) DC.	4	12	Rara
<i>Eucalyptus sideroxylon</i> A. Cunn. ex Wools	4	12	Rara
<i>Euphorbia canariensis</i> L.	4	12	Rara
<i>Euphorbia mellifera</i> Ait.	4	12	Rara
<i>Fagus sylvatica</i> L. var. <i>purpurea</i> (Ait.) Schneid.	4	12	Rara
<i>Festuca elatior</i> L.	4	12	Rara
<i>Ficus aspera</i> Forst. f.	4	12	Rara
<i>Ficus binnendykii</i> (Miq.) Miq.	4	12	Rara
<i>Freesia alba</i> (G. L. Mey.) Gumbel.	4	12	Rara
<i>Gardenia augusta</i> (L.) Merrill	4	12	Rara
<i>Gasteria pillansii</i> Kensit.	4	12	Rara
<i>Grevillea rosmarinifolia</i> A. Cunn.	4	12	Rara
<i>Hebe salicifolia</i> (Forst. f.) Pennell	4	12	Rara
<i>Heliotropium arborescens</i> L.	4	12	Rara
<i>Hibiscus hastatus</i> L. f.	4	12	Rara
<i>Homalocladium platycladum</i> (F. Muell.) L.H. Bail.	4	12	Rara
<i>Howea belmoreana</i> (C. Moore & F. Muell.) Becc.	4	12	Rara
<i>Hyparrhenia hirta</i> (L.) Stapf	4	12	Rara
<i>Ilex perado</i> Ait.	4	12	Rara
<i>Impatiens sodenii</i> Engl. & Warb. ex Engl.	4	12	Rara
<i>Lochroma cyanea</i> (Lindl.) Green.	4	12	Rara
<i>Ipomoea purpurea</i> (L.) Roth.	4	12	Rara
<i>Isoplexis sceptum</i> (L. f.) Loud.	4	12	Rara
<i>Ixia maculata</i> L.	4	12	Rara
<i>Juniperus chinensis</i> L.	4	12	Rara
<i>Lagunaria patersonii</i> (Anderss) G. Don.	4	12	Rara
<i>Lavandula angustifolia</i> Mill.	4	12	Rara
<i>Lycianthes rantonnetii</i> Carr.	4	12	Rara
<i>Malus pumila</i> Mill.	4	12	Rara
<i>Marcelia maderensis</i> (Bornm.) Svent.	4	12	Rara
<i>Matthiola maderensis</i> Lowe	4	12	Rara
<i>Melaleuca hypericifolia</i> Sm.	4	12	Rara
<i>Melanoselinum decipiens</i> (Schrad. & Wendl.) Hoffm.	4	12	Rara
<i>Nandina domestica</i> Thunb.	4	12	Rara
<i>Nephrolepis exaltata</i> (L.) Schott.	4	12	Rara
<i>Nymphaea alba</i> L.	4	12	Rara
<i>Ocimum basilicum</i> L.	4	12	Rara
<i>Ophiopogon jaburan</i> (Kunth) Lodd	4	12	Rara
<i>Opuntia microdasys</i> (Lehm.) Pfeiff. var. <i>albispina</i>	4	12	Rara
<i>Opuntia robusta</i> Wendl. & Pfeiff.	4	12	Rara
<i>Ornithogalum thyrsoides</i> Jacq.	4	12	Rara
<i>Pachypodium lamerei</i> Drake	4	12	Rara
<i>Parietaria judaica</i> L.	4	12	Rara
<i>Passiflora mollissima</i> (HBK.) L. H. Bail.	4	12	Rara
<i>Pelargonium cucullatum</i> (L.) L'Hérit	4	12	Rara
<i>Photinia x fraseri</i> Dress	4	12	Rara
<i>Phyllis nobla</i> L.	4	12	Rara
<i>Pittosporum tenuifolium</i> Banks & Sol.	4	12	Rara
<i>Plantago maderensis</i> Decne.	4	12	Rara
<i>Plectranthus argentatus</i> S. T. Blake	4	12	Rara
<i>Plectranthus ecklonii</i> Benth.	4	12	Rara
<i>Plumeria rubra</i> L. (Poir.) Woodson	4	12	Rara
<i>Podocarpus salignus</i> D. Don.	4	12	Rara
<i>Prunus cerasifera</i> Ehrh.	4	12	Rara
<i>Prunus persica</i> (L.) Batsch.	4	12	Rara
<i>Pycnostachys urticifolia</i> Hook.	4	12	Rara
<i>Radermachera sinica</i> (Hance) Hemsl.	4	12	Rara
<i>Rhododendron arboreum</i> Sm.	4	12	Rara
<i>Sabal palmetto</i> (Walt.) Lodd. ex Schult. & Schult. f.	4	12	Rara
<i>Salix x rubens</i> Schrank.	4	12	Rara
<i>Salvia involucrata</i> Cav.	4	12	Rara
<i>Salvia officinalis</i> L.	4	12	Rara
<i>Schefflera elegantissima</i> (Veitch ex Mast.) Lowry & Frodin	4	12	Rara
<i>Sedum pachyphyllum</i> Rose	4	12	Rara
<i>Senecio tamoides</i> DC.	4	12	Rara
<i>Senna spectabilis</i> (DC.) Irwin & Bameby	4	12	Rara
<i>Syngonium wendlandii</i> Schott.	4	12	Rara
<i>Teucrium abutiloides</i> L' Hérít.	4	12	Rara
<i>Teucrium betonicum</i> L' Hérít	4	12	Rara
<i>Thymus vulgaris</i> L.	4	12	Rara
<i>Tillandsia cyanea</i> Lindl. ex K. Koch.	4	12	Rara
<i>Tillandsia tenuifolia</i> L.	4	12	Rara
<i>Umbilicus rupestris</i> (Salisb.) Dandly	4	12	Rara

<i>Taxon</i>	Espaços Verdes em que ocorre	Espaços Verdes (%)	Classe
<i>Vaccinium padifolium</i> J. E. Sm. ex Ress	4	12	Rara
<i>Vitex agnus-castus</i> L.	4	12	Rara
<i>Vitis vinifera</i> L.	4	12	Rara
<i>Watsonia borbonica</i> (Pourr.) Goldbl. ssp. <i>ardernei</i> (Sander) Goldbl.	4	12	Rara
<i>Weigela florida</i> (Bunge) A. D.C.	4	12	Rara
<i>Acer palmatum</i> Thunb.	5	15	Rara
<i>Albizia julibrissin</i> Durazz.	5	15	Rara
<i>Aloe ferox</i> Mill.	5	15	Rara
<i>Aloe rupestris</i> Bak.	5	15	Rara
<i>Arbutus unedo</i> L.	5	15	Rara
<i>Asclepias curassavica</i> L.	5	15	Rara
<i>Asparagus umbellatus</i> Link ssp. <i>lowei</i> Kunth	5	15	Rara
<i>Aucuba japonica</i> Thunb.	5	15	Rara
<i>Baeckea virgata</i> (Forst. & Forst. f.) Andrews.	5	15	Rara
<i>Brugmansia arborea</i> (L.) Lagerh.	5	15	Rara
<i>Buddleja davidii</i> Franch.	5	15	Rara
<i>Calliandra tweedii</i> Benth.	5	15	Rara
<i>Carica papaya</i> L.	5	15	Rara
<i>Carpobrotus edulis</i> (L.) L. Bol.	5	15	Rara
<i>Ceratonia siliqua</i> L.	5	15	Rara
<i>Cestrum aurantiacum</i> Lindl.	5	15	Rara
<i>Chelidonium majus</i> L.	5	15	Rara
<i>Clytostoma callistigioides</i> Bur. & Schum.	5	15	Rara
<i>Cosmos bipinnatus</i> Cav.	5	15	Rara
<i>Cotyledon orbiculata</i> L.	5	15	Rara
<i>Cymbopogon citratus</i> (DC. ex Nees) Stapf.	5	15	Rara
<i>Cyperus papyrus</i> L.	5	15	Rara
<i>Cyphomandra crassicaulis</i> (Ortega) Kuntze	5	15	Rara
<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link	5	15	Rara
<i>Dianthus barbatus</i> L.	5	15	Rara
<i>Dichondra micrantha</i> Urban.	5	15	Rara
<i>Dietes bicolor</i> (Steud.) Klatt.	5	15	Rara
<i>Erigeron karvinskianus</i> DC.	5	15	Rara
<i>Ficus lyrata</i> Warb.	5	15	Rara
<i>Fuchsia boliviana</i> Carr.	5	15	Rara
<i>Guzmania lingulata</i> Mez	5	15	Rara
<i>Hebe x franciscana</i> (Eastw.) Souster.	5	15	Rara
<i>Hedera maderensis</i> K. Koch ex A. Rutherf. ssp. <i>maderensis</i>	5	15	Rara
<i>Hibbertia scandens</i> (Willd.) Dryand.	5	15	Rara
<i>Hibiscus elatus</i> Swartz	5	15	Rara
<i>Hymenocallis littoralis</i> (Jacq.) Salisb.	5	15	Rara
<i>Ilex canariensis</i> Poir.	5	15	Rara
<i>Iris japonica</i> Thunb.	5	15	Rara
<i>Kniphofia uvaria</i> (L.) Oken.	5	15	Rara
<i>Lysimachia nummularia</i> L.	5	15	Rara
<i>Melaleuca armilaris</i> (Sol. ex Gaertn.) Sm.	5	15	Rara
<i>Melianthus major</i> L.	5	15	Rara
<i>Michelia figo</i> (Lour.) Spreng	5	15	Rara
<i>Monizia edulis</i> Lowe	5	15	Rara
<i>Neodypsis decaryi</i> Jumelle	5	15	Rara
<i>Neoregelia johannis</i> (Carrière) L. B. Smith.	5	15	Rara
<i>Nothoscordum gracile</i> (Ait.) Stearn.	5	15	Rara
<i>Opuntia cylindrica</i> (Lam.) DC.	5	15	Rara
<i>Opuntia ficus-indica</i> (L.) Mill.	5	15	Rara
<i>Pelargonium quercifolium</i> (L.) L'Hérit.	5	15	Rara
<i>Pentas lanceolata</i> (Forssk.) Defflers.	5	15	Rara
<i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) A. W. Hill.	5	15	Rara
<i>Philodendron pinnatifidum</i> Schott.	5	15	Rara
<i>Phyllostachys nigra</i> (Lodd. Ex Lindl.) Munro	5	15	Rara
<i>Plantago major</i> L.	5	15	Rara
<i>Protea neriifolia</i> R. Br.	5	15	Rara
<i>Prunus hixa</i> Willd.	5	15	Rara
<i>Prunus x domestica</i> L.	5	15	Rara
<i>Ravenala madagascariensis</i> Sonn.	5	15	Rara
<i>Ricinus communis</i> L.	5	15	Rara
<i>Rivina humilis</i> L.	5	15	Rara
<i>Rosa banksiae</i> Ait.	5	15	Rara
<i>Rumohra adiantiformis</i> (Forst. f.) Ching.	5	15	Rara
<i>Salix babilonica</i> L.	5	15	Rara
<i>Salvia sessei</i> Benth.	5	15	Rara
<i>Santolina chamaecyparissus</i> L.	5	15	Rara
<i>Sibthorbia peregrina</i> L.	5	15	Rara
<i>Solanum jasminoides</i> Paxt.	5	15	Rara

<i>Taxon</i>	Espaços Verdes em que ocorre	Espaços Verdes (%)	Classe
<i>Sonchus pinnatus</i> Ait.	5	15	Rara
<i>Stachys byzantina</i> K. Koch	5	15	Rara
<i>Strobilanthes kunthianus</i> T. Anders ex Benth.	5	15	Rara
<i>Tanacetum parthenium</i> (L.) Schultz-Bip.	5	15	Rara
<i>Taxus baccata</i> L.	5	15	Rara
<i>Tetrapanax papyrifer</i> (Hook.) K. Kock.	5	15	Rara
<i>Teucrium fruticans</i> L.	5	15	Rara
<i>Tithonia diversifolia</i> (Hemsl.) A. Gray.	5	15	Rara
<i>Trachelium caeruleum</i> L.	5	15	Rara
<i>Zamia furfuracea</i> L. f. in Aiton	5	15	Rara
<i>Acacia melanoxylon</i> R. Br.	6	18	Rara
<i>Aechmea nudicaulis</i> (L.) Griseb.	6	18	Rara
<i>Alcea rosea</i> L.	6	18	Rara
<i>Aloe capitata</i> Bak.	6	18	Rara
<i>Aloe excelsa</i> A. Berger.	6	18	Rara
<i>Ananas comosus</i> (L.) Merr.	6	18	Rara
<i>Anemone hupehensis</i> Lem.	6	18	Rara
<i>Argyranthemum dissectum</i> (Lowe) Lowe	6	18	Rara
<i>Artemisia argentea</i> L'Hérit.	6	18	Rara
<i>Asplenium nidus</i> L.	6	18	Rara
<i>Brugmansia aurea</i> Lagerh.	6	18	Rara
<i>Brugmansia x candida</i> Pers.	6	18	Rara
<i>Cereus uruguayanus</i> Kiesling	6	18	Rara
<i>Coffea arabica</i> L.	6	18	Rara
<i>Crinum x powellii</i> L. H. Bail.	6	18	Rara
<i>Cupressus arizonica</i> Green.	6	18	Rara
<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.	6	18	Rara
<i>Dietes iridioides</i> (L.) Klatt.	6	18	Rara
<i>Echinocactus grusonii</i> Hildm.	6	18	Rara
<i>Echium candicans</i> L. f.	6	18	Rara
<i>Encephalartos lehmannii</i> Lehm.	6	18	Rara
<i>Epidendrum ibaguense</i> HBK	6	18	Rara
<i>Erica platycodon</i> ssp. <i>madericola</i> (D. C. McClint.) Rivas Mart. & al.	6	18	Rara
<i>Euryops chrysanthemoides</i> (DC.) R. Nordenstam	6	18	Rara
<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	6	18	Rara
<i>Fuchsia arborescens</i> Sims.	6	18	Rara
<i>Fuchsia magellanica</i> Lam.	6	18	Rara
<i>Geranium robertianum</i> L.	6	18	Rara
<i>Globularia salicina</i> Lam.	6	18	Rara
<i>Hedera canariensis</i> Willd.	6	18	Rara
<i>Hibiscus schizopetalus</i> (Mast.) Hook.	6	18	Rara
<i>Hymenosporum flavum</i> (Hook.) F. Muell.	6	18	Rara
<i>Ilex x altaclarensis</i> (hort. ex Loud.) Dallim.	6	18	Rara
<i>Iris germanica</i> L.	6	18	Rara
<i>Jasminum mesnyi</i> Hance.	6	18	Rara
<i>Jasminum odoratissimum</i> L.	6	18	Rara
<i>Justicia brandegeana</i> Wassh.	6	18	Rara
<i>Lampranthus aurantiacus</i> (DC.) Swantes	6	18	Rara
<i>Lampranthus multiradiatus</i> (Jacq.) N. E. Br.	6	18	Rara
<i>Leonotis leonurus</i> (L.) R. Br.	6	18	Rara
<i>Leucadendron salignum</i> Bergius x <i>L. laeureolum</i> (Lam.) Fourc.	6	18	Rara
<i>Ligustrum obtusifolium</i> Sieb. & Zucc.	6	18	Rara
<i>Livistona australis</i> (R. Br.) Mart.	6	18	Rara
<i>Lobelia erinus</i> L.	6	18	Rara
<i>Lonchocarpus sericeus</i> (Poir.) Kunth ex DC.	6	18	Rara
<i>Macfadyena unguis-cati</i> (L.) A. Gentry	6	18	Rara
<i>Mandevilla boliviensis</i> (Hook. f.) Woodson	6	18	Rara
<i>Mentha spicata</i> L.	6	18	Rara
<i>Morus nigra</i> L.	6	18	Rara
<i>Nicotiana glauca</i> Grah.	6	18	Rara
<i>Persea indica</i> (L.) Spreng.	6	18	Rara
<i>Petrea volubilis</i> L.	6	18	Rara
<i>Pinus canariensis</i> C. Sm.	6	18	Rara
<i>Podranea ricasoliana</i> (Tanf.) Sprague.	6	18	Rara
<i>Polypodium macaronicum</i> A. E. Bobrov.	6	18	Rara
<i>Pyracantha coccinea</i> Roem.	6	18	Rara
<i>Sambucus lanceolata</i> R. Br. In Buch.	6	18	Rara
<i>Senna corymbosa</i> (Lamk.) Irwin & Bameby	6	18	Rara
<i>Stenocarpus sinuatus</i> Endl.	6	18	Rara
<i>Syngonium podophyllum</i> Shott.	6	18	Rara
<i>Thunbergia grandiflora</i> (Roxb. ex Rottl.) Roxb.	6	18	Rara
<i>Tropaeolum majus</i> L.	6	18	Rara
<i>Verbena x hybrida</i> Groenl. & Ruempl.	6	18	Rara

<i>Taxon</i>	Espaços Verdes em que ocorre	Espaços Verdes (%)	Classe
<i>Vinca major</i> L.	6	18	Rara
<i>Wigandia caracasana</i> HBK.	6	18	Rara
<i>Acacia mearnsii</i> De Wildeman.	7	21	Rara
<i>Aechmea fulgens</i> Brongn. var. <i>discolor</i> (Morr.) Brongn. ex Bak.	7	21	Rara
<i>Allamanda cathartica</i> L.	7	21	Rara
<i>Angiopteris evecta</i> (Forst.) Hoffm.	7	21	Rara
<i>Aptenia cordifolia</i> (L. f.) Schwant.	7	21	Rara
<i>Bougainvillea spectabilis</i> Willd.	7	21	Rara
<i>Brachychiton x hybridus</i> hort.	7	21	Rara
<i>Breynia nívosa</i> (W.G. Sm.) Small.	7	21	Rara
<i>Capsicum frutescens</i> L.	7	21	Rara
<i>Cedrus deodara</i> (D. Don) G. Don.	7	21	Rara
<i>Christella dentata</i> (Forssk.) Brownsey & Jermy	7	21	Rara
<i>Clerodendrum splendens</i> G. Don ex James	7	21	Rara
<i>Clethra arborea</i> Ait.	7	21	Rara
<i>Crococsmia x crocosmiiflora</i> (Burb. & Dean) N.E. Br.	7	21	Rara
<i>Ctenanthe setosa</i> (Roscoe) Eichl.	7	21	Rara
<i>Dombeya cacuminum</i> HOCHR.	7	21	Rara
<i>Doryanthes palmeri</i> W. Hill.	7	21	Rara
<i>Duchesnea indica</i> (Andrews) Focke.	7	21	Rara
<i>Encephalartos transvenosus</i> Stapf & Burt Davy.	7	21	Rara
<i>Ensete ventricosum</i> (Welw.) E.E. Cheesm.	7	21	Rara
<i>Escallonia bifida</i> Link & Otto	7	21	Rara
<i>Fagus sylvatica</i> L.	7	21	Rara
<i>Festuca glauca</i> Vill.	7	21	Rara
<i>Furcraea foetida</i> (L.) Haw.	7	21	Rara
<i>Hibiscus mutabilis</i> L.	7	21	Rara
<i>Hippesatrum vittatum</i> (L' Hérít) Herb.	7	21	Rara
<i>Impatiens hawkeri</i> Bull.	7	21	Rara
<i>Jasminum azoricum</i> L.	7	21	Rara
<i>Kalanchoe daigremontiana</i> Hamet & Perrier	7	21	Rara
<i>Kohleria eriantha</i> (Benth.) Hanst.	7	21	Rara
<i>Lampranthus spectabilis</i> (Haw.) N.E. Br.	7	21	Rara
<i>Lavandula pinnata</i> L. f.	7	21	Rara
<i>Lilium candidum</i> L.	7	21	Rara
<i>Liriodendron tulipifera</i> L.	7	21	Rara
<i>Maytenus umbellata</i> (R. Br.) Mabb.	7	21	Rara
<i>Mirabilis jalapa</i> L.	7	21	Rara
<i>Musa acuminata</i> Colla	7	21	Rara
<i>Musa velutina</i> Wendl. & Drude.	7	21	Rara
<i>Oxalis latifolia</i> HBK.	7	21	Rara
<i>Oxalis pes-caprae</i> L.	7	21	Rara
<i>Parthenocissus tricuspidata</i> Planchon	7	21	Rara
<i>Phyllostachys bambusoides</i> Sieb. & Zucc.	7	21	Rara
<i>Pinus pinaster</i> Ait.	7	21	Rara
<i>Pistia stratiotes</i> L.	7	21	Rara
<i>Rosa x damascena</i> Mill. var. <i>semperflorens</i> (Duhamel) Rowley	7	21	Rara
<i>Saccharum officinarum</i> L.	7	21	Rara
<i>Salvia coccinea</i> Juss. ex Murray	7	21	Rara
<i>Schinus terebinthifolius</i> Raddi	7	21	Rara
<i>Sideroxylon mirmulans</i> Banks ex Lowe	7	21	Rara
<i>Solandra maxima</i> (Sessé & Moc.) P. Green	7	21	Rara
<i>Solanum mauritianum</i> Scop.	7	21	Rara
<i>Sophora japonica</i> L.	7	21	Rara
<i>Teline maderensis</i> Webb et Berth. var. <i>maderensis</i>	7	21	Rara
<i>Thuja occidentalis</i> L.	7	21	Rara
<i>Viola riviniana</i> Rchb.	7	21	Rara
<i>Viola x witrockiana</i> Gams.	7	21	Rara
<i>Abutilon grandifolium</i> (Willd.) Sweet	8	24	Rara
<i>Abutilon pictum</i> (Gillies ex Hook. & Arn.) Walp.	8	24	Rara
<i>Abutilon x hybridum</i> hort.	8	24	Rara
<i>Ageratina riparia</i> (Reg.) R. King. & H. Robinson	8	24	Rara
<i>Aloe mitriformis</i> Mill.	8	24	Rara
<i>Alstroemeria ligtu</i> L.	8	24	Rara
<i>Alstroemeria psittacina</i> Lehm.	8	24	Rara
<i>Amaryllis belladonna</i> L.	8	24	Rara
<i>Araucaria columnaris</i> (Forst. f.) Hook.	8	24	Rara
<i>Arctotis x hybrida</i> hort.	8	24	Rara
<i>Arundo donax</i> L.	8	24	Rara
<i>Butia capitata</i> (Mart.) Becc.	8	24	Rara
<i>Chasmanthe aethiopica</i> (L.) N. E. Br.	8	24	Rara
<i>Cinnamomum zeylanicum</i> Bl.	8	24	Rara
<i>Corynocarpus laevigatus</i> Forst. & Forst. f.	8	24	Rara

<i>Taxon</i>	Espaços Verdes em que ocorre	Espaços Verdes (%)	Classe
<i>Cryptomeria japonica</i> D. Don	8	24	Rara
<i>Ctenanthe lubbersiana</i> (E. Morr.) Eichl.	8	24	Rara
<i>Cycas circinalis</i> L.	8	24	Rara
<i>Cymbalaria muralis</i> P. Gaertn., Mey. & Scherb.	8	24	Rara
<i>Davallia canariensis</i> (L.) Sm.	8	24	Rara
<i>Eichhornia crassipes</i> (Mart.) Solms-Laub.	8	24	Rara
<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.	8	24	Rara
<i>Euphorbia grandicornis</i> Goebel.	8	24	Rara
<i>Euphorbia nerifolia</i> L.	8	24	Rara
<i>Euphorbia piscatoria</i> Ait	8	24	Rara
<i>Ginkgo biloba</i> L.	8	24	Rara
<i>Hemerocallis fulva</i> L.	8	24	Rara
<i>Ipomoea indica</i> (Burm.) Merrill	8	24	Rara
<i>Juniperus cedrus</i> ssp. <i>maderensis</i> (Menezes) Rivas Mart. & al.	8	24	Rara
<i>Kniphofia x praecox</i> Bak.	8	24	Rara
<i>Lantana montevidensis</i> (Spreng.) Briq.	8	24	Rara
<i>Lavandula dentata</i> L.	8	24	Rara
<i>Matthiola incana</i> (L.) R. Br.	8	24	Rara
<i>Melia azederach</i> L.	8	24	Rara
<i>Pandanus utilis</i> Bory	8	24	Rara
<i>Pelargonium x hortorum</i> L. H. Bail.	8	24	Rara
<i>Platanus x acerifolia</i> (Ait.) Willd.	8	24	Rara
<i>Platycladus orientalis</i> (L. f.) Franco	8	24	Rara
<i>Polygala myrtifolia</i> L.	8	24	Rara
<i>Quercus rubra</i> L.	8	24	Rara
<i>Rhaphiolepis umbellata</i> (Thunb.) Mak.	8	24	Rara
<i>Rhapis excelsa</i> (Thunb.) Henry.	8	24	Rara
<i>Rosa laevigata</i> Micchx.	8	24	Rara
<i>Scilla maderensis</i> Mnzs.	8	24	Rara
<i>Sequoia sempervirens</i> (D. Don) Endl	8	24	Rara
<i>Sobralia macrantha</i> Lindl.	8	24	Rara
<i>Sonchus fruticosus</i> L.fil	8	24	Rara
<i>Spathiphyllum walisii</i> Reg.	8	24	Rara
<i>Trachycarpus fortunei</i> (Hook.) H. A. Wendl.	8	24	Rara
<i>Aeonium arboreum</i> (L.) Webb. & Berth.	9	27	Frequente
<i>Aloe plicatilis</i> (L.) Mill.	9	27	Frequente
<i>Alpinia zerumbet</i> (Pers.) B. L. Burt & Rosemary M. Sm.	9	27	Frequente
<i>Anredera cordifolia</i> (Ten.) Steenis	9	27	Frequente
<i>Anthurium andraeanum</i> André.	9	27	Frequente
<i>Antirrhinum majus</i> L.	9	27	Frequente
<i>Asparagus asparagoides</i> (L.) Druce	9	27	Frequente
<i>Bambusa vulgaris</i> Schräd. ex Wendl.	9	27	Frequente
<i>Buxus microphylla</i> Sieb. & Zucc.	9	27	Frequente
<i>Callistemon citrinus</i> (Curtis) Skeels.	9	27	Frequente
<i>Cercis siliquastrum</i> L.	9	27	Frequente
<i>Cestrum roseum</i> HBK.	9	27	Frequente
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> (Murray) Parl.	9	27	Frequente
<i>Chambeyronia macrocarpa</i> (Brongn.) Vieill. ex Becc.	9	27	Frequente
<i>Citrus limon</i> (L.) Burm.	9	27	Frequente
<i>Crinum moorei</i> Hook. f.	9	27	Frequente
<i>Cyathea australis</i> (R. Br.) Domin	9	27	Frequente
<i>Dendranthema x grandiflorum</i> Kitam.	9	27	Frequente
<i>Dicksonia antarctica</i> Labill.	9	27	Frequente
<i>Emilia coccinea</i> (Sims) D. Don.	9	27	Frequente
<i>Eucalyptus ficifolia</i> F. Muell.	9	27	Frequente
<i>Euonymus japonicus</i> Thunb.	9	27	Frequente
<i>Fuchsia triphylla</i> L.	9	27	Frequente
<i>Helichrysum bracteatum</i> (Vent.) Andrews	9	27	Frequente
<i>Jasminum polyanthum</i> Franch.	9	27	Frequente
<i>Justicia carnea</i> Lindl.	9	27	Frequente
<i>Malvaviscus arboreus</i> Cav.	9	27	Frequente
<i>Narcissus tazetta</i> L.	9	27	Frequente
<i>Neoregelia caroliniae</i> (Beer) L. B.	9	27	Frequente
<i>Pericallis x hybrida</i> R. Nordenstam	9	27	Frequente
<i>Petunia x hybrida</i> hort. Vilm.-Andr.	9	27	Frequente
<i>Philodendron bipinnatifidum</i> Endl.	9	27	Frequente
<i>Portulacaria afra</i> Jacq.	9	27	Frequente
<i>Psidium littorale</i> Raddi	9	27	Frequente
<i>Quercus ilex</i> L.	9	27	Frequente
<i>Quercus robur</i> L.	9	27	Frequente
<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	9	27	Frequente
<i>Rudbeckia fulgida</i> Ait.	9	27	Frequente
<i>Russelia equisetiformis</i> Södl. & Cham.	9	27	Frequente

Taxon	Espaços Verdes em que ocorre	Espaços Verdes (%)	Classe
<i>Salix canariensis</i> C. Sm. ex Link	9	27	Frequente
<i>Salvia guaranitica</i> St.-Hil. ex Benth.	9	27	Frequente
<i>Salvia leucantha</i> Cav.	9	27	Frequente
<i>Senecio serpens</i> G. Rowley	9	27	Frequente
<i>Tetradenia riparia</i> (Hochst.) Codd.	9	27	Frequente
<i>Tradescantia fluminensis</i> Vell. Conc.	9	27	Frequente
<i>Tradescantia spathacea</i> Sw.	9	27	Frequente
<i>Yushania anceps</i> (Mitford) Yi.	9	27	Frequente
<i>Acacia sellowiana</i> (O. Berg.) Burret	10	30	Frequente
<i>Aechmea fasciata</i> (Lindl.) Bak.	10	30	Frequente
<i>Aeonium glutinosum</i> (Ait.)	10	30	Frequente
<i>Agave angustifolia</i> Haw.	10	30	Frequente
<i>Aloe ciliaris</i> Haw.	10	30	Frequente
<i>Alternanthera ficoidea</i> (L.) R. Br.	10	30	Frequente
<i>Aspidistra elatior</i> Bl.	10	30	Frequente
<i>Citrus sinensis</i> (L.) Osbeck	10	30	Frequente
<i>Colocasia esculenta</i> (L.) Schott	10	30	Frequente
<i>Cotoneaster pannosus</i> Franch.	10	30	Frequente
<i>Crassula multicava</i> Lem.	10	30	Frequente
<i>Cuphea hyssopifolia</i> HBK.	10	30	Frequente
<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartw. ex Gordon	10	30	Frequente
<i>Cymbidium insignis</i> Rolfe	10	30	Frequente
<i>Deparia petersenii</i> (Kunze) M. Kato.	10	30	Frequente
<i>Dichorisandra thyrsiflora</i> Mikan.	10	30	Frequente
<i>Epipremnum aureum</i> (Lind. & André)	10	30	Frequente
<i>Erythrina speciosa</i> Andrews	10	30	Frequente
<i>Euphorbia tirucalli</i> L.	10	30	Frequente
<i>Euryops pectinatus</i> Cass.	10	30	Frequente
<i>Ficus benjamina</i> L.	10	30	Frequente
<i>Furcraea sellosii</i> K. Koch. var. <i>marginata</i> Trel.	10	30	Frequente
<i>Geranium maderense</i> P. F. Yeo	10	30	Frequente
<i>Ilex aquifolium</i> L.	10	30	Frequente
<i>Iris germanica</i> L. var. <i>florentina</i> (L.) Dykes	10	30	Frequente
<i>Kigelia africana</i> (Lam.) Benth.	10	30	Frequente
<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) De Wit.	10	30	Frequente
<i>Lobularia maritima</i> (L.) Desv.	10	30	Frequente
<i>Lonicera japonica</i> Thunb.	10	30	Frequente
<i>Myrica faya</i> Ait.	10	30	Frequente
<i>Platynerium bifurcatum</i> (Cav.) C. Chr.	10	30	Frequente
<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn.	10	30	Frequente
<i>Pteris tremula</i> R. Br.	10	30	Frequente
<i>Sansevieria trifasciata</i> Prain.	10	30	Frequente
<i>Semele androgyna</i> (L.) Kunth.	10	30	Frequente
<i>Tecoma stans</i> (L.) Juss. ex HBK.	10	30	Frequente
<i>Viburnum tinus</i> L.	10	30	Frequente
<i>Woodwardia radicans</i> (L.) Sm.	10	30	Frequente
<i>Ageratina adenophora</i> (Spreng.) R. King & H. Robinson	11	33	Frequente
<i>Callistemon viminalis</i> (Sol. ex Gaertn.) G. Don ex Loud.	11	33	Frequente
<i>Canna indica</i> L.	11	33	Frequente
<i>Casuarina equisetifolia</i> Forst. & Forst. f.	11	33	Frequente
<i>Chrysalidocarpus lutescens</i> (Bory) Wendl.	11	33	Frequente
<i>Commelina benghalensis</i> L.	11	33	Frequente
<i>Coprosma repens</i> A. Rich.	11	33	Frequente
<i>Ctenanthe oppenheimiana</i> (C. J. Morren) K. Schum.	11	33	Frequente
<i>Dracaena marginata</i> Lam.	11	33	Frequente
<i>Erythrina abyssinica</i> Lam. ex DC.	11	33	Frequente
<i>Euphorbia milli</i> Desmoul.	11	33	Frequente
<i>Euphorbia trigona</i> Mill.	11	33	Frequente
<i>Ficus carica</i> L.	11	33	Frequente
<i>Gerbera jamesonii</i> Bol. ex Adlam.	11	33	Frequente
<i>Hemerocallis dumortieri</i> E. Morr.	11	33	Frequente
<i>Kalanchoe delagouensis</i> Ecklon & Zeyh.	11	33	Frequente
<i>Ligustrum ovalifolium</i> Hassk.	11	33	Frequente
<i>Magnolia x soulangeana</i> Soul. –Bod.	11	33	Frequente
<i>Metrosideros excelsa</i> Sol. ex Gaertn.	11	33	Frequente
<i>Myrtus communis</i> L.	11	33	Frequente
<i>Passiflora edulis</i> Sims	11	33	Frequente
<i>Philodendron erubescens</i> K. Koch & Augustin	11	33	Frequente
<i>Phyllostachis aurea</i> (Carr.) A. & C. Riv.	11	33	Frequente
<i>Pittosporum tobira</i> Ait.	11	33	Frequente
<i>Plectranthus barbatus</i> Andrews	11	33	Frequente
<i>Plectranthus forsteri</i> Benth.	11	33	Frequente
<i>Polygonum capitatum</i> Buch.-Ham. ex D. Don	11	33	Frequente

<i>Taxon</i>	Espaços Verdes em que ocorre	Espaços Verdes (%)	Classe
<i>Roldana petasites</i> (Sims) H. Robinson & Bretell.	11	33	Frequente
<i>Senecio cineraria</i> DC.	11	33	Frequente
<i>Senna didymobotrya</i> (Fres.) Irwin & Barneby.	11	33	Frequente
<i>Senna pendula</i> (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Irwin & Barneby var. <i>glabrata</i> (Vogel) Irwin & Barneby	11	33	Frequente
<i>Solenostemon scutellarioides</i> (L.) Codd.	11	33	Frequente
<i>Spiraea cantoniensis</i> Lour.	11	33	Frequente
<i>Streptosolen jamesonii</i> (Benth.) Miers.	11	33	Frequente
<i>Synadenium grantii</i> Hook. f.	11	33	Frequente
<i>Syzygium jambos</i> (L.) Alston.	11	33	Frequente
<i>Washingtonia robusta</i> Wendl.	11	33	Frequente
<i>Wedelia trilobata</i> (L.) Hitchc.	11	33	Frequente
<i>Acanthus mollis</i> L.	12	36	Frequente
<i>Annona cherimola</i> Mill.	12	36	Frequente
<i>Bauhinia variegata</i> L.	12	36	Frequente
<i>Catharanthus roseus</i> (L.) G. Don.	12	36	Frequente
<i>Cordyline australis</i> (Forst.) Endl.	12	36	Frequente
<i>Cuphea ignea</i> A. DC.	12	36	Frequente
<i>Delonix regia</i> (Bojer) Raf.	12	36	Frequente
<i>Dracaena fragrans</i> (L.) Ker-Gawl.	12	36	Frequente
<i>Euphorbia cotinifolia</i> L.	12	36	Frequente
<i>Euphorbia ingens</i> E. Mey.	12	36	Frequente
<i>Goniophlebium subauriculatum</i> (Bl.) Presl.	12	36	Frequente
<i>Kalanchoe fedtschenkoi</i> Hamet & Perrier	12	36	Frequente
<i>Montanoa bipinnatifida</i> (Kunth) K. Kock	12	36	Frequente
<i>Pilea cadierei</i> Gagnep. & Guillaum.	12	36	Frequente
<i>Ruscus hypophyllum</i> L.	12	36	Frequente
<i>Schotia brachypetala</i> Sonder.	12	36	Frequente
<i>Trachelospermum jasminoides</i> (Lindl.) Lem.	12	36	Frequente
<i>Yucca elephantipes</i> Reg.	12	36	Frequente
<i>Calendula officinalis</i> L.	13	39	Frequente
<i>Callistephus chinensis</i> (L.) Nees.	13	39	Frequente
<i>Cardiospermum grandiflorum</i> Sw.	13	39	Frequente
<i>Chamaerops humilis</i> L.	13	39	Frequente
<i>Cortaderia selloana</i> (Schult. & Schult. f.) Asch. & Gräbn.	13	39	Frequente
<i>Dombeya wallichii</i> (Lindl.) B. D. Jackson	13	39	Frequente
<i>Felicia amelloides</i> (L.) Voss.	13	39	Frequente
<i>Ficus benjamina</i> L. var. <i>nuda</i> (Miq.) Barrett	13	39	Frequente
<i>Hylocereus triangularis</i> (L.) Britt. & Rose	13	39	Frequente
<i>Osteospermum ecklonis</i> (DC.) Norl.	13	39	Frequente
<i>Paspalum dilatatum</i> Poir.	13	39	Frequente
<i>Phyllanthus tenellus</i> Roxb.	13	39	Frequente
<i>Phytolacca dioica</i> (L.) Moq.	13	29	Frequente
<i>Picconia excelsa</i> (Ait.) DC.	13	39	Frequente
<i>Psidium guajava</i> L.	13	39	Frequente
<i>Schefflera actinophylla</i> (Endl.) Harms	13	39	Frequente
<i>Tibouchina grandifolia</i> Cogn.	13	39	Frequente
<i>Zantedeschia aethiopica</i> (L.) Spreng.	13	39	Frequente
<i>Aloe saponaria</i> (Ait. f.) Haw.	14	42	Frequente
<i>Aloe vera</i> (L.) Burm.	14	42	Frequente
<i>Argyranthemum pinnatifidum</i> (L. f.) Lowe ssp. <i>pinnatifidum</i>	14	42	Frequente
<i>Billbergia vittata</i> Brongn. ex Morel.	14	42	Frequente
<i>Camellia japonica</i> L.	14	42	Frequente
<i>Cupressus lusitanica</i> Mill.	14	42	Frequente
<i>Kalanchoe blossfeldiana</i> Poelln.	14	42	Frequente
<i>Leptospermum scoparium</i> Forst. & Forst. f.	14	42	Frequente
<i>Ochna serrulata</i> (Hochst.) Walp.	14	42	Frequente
<i>Phoenix reclinata</i> Jacq.	14	42	Frequente
<i>Phormium tenax</i> Forst. & Forst. f.	14	42	Frequente
<i>Ageratum houstonianum</i> Mill.	15	45	Frequente
<i>Argyranthemum frutescens</i> (L.) Schultz-Bip.	15	45	Frequente
<i>Begonia minor</i> Jacq.	15	45	Frequente
<i>Brunfelsia pauciflora</i> (Cham. & Scltd.) Benth.	15	45	Frequente
<i>Callistemon rigidus</i> R. Br.	15	45	Frequente
<i>Centranthus ruber</i> (L.) DC.	15	45	Frequente
<i>Cyperus involucratus</i> Rottb.	15	45	Frequente
<i>Cyrtomium falcatum</i> (L. f.) Presl	15	45	Frequente
<i>Ficus elastica</i> Roxb. ex Hornem	15	45	Frequente
<i>Gazania rigens</i> (L.) Gaertn.	15	45	Frequente
<i>Holmskioldia sanguinea</i> Retz.	15	45	Frequente
<i>Mangifera indica</i> L.	15	45	Frequente
<i>Markamia lutea</i> (Benth.) Schum.	15	45	Frequente
<i>Musa x paradisiaca</i> L.	15	45	Frequente

<i>Taxon</i>	Espaços Verdes em que ocorre	Espaços Verdes (%)	Classe
<i>Pelargonium zonale</i> (L.) L'Hérit	15	45	Frequente
<i>Phoenix dactylifera</i> L.	15	45	Frequente
<i>Pittosporum undulatum</i> Vent.	15	45	Frequente
<i>Plumbago auriculata</i> Lam.	15	45	Frequente
<i>Schefflera arboricola</i> (Hayata)	15	45	Frequente
<i>Tecomaria capensis</i> (Thunb.) Spach.	15	45	Frequente
<i>Agave americana</i> L.	16	48	Frequente
<i>Buxus sempervirens</i> L.	16	48	Frequente
<i>Celtis australis</i> L.	16	48	Frequente
<i>Hedychium gardnerianum</i> Ker-Gawl.	16	48	Frequente
<i>Lantana camara</i> L.	16	48	Frequente
<i>Leucanthemum x superbum</i> (J. Ingram) Bergmans ex Kent	16	48	Frequente
<i>Ophiopogon japonicus</i> (L. f.) Ker-Gawl	16	48	Frequente
<i>Osteospermum barberiae</i> (Harv.) Norl.	16	48	Frequente
<i>Persea americana</i> Mill.	16	48	Frequente
<i>Phlebodium aureum</i> (L.) J. Sm.	16	48	Frequente
<i>Pilea microphylla</i> (L.) Liebm.	16	48	Frequente
<i>Schinus molle</i> L. non hort. ex Engl.	16	48	Frequente
<i>Tradescantia pallida</i> (Rose) D. Hunt.	16	48	Frequente
<i>Araucaria bidwillii</i> Hook. f.	17	52	Comum
<i>Begonia x ricinifolia</i> A. Dietr.	17	52	Comum
<i>Cordyline stricta</i> (Sims) Endl.	17	51	Comum
<i>Echium nervosum</i> Dryand.	17	51	Comum
<i>Erythrina crista-galli</i> L.	17	51	Comum
<i>Erythrina lysistemon</i> Hutch.	17	51	Comum
<i>Ficus pumila</i> L.	17	51	Comum
<i>Laurus novocanariensis</i> Rivas Mart. & al.	17	51	Comum
<i>Odontonema strictum</i> (Nees) Kuntze	17	51	Comum
<i>Pyracantha angustifolia</i> (Franch.) Schneid.	17	51	Comum
<i>Rosmarinus officinalis</i> L.	17	51	Comum
<i>Sansevieria trifasciata</i> Prain var. <i>laurentii</i> (De Wild.) N. E. Br.	17	51	Comum
<i>Tibouchina urvilleana</i> (DC) Cogn.	17	51	Comum
<i>Adiantum capillus-veneris</i> L.	18	54	Comum
<i>Araucaria heterophylla</i> (Salisb.) Franco	18	54	Comum
<i>Chamaedorea elegans</i> Mart.	18	54	Comum
<i>Dracaena deremensis</i> Engl.	18	54	Comum
<i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl.	18	54	Comum
<i>Heliconia bihai</i> (L.) L.	18	54	Comum
<i>Hibiscus syriacus</i> L.	18	54	Comum
<i>Pelargonium peltatum</i> (L.) L'Hérit.	18	54	Comum
<i>Pyrostegia venusta</i> (Ker-Gawl.) Miers	18	54	Comum
<i>Tagetes patula</i> L.	18	54	Comum
<i>Wisteria sinensis</i> (Sims) Sweet.	18	54	Comum
<i>Asparagus densiflorus</i> (Kunth) Jassop	19	58	Comum
<i>Clivia nobilis</i> Lindl.	19	58	Comum
<i>Cupressus sempervirens</i> L.	19	58	Comum
<i>Howea forsteriana</i> (C. Moore & F. Muell.) Becc.	19	58	Comum
<i>Strelitzia nicolai</i> Reg. & Körn.	19	57	Comum
<i>Tradescantia zebrina</i> hort. ex. Bosse	19	57	Comum
<i>Bulbine frutescens</i> (L.) Willd.	20	61	Comum
<i>Cycas revoluta</i> Thunb.	20	61	Comum
<i>Farugium japonicum</i> (L.) Kitam.	20	61	Comum
<i>Hedera helix</i> L.	20	61	Comum
<i>Ligustrum lucidum</i> Ait. f.	20	61	Comum
<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassm.	20	61	Comum
<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	20	61	Comum
<i>Yucca gloriosa</i> L.	20	61	Comum
<i>Agathis robusta</i> (C. Moore ex. F. Muell.) Bail.	21	64	Comum
<i>Aloe arborescens</i> Mill.	21	64	Comum
<i>Eugenia uniflora</i> L.	21	64	Comum
<i>Livistona chinensis</i> (Jacq.) R. Br. ex Mart.	21	64	Comum
<i>Phoenix roebelinii</i> O' Brien.	21	64	Comum
<i>Rhododendron mucronatum</i> G. Don.	21	64	Comum
<i>Salvia splendens</i> Sell ex Roem. & Scult.	21	64	Comum
<i>Agave attenuata</i> Salm-Dyck	22	67	Comum
<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> H. A. Wendl. & Drude.	22	67	Comum
<i>Brugmansia versicolor</i> Lagerh.	22	67	Comum
<i>Codiaeum variegatum</i> (L.) Bl. var. <i>pictum</i> (Lodd) Muell. Arg.	22	67	Comum
<i>Cordyline terminalis</i> (L.) Kunth.	22	67	Comum
<i>Cyathea cooperi</i> (F. Mueller) Domin.	22	67	Comum
<i>Hydrangea macrophylla</i> (Thunb.) Ser.	22	67	Comum
<i>Pteris vittata</i> L.	22	67	Comum
<i>Punica granatum</i> L.	22	67	Comum

<i>Taxon</i>	Espaços Verdes em que ocorre	Espaços Verdes (%)	Classe
<i>Washingtonia filifera</i> (Lind. ex André) H. A. Wendl	22	67	Comum
<i>Crassula ovata</i> (Mill.) Druce.	23	70	Comum
<i>Duranta erecta</i> L.	23	70	Comum
<i>Iresine herbstii</i> Hook.	23	70	Comum
<i>Nolina recurvata</i> (Lem.) Hemsl.	23	70	Comum
<i>Apollonias barbujana</i> (Cav.) Bomm.	24	73	Comum
<i>Bergenia crassifolia</i> (L.) Fritsch.	24	73	Comum
<i>Brachychiton acerifolius</i> Cunn. ex. F. Muell.	24	73	Comum
<i>Chlorophytum comosum</i> (Thumb.) Jacques	24	73	Comum
<i>Grevillea robusta</i> A. M. Cunn. Ex. R. Br.	24	73	Comum
<i>Impatiens walleriana</i> Hook. f.	24	73	Comum
<i>Nephrolepis cordifolia</i> (L.) Presl.	24	73	Comum
<i>Abelia x grandiflora</i> (André) Rehd.	25	76	Muito Comum
<i>Asparagus setaceus</i> (Kunth) Jassop	25	76	Muito Comum
<i>Chorisia speciosa</i> A. St. Hil.	25	76	Muito Comum
<i>Clivia miniata</i> Regel	25	76	Muito Comum
<i>Euphorbia pulcherrima</i> Willd. ex Klotzsch.	25	76	Muito Comum
<i>Lagerstroemia indica</i> L.	25	76	Muito Comum
<i>Monstera deliciosa</i> Liebm.	25	76	Muito Comum
<i>Plumeria rubra</i> L. var. <i>acutifolia</i> (Poir.) Woodson.	25	76	Muito Comum
<i>Spathodea campanulata</i> Beauv.	25	76	Muito Comum
<i>Cinnamomum camphora</i> (L.) Sieb.	26	79	Muito Comum
<i>Jacaranda mimosifolia</i> D. Don.	26	79	Muito Comum
<i>Ocotea foetens</i> (Aiton) Baill.	26	79	Muito Comum
<i>Canna x generalis</i> L.H. Bail.	27	82	Muito Comum
<i>Bougainvillea glabra</i> Choisy	28	85	Muito Comum
<i>Dracaena draco</i> (L.) L. ssp. <i>draco</i>	28	85	Muito Comum
<i>Magnolia grandiflora</i> L.	28	85	Muito Comum
<i>Stenotaphrum secundatum</i> (Walter) Kuntze	28	85	Muito Comum
<i>Acalypha wilkesiana</i> Muell. Arg.	29	88	Muito Comum
<i>Agapanthus praecox</i> Willd. ssp. <i>orientalis</i> (Leighton) Leighton	29	88	Muito Comum
<i>Nerium oleander</i> L.	30	91	Muito Comum
<i>Strelitzia reginae</i> Banks ex Dryand	30	91	Muito Comum
<i>Hibiscus rosa-sinensis</i> L.	31	94	Muito Comum
<i>Phoenix canariensis</i> Chabaud.	31	94	Muito Comum